

临床医学

多选题试题汇编

浙江医科大学

1984年7月

编写说明

一、多选题考试方法具有考查知识面广，评分标准客观、方法简便等优点，在国外已是一种相当通行的考试方法。近年来，在我国医学领域的各种考试中也较多采用。我们编印多选题汇编的目的在于使读者适应并熟悉这种考试方法和对各学科基础理论及临床知识的巩固和提高。

二、我校在参加卫生部组织的1982年毕业生统考的基础上，曾编写了《临床医学多选题汇编》，深受广大师生和读者欢迎。现在我们又组织了各专业有经验的临床医师，从我校82届、83届统考复习、模拟考试以及84届备考使用的试题中，按照卫生部规定命题范围和原则，经修删后选择其中4,000余题汇编成册，供医学生复习用，也可作为临床医师教学、医疗工作以及医护人员晋升考试时参考。

三、本汇编分内科学、外科学、妇产科学和儿科学四部分，包括十六个学科内容。为便于复习和查阅，均按内容分节，各节自立题序，并按A、B、C、K四种题型依次排列，答案以教材为依据，附在各节之后。

四、为了加强基础知识与临床实践的联系，增加了应用题的数量，约占总题量的25%，并附有X线片、心电图等图片百余幅，提供读者学习参考。

因编写时间仓促，也限于我们的业务水平，本汇编中难免存在不足和错误，希望读者批评指正。

编者

主编：吕学正

编委：（按姓氏笔划为序）

王友赤 叶育林 朱士鑫 刘富光
林建灿 郑宝琴 夏惕勤 曹敏

福建人民出版社

主 要 编 写 人 员

内科学： 钱可大 黄怀德 金宏义 陈恭森 刘富光 黄文礼 刘 银 范小莹 汤德骥 王友赤 王振生 夏惕勤 宋作珪 叶育林 丁德云 郭公宜

消化系统： 钱可大 黄怀德
循环系统： 金宏义 陈恭森
呼吸系统： 刘富光 黄文礼 刘 银
泌尿系统： 范小莹 汤德骥
造血系统： 王友赤 王振生
内分泌系统： 夏惕勤 宋作珪
传染病： 叶育林
神经系统： 丁德云
精神病： 郭公宜

外科学：

外科学总论： 吕学正 冯懿正 丁岳梁 陈庆廉
普通外科： 林建灿 李性定 潘 奎 朱士鑫 王家骅
骨 科： 夏贤良
泌尿外科： 史时芳
胸心外科： 叶丁生
神经外科： 吕学正

妇产科学： 郑宝琴 孙 进 沈明龙

儿科学： 曹 敏 龚理征 康曼丽 孙 琼

浙江医科大学医教处组编

录 目

答 题 说 明

〔A型题〕

每道题下面都有A、B、C、D、E五个备选答案,答题时只许从中选择一个最合适的答案。

〔B型题〕

上面的A、B、C、D、E是共用的备选答案,下面有一道至数道考题。答题时,要为每一道考题从共用的备选答案中选择一个答案。每个答案可以被选用一次或一次以上,也可以一次不选用。

〔C型题〕

上面A、B、C、D是四个共用的备选答案,下面有一道或数道考题。答题时要为每一道考题从共用的备选答案中选择一个合适的答案。每个答案可以被选用一次或一次以上,也可以一次不选用。

〔K型题〕

每道考题下面有①②③④四个答案,通过不同的组合,构成A、B、C、D、E五个备选答案,其组合如下:

A. ①+②+③

B. ①+③

C. ②+④

D. ④

E. ①+②+③+④

不论哪一种题型的考题,答题时,只许从备选答案中选择一个合适的答案。

目 录

第一篇 内科学

第一章 消化系统.....	1~28
第一节 胃炎(1) 第二节 消化性溃疡(3) 第三节 肝硬化(9)	
第四节 原发性肝癌(15) 第五节 肝性昏迷(18) 第六节 急性胰腺炎(19)	
第七节 结核性腹膜炎与肠结核(22)	
〔附〕 有机磷农药中毒(26)	
第二章 循环系统.....	28~57
第一节 心功能不全(28) 第二节 心律失常(33) 第三节 风湿热、风湿性心脏瓣膜病(37)	
第四节 高血压病(42) 第五节 动脉粥样硬化、冠状动脉粥样硬化性心脏病、心源性休克(45)	
第六节 感染性心内膜炎、心包炎(50) 第七节 肺源性心脏病(53) 第八节 心肌炎与心肌病(55)	
第三章 呼吸系统.....	57~83
第一节 支气管疾病(57) 第二节 肺部感染性疾病(63) 第三节 肺结核病(71)	
第四节 肺癌(75) 第五节 胸膜疾病(80)	
第四章 泌尿系统.....	83~100
第一节 总论(83) 第二节 肾小球疾病(87) 第三节 肾盂肾炎(95)	
第四节 肾功能不全(98)	
第五章 造血系统.....	100~116
第一节 贫血(100) 第二节 白细胞疾病(108) 第三节 出血性疾病(113)	
第六章 内分泌代谢病.....	116~128
第一节 甲状腺功能亢进症(116) 第二节 糖尿病(122)	
第七章 传染病.....	128~168
第一节 总论(128) 第二节 病毒性肝炎(133) 第三节 伤寒与副伤寒(137)	
第四节 霍乱与副霍乱(140) 第五节 细菌性痢疾与阿米巴病(144)	
第六节 流行性脑脊髓膜炎(148) 第七节 流行性乙型脑炎(152)	
第八节 疟疾(155) 第九节 流行性出血热(159)	
第十节 钩端螺旋体病(163) 第十一节 血吸虫病(166)	
第八章 神经系统.....	168~178
第一节 总论(168) 第二节 周围神经病(170) 第三节 脊髓疾病(172)	

- 第四节 脑血管病(173) 第五节 震颤麻痹(175) 第六节 癫痫(176)
第七节 肌肉疾病(177)

第九章 精神病.....178~186

- 第一节 总论(178) 第二节 精神分裂症(182) 第三节 神经官能症(184)
第四节 症状性精神病与脑器质性精神病(185) 第五节 精神发育不全(186)

第二篇 外科学

第一章 外科学总论.....187~229

- 第一节 无菌术(187) 第二节 水、电解质代谢和酸碱平衡的失调(189)
第三节 输血(197) 第四节 休克(198) 第五节 急性肾功能衰竭(200)
第六节 麻醉(202) 第七节 复苏(205) 第八节 手术前准备和手术后处理(206)
第九节 外科感染(211) 第十节 损伤(216) 第十一节 烧伤(220) 第十二节 肿瘤(226)

第二章 普通外科.....229~287

- 第一节 颈部疾病(229) 第二节 乳房疾病(234) 第三节 腹外疝(238)
第四节 腹部闭合性损伤(241) 第五节 急性化脓性腹膜炎(245)
第六节 胃十二指肠疾病(248) 第七节 肠梗阻(254)
第八节 肠息肉及肠肿瘤(257) 第九节 阑尾炎(260) 第十节 肛管疾病(263)
第十一节 肝脏疾病(266) 第十二节 上消化道出血(270)
第十三节 胆道疾病(273) 第十四节 胰腺疾病(278) 第十五节 周围血管疾病(285)

第三章 骨科.....288~303

- 第一节 创伤(288) 第二节 腰腿痛(293) 第三节 骨与关节化脓性感染(295)
第四节 骨与关节结核(298) 第五节 骨肿瘤(300)
第六节 其他(303)

第四章 泌尿外科.....304~313

- 第一节 损伤(304) 第二节 感染(306) 第三节 结核(307)
第四节 结石(309) 第五节 肿瘤(311) 第六节 梗阻(313)

第五章 胸腔外科.....314~323

- 第一节 胸部损伤(314) 第二节 缩窄性心包炎(320) 第三节 食管癌(321)

第六章 神经外科.....324~330

- 第一节 颅内压增高(324) 第二节 颅脑损伤(326)

第三篇 妇产科学

第一章 女性生殖系统解剖及生理	332~335				
第一节 女性生殖系统解剖 (332)	第二节 女性生殖系统生理 (333)				
第二章 生理产科	335~340				
第一节 妊娠生理及诊断 (335)	第二节 正常分娩及产褥 (338)				
第三章 病理产科	340~366				
第一节 流产 (340)	第二节 异位妊娠 (343)	第三节 妊娠中毒症 (345)	第四节 前置胎盘 (347)	第五节 胎盘早期剥离 (349)	
第六节 妊娠合并心脏病 (350)	第七节 妊娠合并病毒性肝炎 (352)	第八节 异常分娩 (353)	第九节 子宫破裂 (359)	第十节 产后出血 (360)	
第十一节 羊水栓塞 (362)	第十二节 胎儿窘迫及新生儿窒息 (363)	第十三节 羊水过多等 (365)	第十四节 产褥感染 (365)		
第四章 妇 科	366~383				
第一节 女性生殖系统炎症 (366)	第二节 女性生殖系统肿瘤 (370)	第三节 滋养层细胞肿瘤 (376)	第四节 月经失调 (378)	第五节 子宫内膜异位症 (381)	第六节 子宫脱垂 (382)
第五章 计划生育	383~385				

第四篇 儿科学

第一章 儿科基础	386~390						
第二章 新生儿疾病	390~394						
第三章 系统疾病	394~427						
第一节 营养缺乏病 (394)	第二节 婴儿腹泻及补液 (396)	第三节 小儿肺炎 (402)	第四节 先天性心脏病 (404)	第五节 小儿肾炎及肾病 (411)	第六节 小儿贫血 (415)	第七节 小儿结核病 (421)	第八节 麻疹及化脓性脑膜炎 (423)

第一篇 内 科 学

第一章 消化系统

第一节 胃 炎

〔A 型 题〕

1. 下列哪类胃炎与胃癌的关系较为密切?

- A. 浅表性胃炎
- B. 肥厚性胃炎
- C. 萎缩性胃炎
- D. 糜烂性胃炎
- E. 出血性胃炎

2. 下列哪项不符合萎缩性胃炎

- A. 胃酸分泌可能正常
- B. 多有消化道症状
- C. 与胃癌关系较密切
- D. 易发生恶性贫血
- E. 抗壁细胞抗体阴性

3. 关于慢性胃炎的病理下列哪项是不正确的?

- A. 慢性胃炎常兼有浅表性和萎缩性病变
- B. 肥厚性胃炎难以得到活检证实
- C. 假幽门腺化生仅见于萎缩性胃炎
- D. 肠腺化生可见于浅表或萎缩性胃炎
- E. 胃上皮细胞不典型增生, 仅见于萎缩性胃炎

4. 对萎缩性胃炎, 有较肯定诊断意义的是:

- A. 胃镜检查发现, 粘膜红白相间
- B. 钡餐造影发现胃皱襞相对减少

C. 胃脱落细胞检查, 有典型的炎症细胞

D. 抗壁细胞抗体阳性及低酸

E. 活检有胃腺体细胞消失, 腺窝增生及肠腺化生

5. 胃粘膜屏障是指:

- A. 盐酸和胃蛋白酶的消化作用
- B. 胃粘膜的微循环
- C. 胃上皮细胞膜的脂蛋白层
- D. 胃上皮细胞更新
- E. 胃粘膜表面的粘液层

6. 60岁, 男性, 间歇性上腹部不适, 食欲减退、消瘦、乏力已二年余。胃液分析: 基础酸分泌量为0 (BAO 正常为1—2毫当量/小时), 最大酸分泌量5毫当量/小时, (MAO正常为17—23毫当量/小时), 壁细胞总数2.5亿个, 下列疾病哪种最可能?

- A. 浅表性胃炎
- B. 肥厚性胃炎
- C. 胃溃疡
- D. 萎缩性胃体胃炎
- E. 萎缩性胃窦胃炎

题7~8. 40岁, 因上腹部不适及黑便而作胃镜检查, 胃窦部粘膜严重充血、水肿、小弯处有多处粘膜剥脱及粘膜下出血点。病理切片中有中性细胞、淋巴细胞浸润, 血管破坏及出血。曾因高血压病服用利血平等药物。

7. 应考虑诊断为:

- A. 糜烂、出血性胃炎
- B. 浅表性胃炎
- C. 胃窦部多发性溃疡
- D. 萎缩性胃炎
- E. 胃泌素瘤

8. 下列哪种药物对上例的治疗较为适宜?

- A. 生胃酮
- B. 丙谷胺
- C. 654—2
- D. 重碳酸钠
- E. 维生素U

题9~10. 26岁女性, 上腹部隐痛、腹胀, 食欲减退, 消瘦及乏力已有半年余。胃镜检查发现胃体前壁粘膜斑块样充血, 红白相间, 以红为主, 较多粘液, 病理检查: 有淋巴细胞、浆细胞浸润及肠腺化生。

9. 应考虑诊断为:

- A. 浅表性胃炎
- B. 萎缩性胃炎
- C. 糜烂性胃炎
- D. 肥大性胃炎
- E. 早期胃癌

10. 钡餐检查时, 下列哪项发现对上例诊断最有帮助?

- A. 无显著病变可见
- B. 胃粘膜断裂及僵直
- C. 胃蠕动明显减少
- D. 胃粘膜星状聚合
- E. 胃轮廓外有小龛影

11. 25岁女性, 胃镜检查时发现胃窦部粘膜明显充血、水肿, 有较多粘液, 粘膜下可见少量出血点, 幽门孔有较多胆汁反流, 下列药物哪种较好?

- A. 胆络胺或胃复安
- B. 生胃酮
- C. 普鲁本辛

- D. 链霉素口服
- E. 碳酸钙

[B型题]

- A. 抗线粒体抗体
 - B. 抗内因子抗体
 - C. G细胞抗体
 - D. 嗜异抗体
 - E. 抗平滑肌抗体
12. 胃窦胃炎可能检出
13. A型胃炎合并恶性贫血时可能检出

- A. 上消化道出血
 - B. 恶性贫血
 - C. 胃癌
 - D. 反流性食管炎
 - E. 幽门不全梗阻
14. 胃体胃炎(A型胃炎)特有的并发症是
15. 胃窦胃炎(B型胃炎)可能演变为

[C型题]

- A. A型胃炎
 - B. B型胃炎
 - C. 两者都有
 - D. 两者都无
16. 可引起上消化道出血
17. 可引起血清胃泌素浓度增高

[K型题]

18. 下列哪些疾病伴有高胃酸?
- ① 胃泌素瘤
 - ② 胃息肉并萎缩性胃炎
 - ③ 十二指肠溃疡
 - ④ 胃溃疡

19. 关于慢性胃炎, 下列哪些是正确的?

- ① 及时治疗, 可能治愈
- ② 浅表性胃炎可能演变为萎缩性胃炎
- ③ 治疗时, 应去除致病因素
- ④ 中国人以B型胃炎多见

20. 钡餐胃造影时, 出现以下哪项征象, 可诊断为胃窦胃炎?

- ① 粘膜呈钝锯齿状
- ② 胃窦有轮廓内的小龛影
- ③ 痉挛和变形
- ④ 胃壁僵直及无蠕动

答 案

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. D | 3. E | 4. E |
| 5. C | 6. D | 7. A | 8. B |
| 9. A | 10. A | 11. A | 12. C |
| 13. B | 14. B | 15. C | 16. C |
| 17. A | 18. B | 16. E | 20. B |

第二节 消化性溃疡

〔A 型 题〕

1. 关于胃溃疡的发病机制, 下列哪项是不正确的?

- A. 胃粘膜屏障破坏, 氢离子回渗和十二指肠液反流
- B. 胃窦部潴留, 胃泌素分泌增多
- C. 壁细胞总数增多, 胃酸分泌增多
- D. 十二指肠液反流, 引起胃窦粘膜萎缩
- E. 以上都不是

2. 柯兴氏 (Cushing's) 溃疡的病因是,

- A. 白塞氏病
- B. 胃泌素瘤
- C. 败血症
- D. 脑外伤
- E. 大面积烧伤

3. 消化性溃疡病变的深度, 至少应达到,

- A. 胃粘膜内, 不超过基底膜
- B. 粘膜层
- C. 粘膜下层
- D. 粘膜肌层
- E. 浆膜下层

4. 复合溃疡系指:

- A. 胃窦及胃体均有溃疡
- B. 胃体及贲门均有溃疡
- C. 胃窦部有二个以上的溃疡
- D. 幽门管及胃窦部均有溃疡
- E. 胃及十二指肠球部均有溃疡

5. 下列哪项可较为肯定地诊断消化性溃疡?

- A. 慢性、周期性、节律性上腹疼痛
- B. 服用制酸剂可使疼痛减轻或消失
- C. 最大酸分泌量 (MAO) 大于60毫当量/小时
- D. 反复上消化道出血及BAO增高
- E. 钡餐X线造影发现胃轮廓外龛影

6. 关于球后溃疡下列哪项是正确的?

- A. 病变在十二指肠球部后壁
- B. 溃疡直径较大, 钡餐检查易发现
- C. 溃疡愈合时, 可引起幽门梗阻
- D. 用甲氧咪胺治疗, 效果良佳
- E. 常需外科手术治疗

7. 若消化性溃疡的病情发展快, 常为穿透性, 易引起梗阻, 缺乏疼痛的典型节律性, 内科治疗效果差, 考虑溃疡的部位

在:

- A. 胃角部巨大溃疡
- B. 球后溃疡
- C. 胃窦部多发性溃疡
- D. 幽门管溃疡
- E. 球部巨大溃疡

8. 关于十二指肠球部溃疡, 下列哪项是正确的?

- A. 壁细胞总数较正常人低
- B. 疼痛规律为: 疼痛—进食—缓解
- C. 胃酸测定, 基础胃游离酸分泌量与最大胃游离酸分泌量比值超过60%
- D. X线显示球部畸形、激惹, 可以确诊
- E. 治疗药物, 首选生胃酮

9. 下列组合中, 哪项是正确的?

- A. 粘膜桥形皱襞—胃息肉
- B. 球部三叶形变形—十二指肠憩室
- C. 粘膜杵状中断—胃癌
- D. 粘膜皱襞集中—慢性肥厚性胃炎
- E. 十二指肠框增大—胆囊肿大

10. 穿透性溃疡的常见部位在:

- A. 食管贲门联接处
- B. 胃体后壁
- C. 胃角小弯
- D. 胃体大弯
- E. 胃窦前壁

11. 下列哪项需考虑胃溃疡癌变

- A. 食欲减退、消瘦及乏力
- B. 多发性胃溃疡
- C. 大便潜血试验阳性
- D. 抗胆碱能药物治疗效果不佳
- E. 五肽胃泌素试验示胃酸缺乏

12. 下列哪项, 需考虑为恶性溃疡?

- A. 龛影周围粘膜有星状聚合征

B. 钡餐造影出现粘膜皱襞中断

C. 龛影位于胃轮廓之外

D. 大便潜血试验阳性

E. 胃酸稍减低

13. 可能引起空腹和夜间胃酸分泌增高的疾病是:

- A. 胃溃疡
- B. 浅表性胃炎
- C. 胃息肉
- D. 肥大性胃炎
- E. 以上都不是

注: 答案是十二指肠溃疡

14. 判断胃酸缺乏最可靠的指标是:

- A. 空腹胃液的pH为7.0
- B. 基础酸分泌量(BAO)为0
- C. 最大酸分泌量(MAO)为0
- D. 胃液中找到四联球菌
- E. 空腹胃液中无游离酸

15. 上消化道出血患者, 下列哪些情况需作选择性动脉造影?

- A. 十二指肠球部憩室反复出血
- B. 出血量低于5毫升/分
- C. 为了解周围循环衰竭的情况
- D. 纤维胃镜检查后, 仍未能明确病变
- E. 可作为首选的诊断方法

16. 关于上消化道出血, 下列哪项是错误的:

- A. 屈氏韧带以上的消化道出血
- B. 常见的病因是消化性溃疡
- C. 尿毒症是引起出血的原因之一
- D. 大便隐血试验阳性, 指出血量在5毫升以上
- E. 发热与肠道内积血有关

17. 碳酸钙用于治消化性溃疡时, 下列哪项是不正确的?

- A. 本药是不溶性的药物
- B. 剂量为0.5~1.0克, 每天三次
- C. 可引起便秘
- D. 需检查肾功能
- E. 毒性小可长期应用, 尤其适宜老年人

18. 抗胆碱能药物适于治疗下列哪种疾病?

- A. 反流性食管炎
- B. 胃溃疡
- C. 十二指肠溃疡
- D. 反流性胃炎
- E. 幽门梗阻

19. 用抗胆碱能药物治疗消化性溃疡时, 下列哪项不是禁忌症?

- A. 虹膜睫状体炎
- B. 反流性食管炎
- C. 近期溃疡出血
- D. 青光眼
- E. 前列腺肥大

20. 关于甲氰咪胺, 下列哪项是不正确的?

- A. 主要用于治疗十二指肠溃疡
- B. 每日三次, 每次200毫克, 睡前服400毫克
- C. 为组胺H₂受体拮抗剂
- D. 疗程为4~6周, 复发率低
- E. 抑制胃酸、胃蛋白酶分泌

21. 关于生胃酮, 下列哪项是不正确的?

- A. 主要用于治疗胃溃疡
- B. 药物掩盖胃溃疡表面
- C. 可抑制胃蛋白酶
- D. 可引起低血钾甚至死亡
- E. 为预防水肿可合用双氢克尿塞和钾盐

22. 胃溃疡出血, 下列哪项治疗较合理?

- A. 阿托品注射

- B. 凝血质静脉滴注
- C. 三腔二囊管压迫止血
- D. 去甲肾上腺素胃内滴注
- E. 胃复安肌肉注射

23. 消化性溃疡的手术治疗指征为:

- A. 积极内科治疗无效
- B. 有二个以上溃疡
- C. 胃体小弯垂直部的溃疡
- D. 患者要求手术治疗
- E. 以上都不是

题24~25. 45岁男性, 反复发作上腹部疼痛已三年, 黑便二天入院, 曾作钡餐胃造影发现胃体小弯垂直部有一个约3.5×1.5厘米轮廓外龛影, 有粘膜星形聚合及对侧切迹。

24. 引起出血的原因可能为:

- A. 胃癌
- B. 胃溃疡
- C. 胃息肉
- D. 胃憩室
- E. 胃平滑肌瘤

25. 下列哪种药物不适用于该病的治疗:

- A. 三钾二枸橼合剂
- B. 胃复安
- C. 硫糖铝
- D. 丙谷胺
- E. 胃蛋白酶合剂

26. 男性, 28岁, 反复关节游走性疼痛二年, 常服水杨酸类药物, 可获缓解, 呕血、黑便三天, 经治疗止血后二周, 作胃肠钡餐检查见附图一。应考虑诊断是:

- A. 胃粘膜脱垂症
- B. 胃溃疡
- C. 出血糜烂性胃炎
- D. 慢性萎缩性胃炎

E. 胃癌

27. 男性, 50岁, 上腹疼痛四年, 有暖气反酸, 半年来呕血及黑便各一次, 有慢性支气管炎及肺气肿史已七年, 胃肠钡餐检查见附图二。应考虑诊断是:

- A. 胃息肉
- B. 胃癌
- C. 胃溃疡
- D. 慢性胃炎
- E. 十二指肠溃疡

28. 男性, 30岁, 上腹疼痛五年, 近半年来节律性疼痛消失, 黑便二次, 胃液分析BAO 8毫当量/小时, 经胃肠钡餐检查见附图三。应考虑诊断是:

- A. 胃溃疡
- B. 十二指肠溃疡
- C. 慢性胃炎
- D. 胃癌
- E. 幽门管溃疡

29. 30岁, 男性, 反复上腹部疼痛五年, 黑便三次。一月来上腹痛加重, 每日呕吐大量胃内容及食物, 体检: 消瘦, 上腹胀隆, 可见胃蠕动波, 有拍水声, 经胃肠钡餐检查见附图四。应考虑诊断是:

- A. 胃扩张
- B. 胃粘膜脱垂
- C. 胃肉瘤
- D. 胃癌伴幽门梗阻
- E. 十二指肠溃疡伴幽门梗阻

题30~32. 28岁女性, 因柏油样大便三天入院。无服药物及特殊饮食史。三年来饥饿时常有上腹不适。上腹部有轻压痛, 大便潜血试验(++++)。

30. 引起出血原因最可能为:

- A. 急性糜烂出血性胃炎
- B. 贲门粘膜撕裂症

C. 幽门管溃疡

D. 十二指肠溃疡

E. 胃癌

31. 可作下列哪项检查:

- A. 剖腹探查
- B. 胃镜检查
- C. 胃液分析
- D. B型超声检查
- E. 以上都不是

32. 下列哪个药物较为实用及适宜:

- A. 甲氰咪胺
- B. 生胃酮
- C. 普鲁本辛
- D. 重碳酸钠
- E. 前列腺素E₂ (PGE₂)

题33~34. 26岁男性, 反复发作上腹部疼痛伴呕吐2年, 吐出物有时为宿食, 吐后症状可减轻。一周来症状又有发作入院。体检: 较消瘦, 轻度脱水, 上腹部正中有轻压痛, 有震水音, 大便潜血试验(+), 钡餐造影未见显著病变

33. 应考虑诊断为:

- A. 球后溃疡
- B. 幽门管溃疡
- C. 早期胃癌
- D. 慢性胃炎
- E. 胃溃疡疤痕形成

34. 为明确诊断可作:

- A. 气钡双重胃造影
- B. 纤维胃镜检查
- C. 抗壁细胞及G细胞抗体检查
- D. 选择性血管造影
- E. 胃液脱落细胞检查

题35~37. 60岁男性, 餐后二小时出现上腹部疼痛二年, 伴有食欲减退及乏力。入

院前一天饮白酒及进食鸭块后出现上腹部剧痛, 呕吐。体检: 体温 38°C , 血压 $80/40$, 腹平坦, 剑突下有压痛及反跳痛, 肝浊音界消失, 白细胞 $15,000$, 中性 92% , 血淀粉酶 250 苏氏单位。

35. 应考虑诊断为:

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 消化性溃疡穿孔
- D. 胃癌穿孔
- E. 急性心肌梗塞

36. 进一步确诊宜作:

- A. 重复血、尿淀粉酶检查
- B. 心电图检查
- C. 胸、腹部联合X线检查
- D. 急症胃镜检查
- E. B型超声扫描检查

37. 首先考虑的治疗措施为:

- A. 止痛、抗生素及抑肽酶
- B. 补液、静脉滴注阿拉明及多巴胺
- C. 迅速改善全身情况后剖腹探查
- D. 利胆药及先锋霉素静脉滴注
- E. 补液、胃肠减压及抗生素

题38~39. 28岁女性, 上腹部不适已三年余, 近二月来有不规则疼痛, 食欲减退及体重减轻, 大便次数增多, 体温 37.8°C , 血红蛋白 7.5 克, 血沉 78 毫米, 白细胞 4500 , 血HbsAg(-), 10次大便潜血试验中7次阳性(+~++)。

38. 考虑诊断为:

- A. 慢性胃炎
- B. 消化性溃疡
- C. 结核性腹膜炎
- D. 肝炎
- E. 胃癌

39. 进一步明确诊断, 宜作哪项检查?

- A. 胃镜检查及活检
- B. 腹腔诊断性穿刺
- C. 胃液BAO, MAO及PAO测定
- D. 肝功能检查
- E. 乙型肝炎的抗原抗体系统检查

40. 40岁男性, 上腹部疼痛、食欲减退及偶有呕吐2月余。大便潜血试验 $\pm\sim++$, 钡餐检查胃窦小弯轮廓内缺损, 周围粘膜僵直, 蠕动减少, 考虑诊断为:

- A. 胃窦溃疡
- B. 胃窦胃炎
- C. 胃窦穿透性溃疡
- D. 胃粘膜脱垂症
- E. 胃癌

41. 40岁男性, 上腹部隐痛二年余, 加重三月, 仍为节律性疼痛, 黑便二天, 体检上腹部轻度压痛。钡餐造影检查见附图五。诊断应考虑是:

- A. 慢性胃炎
- B. 胃溃疡
- C. 胃癌
- D. 胃息肉
- E. 十二指肠溃疡

42. 男性35岁, 上腹部节律性疼痛三年, 偶有呕吐胃内容, 量不多, 黑便三次, 体检: 上腹部有轻压痛, 粪潜血试验(+). 胃肠钡餐检查见附图六。应考虑诊断是:

- A. 胃溃疡
- B. 十二指肠溃疡
- C. 复合性溃疡
- D. 胃癌
- E. 胃底静脉曲张

43. 男性, 50岁, 上腹部隐痛半年, 无反酸暖气, 近半年食欲差, 疼痛加重, 体检: 上腹稍压痛。胃钡餐检查见附图七。应考

考虑诊断是:

- A. 胃溃疡
- B. 十二指肠溃疡
- C. 胃粘膜脱垂
- D. 胃癌
- E. 慢性胃炎

题44~46, 45岁男性早餐后一小时, 解出棕色成形大便, 起立后突然晕倒, 大汗淋漓, 曾因发热、头痛而服“退热止痛片”二天。体温 37.9℃, 血压80/60, 脉搏 128次/分, 神志清, 面色苍白, 心律整齐。二肺(-), 肝浊音界存在, 肠鸣音亢进, 血红蛋白14.5克, 白细胞10,300, 中性88%。

44. 最可能的诊断为:

- A. 低血糖
- B. 脑血管意外
- C. 感染性休克
- D. 上消化道出血
- E. 癫痫及上呼吸道感染

45. 下列哪项检查对本例的诊断最有帮助?

- A. 胸、腹部X线透视
- B. 血糖测定
- C. 脑脊液检查
- D. 大便潜血试验
- E. 脑电图检查

46. 首先考虑的治疗措施为:

- A. 补液及输血
- B. 苯妥英钠及抗生素
- C. 补液及地塞米松
- D. 广谱抗生素, 升压药物及激素
- E. 高渗葡萄糖及吸氧

B. Mallory-Weiss (麦一魏)氏综合征

C. 两者均有关

D. 两者均无关

47. 引起上消化道出血的是:

48. 贲门粘膜撕裂症是指:

〔K 型 题〕

49. 关于消化性溃疡, 下列哪些是正确的?

- ① 缓解期, 表明溃疡已愈合
- ② 慢性过程, 周期性发作
- ③ 暴饮暴食是主要的发病因素
- ④ 部份患者, 可能以并发症为首先出现的临床表现

50. 消化性溃疡疼痛发生的机理是:

- ① 溃疡和其周围组织的炎症
- ② 局部肌肉张力增高或痉挛
- ③ 胃酸对溃疡面的刺激
- ④ 溃疡与周围组织粘连

51. 幽门管溃疡的特点是:

- ① 有明显的节律性疼痛
- ② 常有呕吐
- ③ 钡餐检查容易发现
- ④ 内科治疗效果不理想

52. 消化性溃疡合并幽门梗阻的临床表现有:

- ① 餐后上腹痛, 胃蠕动波拍水声
- ② 大量呕吐, 吐后症状减轻
- ③ 呕吐物为含酸酵宿食
- ④ 失水、电解质和酸碱平衡紊乱及营养不良

53. 消化性溃疡的常见并发症为:

- ① 出血
- ② 穿孔
- ③ 幽门梗阻

〔C 型 题〕

A. Zollinger-Ellison (卓一艾)氏综合征

④ 返流性食管炎

54. 上消化道大量出血后, 血非蛋白氮增高的原因是:

- ① 继续出血或再出血
- ② 蛋白消化产物的吸收
- ③ 肾小球滤过率下降
- ④ 急性肾功能衰竭

55. 上消化道出血患者, 下列哪些情况提示继续出血?

- ① 黑粪次数增加伴肠鸣亢进
- ② 血红蛋白与红细胞压积继续下降
- ③ 血尿素氮持续增高
- ④ 输血后, 仍有中心静脉压波动

56. 关于胃溃疡癌变, 下列哪些是正确的?

- ① 粪便隐血试验持续阳性
- ② 无并发症而疼痛的节律性丧失, 治疗效果差或无效
- ③ 经X线、胃镜检查后, 仍不能确诊, 应考虑剖腹探查
- ④ 胃溃疡癌变多见, 尤其是大溃疡

57. 治疗消化性溃疡时, 下列药物组合, 哪些是不正确的?

- ① 胃复安和阿托品
- ② 丙谷胺和硫糖铝
- ③ 生胃酮和安体舒通
- ④ 甲氰咪胺和碳酸钙

58. 654—2可用于下列哪种疾病?

- ① 胃溃疡
- ② 消化性溃疡近期出血
- ③ 消化性溃疡伴幽门梗阻
- ④ 十二指肠溃疡

59. 关于制酸剂治疗消化性溃疡, 下列哪些是不正确的?

- ① 片剂服用方便, 效果也较好

② 症状消失后, 继续服用以防复发

③ 增加每次剂量, 至胃蛋白酶完全灭活

④ 每餐后一小时及睡前服用一次, 效果较好

60. 关于胃泌素瘤, 下列哪些是正确的?

- ① 手术切除溃疡, 效果好
- ② 胃窦部大而深的溃疡
- ③ 用解痉剂治疗, 效果较好
- ④ 为高胃酸分泌

答 案

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. D | 3. D | 4. E |
| 5. E | 6. E | 7. D | 8. B |
| 9. C | 10. B | 11. E | 12. B |
| 13. E | 14. C | 15. D | 16. E |
| 17. E | 18. C | 19. A | 20. D |
| 21. B | 22. D | 23. A | 24. B |
| 25. E | 26. C | 27. C | 28. B |
| 29. E | 30. D | 31. B | 32. A |
| 33. B | 34. B | 35. C | 36. C |
| 37. C | 38. E | 39. A | 40. E |
| 41. C | 42. D | 43. D | 44. D |
| 45. D | 46. A | 47. C | 48. B |
| 49. C | 50. A | 51. C | 52. E |
| 53. A | 54. E | 55. E | 56. A |
| 57. B | 58. D | 59. A | 60. D |

第三节 肝硬化

[A 型 题]

1. 门脉高压症的诊断, 哪项最有价值?