

全国护士执业考试应试 全真模拟题

主 编 王桂兰 李春昌

主 审 金 乔

中国医药科技出版社

全国护士执业考试应试 全真模拟题

主 编 王桂兰 李春昌

主 审 金 乔

登记证号:(京)075 号

图书在版编目(CIP)数据

全国护士执业考试应试全真模拟题/王桂兰、李春昌
主编. —北京:中国医药科技出版社,1995.4

ISBN 7-5067-1384-5

I. 全… II. 李… III. 护理人员—就业—考试—试题 IV.
R192.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 05440 号

全国护士执业考试应试
全真模拟题

主编:王桂兰 李春昌

主审:金 乔

*

中国医药科技出版社 出版发行

(北京北礼士路甲 38 号)

(邮政编码 100810)

河北省保定冀中印刷厂 印刷

*

开本 787×1092mm1/32 印张 10.125

字数 240 千字 印数 1—11000

1995 年 4 月第 1 版 1995 年 4 月第一次印刷

ISBN 7-5067-1384-5/R·1221

定价 10.50 元

前 言

卫生部于 1994 年发布第 31 号令《中华人民共和国护士管理办法》。《办法》的第二章第六条规定“凡申请护士执业者必须通过卫生部统一执业考试,取得《中华人民共和国护士执业证书》”。并委托国家医学考试中心具体实施考试工作。今年的全国护士执业考试将于 6 月下旬举行。

为了帮助应试者对国家医学考试中心编写的《全国护士执业考试应试指南》一书全面理解,并能在短时间内熟悉考试方法、了解考试题型、熟练应试技巧、掌握复习要点,特编写《全国护士执业考试应试全真模拟题》一书,以便考生复习备考和各卫生部门办班辅导。

该书包括基础护理学、内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学等共计 1240 道题,题型包括 A_1 , A_2 , X 型,考题由浅入深,重点突出,特别注重对基础理论、基本知识和基本技能的模拟考核。是应试者备考的必读书。

《全国护士执业考试应试全真模拟题》一书的考试题,有 A 型题(包括 A_1 , A_2)和 X 型题两种。A 型题是最佳选择题,即在备选择项目中选择一个最佳答案。X 型题是多项选择题,在备选择项目中有一个或一个以上答案,多选或少选均不得分。

由于时间仓促,难免有不足之处,敬请批评指正。

目 录

基础护理学试题	(1)
A ₁ 型题	(1)
A ₂ 型题	(34)
X 型题	(46)
内科护理学试题	(68)
A ₁ 型题	(68)
A ₂ 型题	(99)
X 型题	(110)
外科护理学试题	(129)
A ₁ 型题	(129)
A ₂ 型题	(164)
X 型题	(176)
妇产科护理学试题	(198)
A ₁ 型题	(198)
A ₂ 型题	(223)
X 型题	(235)
儿科护理学试题	(252)
A ₁ 型题	(252)
A ₂ 型题	(276)
X 型题	(284)
答案	(300)

基础护理学试题

A₁ 型题:

- ✓ 1、我国第一所护士学校成立于(C)
- A、1835 年 广州
 - B、1860 年 上海
 - C、1888 年 福州
 - D、1906 年 北京
 - E、1912 年 天津
- ✓ 2、护理的概念是(E)
- A、帮助患病的人,恢复和保持健康
 - B、为病人解除痛苦,使其处于最佳状态
 - C、保护和照料病人,满足他们的基本需要
 - D、对人的整个生命周期进行帮助,使其达到健康的最佳状况
 - E、对每个人存在的或潜在的健康问题反应的诊断和处理
- 3、在抢救过程中,护士执行医嘱不正确的做法是(B)
- A、口头医嘱,向医生复述一遍,双方确认无误,方可执行
 - B、抢救完毕后,护士及时补写医嘱和处方
 - C、用过药物的容器,经两人核对后方可丢弃
 - D、输血空袋(或瓶)集中放置,便于查对核实
 - E、输液空瓶集中放置,以便进行查对和统计总量
- 4、病区物理环境的要求中,不宜强求一致的是(B)
- A、物品整齐清洁
 - B、不留家属陪住

C、美观、舒适

D、安静

E、安全

√ 5、病室内最适宜的温度是(C)

A、14~16℃

B、16~18℃

C、18~22℃

D、22~26℃

E、26~28℃

√ 6、病室内最适宜的湿度是(D)

A、20%~30%

B、30%~40%

C、40%~50%

D、50%~60%

E、60%~70%

√ 7、一般患者入院,护士首先要为患者(D)

A、测量体温、脉搏、呼吸、血压

B、安置好病床

C、通知医生

D、介绍有关规章制度

E、填写病历中有关楣栏

8、用平车运送病人时,不正确的做法是(B)

A、患者躺卧在平车中间,车速不可太快

B、上下坡时病人头部在前,病人感到安全

C、骨折患者搬运时车上垫木板,并先做好固定

D、病人如有输液而无输液架,须一人高举输液瓶

E、出入门时应先打开门,不可用车撞开门

9、消毒是指(C)

- A、清除物品上的微生物
- B、消除物品上的细菌繁殖体
- C、杀灭或消除物品上的致病微生物
- D、杀灭物品上的致病和非致病微生物,包括芽孢
- E、清除物品上的污秽

10、物理消毒灭菌法不包括(C)

- A、燃烧法
- B、煮沸法
- C、擦拭法
- D、光照法
- E、高压蒸汽法

11、传染病患者用过而又无保留价值的物品,终末处理最适宜的方法是(E)

- A、熏蒸法
- B、喷雾法
- C、日光曝晒法
- D、煮沸法
- E、燃烧法

12、用煮沸法杀灭细菌繁殖体最短需用的时间(B)

- A、3~5min
- B、5~10min
- C、10~20min
- D、20~30min
- E、30~60min

13、煮沸法杀灭芽孢至少需(D)

- A、10~20min

B、20~30min

C、30~60min

D、1~3 小时

E、3~5 小时

14、煮沸法消毒灭菌时,为提高沸点并去污防锈,水中加入

(C)

A、亚硝酸钠

B、硫酸钠

C、碳酸氢钠

D、乳酸钠

E、氢氧化钠

15、用煮沸法消毒灭菌物品,不正确的做法是(C)

A、煮沸前将物品刷洗干净

B、打开物品盖子或轴节

C、橡胶类物品温水放入

D、物品全部浸没在水中

E、水沸后开始计时

16、高压蒸汽灭菌法不适用于(C)

A、玻璃类制品

B、棉纱敷料

C、塑料、尼龙类制品

D、金属器械

E、搪瓷类

17、高压蒸汽灭菌法,压力达 103kPa,温度达 121.3℃时,达到灭菌目的时间为(C)

A、3~5min

B、5~15min

C、15~30min

D、30~60min

E、60~90min

18、用日光曝晒法消毒被褥衣物时,曝晒时间不应低于(D)

A、1 小时

B、2 小时

C、4 小时

D、6 小时

E、8 小时

19、用紫外线灯照射消毒物品的有效距离为(E)

A、1~2m

B、60~100cm

C、60~80cm

D、45~70cm

E、25~60cm

√ 20、用紫外线灯照射消毒物品在有效距离内,适宜的照射时间是(D)

A、50~60min

B、40~50min

C、30~40min

D、20~30min

E、10~20min

√ 21、用紫外线灯消毒空气的有效距离为(C)

A、1m

B、1.5m

C、2m

D、2.5m

E、3m

22、用紫外线灯消毒,错误的做法是(D)

- A、照射前灯管、物品需清拭尘埃
- B、注意保护病人的皮肤、眼睛
- C、建立灯管使用时间记录卡
- D、从灯亮开始计数消毒时间
- E、定期检查消毒效果

23、用浸泡法消毒物品,不正确的是(D)

- A、浸泡前物品洗净擦干
- B、物品全部浸没于消毒液内
- C、药液浓度要准确
- D、消毒时间根据每件物品放入的时间分别计数
- E、物品的盖和轴节要打开

24、不能用做熏蒸消毒的消毒剂是(E)

- A、乳酸
- B、新洁尔灭
- C、食醋
- D、过氧乙酸
- E、甲醛

25、用熏蒸法进行室内空气消毒,密闭门窗的时间不少于

(C)

- A、2 小时
- B、4 小时
- C、6 小时
- D、8 小时
- E、10 小时

✓ 26、用熏蒸法消毒流感病室,食醋用量的计算按每立方米

(B)

A、3~5ml

B、5~10ml

C、10~15ml

D、15~20ml

E、20~30ml

✓ 27、用熏蒸法消毒手术室,乳酸用量计算按每立方米(E)

A、4ml

B、6ml

C、8ml

D、10ml

E、12ml

✓ 28、不能杀灭芽孢的消毒剂是(C)

A、碘酊

B、过氧乙酸

C、新洁尔灭

D、戊二醛

E、漂白粉

29、不宜用燃烧法消毒灭菌的物品是(D)

A、污染的敷料

B、治疗碗

C、镊子

D、拆线剪

E、坐浴盆

✓ 30、防止交叉感染针对性最强的措施是(B)

A、无菌物品和非无菌物品分别放置

B、1 份无菌物品仅供 1 位患者使用

C、取无菌物品必须使用无菌钳

D、操作者衣帽要清洁干燥

E、操作时环境要清洁

31、关于无菌物品的保管,不正确的是(D)

A、无菌物品和非无菌物品分别放置

B、无菌物品须存放于无菌包或无菌容器内

C、无菌包外应注明物品名称和灭菌日期

D、在未污染的情况下,可保存 2~3 周

E、过期或潮湿应重新灭菌

32、执行无菌操作,错误的做法是(C)

A、无菌物品用无菌钳夹取

B、手臂保持在腰部水平以上

C、取出的无菌物品未使用可放回原容器内

D、疑有污染的物品不可再用

E、手臂不可跨越无菌区

33、无菌持物钳的使用中,错误的做法是(D)

A、无菌持物钳浸泡在盛有消毒液的容器中

B、取或放无菌持物钳时,钳端闭合且不可触及容器口缘

C、使用时,钳端向下,不可倒转向上

D、到远处夹取物品时,行走中注意保护钳端,不可触碰非
无菌物

E、不可夹取油纱或消毒皮肤

34、无菌容器的使用,错误的做法是(C)

A、打开无菌容器盖时,把盖的内面朝上放置

B、从无菌容器中取物品时,无菌钳只可触及容器的内面

C、手持容器时,双手不可触及容器的内面,只能触碰容器

的口缘和外面

D、取物完毕,立即将无菌容器盖严

E、无菌容器每周清洁消毒一次

✓ 35、取无菌溶液,不正确的是(A)

A、一瓶无菌溶液,仅供一位患者使用

B、取溶液前先核对瓶上标签,后检查溶液有无污染变质

C、倒溶液时标签朝上,先倒少量冲洗瓶口,再由原处倒出

D、不可将无菌敷料堵住瓶口倾倒

E、不可用无菌棉球直接伸入瓶内蘸取

✓ 36、关于无菌包的使用,不正确的是(D)

A、先查看无菌包名称及灭菌日期

B、放于清洁干燥平坦处打开

C、用无菌钳取出物品后,按原折痕包好,注明开包日期和时间

D、包内剩余无菌物品 4 小时后不能再用

E、无菌包被浸湿不能使用

✓ 37、无菌盘铺好后,有效期不超过(A)

A、4 小时

B、6 小时

C、8 小时

D、12 小时

E、24 小时

✓ 38、戴无菌手套时,需特别注意的是(D)

A、选择适合手大小号码的手套

B、滑石粉擦抹要均匀,滑石粉包用后放于包布上

C、不可强拉手套边缘,以免损坏手套

D、未戴手套的手不可触及手套的外面

E、手套的翻折边缘要扣套在工作服的袖口外面

39、褥疮发生的直接原因是(A)

A、局部组织长期受压缺血

B、皮肤受汗液、尿液刺激

C、皮肤机械性损伤

D、全身营养缺乏

E、局部微生物感染

40、预防褥疮最有效的方法是(C)

A、增加营养提高机体抵抗力

B、保持皮肤清洁干燥,避免刺激

C、经常更换体位,避免局部长期受压

D、避免皮肤破损、摩擦

E、局部给予理疗或按摩

41、褥疮的溃疡期,主要治疗原则是(E)

A、局部理疗

B、按外科换药方法处理创面

C、增加营养,提高机体抵抗力

D、全身应用抗生素

E、治疗原发病

42、保护具不适用于(D)

A、躁动不安者

B、谵妄者

C、高热者

D、不愿配合治疗者

E、昏迷者

43、不宜进半流质饮食的是(D)

A、消化不良者

- B、发热者
- C、咀嚼障碍者
- D、术后恢复者
- E、消化道出血者

✓44、进流质饮食的患者，每日进餐次数为(C)

- A、4~5 次
- B、5~6 次
- C、6~7 次
- D、7~8 次
- E、8~10 次

✓45、不属于治疗类饮食的是(D)

- A、低蛋白饮食
- B、低脂肪饮食
- C、低盐饮食
- D、流质饮食
- E、高蛋白饮食

✓46、不必限制钠盐摄入的病人是(C)

- A、高血压患者
- B、心力衰竭患者
- C、传染性肝炎患者
- D、肝硬化腹水者
- E、急性肾炎患者

✓47、低脂肪饮食原则是成人每日脂肪摄入量不超过(B)

- A、30g
- B、50g
- C、70g
- D、80g

E、90g

48、关于潜血试验饮食的叙述中,错误的是(A)

A、潜血试验饮食是协助诊断胆道有无梗阻时食用的

B、检查前 3 天开始进潜血试验饮食

C、饮食原则是禁食肉类、动物血、绿色蔬菜,含铁丰富的食物

D、可食用牛奶、豆制品、白菜、土豆

E、第 4 天开始留大便检查

49、胆囊造影检查,需进高脂肪饮食,是因为(D)

A、可使胆汁分泌增多,致使胆囊显影清晰

B、可减少胆汁分泌,便于胆囊排空

C、对造影剂有加强作用,便于观察

D、可引起胆囊收缩和排空

E、滞留在胃内时间长,以保证摄片的适宜时机

50、忌碘饮食是检查测定内分泌腺功能时食用的,用于(C)

A、肾上腺皮质功能测定

B、胰腺功能测定

C、甲状腺功能测定

D、垂体功能测定

E、性腺功能测定

51、为昏迷病人插胃管,插入 14~16cm 处,为提高成功率,可将病人(D)

A、头向后仰,颈部后屈

B、头偏向一侧

C、右侧卧位

D、头向前倾,下颌靠近胸骨柄

E、半坐卧位