

景岳新方八陣石

增輯陳修園醫書七十種

上海廣益書局印行

張景岳新方序

以藥治病而有方，方既行於世，何以疑之？以其似是而非，害經方也。經方云：何如仲景？模用素問，按六經而集。但聖湯流之遺方也。醫道肇於軒岐，而昌明於仲景，猶泰章之道，賴之孔子後之學者，雖天分極高，總不可舍先聖範圍而求創故也。且人可以勝人，而不可勝天。天欲明，至道而垂萬世，必生一至人以主之，如靈樞素問醫學之全體也。傷寒雜病論，醫學之大用也。天授之書可述，而不可作；作則誤，爲新方矣。然吾以爲醫學之誤，不始新方，而始於叔和。而新方之誤尤甚於叔和者，叔和以傷寒論中六經括百病者，謂為冬月用不關三時。致後人相襲相悖，雖六經之法因之而廢，至今尚知推崇乎？仲景景岳生於明季，有志著書，則當明經衛道，指叔和之誤而正之。何以反作新方？欲駕仲景而上之，余初得景岳類經，開葉散門序文，稱景岳經更子集，無不研究會稽，中傑士也。意其人必能直識仲景，可以羽翼聖經，不意其治陽虛者不知求之太陽，陽盛者不知責之陽明，而專主人參，欲補陰者不知求之太陰，欲救陰者不知取之少陰，而專主地黃滿敵之論。陰論陽，依流俗之好尚，不尤甚叔和之誤？傷寒論之專為冬月而設耶？余為景岳惜，斯不能曲爲景岳諱也。嘗攷軒岐繼天之極，與岐伯諸臣互明醫道，何重民病也？漢仲景任長沙太守，慨世醫之誤，爲軒岐闡法以開蒙昧，譜其自序，又何悲憫也？古聖人推其不忍人之心，而大有造於天下萬世，豈淺鮮哉？余友陳修園治舉子業，以文章著，而尤究心於內經、傷寒、金匱等書，常言醫道在茲。著述頗富，仕畿輔大水後，民患濕瘡，施方藥全活者，不可勝數。目擊一時，方士因陋就簡，語以仲景集群聖之方法，則茫然心甚痛之。夫陽託仲景之名，而實與相反者，景岳之邪說也。聖訓不明，網由邪說，不辟為邪說之最者，莫如景岳之新方。八陣脩園取新方而反之，寧獲罪於景岳而思有所補於蒼生，斯不得不於宗景岳者，腦後痛下一鉢也。修園出其書以示余，旋自悔其言之激而焚之。余與修園有同志私寃，其原稿屬坊友仲梓而出之，俾紫不奪朱，鄭不亂雅於醫道，不無少補云。

嘉慶九年桂月

愚弟許天霖在田氏拜題

張景岳新方略小引

景岳新方八陣余友林雨蒼徇時好而為歌括屬余註解余固辭之又力請遂不能却攷景岳用功以多為費曾著類經質疑集而全書六十四卷世傳出其燭手要皆拾前人之糟粕而張大其言斯道為之晦而通行之套法實為之闢也余即取通行之套法與經旨不戾者借仲景之方而暢發之景岳謂熟地補陰即於陰字疏其義甚不能補陰處自在言外人參補陽即於陽字疏其不能補陽處亦在言外註之即所以敗之也然業是道者絕少通儒保無有讀畫死於句下者且師友相傳因陋就簡謂景岳方最切時用每出方論反借余之註解以覆空疏竟使余寓敗於張之意盡為庸耳俗目所掩可知筆墨之不可浪用也余過矣徐靈胎有醫貫此一書謂趙氏之荒唐不足責呂氏負一時之望而嘉之則流毒無有已時猶賞溢之罪大於為盜者則向者之新方註解毫釐姑存乎因效徐靈胎例著新方略四卷知者必於矛盾處鑒余之苦心焉

嘉慶七年歲次壬戌端陽陳念祖脩園題於保陽差次

卷一 補陣

大補元煎

左歸飲

左歸丸

右歸丸

五福飲

七福飲

加減一陰煎

二陰煎

三陰煎

四陰煎

五陰煎

太陰煎

小營煎

補陰益氣煎

舉元煎

貞元飲

當歸地黃飲

濟川煎

地黃醴

歸脾丸

贊化血餘丹

養元粉

元武豆

蟠桃果

王母桃

休羉飲

卷二 和陣

金水六君煎

六安煎

和胃二陳煎

蒼朮二陳煎

和胃飲

排氣飲

大和中飲

小和中飲

大分清飲

小分清飲

解肝煎

二木煎

廓清飲

十香丸

芍藥枳术丸

蒼朮丸

解肝煎

括痰丸

神香散

攻陣

吐法

赤金豆

太平丸

敷草丸

徹蟲丸

百順丸

散陣

一柴胡飲

二柴胡飲

三柴胡飲

四柴胡飲

五柴胡飲

正柴胡飲

麻桂飲

大溫中飲

柴芩煎

柴芩煎

柴芩飲

柴胡白蘆煎

歸葛飲

柴葛煎

祕傳走馬通聖散

祕傳白疕丹

柴歸飲

寒陣

保陰煎

加減一陰煎

抽薪飲

徒薪飲

大分清飲

清流飲

化陰煎

清膈煎

化肝煎

安胃飲

玉女煎

大清飲

茵陳飲

玉泉散

雪梨漿

滋陰八味丸

約陰丸

服蠻煎

約蠻煎

卷三 热障

辛木 丙火 酸土 金水

四味回陽飲 六味回陽飲 理陰煎

食中煎

溫胃飲

五君子煎

六味異功煎

參鬱飲

胃關煎

佐關煎

抑扶煎

四維煎

鎮陰煎

歸氣飲

煖肝煎

毒脾煎

三氣飲

五德丸

七德丸

復陽丹

黃升丸

一无丹

九蒸丹

溫臟丸

聖求煎

固障

固陰煎

兔絲煎

惜紅煎

苓朮兔絲丸

固真丸

卷四 因障

逍遙散

決津煎

五物煎

調經飲

通瘀煎

胎元飲

固胎煎

涼胎飲

滑胎煎

殷胞煎

脫花煎

九蜜煎

清化飲

毓麟珠

贊育丹

柴歸飲

疎邪飲

涼血養榮煎

柴葛飲

搜毒煎

六物煎

六氣煎

九味異功煎

透邪煎

牛膝煎

何人飲

追瘧飲

連翹金貝煎

牙皂散

荔枝散

豕膏

醫傷寒結胸法

連翹金貝煎

連翹歸尾煎

桔梗杏仁煎

當歸蓀藜煎

芍藥蓀藜煎

降癲散

百草煎

螵蛸散

腸癰秘方

槐花散

飛丹散

綿花瘡點藥

雞子黃連膏

金露散

二卒煎

冰玉散

冰白散

代是散

固齒將軍散

薰疥方

牡丹膏

銀珠烟

雷火鍼

瘡瘍光

瘡掌風

祕傳水銀膏

附二十四味敗毒散

臘瘡隔紙膏

收瘡散

補陣

閩吳航陳念祖修園人著

男元豹道光古思石仝校字

大補元煎 治男婦氣血大壞精神失守危劇等證此回天贊化救本培元第一要方 本方與後石歸飲出入互用

人參補氣補陽以此爲主少則用一二錢多則用一二兩

山藥炒二錢熟地用三二錢多則用二三兩

杜仲二錢當歸二三錢苦泄

當歸

二三錢苦泄者去之

桂枝

山茱萸一錢酸甘苦寒之味去之

枸杞二錢錢

火甘草一錢水二錢煎七分食遠溫服

陳修園曰景岳開章第一方即雜

沓模糊以啟庸醫混補之漸據一派氣血大壞精神失守自非泛泛之藥可以模棱倅中景岳未讀本草經竟臆創一說曰補氣補陽以人參爲主少則用一二錢多則用一二兩補精補陰以熟地爲主少則用二三錢多則用二三兩自此說

一開市醫俱得捷徑不知神農明人參之性通共三十七字以補五藏爲提綱謂五藏屬陰此物專於補陰也仲景於汗吐下後用之以救陰存液如四逆湯白通湯通脈四逆湯等皆回陽大劑俱不加此陰柔之品致陽藥反掣肘而不

行自唐宋後少明其理無怪景岳一人也至於地黃神農有墮骨髓長肌肉等說然爲服食之品非除病之藥本草經

另特出久服二字多則服至終身少亦服至數年與五穀之養人無異者從景岳之言腎虛精竭之人用地黃二三兩

煮成稠汁令其多服即可畢補腎之能事宣脾虛食少之人用白米二三升煮成糜粥令其強食即可畢補腎之能事

乎吾知其爲害多矣且一方之中混拈補藥數味絕無配合意義歸地榆茱萸人參皆粘骨之品又益以甘草之甘

杜仲之鈍絕無靈動之性入咽之後無不壅塞氣減食氣壅則神日昏食減則精不儲於殺神爲陽氣之主宰精爲陰氣

之真華精神因此藥而賴敗固不待言城西李某患腹中滿悶倦怠懶言等證醫用逍遙散服二十劑小便綠色脚癩

弱延余診之六脈數而弦余曰病在中土土氣本緩而變數者緩之反也且兼弦象弦爲土賊誤藥大傷土氣先以

右解意以之類先取其淡以補脾嗣以大藥救之李某云甘本入脾令謂淡以補脾何義余曰洪範有火上作苦潤下作鹹等句皆就本物之味言之唯於土則曰稼穡作甘以土本無味可指故指土之所生而言也無味即爲淡五味皆

託始於淡淡爲五味之本五藏皆受之氣於脾脾爲五藏之本此理甚妙李某持方案之前醫用貞元飲加味即理陰之類夜用六味同

前日服一劑半月後大喘大汗四肢逆冷適全爲體虛堅留署中治病前醫用貞元飲加味即理陰之類夜用六味同

陽飲三劑次早余到肢冷如冰汗出如湧六脈全無氣喘聲澁澁余曰此因誤服參地過多致下焦陰氣上凌陽位痰涎水飲閉寒氣道內經名爲冒明晦塞反以貞元飲六味回陽飲與前此所服大補元煎皆重用地黃附和陰氣令陰霾四佈水勢滔天託回陽之名以促其歸陰余每半日擊服此藥枉死者數十人午後陰氣用事必不能少延果如言而歿附此以為喜用地黃當歸枸杞人參者戒

**左歸飲** 此壯水之劑也凡命門之陰衰陽盛者此方加減主之

熟地二三錢或加至一兩

山藥二錢

枸杞二錢

甘

草一錢

茯苓一錢

山茱萸一二錢畏酸者少用之

水二鍾煎七分食遠服

陳修園曰左右歸二飲余於歌括注取其用

甘草一味從陽明以輸精及腎亦不沒景岳之善悟偶中處究竟是無病時服食之方若真止腎虛必專用健脾法俾精生於穀或兼用補火法俾火能致水若徒用左右歸二飲是蓋逐其末而忘其本不足賴也二方之加減尤陋

**右歸飲** 此益火之劑也凡命門之陽衰陰盛者耳此方加減主之

熟地用前如二錢

山藥炒二錢

山茱萸二錢

枸杞

二錢

甘草一錢

杜仲蜜製二錢

肉桂一二錢

附子錢製一二三

水二鍾煎七分食遠溫服

**左歸丸** 治真陰腎水不足不能滋養等篇斷至衰弱或虛熱往來自汗盜汗或神不守舍血不歸原或虛損傷陰或遺

淋不禁或氣虛昏暈或眼花耳聾或口燥舌乾或腰痠腿軟凡精髓內虧津液枯涸等症俱速宜壯水之主以培左腎

之元陰而精血自充矣宜此方主之

大懷地八兩

山藥炒四兩

枸杞四兩

山茱萸四兩

川牛膝酒洗熟三兩

鹿膠碎炒珠四兩

龜膠切碎炒珠四兩

無火者不必用

不用

精滑者

免絲子雨製四兩

鹿膠敲碎炒珠四兩

龜膠切碎炒珠四兩

無火者不必用

煉蜜丸桐子大用滾湯或淡鹽湯送下百餘丸

陳修園

國曰左右歸二丸集藥品頗純然亦是尋常服食之劑若真正腎虛病服之必增痰多氣壅食少神昏心下悸吐血等

病蓋方中廣集陰柔之品每令陰氣上瀉而天日不見讀內經者自知之余嘗與友人談及二方謂景岳算得是一個

好厨子左歸丸即廚子所造入仙菜用熟蜜潤肺諸脊髓豬胰蹄鵝子蛋遼海參香菌雞汁烹煮右歸丸又加椒薑大

辛之味及火硝一二品在內不特可口而且益人若因其益人而與病人食之未有不作脹留熱而增病者余故曰景

岳為厨中一好手爲醫中一壞手也令以此二方媚富貴家者皆割烹要人之術也至於自註云治真陰腎水不足不

能滋養衆衛漸至衰弱等句不通之甚

**右歸丸** 治元陽不足或先天稟衰或勞傷過度以致命門火衰不能生土而爲脾胃虛寒飲食少進或嘔惡膨脹或嘔

胃噎膈或怯寒畏冷或臍腹多痛或大便不寔滯刺頻作或溺自遺虛淋寒疝或侵輪歎而肢節痺痛或寒在下焦而水邪淫腫總之真陽不足者必神疲氣怯或心跳不竅或四體不收或眼見邪祟或陽衰無子等證俱速宜益火之原以培右腎之元陽而神界自強矣此方主之

大懷地八兩

山藥炒四兩

當歸二兩

甘草一錢

白朮半錢

枸杞微炒

四兩 兔絲子兩 製附子四兩 杜仲一錢炒 當歸三兩使 兼歸唐勿用 肉桂二兩漸加至四兩 製附子自二兩漸加至五六兩 右法凡如前或如彈子每嚼服二三丸以滾白湯送下其效尤速

五福飲 凡五臟氣血虧損者此能兼治之足稱王道之最

人參心隨宜

熟地隨宜

當歸二三錢

白朮一錢

甘草一錢

草脾錢水二鍾煎七分食遠溫服 陳修園曰凡藥之補氣血者非以藥汁入腹即為人血藥氣入腹即為人氣也不過視此經之空虛引他經之氣血注之耳若依景岳五福飲之說則不論何臟之血虛歸地可以補之不論何臟之氣虛參木可以補之不論諸藥性用何如甘草可以和之又自注分五臟補之試問五臟之氣血從何處而來渠反昧昧即果如其說獨不犯內經久而增氣氣增而火之戒乎景岳方誠庸陋之甚也

七福飲 治氣血俱虛而心脾為甚者

即前方加棗仁二錢

遠志三分

陳修園曰論見五福飲又加棗仁遠志

名焉七福飲自注云治氣血俱虛而心脾為甚者若依景岳之言凡心脾之虛得此二味無不可補宜諸方皆可加入何必於五福飲加二味而特立個方名乎多事甚矣

一陰煎 此治水虧火勝之劑故曰一陰凡腎水真陰虛損而脈症多陽虛火發熱及陰虛動血等證或瘧疾傷寒屢散之後取汗既多脈虛氣弱而煩渴不止潮熱不退者此以汗多傷陰水虧而然也皆宜用此加減主之

詞不  
詒

生地

錢二錢熟地三五錢

芍藥二錢

麥冬二錢

甘草一錢

牛膝一錢

丹參二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

陳修園

園曰甘寒之法原不可廢試問此方有何意義凡一切市上搖鈴輩販藥輩誰不能如此配合者景岳竟以之立方垂訓又於方下自注許多症治試問有一證入扣否且飾以一二三四五名色愈形其陋

加減一陰煎 治證如前而火之甚者宜用此方

生地

芍藥

麥冬各二錢

熟地三五錢

火甘草五錢

知母

地骨皮錢一水二鍾煎服 陳修園曰此方去熟地尚不甚駁雜

二陰煎

此治心經有熱水不制火之病故曰二陰凡驚狂失志多言多笑或瘡疹煩熱失血等證宜此主之

生地

二三 麥冬二錢 杜仲二錢 元參一錢 黃連二錢 茶芩一錢 木通半錢 水二鍾加燈草二十根或竹葉亦可煎七分食遠服 陳修園曰心經有熱非此藥鎮滯所可療仲景瀉心湯防已地黃湯風引湯俱有治日補天之妙製此方者全未夢見

三陰煎 此治肝脾虛損精血不足及榮虛失血等病故曰三陰凡中風血不足養筋及瘧疾汙出多邪散而寒熱猶不能止寒者少陽厥陰虛少血之病微有火者宜一陰煎無火者宜此主之

當歸

三錢

熟地

三五

甘草

一錢

芍藥酒炒二錢 束仁二錢 人參隨宜 水煎溫服 陳修園曰木為三數二陰煎者治木病也然其自注治肝脾虛損三句絕不聯貫又云治少陽厥陰虛少血之病陰虛少血四字不通謂此方能治少陽之病試問方中何物是少陽之藥謂肝主血入血分藥俱能治肝亦是模棱之術內經云伏其所主先其所因或收或散或逆或從隨所利而行之調其中氣使之和平厥陰之治法惟仲景得之若以此方常服則氣火交鬱百病續生看似和平其寔僞君子之害更甚於真小人也

四陰煎 此保肺清金之劑故曰四陰治陰虛勞損相火熾盛津枯煩渴欬嗽吐衄多軟掌證 生地二三 麥冬二

錢

麥冬

二

錢

百合

二錢

沙參

二錢

茯苓

一錢

生甘草

一錢

水

二鍾

煎七分食遠服 陳修園曰金畏火人

所知也而內經曰肺惡寒又云形寒飲冷則傷肺保肺清金四字流俗之談令人奉為格言為害非淺而景岳於此方又注云相火熾盛津枯煩渴等句亦是一偏之談火盛津枯者固有之而不知津隨氣行氣之所到津亦到焉金匱治肺痿症以甘草乾薑湯為首方此旨非景岳所可蠡測茲方黨平鈍微寒之品咳嗽吐血之人百服百死吾願業此道者歷溯平日用此方之誤發一點天良而自加懲創焉

五陰煎 凡真陰虧損脾虛失血等證或見溏泄木甚者所重在脾故曰五陰忌潤滑宜此主之 熟地五七錢山

藥

炒三

扁豆

炒二

甘草

一錢

茯苓

半

錢

芍藥

炒黃

五味子

粒十

人參

隨宜

白朮

炒一

錢

水

二鍾

加

言以脾為陰中之至陰也但補陰有理中湯盡美盡善景岳不知陰陽二字的解滿腔俱是歸地補陰參木補陽之說遂有此方之庸劣又加以熟地一味雜亂無章以致患此者百服百死余為活人計不得不大聲疾呼也

大榮煎 治真陰精血虧損及婦人經遲血少腰膝筋骨疼痛夢氣血虛寒心腹疼痛等證

當歸二三錢 熟地五錢

錢 柏杞二錢 甘草一錢 杜仲一錢 牛膝一錢 肉桂一錢

水二鍾煎七分食遠服

陳修園曰據云真陰精

血虧損必求之太陰陽明以納穀為寶生血化精以復其真陰之不足若徒用熟地枸杞當歸牛膝等溫傷脾而滯妨胃及竭其精血之源也腰膝筋骨疼痛非風即濕木附是其要藥心腹疼痛與此等方亦更無涉惟經遲夢者頗為近道小榮煎 治血少陰虛此性味和平之方也

當歸二錢 熟地二錢 炙藥炒二錢 山藥炒二錢 枸杞二錢 甘草一錢

水二鍾煎七分食遠服

陳修園曰血少陰虛論是大榮煎此方自注云性味和平究竟無一味是治病之品學

者取不可走此一路養病以害人也時醫鄭培齊專講此法名噪一時夏月患霍亂吐瀉自用藿香正氣散二服而變是以通食藥誤人而自誤也

補陰益氣煎

此補中益氣湯之變方也治勞倦傷陰精不化氣或陰虛內乏以致外感不解寒熱瘧陰虛便結不通

等證凡屬陰氣不足而虛邪外侵者用此升散無不神效

人參一二錢當歸二錢山藥酒炒二錢

熟地三五錢

一二兩

陳皮一錢 甘草一錢 升麻三分火浮於上

柴胡一錢如無外邪者不用

水二鍾加生薑三五七片煎八分食

黃芩升麻非補氣之品

遠溫服

陳修園曰勞倦傷陰精不化氣八字不通又云陰虛內乏致外感不解此藥更不可沾唇必以桂枝湯和陰

陽而調榮衛又啜粥以助胃氣之內乏取水穀之津以為汗則邪從汗解而陰沒不傷矣又云寒熱瘧虛便結不通等證更非此方所可倖效必用小柴胡湯方效仲景云上焦得通津液得下胃氣因和身濶然汗出而解聖法彰彰是益方平庸者居多久服每因循而誤事此則雜亂無章入咽之噴其害立見

舉元煎

治氣虛下陷血崩脫亡陽垂危等症有不利於歸熱等劑而但宜補氣者以此主之

黃芩升麻非補氣之品

人參四兩

大熟地一斤以河水熬膏

不拘時服

陳修園曰人參生於上靈山谷遼東幽冀諸州背陽向陰其味甘中帶苦其質柔潤多液置於日中一晒

減去數味即不成方義

雨儀膏 治精氣大虛諸藥不應或以克伐太過耗損真陰凡虛在陽分而氣不化精者宜參朮膏若虛在陰分而精不

化氣者莫妙於此其有未至大病而素覺陰虛者用以調元尤稱神妙

人參半斤或

大熟地一斤以河水熬膏

不拘時服

陳修園曰人參生於上靈山谷遼東幽冀諸州背陽向陰其味甘中帶苦其質柔潤多液置於日中一晒

便變色而易蛀其爲陰藥無疑讀神農本草經自知景岳又倍用熟地合者成膏但是純陰之氣於陽藏之人反煩躁多熱之病便閉溺短易飢者未始不宜之若咳嗽食少便溏等症當視之如砒以兩儀命名不確

貞元飲

治氣短似喘呼吸促急提不能升嚥不能降氣道喧塞勢劇垂危者常人但知爲氣急甚病在上而不知元海無根虧損肝腎止子午不交氣脫症也尤爲婦人血海常虧者最多此證宜急用此飲以濟之緩之敢云神劑凡診此證脈必微細無神若緩而兼緊尤爲可畏倘庸巫不知妄云疲逆氣滯用牛黃蘇合及青陳枳殼破氣等劑則速其危矣醫用此方後必歸此不通語可笑

熟地者一八錢

甘草三錢

當歸二錢

水二錢

溫服

陳修園曰此方治燥渴易飢時或氣急不利於辛散燥熱之劑景岳取熟地當歸以濟其枯取甘草以緩其急爲輕症立法偶或有效若咳挾寒水之氣上逆非小青龍佐以真武不平若風火而激動水飲非越婢加半夏湯不可若支飲內痛不得畏十乘火湯之峻攻若飲滿氣閉不必慮葶苈大棗瀉肺湯之苦寒少陰之氣上脫必用通脈四逆湯加膽汁人尿以追之太陰购之氣不輸必用理中湯倍加人參以助之此皆急救法也全置云氣短有微飲當從小便去之腎氣丸主之今桂朮甘湯亦主之此緩治法也若用貞元飲遏元陽助水邪而又滯痰壅氣無不下咽立危者特不解時醫以此方日殺數人而不知變計吾知其良心喪盡矣

當歸地黃飲 治腎虛腰膝疼痛等證

當歸三錢

熟地三五錢

山藥一錢

杜仲一錢

牛膝半錢

山茱萸一錢

甘草八分

水二錢

煎八分

速服

陳修園曰腰膝疼痛因風寒濕三氣者最多服此方必劇以其助濕留邪也至云起於腎虛宜熟地枸杞等藥爲腎虛必需之品乎抑亦顧未忘本矣

濟川煎

凡病涉虛損而大便閉結不通則硝黃攻擊等劑必不可用若勢有不得不通者宜此主之此用通於補之劑

也最妙

當歸三五錢

牛膝二錢

肉蓯蓉

或去鹽

澤瀉半錢

升麻五七分

或一錢

枳殼一錢

枳殼者不必用

水一錢

半錢

枳殼者不必用

水一錢

半錢

煎七

分食而服 陳修園曰大便祕者除脾約丸三氣湯外又有大熱之備急丸大寒之更衣丸通津液之小柴胡湯下實火之大柴胡湯等法皆聖法也而滋潤之說爲庸醫之逢迎富貴掩覆空疏之詭術如此乃是也然視近今仁人多喜勝一格

地黃酒

治男婦精血不足榮衛不充等患宜製此常用之

大棗地

取味極甘者燒爛

乾以去水氣八兩

沉香一錢或白檀

或一錢亦可

枸杞

或一錢亦可

水一錢

或一錢亦可

水一錢

或一錢亦可

水一錢

或一錢亦可

用極肥者亦然

或一錢亦可

水一錢亦可

完又加酒六七斤再浸半月仍可用 陳修園曰此服食方也却亦多當

歸腎丸

治腎水真陰不足精衰血少腰痠脚軟形容憔悴道泄陽遺等證

熟地八兩

山藥四兩

山茱萸兩四

淡芩

歸身三兩

枸杞四兩

杜仲四兩鹽水炒

巴戟肉酒浸制

小茴香一錢

白茯苓乳拌蒸熟

肉蓯蓉酒洗

陳修園曰以丸藥為補養非古法也始於孫真人而後世因之此方為通用之應酬方亦不必議之

贊化血餘丹

此藥大補氣血故能烏鬚髮壯形體其於培元贊育之功有不能盡述者

血餘灰八兩

熟地八兩蒸湯

山藥四兩

枸杞

當歸鹿角膠炒珠免絲子製

杜仲鹽水

巴戟肉酒浸制

小茴香一錢

白茯苓乳拌蒸熟

肉蓯蓉酒洗

胡桃肉

去皮肉各四兩

何首烏四兩

何首烏小黑豆汁拌蒸七次如無黑豆或牛乳人乳拌蒸相炒四兩

人參隨宜如

右盜丸每食前用白沸湯送下二

三錢

陳修園曰血餘灰能利小便如久患淋瀝及溺血者最宜久服者亦宜之此方頗有條理但首烏宜去之

養元粉

大能寶脾養胃氣

糯米一斗水浸一宿

山藥炒

艾實炒

蓮肉兩

川椒去目及閉口者炒出汗取細末二三錢

右爲末每日飢時以滾水一碗入白糖三匙化開入藥末一二兩調服之或加四君山楂肉各一二兩更妙

陳修園曰此方最佳但非治病藥耳

元武豆

羊腰子個五十枸杞二斤

補骨脂一斤大茴香六兩

小茴香六兩

內從容滑者去之

青鹽八兩如無蔴蓉此宜

十二兩大便

砂鍋煎

大黑豆

一斗圓淨淘洗淨

右用甜水二斗以砂鍋煮前藥七味至半乾去渣入黑豆勻火煮乾為度如有餘汁復

宜拌滲於內取出用新布攤涼晒乾盛瓶收貯日服之其效無窮如無砂鍋即鐵鍋亦可若陽虛者加製附子一兩更

妙

陳修園曰此豆常服益人但功緩耳

蟠桃果

治遺精虛弱補腎最佳

芡實炒一斤

蓮肉一斤

膠東肉一兩

熟地一斤

胡桃肉去皮二斤

陳

修園曰此方去熱地則藥純而功大

王母桃

培補脾腎功力最妙

白朮

用冬朮腿片味甘者佳苦者勿用以米泔浸一夜切片炒

何首烏

人乳蒸

巴戟水浸

枸杞子

烘以上三味減半

右爲末

燒蜜搗丸龍眼大每用三四丸飢時嚼服滾湯送下

陳修園曰方雖庸而却不雜

休瘧飲

此止瘧最妙之劑也若汙散既多元氣不復或以衰老或以弱質而瘧有不能止者但宜用此化暴善後之第

一方也其有他證加減俱如法

人參白朮炒

當歸各三錢

何首烏製五

甘草八分

水一鍾半煎七分食

遠服渣且煎或用陰陽水各一鍾飯後食速昇服一鍾 陳修園曰久瘧之治以理中湯為第一善法此方不寒不熱又重用首烏之滯便不成方法予每見服之減食久服變成脹滿之證戒之戒之

## 景岳新方卷二

和障

金水六君煎 治肺腎虛寒水泛為痰或年邁陰虛氣不足外受風寒咳嗽嘔惡痰喘急等證神效

當歸二錢

熟地三五錢

陳皮一錢

半夏一錢

茯苓錢

甘草錢

水一鍾生薑三五片煎七八分食送服之

陳修園曰二

陳湯為驅痰之通劑蓋以痰之本水也佐苓利水以治其本痰之動濕也茯苓決瀉以制其動方中只此一味是治痰正藥其餘生夏降逆陳皮順氣甘草調中皆取之以為茯苓之佐使耳故仲景書凡痰多者加茯苓者俱加半夏古聖不易之法也景岳取熟地寒潤當歸半潤加此二味自注為肺腎虛寒水泛為痰之劑不知肺寒非乾薑細辛五味子合用不可腎寒非乾薑附子重用不可若用當歸熟地之寒濕助其水飲則陰霾四佈水勢上凌而氣逆咳嗽之病日甚矣。燥濕二氣若冰炭之反會妄以騎牆之見難湊成方。乍張大其說以欺人庸醫喜得騙人糊口之真言如草菅命苟效者少不效者多且白芥子杏仁性不馴良多服每令人吐血不如傷寒論金匱諸法之有利無害也。

六安煎 治風寒咳嗽及非風初感痰滯氣逆等證

陳皮半錢

半夏錢

茯苓錢

甘草錢

杏仁錢

白芥

子五八分老年

氣皆不用

水一鍾半加生薑三五七片煎七分食送服

陳修園曰

此方看似平穩其實咳嗽氣喘者服之

智胃二陳煎 治胃寒生痰惡心嘔吐胸膈滿悶噯氣

乾薑炒一錢

砂仁四五分

陳皮半夏

茯苓各一錢

甘草

分煎七水一鍾半煎七分不拘時溫服 陳修園曰方穩

苓朮二陳煎 治痰飲水氣停蓄心下嘔吐酸等症

豬苓一錢

白朮錢

澤鴨一錢

陳皮一錢

半夏錢

茯苓半錢

甘草八分

乾薑炒一錢

水一鍾半煎

陳修園曰方佳

和胃飲 治寒濕傷脾霍亂吐瀉及痰飲水氣胃脘不清嘔惡脹滿腹痛等證 陳皮厚朴各兩半  
乾薑一錢 水一鍾半煎七分溫服 陳修園曰自和胃二陳湯至此方俱佳但乾薑不宜燒恐燒透則氣焦味苦轉失其性且恐減其雄烈辛味不能變胃而受胃變也

排氣飲 治氣逆食滯脹痛等症

陳皮五錢

木香一錢或五分

藿香一錢

香附二錢

枳殼五錢

澤鴻二錢

七氣湯之妙也

大和中飲 治飲食留滯積聚等證

陳皮一錢

枳實二錢

砂仁五分

山楂二錢

麥芽二錢

厚朴一錢半

澤鴻一錢半

水一錢半煎七分食遠溫服

陳修園曰飲食留滯在膈者宜瓜蒂吐之在腹者宜承氣下之若從用此藥消導非古人之治法唐宋後以消導法取諸釀酒龜中自聞有酒味則效然腸胃非酒鑑何以當此丸破而無腐

腸之患乎不如金匱用承氣湯之有利無弊也

小和中飲 治胸膈脹悶或婦人胎氣滯滿等證

陳皮五錢

山楂二錢

茯苓半錢

厚朴一錢半

甘草一分

澤鴻一錢半

水一錢半加生薑三五片煎服

陳修園曰胸膈脹悶多屬濁氣在上所致仲景傷寒金匱諸方俱神若此

方之膚不過冀其倖效而已至婦人胎氣滯滿方中山查更不合宜

大分清飲 方在寒陣五

小分清飲 治小水不利濕滯脹脹不能受補等證此方主之

茯苓二錢

澤鴻二錢

薏苡仁二錢

豬苓二錢

枳殼一錢

厚朴一錢

水一錢半煎七分食前服

陳修園曰小水不利皆由三焦失其瀉瀆之職以致膀胱之

氣不化自有治本清源之道大分清小分清二飲之淺陋不足以治重症也

解肝煎 治暴怒傷肝氣逆脹滿陰滯等證如兼肝火者宜用化肝煎

陳皮半錢

半夏厚朴

茯苓二錢

蘇葉

芍藥各一錢

砂仁七分

水一錢半加生薑三五片煎服

陳修園曰此方從七氣湯食來加陳皮芍藥砂仁三味

便成蛇足且七氣湯做於金匱之半夏厚朴湯原方以生薑為君茯苓為臣紫蘇厚朴半夏為佐使後人套其方為七氣湯已陋景岳又套其方而混加之陋而又陋矣

二术煎 治肝強脾弱氣泄濕泄等證

白术一錢

蒼术米泔浸三錢

芍藥炒黃二錢

陳皮炒一錢

甘草一錢

茯苓

苓二錢

厚朴一錢

生薑湯炒一錢

木香六七錢

乾薑炒黃二錢

澤鴻炒半錢

水一錢半煎七分食遠服

陳修園曰此方芍藥二錢宜換作防風一錢半則純

麻清飲

治三焦壅滯胸膈滿氣道不清小水不利半力未良通身腫脹或肚腹單脹氣寔非水等證 枳殼二錢

厚朴半錢

大腹皮一錢

白芥子五分或

蕪菊子生搗一錢如中不甚服禁食者不必用此

澤瀉二錢

陳皮一錢 水一鍾

半煎七分食遠溫服 陳修園曰寔症可以暫服此方未效即宜舍去以此方者逐末而忘本也

掃蟲煎 治諸蟲上攻胸腹作痛

青皮一錢

小茴香炒一錢

柏榔

烏藥錢半

細榧肉三錢

吳茱萸一錢

烏梅二個 甘草八分 珠砂 雄黃各五分俱為極細末

右將前八味用水一鍾半煎八分去渣隨入後二味再煎三四

沸攪匀徐徐服之

陳修園曰輕症可偶用若重證必須烏梅丸

十香丸 治氣滯寒滯諸痛

木香

沉香

澤鴻

烏藥

陳皮

丁香

小茴香

香附

酒炒

荔枝核

膽集

皂角

假大燒

右為末酒糊丸彈子大者磨花服九桐子大湯下亦可

陳修園曰此丸頗純

芍藥枳朮丸 治食積痞滿及小兒腹大脹滿時常疼痛脾胃不和等證

白朮三兩

赤芍藥二兩

枳實一兩

陳皮一兩

用荷葉湯煮老黃米粥為桐子大米飲或滾白湯送下古餘丸

陳修園曰金匱枳朮湯潔古夢湯為

丸已非古法景岳加陳皮則行氣之藥太過又加芍藥之苦泄大為離經叛道矣

蒼朮丸 治寒濕在脾泄濁久不能愈者

雲茯苓四兩

白芍藥炒黃

四兩

甘草一兩

川椒

去開口者炒出汗

小茴香

各

赤芍藥

酒炒

枳實

歸炒

蒼朮

一兩

厚朴三兩

蜜汁炒

真茅山蒼朮八兩米泔浸一宿切炒

破故紙

酒浸二日晒乾炒香四兩

右為末糯米糊為丸桐子大每

食遠清湯送下八十九 陳修園曰下利者減芍藥大黃仲景聖法也茲方芍藥用四兩之多可知景岳之丸若糯米

不學古也宜薑茶湯泛則大堅不化

貝母丸 消痰熱潤肺止咳或肺癰肺痿乃治標之妙劑

貝母一兩烏末用砂糖或蜜丸龍眼大或噙化或嚼服之

陳修園曰神農本草經云貝母味辛平無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣痘瘡喉乳癰金瘡風癰原文止此二十七字此

方有一症合經旨否然倡斯法者由來有斬不自景岳始也

括痰丸 治一切停痰積飲谷酸嘔酸胸脹悶疼痛等證

半夏

製二兩

白芥子二兩

乾薑

炒黃一兩

豬苓二兩

甘草五錢

陳皮四兩

切碎用鹽二錢入水

中伴浸一宿晒乾

右為末湯浸蒸餅為丸緣豆大每服一錢許滾白湯送下

陳修園曰方

中白芥子用之失法餘亦平平

補香散 治胸脅脾胃逆氣難解疼痛嘔噦腹滿痰飲膈噎諸藥不效者惟此最妙

丁香 白芷(寇亦可) 右二

味等分為末清湯調下五七分甚者一錢日數服不拘 陳修園曰此方可以暫服若服至數日外必增燥渴之症  
攻陣

吐法 此方可代瓜蒂二聖散之屬凡邪寒上焦或痰或瘀或食氣逆不通等證皆可以此吐之用蘿蔔子搗碎以溫湯和擣取淡湯徐徐飲之少頃即當吐出即有吐不盡亦當從下行矣 陳修園曰吐法必遵仲景施攻瓜蒂諸方此法爲家伎倆不能治大病也

赤金豆 亦名八仙丹 治諸積不行凡血凝氣滯疼痛腫脹蟲積結聚癰堅宜此主之此丸去病捷速較之硝黃粒

義之類過傷臟氣者大爲勝之

巴霜去皮膜留去油一錢半 生附子切畧炒二錢 皇角炒微黑一錢 輻粉一錢 丁香 木香 天

竺黃錢各三錢 珠砂馬衣三錢

右為末醋浸蒸餅為丸蘿蔔子大硃砂為丸欲漸去者每服五七丸欲驟行者每服二三

丸用滾湯或真藥或薑醋茶蜜茴香史君子煎湯為引送下若利多不止可飲冷水一二口即止蓋此藥得熱則行得冷則止也 陳修園曰仲景承氣法抵當法大小陷胸法十乘法葶苈法白散方及金匱三物五物七物法攻邪之中大寓養生之道若赤金豆太平丸敦阜丸蠶蠅丸百順丸並吐法只知攻邪不顧元氣下咽之傷邪氣與元氣俱盡而死復之慎之

太平丸 治胸腹疼痛脹滿及食積血積氣疝血疝邪寒秘滯痛劇等證

陳皮 厚朴 木香 蘿蔔子

草豆蔻 三棱 蓬朮炮 乾薑 牙皂炒斷 澤瀉 以上十一味俱為細末巴豆用滾湯泡去皮心臍稱足一錢用水一碗微火煮至半碗將巴豆搗起用乳鉢研極細仍將前湯攪入研勻然後量藥多寡入蒸餅浸爛搗丸前集如綠豆大每用三分或五分甚者一錢

敦阜丸 治堅頑食積停滯腸胃痛劇不行等證 木香 山楂 麥芽 皂角 丁香 烏藥 青皮 陳皮 澤

瀉錢各五

巴霜一錢

右為末用生蒜頭一兩研爛加熟水取汁浸蒸餅搗丸綠豆大每服二十九隨便用湯引

送下如未愈徐徐漸加用之

獵蟲丸 治諸蟲積脹痛蕩癰等症

蕪荑 雷丸 桃仁 乾漆炒烟

雄黃

錫灰 皂角

澤瀉

大黃燒灰 槟榔 史君

子芩等 輕粉減半

細榧肉加倍

湯浸蒸餅為丸綠豆大每服五七分涼白湯下陸續服

鹽

子芩等

輕粉減半

細榧肉加倍

湯浸蒸餅為丸綠豆大每服五七分涼白湯下陸續服

百順丸 治一切陽邪積滯凡氣積血積蟲積食積傷寒寢熱秘結等證但各為湯引隨宜送下無往不利

川大黃

錦紋者牙皂角炒微黃一斤兩六錢

右為末用湯浸蒸餅搗九綠豆大每用五分或一錢或二三錢酌宜用引送下或蜜丸亦可

### 散陣

一柴胡飲 一為水數從寒散也

柴胡二三錢

黃芩半錢

芍藥錢二

生地一錢半

陳皮一錢半

甘草八分

水一鍾煎七八分溫服

二柴胡飲 二為火數從溫散也

柴胡二三錢

陳皮一錢半

半夏二錢

細辛一二錢

厚朴半錢

水一鍾半煎七分溫服

三柴胡飲 三為木數從肝經血分也

柴胡二三錢

芍藥一錢半

甘草錢一

陳皮一錢半

生薑三五片

當歸一錢

易以熟地

水一鍾半煎七分溫服

四柴胡飲 四為金數從氣分也

柴胡二三錢

甘草一錢半

生薑三五片

當歸二三錢

人參二三錢或六錢

錢而用之

水二鍾煎七八分溫服

五柴胡飲 五為土數從脾胃也

柴胡二三錢

當歸二三錢

熟地三五錢

白朮二三錢

芍藥錢半

甘草一錢

陳皮一錢

水一鍾半煎七八分食遠熱服

正柴胡飲 凡外感風寒發熱惡寒頭疼身痛痰癥初起等證凡氣血平和宜從平散者此主之

柴胡二三錢

防風一錢

當歸二三錢

人參二三錢或六錢

錢而用之

水二鍾煎七八分溫服

陳修園曰神農本草經云柴胡

氣味苦平無毒主心腹腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新久服輕身明目益精原文共三十六字無一字言及發汗故少陽症有汗吐下二禁首禁發汗仲景小柴胡湯用八兩之多其不發汗可知並可以悟其性之益人多服

無傷功之頗緩重用始效也景岳未讀本草經誤認柴胡為散藥故以柴胡為主合生地黃芩白芍等名一柴胡飲為溫散合芍藥當歸陳皮生薑等名二柴胡飲從血分而散合人參生薑等名三柴胡飲從脾腎而散合白朮歸芍等名五柴胡飲從脾胃而散合防風陳皮芍草生薑等名七柴胡

飲從平散無知妄作莫比爲甚今之醫輩喜其簡便易從邪說橫行反令仲景發汗諸神法無一人談及凡傷寒病一年中因此方枉死幾千萬人誠可痛恨

麻桂飲 治傷寒癰疽陰暑瘧疾凡陰寒氣勝而邪有不能散者非此不可無論諸經四季凡有是證即宜是藥勿謂夏

月不可用也不必厚蓋但取津津微汗透徹為度此寔麻黃桂枝二湯之變方而其神妙則大有超出二方者不可不