



日常用药禁忌系列

联合用药禁忌

LIANHE YONGYAO JINJI

主 编 侯连兵



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

日常用药禁忌系列

联合用药禁忌

LIANHE YONGYAO JINJI

主 编 侯连兵

副主编 罗景慧 杨西晓 成 蹊 秦 飞
莫立乾 曾 岚

编 者 (以姓氏笔画为序)

马 云	王成蹊	王睿霞	文 壮
孔繁晟	西 娜	刘世霞	刘思佳
刘韶清	李 晓	杨 华	杨西晓
吴秀荣	何艳玲	林焕泽	罗景慧
周 静	赵 洁	侯连兵	侯楚祺
秦 飞	莫立乾	晏 媛	郭 丹
腊			蔡鸿福



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

联合用药禁忌/侯连兵主编. —北京:人民军医出版社,
2013.12

(日常用药禁忌系列)

ISBN 978-7-5091-6931-5

I. ①联… II. ①侯… III. ①药物—配伍禁忌 IV. ①
R942

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 308282 号

策划编辑:黄建松 文字编辑:张青山 责任审读:谢秀英
出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店
通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036
质量反馈电话:(010)51927290;(010)51927283
邮购电话:(010)51927252
策划编辑电话:(010)51927300—8057
网址:www.pmmp.com.cn

印、装:京南印刷厂
开本:850mm×1168mm 1/32
印张:9.125 字数:205 千字
版、印次:2013 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
印数:0001—4000
定价:29.00 元

版权所有 侵权必究

内容提要

本书从药物的联合应用和药物相互作用入手,系统地介绍了药物联合应用的禁忌与注意事项。共分 16 章,主要包括:中枢神经系统、循环系统、呼吸系统、消化系统、泌尿系统、自主神经系统、免疫系统药物的联合用药禁忌,以及抗微生物药物、抗寄生虫病药物、抗肿瘤药物、抗变态反应药物、影响血液及造血系统药物、麻醉药及其辅助药物、激素及其有关药物、维生素类药物和调节水、电解质及酸碱平衡药物的联合用药禁忌。本书收录信息丰富,内容简洁明了,实用性强,可帮助人们增加日常安全、有效、合理用药知识,以减少因药物使用不当带来的危害,特别可作为医师、药师和护师临床用药指导。

前 言

药物是防病治病的重要武器,但其也具有二重性。药物使用得当,能及时解除疾病带给患者的痛苦,康复机体;若使用不当,便会给患者带来更大的痛苦,轻者延误治疗时机,重者危及生命或导致死亡。因此,掌握一些日常生活中科学实用的合理用药知识,对增强卫生保健意识,提高健康水平具有重要现实意义。

药物禁忌也称为“不宜”“不相宜”,表现为与机体不相宜,与饮食不相宜,与药物不相宜,与疾病不相宜,一般为禁、忌、慎三者的总称。药物禁忌,即介绍药物与上述多方面或不宜或不相宜。如何安全、有效、合理地使用药物,使药物发挥其最佳疗效,最大限度地避免可能发生的不良反应,尤其是避免因盲目或滥用药物而导致的药源性疾病和药疗事故,是全社会尤其是医药工作者必须研究与关注的问题。我们在 1995 年即编著出版了《日常用药禁忌 400 例》一书,当时引起了广大同行极大关注和积极反映。此次,我们共收集了近年来 1540 种(例)药物禁忌信息,并整理成《西药服用禁忌》《中药服用禁忌》《联合用药禁忌》三册出版,希望能更好地帮助人们提高安全、有效、合

理用药的意识和水平,以减少因药物使用不当带来的危害,为医务人员临床用药提供指导。

值此付梓之际,我特向为本书编写工作提供支持与帮助的同事和朋友表示衷心感谢,书中如有不妥或谬误之处,恳请各位读者和同道不吝赐教。

南方医科大学南方医院 侯连兵
于广州

目 录

第 1 章 抗微生物药物联合用药禁忌	1
1. 复方磺胺甲噁唑不宜与叶酸合用	1
2. 复方磺胺甲噁唑不宜与丙胺卡因和利多卡因合用	1
3. 复方磺胺甲噁唑不宜与乙胺嘧啶合用	2
4. 磺胺嘧啶不宜与普鲁卡因合用	2
5. 磺胺嘧啶不宜与普鲁卡因胺合用	2
6. 磺胺嘧啶不宜与副醛合用	2
7. 磺胺嘧啶不宜与干酵母合用	3
8. 磺胺噻唑不宜与乌洛托品合用	3
9. 柳氮磺吡啶不宜与四环素合用	3
10. 萘啶酸不宜与丙磺舒合用	3
11. 萘啶酸不宜与呋喃妥因合用	3
12. 诺氟沙星不宜与溴丙胺太林合用	4
13. 诺氟沙星不宜与西咪替丁合用	4
14. 培氟沙星不宜与西咪替丁合用	5
15. 环丙沙星不宜与氢氧化铝合用	5
16. 环丙沙星不宜与硫酸亚铁同服	5
17. 环丙沙星不宜与硫糖铝合用	5
18. 环丙沙星不宜与去羟肌苷合用	6

联合用药禁忌

19. 洛美沙星不宜与芬布芬合用	6
20. 洛美沙星不宜与丙磺舒合用	6
21. 甲硝唑不宜与双硫仑合用	6
22. 乌洛托品不宜与乙酰唑胺合用	7
23. 碘酊和汞溴红忌合用	7
24. 苯扎溴铵忌与肥皂合用	7
25. 青霉素禁止与金霉素合用	8
26. 青霉素 V 不宜与乙酰半胱氨酸合用	8
27. 青霉素 V 不宜与新霉素合用	8
28. 氨苄西林不宜与氯喹合用	8
29. 头孢氨苄不宜与多西环素合用	9
30. 头孢噻啶不宜与呋塞米合用	9
31. 头孢噻吩不宜与丙磺舒合用	9
32. 头孢克洛不宜与食物同服	9
33. 头孢西丁钠不宜与头孢唑肟合用	10
34. 头孢西丁钠不宜与氨基曲南合用	10
35. 红霉素不宜与氯化铵合用	10
36. 醋竹桃霉素不宜与口服避孕药合用	10
37. 林可霉素不宜与西咪替丁合用	11
38. 林可霉素不宜与食物同服	11
39. 林可霉素不宜与白陶土合用	11
40. 万古霉素不宜与硝苯地平合用	12
41. 庆大霉素不宜与西咪替丁合用	12
42. 庆大霉素不宜与羧苄西林合用	12
43. 庆大霉素不宜与克林霉素合用	12
44. 庆大霉素不宜与万古霉素合用	13
45. 庆大霉素不宜与头孢噻吩合用	13
46. 庆大霉素不宜与多黏菌素 B 合用	13

47. 庆大霉素不宜与两性霉素 B 合用	14
48. 庆大霉素不宜与地西泮合用	14
49. 庆大霉素不宜与碳酸氢钠合用	14
50. 庆大霉素不宜与硫酸镁合用	14
51. 卡那霉素不宜与红霉素合用	15
52. 卡那霉素不宜与依他尼酸合用	15
53. 妥布霉素不宜与咪康唑合用	15
54. 四环素类药物应用禁忌	16
55. 四环素不宜与牛奶及抗酸药同服	16
56. 四环素不宜与考来替泊合用	17
57. 四环素类药物不宜与硫酸亚铁合用	17
58. 四环素不宜与葡萄糖酸钙合用	17
59 四环素不宜与硫酸锌合用	18
60. 四环素不宜与利尿药合用	18
61. 四环素不宜与泼尼松合用	18
62. 四环素不宜与去羟肌苷合用	18
63. 多西环素不宜与乙醇合用	19
64. 多西环素不宜与氟地西泮合用	19
65. 多西环素不宜与卡马西平合用	19
66. 多西环素不宜与苯巴比妥合用	19
67. 多西环素不宜与苯妥英合用	20
68. 氯霉素不宜与对乙酰氨基酚合用	20
69. 氯霉素不宜与利福平合用	20
70. 多黏菌素 B 不宜与丙氯拉嗪合用	20
71. 黏菌素甲磺酸不宜与头孢噻吩合用	21
72. 异烟肼应用禁忌	21
73. 异烟肼不宜与青霉胺合用	21
74. 对氨基水杨酸不宜与乙醇合用	22

联合用药禁忌

75. 对氨基水杨酸不宜与水杨酸镁合用	22
76. 对氨基水杨酸不宜与丙磺舒合用	22
77. 利福平应用禁忌	22
78. 利福平不宜与醋竹桃霉素合用	24
79. 利福布汀不宜与茚地那韦合用	24
80. 慎重处理乙胺丁醇与异烟肼的合用	24
81. 乙胺丁醇不宜与青霉胺合用	25
82. 乙胺丁醇不宜与氢氧化铝合用	25
83. 紫霉素禁与链霉素合用	25
84. 氨苯砜不宜与去羟肌苷合用	25
85. 两性霉素 B 不宜与氢化可的松合用	25
86. 慎重处理酮康唑与苯妥英的合用	26
87. 慎重处理酮康唑与西咪替丁的合用	26
88. 慎重处理酮康唑与溴丙胺太林的合用	26
89. 慎重处理酮康唑与利福平的合用	26
90. 慎重处理酮康唑与异烟肼的合用	27
91. 慎重处理酮康唑与去羟肌苷的合用	27
92. 慎重处理氟胞嘧啶与两性霉素 B 的合用	27
93. 慎重处理特比萘芬与利福平的合用	27
94. 慎重处理特比萘芬与西咪替丁的合用	28
95. 慎重处理阿糖腺苷与别嘌醇的合用	28
第 2 章 抗寄生虫病药物联合用药禁忌	29
1. 氯喹与氯化铵不宜合用	29
2. 8-羟基喹林软膏不宜选用石蜡基质	29
3. 哌嗪不宜与噻嘧啶合用	29
4. 慎重处理甲苯咪唑与苯妥英的合用	30
5. 吡喹酮不宜与地塞米松合用	30

第3章 主要作用于中枢神经系统药物的联合用药禁忌	31
1. 咖啡因忌与苯丙醇胺合用	31
2. 咖啡因忌与甲氧沙林合用	31
3. 慎重处理咖啡因与苯乙肼的合用	32
4. 咖啡因不宜与呋拉茶碱合用	32
5. 咖啡因忌与西咪替丁合用	32
6. 多沙普仑忌与碳酸氢钠合用	32
7. 香草二乙胺忌与吗氯贝胺合用	33
8. 左旋多巴不宜与苯海索合用	33
9. 左旋多巴不宜与维生素 B ₆ 合用	33
10. 左旋多巴忌与蛋氨酸合用	34
11. 左旋多巴忌与胡椒碱合用	34
12. 左旋多巴不宜与罂粟碱合用	34
13. 溴隐亭忌与乙醇合用	34
14. 溴隐亭忌与红霉素合用	35
15. 溴隐亭不宜与灰黄霉素合用	35
16. 溴隐亭不宜与口服避孕药合用	35
17. 金刚烷胺忌与阿托品合用	35
18. 苯妥英忌与阿斯巴糖合用	36
19. 苯妥英不宜与乙醇合用	36
20. 苯妥英不宜与别嘌醇合用	36
21. 苯妥英与活性炭慎重合用	36
22. 苯妥英忌与登齐醇合用	37
23. 苯妥英与克拉霉素慎重合用	37
24. 苯妥英与左丙氧芬慎重合用	37
25. 苯妥英忌与氯苯那敏合用	37
26. 苯妥英与非氨酯慎重合用	38

联合用药禁忌

27. 苯妥英忌与西咪替丁合用	38
28. 苯妥英忌与萘咪酮合用	38
29. 苯妥英与地塞米松慎重合用	39
30. 苯妥英不宜与卤加比合用	39
31. 苯妥英与二氮嗪慎重合用	39
32. 苯妥英不宜与双硫仑合用	39
33. 苯妥英不宜与司替戊醇合用	40
34. 苯妥英忌与多巴胺合用	40
35. 苯妥英与叶酸慎重合用	41
36. 苯妥英忌与胺碘酮合用	41
37. 苯妥英忌与异烟肼合用	41
38. 苯妥英忌与氟康唑合用	42
39. 苯妥英不宜与咪康唑合用	42
40. 苯妥英与保泰松慎重合用	42
41. 苯妥英不宜与磺吡酮合用	43
42. 苯妥英与磺胺甲噻二唑慎重合用	43
43. 苯妥英与甲氧苄啶慎重合用	43
44. 苯妥英与苯丁酰脲慎重合用	43
45. 苯妥英与非尼拉多慎重合用	43
46. 苯妥英与蔗糖铝慎重合用	44
47. 苯妥英不宜与流感疫苗合用	44
48. 苯妥英不宜与利福平合用	44
49. 苯妥英与甲氨蝶呤慎重合用	45
50. 苯妥英不宜与舒噻美合用	45
51. 苯妥英忌与替尼酸合用	45
52. 苯妥英不宜与氨己烯酸合用	45
53. 苯妥英忌与阿扎丙宗合用	46
54. 苯妥英不宜与氯贝丁酯合用	46

55. 苯妥英与扑米酮慎重合用	46
56. 卡马西平与丙戊酸慎重合用	46
57. 卡马西平忌与氟西汀合用	47
58. 卡马西平忌与活性炭合用	47
59. 卡马西平不宜与红霉素合用	47
60. 卡马西平与异烟肼慎重合用	48
61. 卡马西平与烟酰胺慎重合用	48
62. 卡马西平与茶咪酮慎重合用	48
63. 卡马西平不宜与丙氧芬合用	48
64. 卡马西平与司替戊醇慎重合用	49
65. 卡马西平不宜与维拉帕米合用	49
66. 卡马西平不宜与利血平合用	49
67. 卡马西平与维洛沙嗪慎重合用	50
68. 卡马西平与达那唑慎重合用	50
69. 卡马西平与丙戊酰胺慎重合用	50
70. 卡马西平与拉莫三嗪慎重合用	51
71. 拉莫三嗪与苯妥英慎重合用	51
72. 拉莫三嗪不宜与对乙酰氨基酚合用	51
73. 非尔氨酯忌与丙戊酸合用	52
74. 非尔氨酯不宜与苯妥英合用	52
75. 非尔氨酯不宜与卡马西平合用	52
76. 氯巴占与苯巴比妥慎重合用	52
77. 氯巴占与苯妥英慎重合用	53
78. 氯巴占与卡马西平慎重合用	53
79. 氯巴占与丙戊酸慎重合用	53
80. 不宜与氯丙嗪合用的药物	54
81. 氯丙嗪忌与氟烷合用	54
82. 氯丙嗪忌与左旋多巴合用	54

83. 氯丙嗪忌与乙醇合用	54
84. 氯丙嗪忌与甲喹酮合用	55
85. 氯丙嗪与西咪替丁慎重合用	55
86. 氯丙嗪忌与甲氧氯普胺合用	55
87. 氯丙嗪不宜与苯乙肼合用	55
88. 氯丙嗪忌与苯丙胺合用	56
89. 氯丙嗪与苄托品慎重合用	56
90. 氯丙嗪忌与二氮嗪合用	56
91. 氯丙嗪不宜与曲唑酮合用	56
92. 氯丙嗪忌与碳酸锂合用	57
93. 硫利哒嗪不宜与卡马西平合用	57
94. 硫利哒嗪忌与纳曲酮合用	57
95. 硫利哒嗪禁与苯丙醇胺合用	57
96. 氟哌啶醇与卡马西平慎重合用	58
97. 氟哌啶醇不宜与利福平合用	58
98. 氟哌啶醇与氟西汀慎重合用	58
99. 氟哌啶醇与异烟肼慎重合用	58
100. 碳酸锂不宜与卡托普利合用	59
101. 碳酸锂与乙酰唑胺慎重合用	59
102. 碳酸锂与维拉帕米慎重合用	59
103. 碳酸锂与卡马西平慎重合用	60
104. 碳酸锂与氯噻嗪慎重合用	60
105. 碳酸锂不宜与氟西汀合用	60
106. 碳酸锂不宜与硫利哒嗪合用	60
107. 碳酸锂不宜与氟哌啶醇合用	61
108. 碳酸锂与氯化钠慎重合用	61
109. 碳酸锂与甲硝唑慎重合用	62
110. 碳酸锂不宜与吡哌美辛合用	62

111. 碳酸锂不宜与大观霉素合用	62
112. 碳酸锂不宜与茶碱合用	62
113. 碳酸锂不宜与碘化钾合用	63
114. 碳酸锂不宜与四环素合用	63
115. 碳酸锂不宜与吗咧啉合用	63
116. 丙咪嗪忌与格鲁米特合用	63
117. 慎重处理丙咪嗪与苯乙肼的合用	64
118. 丙咪嗪不宜与异烟肼合用	64
119. 慎重处理丙咪嗪与卡马西平合用	64
120. 慎重处理丙咪嗪与碘赛罗宁的合用	65
121. 丙咪嗪不宜与反苯环丙胺合用	65
122. 慎重处理地昔帕明与美沙酮的合用	66
123. 慎重处理去甲替林与奎尼丁的合用	66
124. 慎重处理阿米替林与硝西泮的合用	66
125. 阿米替林不宜与硫糖铝合用	66
126. 阿米替林忌与奥芬那君合用	67
127. 慎重处理非莫西汀与西咪替丁的合用	67
128. 苯乙肼不宜与舍曲林合用	67
129. 苯乙肼禁与氟西汀合用	67
130. 苯乙肼禁与右美沙芬合用	68
131. 苯乙肼忌与乙醇合用	68
132. 慎重处理苯乙肼与左旋多巴的合用	68
133. 慎重处理吗氯贝胺与西咪替丁的合用	69
134. 氟西汀忌与 L-色氨酸合用	69
135. 苯乙肼忌与 L-色氨酸合用	69
136. 不宜与镇静催眠药合用的药物	70
137. 苯巴比妥不宜与阿司匹林合用	70
138. 苯巴比妥不宜与乙醇合用	71

联合用药禁忌

139. 苯巴比妥不宜与活性炭合用	71
140. 慎重处理苯巴比妥与氢氧化铝的合用	72
141. 苯巴比妥忌与硫酸镁合用	72
142. 苯巴比妥不宜与地芬诺酯合用	72
143. 苯巴比妥不宜与西沙必利合用	73
144. 慎重处理苯巴比妥与司替戊醇的合用	73
145. 慎重处理苯巴比妥与磺胺嘧啶的合用	73
146. 慎重处理苯巴比妥与咪康唑的合用	73
147. 慎重处理苯巴比妥与丙戊酸的合用	73
148. 慎重处理地西洋与奥美拉唑的合用	74
149. 慎重处理地西洋与西咪替丁的合用	74
150. 地西洋忌与乙醇合用	74
151. 地西洋忌与氨茶碱合用	75
152. 地西洋忌与氯普噻吨合用	75
153. 慎重处理地西洋与氟西汀的合用	75
154. 劳拉西洋不宜与丙磺舒合用	76
155. 替马西洋禁与苯海拉明合用	76
156. 慎重处理氟硝西洋与芬太尼的合用	76
157. 三唑仑不宜与红霉素合用	76
158. 咪唑仑不宜与苯乙肼合用	77
159. 阿普唑仑不宜与右丙氧芬合用	77
160. 甲丙氨酯忌与乙醇合用	77
161. 水合氯醛忌与乙醇合用	77
162. 水合氯醛忌与氯丙嗪合用	78
163. 甲喹酮禁与苯海拉明合用	78
164. 格鲁米特忌与丙咪嗪合用	78
165. 氯美噻唑忌与乙醇合用	78
166. 氯美噻唑不宜与西咪替丁合用	79

167. 半琥珀酸丁辛酰胺忌与乙醇合用	79
168. 半琥珀酸丁辛酰胺不宜与西咪替丁合用	80
169. 替吡度尔忌与乙醇合用	80
170. 替吡度尔不宜与碳酸锂合用	80
171. 替吡度尔忌与丙咪嗪合用	80
172. 替吡度尔忌与苯乙肼合用	81
173. 阿托品忌与乙醇合用	81
174. 溴米那忌与乙醇合用	81
175. 格鲁米特忌与乙醇合用	81
176. 米安色林忌与乙醇合用	82
177. 氟伏沙明忌与乙醇合用	82
178. 维拉帕米忌与乙醇合用	82
179. 双硫仑忌与乙醇合用	82
180. 氢吗啡酮禁与乙醇合用	83
181. 吗啡不宜与喷他佐辛合用	83
182. 吗啡不宜与西咪替丁合用	83
183. 慎重处理氯丙嗪与哌替啶的合用	83
184. 苯乙肼禁与哌替啶合用	84
185. 苯巴比妥忌与哌替啶合用	84
186. 哌替啶不宜与口服避孕药合用	84
187. 美沙酮不宜与苯妥英合用	85
188. 美沙酮忌与利福平合用	85
189. 芬太尼不宜与吗氯贝胺合用	85
190. 慎重处理阿芬他尼与红霉素的合用	86
191. 曲马朵不宜与苯乙肼合用	86
192. 慎重处理丙氧芬与乙醇的合用	86
193. 吲哚美辛不宜与氟哌啶醇合用	86
194. 慎重处理吲哚美辛与丙磺舒的合用	87