

中等护士专业  
医学多选题集  
内科学及护理分册

1984·9

# 中等护士专业

# 医学多选题集

## 内科学及护理分册

编 审

张恩宏 毛大成

张魁元

辽宁省铁岭地区卫生学校

## 前　　言

这套《医学多选题集》是根据部颁中等卫生学校护士专业教学大纲的要求和统编教材的内容，以我们在组织我校一九八四年护士毕业班总复习所编复习题和模拟试题为基础，并参考兄弟院校的多选题，整理编辑而成，供内部使用。

本《集》可供护士专业学生复习考试、从事护士专业者自学以及晋级考试参考使用。对其他卫生专业的初、中级人员的学习，也有一定参考意义。

本《集》包括《基础护理学分册》（1100余题）《内科学及护理分册》（1800余题）和《外科学及护理分册》（1500余题）三部分。总共近4500余题。

《医学多选题集》编审成员：张魁元（主编）王英娟、包英华、张凤珍、张恩宏、毛大成、邢志强、谷捷三、齐乃刚。

由于我们的水平有限，时间仓促，错误和不妥之处在所难免，希望读者批评指正。

编　者

1984.9

## 解题说明

### 一、A型题(最佳回答题)：

先列出一段叙述性主题，接着写出A、B、C、D、E五个备选答案，其中只有一个是最正确的(亦可能是问题中要求指出错误的一个)，称为正确选择或正确答案，另外四个为干扰答案。有的干扰答案全错，有的是部分正确的。答题时从五个备选答案中选一个最佳答案，在答卷上将相应题号的相应字母涂黑，表示正确回答。如果选择两个或两个以上答案，视为无效。

### 二、B型题(配伍题)：

先列出A、B、C、D、E五个备选答案，接着是几个试题。要求回答每一问题时在五个备选答案中选择一个正确答案与之配伍，并在答卷上将相应题号的相应字母涂黑。备选答案中的每一个答案，可以重复使用，也可以不被选用。

### 三、C型题(比较选择题)

先列出A、B、C、D四个答案，接着是几个试题。要求对A和B列出的两种现象进行对比，因此有四种可能性：A是正确的，答案为A；B是正确的，答案为B；A和B都正确，答案为C；A和B都不正确，答案为D。回答问题时，在答卷上将认为正确的相应题号的相应字母涂黑，每题只许选一个正确答案，否则视为无效。

### 四、K型题(复合是非题)：

先列出一段叙述性主题，接着是①、②、③、④标出的

四个备选答案。答案是按固定的方式进行组合，其方式为：

- A : ① + ② + ③
- B : ① + ③
- C : ② + ④
- D : ④
- E : ① + ② + ③ + ④

其意为：如果认为正确答案包括①、②、③则在答卷上将相应题号的A涂黑；如果认为正确答案包括①和③，则将答卷上相应的B涂黑；如果认为正确答案包括②和④，则将答卷上相应的C涂黑；如果认为正确答案为④，则将答卷上相应的D涂黑；如果认为正确答案包括①、②、③、④，则将答卷上相应的E涂黑。每题只许选择A、B、C、D、E五组答案中的一个，否则视为无效。

# 目 录

## 第一篇 诊断学基础

第一章 常见症状.....	1
第二章 病史的采取及体格检查.....	9
第三章 检验诊断.....	37
第四、五、六章 X线检查 心电图 检查 超声波检查 .....	47

## 第二篇 系统内科学及护理

第一章 内科疾病护理总论.....	52
第二章 呼吸系统疾病及护理.....	54
第三章 消化系统疾病及护理.....	86
第四章 循环系统疾病及护理 .....	121
第五章 泌尿系统疾病及护理 .....	177
第六章 造血系统疾病及护理 .....	191
第七章 内分泌、代谢疾病及护理 .....	203
第八章 理化因素所致疾病及护理 .....	221
第九章 骨关节病及护理 .....	228
第十章 神经精神病及护理 .....	230
第十一章 诊疗技术 .....	245

# 第一篇 诊断学基础

## 第一章 常见病状

### [A型题]

- 1、发热是致热物质作用于  
A、中脑                            B、妊娠毒血症  
B、丘脑上部                    C、脑膜炎  
C、丘脑下部                    D、脑血栓形成  
D、桥脑                           E、脑栓塞  
E、延髓
- 2、稽留热常见于  
A、肝脓肿                        A、大脑皮层  
B、典型大叶性肺炎            B、丘脑上部  
C、风湿热                        C、丘脑下部  
D、败血症                        D、桥脑  
E、肾盂肾炎                    E、延髓
- 3、非器质性头痛见于  
A、乙型脑炎                    A、百日咳  
B、流行性脑脊髓膜炎          B、急性支气管炎  
C、蛛网膜下腔出血            C、支气管扩张伴感染  
D、屈光不正                    D、胸膜炎  
E、神经衰弱                    E、浸润型肺结核
- 4、头痛伴发热，呕吐可能是  
A、高血压脑病                   A、支气管扩张症  
B、急性支气管炎                B、急性支气管炎  
C、支气管哮喘                   C、支气管哮喘

- D、支气管异物  
E、慢性支气管炎
- 8、大量咯血指咳血量至少为  
A、10毫升  
B、20毫升  
C、50毫升  
 D、100毫升  
E、1000毫升
- 9、鉴别呕血与咯血下列哪项是错误的?  
A、有无心肺疾患或消化系统疾病的病史  
B、吐出的血液是鲜红的带泡沫为咯血  
C、血液呈酸性的应考虑为呕血  
 D、有黑便即可确定为呕血  
E、咯血前常伴有咳嗽、胸痛
- 10、下列哪项不发生呕血  
A、食道炎  
 B、急性左心衰竭  
C、胃炎  
D、门脉高压症  
E、再生障碍性贫血
- 11、除……外均常发生腹泻  
A、萎缩性胃炎  
B、局限性肠炎  
C、慢性胰腺炎  
D、肝硬化  
 E、甲状腺机能减退
- 12、局限性水肿可见于  
A、右心衰竭  
B、肾病综合症  
C、甲状腺机能减退  
D、肝硬化  
 E、以上都不是
- 13、全身性疾病引起昏迷的是  
A、脑肿瘤  
B、原发性癫痫  
C、脑溢血  
D、硬脑膜外血肿  
 E、肺性脑病
- 14、关于昏迷下列哪项错误  
A、为疾病重危征象  
B、深昏迷时对各种刺激均无反应、大小便失禁  
 C、浅昏迷时呼吸不规则、血压开始下降  
D、浅昏迷时对压眶有防御反射、角膜反射存在  
E、深昏迷时咳嗽、吞咽及

- 腱反射消失
- 15、排柏油样便提示上消化道出血量至少为
- A、5毫升  
B、10毫升  
C、20毫升  
D、50毫升  
E、60毫升
- 16、出现紫绀时血液还原血红蛋白超过
- A、1.5克%  
B、10毫克%  
C、5克%  
D、2克%  
E、3克%
- 17、血液中总胆红素浓度超过多少可使皮肤出现黄染?
- A、0.1毫克%  
B、0.5毫克%  
C、1.0毫克%  
D、2.0毫克%  
E、1.5毫克%
- 18、哪项与心源性水肿关系最密切?
- A、肾滤过减少  
B、钠、水潴留
- C、血浆胶体渗透压降低  
D、毛细血管滤过压增高  
E、毛细血管渗透性增强
- 19、病人不易唤醒、答话含糊不清，答非所问应为
- A、意识模糊  
B、昏睡  
C、昏迷  
D、谵妄  
E、嗜睡
- 20、不符合溶血性黄疸的是
- A、凡登伯试验间接反应阳性  
B、尿胆元增加  
C、血胆红素增加  
D、粪胆元增加  
E、尿胆红素阳性
- 21、发热最常见的原因是
- A、变态反应  
B、植物神经机能紊乱  
C、体温调节中枢功能失常  
D、无菌性坏死组织的吸收  
E、感染
- 22、女20岁、突然发生意识障碍，面色苍白，脉速而弱，平卧后10分钟逐渐好

转应考虑为

- A、嗜睡
- B、昏睡
- C、晕厥
- D、浅昏迷
- E、深昏迷

23、心血管疾病中伴咯血最多

见是

- A、先天性心脏病
- B、二尖瓣狭窄
- C、高血压病
- D、冠心病
- E、慢性肺心病

24、男28岁，半小时前被汽车撞倒，急送医院。查体：

血压140/90毫米汞柱，呼之不应，对光反射存在，小便失禁，压眶有痛苦表情，四肢躁动，应属于

- A、嗜睡
- B、昏睡
- C、意识模糊
- D、浅昏迷
- E、深昏迷

25、在严重缺氧时不出现紫绀的是

- A、肺气肿
- B、心力衰竭
- C、严重贫血
- D、缩窄性心包炎
- E、休克

#### 〔B型题〕

- A、咳大量脓性痰
- B、咳铁锈色痰
- C、咳粘液脓痰
- D、咳果酱色痰
- E、咳粉红色泡沫痰

26、大叶性肺炎

27、阿米巴肺脓肿

28、支气管扩张并感染

29、急性肺水肿

30、细菌性肺脓肿

31、慢性支气管炎

- A、脂肪泻
- B、脓血便
- C、血便
- D、陶土样便
- E、水样便

32、慢性胰腺炎

33、阻塞性黄疸

#### 〔C型题〕

- A、阻塞性黄疸

B、肝细胞性黄疸

C、两者均有

D、两者均无

34、肝癌

35、胆道蛔虫症

A、中枢性紫绀

B、周围性紫绀

C、二者均是

D、二者均不是

36、肠原性紫绀

37、休克性肺炎

〔K型题〕

38、下面哪项能引起发热?

①心肌梗死

②脑溢血

③急性溶血

④肺癌

39、弛张热的体温曲线特点为

①体温常升高达39℃以上

②发热无一定规律

③一日内温差可达2℃以上

④发热期与无热期常交替出现

40、关于稽留热正确的是

①高热持续达数日

②一日内体温波动可达2℃

以上

③常见于伤寒

④体温常升高在38℃左右

41、可引起头痛的疾病是

①青光眼

②鼻窦炎

③贫血

④高血压

42、咳嗽伴咳痰见于

①慢性支气管炎

②肺脓肿

③支气管扩张症

④胸膜炎

43、可发生咯血的是

①肺梗死

②气管异物

③肺转移癌

④门脉高压症

44、可导致呼吸困难的是:

①左心衰竭

②气管异物

③支气管哮喘

④尿毒症

45、呼吸困难可分为

①吸气性呼吸困难

②呼气性呼吸困难

③混合性呼吸困难

④张口端坐呼吸

46、可发生呕血的疾病是

①胆道蛔虫症

②食道癌

③缺铁性贫血

④再生障碍性贫血

C

47、病人排黑便应考虑

①胃、十二指肠溃疡

②胰腺癌

③胃粘膜脱垂

E

④服活性炭、铁剂等

48、呕吐可见于

①脑血管意外

B

②幽门梗阻

③内耳眩晕症

④尿毒症

49、呕血可见于

①白血病

A

②胆结石

③胃癌

④结肠癌

50、胸痛常见的病因是

①心绞痛

B

②食道炎

③膈下脓肿

④自发性气胸

51、紫绀出现在下列哪个部位  
最明显？

①口唇

B

②前额

③鼻尖

④颈部

52、中枢性紫绀可见于

①大叶性肺炎

B

②缩窄性心包炎

③自发性气胸

④亚硝酸盐中毒

53、能引起恶心呕吐的疾病有

①阑尾炎

A

②癔病

③胃炎

④过敏性肠炎

54、可引起腹痛的是

①大叶性肺炎

A

②糖尿病酮症酸中毒

③过敏性紫癜

④支气管扩张症

55、腹泻产生的主要机理是

①肠道运动机能亢进

B

②肠道消化与吸收功能亢进

③肠道炎症刺激

- ④阿托品药物中毒

56、下面可引起腹泻的是

- ①甲亢

- ②酒精中毒

- ③糖尿病

- ④慢性肝炎

2

57、全身性水肿可见于

- ①严重营养不良

A

- ②缩窄性心包炎

- ③肝硬化

- ④丝虫病

58、符合水肿发生机制的是

- ①水钠异常潴留

H

- ②血浆胶体渗透压降低

- ③淋巴回流受阻

- ④毛细血管滤过压降低

59、可发生器质性便秘有

- ①泌尿道结石、胆结石

A

- ②脑炎、脑肿瘤

- ③阑尾炎、腹膜炎

- ④内脏下垂

60、昏迷可见于

- ①阿—斯氏综合症

b

- ②尿毒症

- ③有机磷中毒

- ④败血症

61、浅昏迷时

B

- ①病人意识丧失，无自主运动

- ②呼吸不规则，血压开始下降

- ③角膜反应仍存在

- ④对强烈的疼痛刺激无反应

62、深昏迷时

A

- ①对各种刺激均无反应

- ②全身肌肉松弛

- ③呼吸不规则，血压开始下降

- ④咳嗽、吞咽反射存在

63、突然发生的昏迷可见于

- ①尿毒症

J

- ②糖尿病酮症酸中毒

- ③妊娠毒血症

- ④脑溢血

64、可出现黄疸的疾病有

- ①败血症

- ②胰头癌

- ③中毒性肝炎

- ④胆道蛔虫症

65、阻塞性黄疸化验可见

- ①凡登伯试验直接反应阳性

- ②尿胆红素阳性

- ③碱性磷酸酶增高 29 · E 30 · A 31 · C  
 ④尿胆元增加 32 · A 33 · D 34 · C
- 66、肝细胞性黄疸化验可见  
 ①血中结合胆红素可升高 35 · A 36 · D 37 · C  
 ②尿中尿胆元升高 38 · E 39 · B 40 · B  
 ③转氨酶和絮状试验异常 41 · E 42 · A 43 · A  
 ④凡登伯试验常呈双相反应 44 · E 45 · A 46 · C
- 67、尿中不出现胆红素的疾病  
 有  
 ①肝硬化 47 · E 48 · E 49 · A  
 ②胰头癌 50 · E 51 · B 52 · B  
 ③病毒性肝炎 53 · A 54 · A 55 · B  
 ④异型输血 56 · E 57 · A 58 · A  
 59 · A 60 · E 61 · B  
 62 · A 63 · D 64 · E  
 65 · A 66 · E 67 · D  
 68 · C
- 68、溶血性黄疸可见于  
 ①药物反应，如氯丙嗪  
 ②苯中毒  
 ③钩端螺旋体病  
 ④蛇咬伤

### 答 案

- 1 · C 2 · B 3 · E 4 · C  
 5 · E 6 · C 7 · A 8 · D  
 9 · D 10 · B 11 · E 12 · E  
 13 · E 14 · C 15 · E 16 · C  
 17 · D 18 · D 19 · B 20 · E  
 21 · E 22 · C 23 · B 24 · D  
 25 · C 26 · B 27 · D 28 · A

## 第二章 病史的采集及体格检查

### 〔A型题〕

1、某一女病人的月经情况为，  
每月行经3至5天，周期为  
28至30天，末次月经时间  
为79.12.12，初潮年令是  
14岁，应记录为

- A、3—5— $\frac{14}{79.12.12}$ —28—30  
B、14— $\frac{28-30}{79.12.12}$ —3—5  
C、14— $\frac{3-5}{28-30}$ —79.12.12  
D、—79.12.12— $\frac{3-5}{28-30}$ —14  
E、14— $\frac{28-30}{3-5}$ —79.12.12

2、间接叩诊法错误的是

- A、左手中指第二指节紧贴于叩诊部位  
B、用右手中指指端叩击左手第二指节前端  
C、叩击方向应与叩诊部位垂直  
D、动作要灵活，短促而有

弹性

E、用腕关节和肘关节活动力量来叩击  
3、对大量腹水患者肝脏触诊常用

- A、浅部触诊法  
B、深部滑行触诊法  
C、双手触诊法  
D、冲击触诊法  
E、深插触诊法

4、下列叩诊音不正确的是

- A、浊音：音调较高、音响较弱  
B、实音：音调更高、音响较弱  
C、鼓音：比清音的音响强  
D、过清音：比鼓音的音响更强  
E、清音：音调低，音响较强

5、吸气时脉搏减弱或消失为

- A、交替脉

- B、奇脉  
C、水冲脉  
D、重脉  
E、不整脉
- 6、脉搏骤起骤降急促有力为  
A、短绌脉  
B、奇脉  
C、重搏脉  
D、水冲脉  
E、交替脉
- 7、节律正常而交替出现一强一弱的脉搏可见于  
A、甲亢  
B、心包积液  
C、冠心病心衰  
D、伤寒  
E、二尖瓣狭窄
- 8、水冲脉常见于  
A、心包积液  
B、伤寒  
C、主动脉瓣关闭不全  
D、二尖瓣狭窄  
E、室间隔缺损
- 9、糖尿病酮症酸中毒患者的呼吸特点为  
A、毕奥氏呼吸
- B、库司模氏大呼吸  
C、潮式呼吸  
D、呼吸变浅而稍慢  
E、呼吸变浅而稍快
- 10、呼吸与呼吸暂停相交替提示为  
A、潮式呼吸  
B、库司模氏大呼吸  
C、毕奥氏呼吸  
D、正常呼吸  
E、肺气肿
- 11、昏睡与浅昏迷的鉴别要点是  
A、有无瞳孔反射  
B、有无角膜反射  
C、有无病理反射  
D、病人能否唤醒  
E、压眶有无反应
- 12、烦躁不安、颜面潮红、呼吸急促、表情痛苦是  
A、慢性病容  
B、恶液质  
C、病危面容  
D、二尖瓣面容  
E、急性病容
- 13、胸腔积液病人常取

- A、端坐位      B、蜘蛛痣  
B、仰卧位      C、充血性皮疹  
C、俯卧位      D、瘀斑  
D、侧卧位      E、紫癜
- 14、心衰患者常被迫采取  
A、变换体位      B、自动体位  
C、仰卧位      D、强迫坐位  
E、侧卧位
- 15、关于皮肤粘膜下出血哪项不正确  
A、指压后不褪色      B、最多见于造血系统的疾病  
C、败血症患者也可有皮下出血      D、直径小于2毫米称为出血点  
E、直径大于2毫米称之为瘀斑
- 16、在皮肤上发现多数红点，直径1~2毫米压之不能褪色应考虑为  
A、皮下出血点      B、蜘蛛痣      C、充血性皮疹  
D、瘀斑      E、紫癜
- 17、在患者左锁骨上区，触到一质硬，直径为1.5厘米的淋巴结，无压痛、较固定，可能性最大的是  
A、肺癌转移      B、淋巴结炎  
C、淋巴结核      D、胃癌转移  
E、急性白血病
- 18、正常人瞳孔直径大小为  
A、1~2毫米      B、2~3毫米  
C、3~4毫米      D、4~5毫米  
E、5~6毫米
- 19、男患，45岁，因颅内高压，视神经乳头水肿而入院，当晚出现两侧瞳孔大小不等，应考虑可能发生  
A、脑缺血      B、脑缺氧  
C、脑疝