

校正外科正宗

卷三

流注 痔瘡 臂癰

乳癰 下疳 楊梅瘡

附骨疽 魚口便毒 結毒

腸癰 囊癰 多骨疽

臟毒 懸癰 陰瘡

流注論第三十二

夫流者行也乃氣血之壯自無停息之機注者住也因氣血之衰是有凝滯之患稍案流注者其毒流走其形漫腫無頭皮色不變母論只直隨處可生凡得此者多生於體虛之人勤勞之輩不慎調變夏秋露臥縱意取涼熱體當風圖身快爽或中風邪發散未盡或後陰虛外寒所侵又或惱怒傷肝鬱結傷脾榮氣不從逆於肉裏又或跌打損傷瘀血凝滯或產後惡露未盡流宿經絡皆成斯疾既成之後當分表裏寒熱虛實邪正新久而治之初因風寒所中表症發散未盡者人參敗毒散散之房慾之後體虛寒氣外侵者五積散加附子溫之附子勞傷鬱怒思慮傷脾而成者歸脾湯加香附青皮散之跌撲傷損瘀血凝滯而成者復元活血湯逐之產後惡露未盡流注經絡而成者木香流氣飲導之此皆初起將成法治一服至三四服皆可外俱用琥珀膏敷貼其中亦有可消者十中五六如服前藥不得內消者法當大養氣血徐曰尤培助脾胃溫煖經絡通行關節木香流氣散十全大補湯俱加熟附子香附熟附子培助根本如此則未成者自消已成者自潰已潰者自飲而終無破敗破漏不斂之症如有膿宜急開之患者又當慎起居戒七情遠寒就溫庶可保全若誤用寒涼剋伐內消等藥終至不救者多矣徐曰流注有虛痰實痰兩種又曰流注一症由風寒入膜所致膜在皮中旁通四達初無定處所以隨處作患此真脈絡之病故古人製大活絡丹以治之其餘煎丸皆非正治蘇州一小兒甫九歲患流注肩背腰脅十餘處百端醫治無效余曰此惟大活絡丹能愈服至三十餘丸未破者消已破者收口更服補氣血之藥而愈此條從回溪醫案移入

流注看法

初起漫腫皮色光亮微熱微疼筋骨不牽強者順已成身體微熱飲食有味疼痛有時腫生紅色者順已潰膿稠而黃腫消痛止身體輕便起坐如常者順潰後內肉易生膿水易止精神易復膿口易合者順初起身體發熱脈

細而數皮色微腫痛徹筋骨者險已成飲食少思口乾作渴身體疼痛四肢沉重者險已潰膿水清稀腫仍不消虛熱不退疼痛不減者逆潰後膿穢不止肌膚瘦削飲食不食發熱皮粗者死 徐曰看法亦與諸症相同

流注治法

初起風寒表散未盡而後復生腫痛者再宜和解之表邪已盡而後復生流注者宜清熱消腫行散氣血暴怒所傷抑鬱所致胸膈痞悶中氣不舒宜順氣寬中腫硬已成而不得內消者宜和氣血更兼補助脾胃跌撲閃胸瘀血凝滯為患者宜調和氣血通行經絡寒邪所襲筋骨骨痛及遍身疼痛者溫經絡行氣血產後瘀血流注關節致生腫痛者當散敗瘀養氣血潰後膿水不止而形衰食少者宜滋氣血峻補脾胃 徐曰亦與諸症相同

流注治驗

一男子風寒表散未盡兩腮腫痛微熱不退用小柴胡湯加川芎天花粉徐曰天花粉桔梗連翹二服熱頓退又以二陳湯加桔梗黃芩牛蒡子連翹四服十日而安 徐曰此乃風痰非流注也

一男子勞傷受寒背生三腫皮色不變寒熱交作至夜尤甚先以萬靈丹洗浴發汗寒熱頓退惟腫硬不消以琥珀膏敷之三次腫消痛止漸平 徐曰此亦風痰所聚

一婦人因怒脇下結腫將近半年方痛此肝氣鬱結之症用木香流氣散四服其腫漸紅益病久必欲作膿不可內消又以十全大補湯徐曰加木香香附青皮十餘服腫漸高又以本方加皂角刺五服其膿乃潰清而且多此元氣已經虧損所致服人參養榮湯加熟附子徐曰月餘膿始稠少本方倍參者歸來兩月而愈

一男子元氣素虛因暴怒得生腫塊疼痛牽強寒熱往來飲食減少以補中益氣湯此五字徐曰加香附貝母十餘服寒熱漸止又服益氣養榮湯月餘而腫潰開服八珍湯外用香附餅日灸二次徐曰脾胃健而安

一婦人項間乳上各腫一塊將近一年漸大而痛診之脈細數而無力此思慮過傷之症用歸脾湯加桔梗香附十餘服腫漸高以琥珀膏敷之色漸紅欲其作膿以十全大補湯加桔梗貝母服之半日膿熟針之頭腐膿清

虛熱復作食少不睡仍以歸脾湯間道送散服之三月而愈

一男子平素怯弱腰後微腫一塊飲食少思口乾發熱此腎傷也治當朝以附桂八味丸以上七字徐曰大誤午用人參

養榮湯扶植根本為要。彼以口乾發熱為內有大。何得又用熱藥欲投清涼之劑解之。徐曰其死亦不以余辭不治。彼請內科治之以退熱為主。正合其意。授藥三劑。腹痛作瀉。又以豬苓澤瀉厚朴。此三味徐物泄氣等藥投之大熱發作。形體更變。復請余治。余曰死期速矣。因虛致病。法當滋補。况腫在腰間。內腎受傷。口乾作渴。腎水枯竭。發熱不退。陰虛血少。今以有餘之藥而療不足之症。豈有不死者哉。又半月而死。徐曰以上所載五案皆係疾毒。並非流注之病。流注者纏綿不已。或五或七或九。愈者愈。發者發。變態多端。若初生一兩個旋即消潰。皆非真流注也。

流注主治方

調和榮衛湯

調和榮衛湯。芍藥白芷。獨活。甘草。黃芩。大茴。

獨活。甘草。黃芩。大茴。

治流注初起。氣血凝聚。結腫不散。已成未成。並服。

川芎

當歸

陳皮

獨活

赤芍

白芷

黃芩

大茴

白芷

烏藥

大茴

黃芩

甘草

紅花

牛膝

下部

水

二茶鍾

煎八分

入酒一盞

量病上下服

徐曰

通治之方

但少痰藥

梔子

大茴

香

一味

徐勒批曰

此味不解

木香

流氣

飲

枳殼

枳實

防風

半夏

白芍

甘草

大腹皮

木香

流氣

飲

枳殼

枳實

防風

半夏

白芍

甘草

大腹皮

治流注

瘰癧

及鬱結

為腫

或氣血凝滯

過身

走注

作痛

或

心胸痞悶

咽嗝不利

脇腹脹

嘔吐不食

上氣喘急

桔梗

青皮

陳皮

烏藥

黃耆

枳實

茯苓

防風

半夏

白芍

甘草

大腹皮

木香

檳榔

澤瀉

枳殼

枳實

牛膝

下部

加水三茶鍾

薑三片

棗一枚

煎八分

食遠服

徐曰

此流注主方

藥味太

雜

宜擇用

梔子

青皮

烏藥

大腹皮

木香

枳殼

枳實

防風

半夏

白芍

甘草

大腹皮

木香

治諸鬱結腫及左右二搭相串

濕痰流注等症

川芎

半夏

茯苓

香附

陳皮

山梔

各一

六鬱湯

六鬱湯

內用川芎

半夏

陳皮

香附

山梔

各一

蒼朮

砂仁

甘草

各五

水二茶鍾

薑三片

煎服

治諸鬱結腫及左右二搭相串

濕痰流注等症

川芎

半夏

茯苓

香附

陳皮

山梔

各一

茯苓

香附

陳皮

山梔

各一

蒼朮

砂仁

甘草

各五

水二茶鍾

薑三片

煎服

治諸鬱結腫及左右二搭相串

濕痰流注等症

川芎

半夏

茯苓

香附

陳皮

山梔

各一

蒼朮

砂仁

甘草

附子

八物湯

附子

八物湯

附子

八物湯

附子

八物湯

附子

八物湯

附子

八物湯

附子

八物湯

附子

八物湯

附子

八物湯

附子

八物湯

附子

八物湯

附子

八物湯

川芎

白芍

熟地

人參

白朮

茯苓

當歸

附子

各一

肉桂

木香

甘草

各三

水二茶鍾

薑三片

煎服

治諸鬱結腫及左右二搭相串

濕痰流注等症

川芎

半夏

茯苓

香附

陳皮

山梔

三忌

棗一枚

煎八分

食遠服

徐曰

此通治虛寒之方

非流注之方

凡立方

總當兼顧本症

一二不可全不照

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

應

瘡科流氣飲瘡科流氣飲芍歸 治流注及一切鬱怒凝滯氣血作脹疼痛或胸膈痞悶或

風涼溼毒搏於經絡結成腫塊者當歸甘草紫蘇人參白芍官桂黃耆防風枳殼烏

藥桔梗厚朴路七檳榔 木香 川芎 白芷路五 水二茶鍾煎八分食前服 徐曰此亦流注通治

之方與前義同

通經導滯湯通經導滯湯有附 赤芍芍歸熟地隨 治婦人產後敗血流注經絡結成腫塊疼痛者

香附赤芍 川芎 當歸 熟地 陳皮 紫蘇 牡丹皮 紅花 牛膝 枳殼路一 甘草節 獨活五

分 水二茶鍾煎八分入酒一小杯食前服 徐曰亦與前方相同皆重出

香附餅香附餅用香附木 酒和調成散風寒 治風寒流注襲於經絡結成腫痛用香附為末酒和量瘡大小

做餅覆患處熱熨斗熨藥上未成者自消已成者自潰風寒溼毒宜薑汁作餅 徐曰外治良法

醒脾湯醒脾湯中參木香 黃連 遠志 地骨皮 治懷抱鬱結思慮傷脾致脾氣不行逆於內裏乃生坐腫疼痛

不眠心煩不安神氣不清 白朮 黃耆 人參 茯苓 神各一酸棗仁 地骨皮 遠志路七 柴胡 甘草

桔梗 黃連 木香 香附各五 龍眼肉七 水二茶鍾薑三片棗二枚煎八分不拘時服 徐曰即歸脾湯

意 調中大成湯調中大成湯木附 苓歸芍藥薑參者 治流注潰後膿水清稀飲食減少不能生肌收斂

白朮 茯苓 歸身 白芍 陳皮 山藥 牡丹皮 黃耆各一 人參二 藿香 砂仁 遠志 甘草各五

附子 肉桂各八 水二茶鍾煨薑三片棗二枚煎八分食遠服 徐曰此病後調養方

黃耆六一湯黃耆六一湯參草 三味同煎功不小 治流注潰後膿水多出口乾作渴煩燥不寐

黃耆六錢半生 甘草一分 人參錢一 水二茶鍾煎八分食遠服

散血葛根湯散血葛根湯半生 芍防羌葛升麻 治跌撲損傷瘀血凝滯結成流注身發寒熱者

乾葛 半夏 川芎 防風 羌活 升麻 桔梗路八 白芷 甘草 細辛 蘇葉 香附 紅花路六

先天大造丸先天大造丸歸杞 治風寒溼毒襲於經絡初起皮色不變漫腫無頭或陰虛

外寒侵入初起筋骨痠痛日久遂腫潰後膿水清稀久而不愈漸成漏症者紫河車一具酒 熟地黃四兩

歸身茯苓 人參杞枸 菟絲子內從容酒洗 黃精白朮 何首烏同法用黑豆 川牛膝骨

碎補微炒 仙茅浸去赤汁蒸熟去 川巴戟去骨 破故紙炒 遠志各一兩 木香青鹽各五 丁有

三黑棗肉二 右為細末煉蜜丸如桐子大每服七十丸空心溫酒送下此方非獨流注成漏可用又補一

切氣血虛羸勞傷內損及男婦久無嗣息並有奇功 徐曰此通治補藥病後調養法又曰此虛人潰後補

藥初起禁用

琥珀膏琥珀膏中用大黃 治一切皮色不變漫腫無頭氣血凝滯結成流毒無論身體上

下年月新久但未成膿者大黃 鬱金南星 白芷各一 共為細末用大蒜頭去殼搗爛入上藥搗

稠再入酒一二匙調勻遍敷腫上紙蓋或即熱痛或不痛俱待藥乾便效次日又有起泡又有不起泡者如有

泡起挑去泡中黃水膏貼之自效 徐曰此吊毒法亦有必當用之法 又曰此提毒之法毒淺者自消凡一切

無頭腫痛之症俱效 梔案余所製消核膏流注初起貼之可消

附錄大活絡丹 治一切中風癱瘓痿痺痲瘋拘攣痲瘋癰疽流注跌撲損傷小兒驚癇婦人停經 白花蛇

烏梢蛇威靈仙 兩頭失酒 草烏天麻 煨全蝎 首烏黑豆 龜板炙 麻黃貫眾 炙草

羌活官桂 藿香烏藥 黃連熟地 大黃熟 木香沈香 附子製 細辛赤芍 沒藥法 丁香

乳香法 僵蠶天南星 姜青皮 骨碎補白寇 安息香酒 黑附子製 黃芩熟 香附酒浸 元

參白朮 防風五錢 葛根虎脰骨 炙當歸 兩半血竭 地龍炙 犀角廣香 松脂五

錢牛黃 片腦各半 人參三 右藥各研稱準合和再研蜜丸如桂圓核大金箔為衣陳酒送下須用白

蠟為圓收藏以免泄氣 徐曰頑痰惡風熱毒瘀血入於經絡非此不能透達乃治肢體大症必備之藥他書

活絡丹祇用地龍乳香等四五味乃治慈霍人寶邪之方不可用

流注應用方 十全大補湯 人參養榮湯 補中益氣湯 歸脾湯 益氣養榮湯 八珍湯俱見清 萬靈

丹陽腫 小柴胡湯 二陳湯 俱見原

乳癰乳岩論第三十三

夫乳病者乳房為陽明胃經所司乳頭為厥陰肝經所屬乳子之母不能調養以致胃汁濁而壅滯為脹又有憂鬱傷肝肝氣滯而結腫初起必煩渴嘔吐寒熱交作腫痛甚者宜牛蒡子湯主之厚味飲食暴怒肝火妄動結腫者宜橘葉散散之又憂鬱傷肝思慮傷脾積想在心所慮不得致經絡痞澀聚結成核初如豆大漸若團棗子半年一年二載三載不疼不癢漸漸而大始生疼痛痛則無解日後腫如堆棗或如覆碗紫色氣穢漸漸潰爛深者如岩穴凸者若泛蓮疼痛連心出血則具其時五臟俱衰四大不救名曰乳岩凡犯此者百人必百死知覺若早姑用清肝解鬱湯或益氣養榮湯患者再加清心靜養無罣礙服藥調理尚可苟延歲月若中年以後無夫之婦得此其犯尤速故曰夫乃婦之天也惟初生核時急用艾炷核頂待日起泡挑破用披針入四分此方徐勣批曰必更用冰蠅散條插入核內此四字糊紙封蓋至十三日其核自落用玉紅膏生肌飲口再當得養度不再發又男子乳癰與婦人微異女損肝胃男損肝腎蓋怒火房慾過度以致肝虛血燥腎虛精怯血脈不得上行肝筋無以榮養遂結腫痛治當八珍湯加山梔牡丹皮徐勣批口乾作渴者加減八味丸徐勣批勒腎氣素虛者腎氣丸已潰作膿者十全大補湯懷孕之婦乳疾曰內吹因胎氣旺而上衝致陽明乳房作腫宜石膏散清之此句徐勣批亦可消散遲則遷延日久將產出膿乳汁亦從膿竅流出其口難完有此者純用補托生肌其口亦易完矣徐曰乳病有數種種種各別須知之又曰乳腫不同俱係陽明結氣結痰各有專方一概瞎藥皆有損無益也

乳癰乳岩看法

初起紅赤腫痛身微寒熱無頭眩無口乾微痛者順已成掀腫發熱疼痛有時一囊結腫不侵別囊者輕已潰膿黃而稠腫消疼痛漸止四邊作癢生肌者順潰後膿水自止腫痛自消新肉易生膿口易合者順初起一乳通腫水痛不紅寒熱心煩嘔吐不食者逆已成不熱不紅堅硬如石口乾不眠胸痞食少者逆已潰無膿正頭腐爛腫勢愈高痛勢愈盛流血者死潰後肉色紫黑痛苦連心吮氣日深形體日削者死徐曰乳癰與乳岩各有看法

此乃乳癰看法也。

乳癰乳岩治法

初起發熱惡寒頭眩體倦六脈浮數邪正在表宜散之發熱無寒惡心嘔吐口乾作渴胸膈不利者宜清之憂鬱傷肝思慮傷脾結腫堅硬微痛者宜疎肝行氣已成掀腫發熱疼痛有時已欲作膿者宜托裏消毒膿已成而脹痛者宜急開之脾胃虛弱宜更兼補托潰而不斂膿水清稀腫不消痛不止宜大補氣血結核不知疼痛久而漸大破後惟流污水宜養血清肝徐曰此亦是乳癰治法乳岩無治法不過使之遷延歲月不知痛苦惡具而已

乳癰乳岩治驗

一婦人因怒左乳腫痛寒熱交作服人參敗毒散一劑人參敗毒散徐表症已退又用牛蒡子湯二服腫消漸安一婦人憂思過度久鬱成癥左乳結核如桃徐曰此半年似痛非痛咳嗽生痰身發潮熱診之脈微數而無力此

真氣雖弱而邪火尚未有餘如用藥合理尚堪調治先用逍遙散加有附貝母十餘服而咳嗽漸止寒熱間作又用八珍湯加有附牡丹皮紫皮遠志十餘服身熱去其八九又服益氣養榮湯加青皮木香兩月餘胸膈得利暖氣得舒飲食漸進肌膚漸澤外腫以阿魏化症膏貼之半年餘而消

一婦人右乳疼腫而覆碗診之脈數有及此有餘症欲作膿也用托裏消毒散數服而脹痛針之出膿碗計又用十全大補湯加有附十餘服而安徐曰此是乳癰實症如乳子之時有此乃是外吹也

一婦人暴怒左乳結腫疼痛自服仙方活命飲二劑疼痛稍止結腫不消仍服清涼敗毒之劑清涼敗毒之劑腫痛更作形體日弱診之脈浮數而無力此真氣虛而邪氣實也非補不可用益氣養榮湯四五服其腫自高寒熱亦退

又十餘服而膿潰兼服十全大補湯兩月而痊此症非純補豈能得愈

純補二字徐物批

一男子年過五十因妻喪子不成立憂鬱傷肝左乳結腫半年痛甚作腐肝脈弦數先用小柴胡湯加青皮山梔遠志貝母數服而肝脈稍平又用八珍湯仍加前藥十餘服其腫漸腐為膿更服益氣養榮湯庶保收斂彼為內醫所惑謂鬱怒傷肝肝經有火不必用補更服降火流氣寬中等劑致食少便秘發熱作渴復請余治肝脈復弦口乾作渴邪火內淫飲食減少脾土受傷便秘發熱陰血竭而為燥為熱已上俱內損症也辭不治後月

餘果死 徐曰此即男子乳岩本屬難治

一婦人左乳結核三年方覺腫痛診之脈緊數而有力此陽有餘而陰不足也況結腫如石皮肉紫色不澤乃真乳岩症辭不治又一婦左乳結腫或大或軟或硬俱不作痛至半年餘腫如覆碗堅硬木痛近乳頭累七便生死瘡時痛時癢診之脈弦而數腫色慘黑不澤此氣血已死亦辭不治又一婦已潰腫如泛蓮流血不禁亦辭之後果俱死 徐曰此段所述皆真乳岩無愈理 栢案余所製消核膏凡乳核初起無內症貼之無不消者俱除根甚難耳因循不治變為乳岩則難治乳岩潰後宜貼陽和解凝膏近見刻本經驗良方載以鴉片灰作糝方亦有得愈者附記于此 又按全生集乳岩治法初起用犀牛丸每服三錢酒送十服全愈或以陽和湯加土貝五錢煎服數日可消倘誤以膏貼藥敷 栢案貼余消核膏無定主日漸腫大內作一抽之痛已覺遲治倘皮色變異難以挽回勉以陽和膏日服或以犀黃丸日服或二藥每日早晚輪服服至有潰而痛者外用大蟾六隻分作三日每日早晚取蟾破腹連雜蟾身刺孔貼於患口內服千金托裏散散防規蟾三日後接服犀黃丸可救十中三四潰後不痛而瘡極者無一毫挽回大忌開刀開則翻花最慘萬無一活男女皆有此症

乳癰主治方

牛蒡子湯

牛蒡子湯瓜蒌仁黃連連翹柴花粉

銀花山柃甘草陳青皮牛蒡子角針

治乳癰結腫疼痛毋論新久但未成膿者

陳皮 牛蒡子

山柃

金銀花 甘草 瓜蒌仁 黃芩 天花粉 連翹 角針 柴胡 青皮 水二茶鍾煎

八分入酒一盃和勻食遠服 徐曰此乳症通治方

栢案瓜蒌仁青皮徐園

治婦人有孕胎熱為內吹有兒吃乳名外吹致乳結成腫痛寒

橘葉散橘葉散內用柴陳橘葉甘片草五分

橘葉散

橘葉散內用柴陳橘葉甘片草五分

治婦人有孕胎熱為內吹有兒吃乳名外吹致乳結成腫痛寒

橘葉散橘葉散內用柴陳橘葉甘片草五分

橘葉散橘葉散內用柴陳橘葉甘片草五分

橘葉散橘葉散內用柴陳橘葉甘片草五分

熱交作甚者惡心嘔吐

柴胡 陳皮 川芎 山柃 青皮 石膏 黃芩 連翹 甘草 橘葉

水二茶鍾煎八分食遠服 徐曰亦通治方

栢案橘葉徐園

治一切憂鬱氣滯乳結腫硬不疼不癢久漸作疼或胸膈

清肝解鬱湯清肝解鬱湯白芍 桂枝 芍藥 茯苓 附子 陳皮 白芍 川芎 當歸 生地 半夏 香附 青皮 遠

清肝解鬱湯

清肝解鬱湯白芍 桂枝 芍藥 茯苓 附子 陳皮 白芍 川芎 當歸 生地 半夏 香附 青皮 遠

清肝解鬱湯白芍 桂枝 芍藥 茯苓 附子 陳皮 白芍 川芎 當歸 生地 半夏 香附 青皮 遠

清肝解鬱湯白芍 桂枝 芍藥 茯苓 附子 陳皮 白芍 川芎 當歸 生地 半夏 香附 青皮 遠

清肝解鬱湯白芍 桂枝 芍藥 茯苓 附子 陳皮 白芍 川芎 當歸 生地 半夏 香附 青皮 遠

清肝解鬱湯白芍 桂枝 芍藥 茯苓 附子 陳皮 白芍 川芎 當歸 生地 半夏 香附 青皮 遠

不利肢體倦怠面色萎黃飲食減少

陳皮 白芍 川芎 當歸 生地 半夏 香附 青皮 遠

陳皮 白芍 川芎 當歸 生地 半夏 香附 青皮 遠

陳皮 白芍 川芎 當歸 生地 半夏 香附 青皮 遠

陳皮 白芍 川芎 當歸 生地 半夏 香附 青皮 遠

陳皮 白芍 川芎 當歸 生地 半夏 香附 青皮 遠

片二十

水二茶鍾煎八分食遠服 徐曰亦通治方

栢案橘葉徐園

治一切憂鬱氣滯乳結腫硬不疼不癢久漸作疼或胸膈

清肝解鬱湯白芍 桂枝 芍藥 茯苓 附子 陳皮 白芍 川芎 當歸 生地 半夏 香附 青皮 遠

清肝解鬱湯白芍 桂枝 芍藥 茯苓 附子 陳皮 白芍 川芎 當歸 生地 半夏 香附 青皮 遠

不利肢體倦怠面色萎黃飲食減少

陳皮 白芍 川芎 當歸 生地 半夏 香附 青皮 遠

陳皮 白芍 川芎 當歸 生地 半夏 香附 青皮 遠

陳皮 白芍 川芎 當歸 生地 半夏 香附 青皮 遠

陳皮 白芍 川芎 當歸 生地 半夏 香附 青皮 遠

陳皮 白芍 川芎 當歸 生地 半夏 香附 青皮 遠

志 伏神 貝母

蘇葉

桔梗 各六

甘草

山柰

木通 各四

水二茶鍾

薑三斤

煎八分

食遠服

曰與前法重

鹿角散

鹿角散用角三寸

炭大

新起

散無紅

治乳癰

新起

結腫

疼痛

憎寒

發熱

但未成者

俱效

鹿角

用大

三寸

用炭大

服三錢

酒調下

炭大

新起

散無紅

治乳癰

新起

結腫

疼痛

憎寒

發熱

但未成者

俱效

鹿角

用大

三寸

回乳四物湯

同上

麥芽

能散乳

治乳癰

新起

散無紅

治乳癰

新起

結腫

疼痛

憎寒

發熱

但未成者

俱效

鹿角

用大

三寸

川芎

當歸

白芍

熟地

各二錢

麥芽

能散乳

治乳癰

新起

散無紅

治乳癰

新起

結腫

疼痛

憎寒

發熱

但未成者

俱效

鹿角

用大

三寸

腫自然消散

甚者再用一服

徐曰

此治乳癰

消乳之法

宜再加豬

苓澤瀉

茯苓等

以利其水

治乳癰

新起

結腫

疼痛

憎寒

發熱

但未成者

俱效

鹿角

用大

三寸

灸乳腫妙方

將乳腫

痛方

灸高

諸般

腫痛

氣不

治乳癰

新起

結腫

疼痛

憎寒

發熱

但未成者

俱效

鹿角

用大

三寸

粗燈草四根

十字排

碗內

燈草

頭各

靈寸許

再用

平山

粗紙

裁成

一寸

五分

闊紙

條用

水浸

紙貼

蓋碗內

燈

草上

紙與

碗口

草上紙與

碗口

相齊

將碗

覆於

腫乳

上留

燈草

頭在

外將

艾大

圓於

碗足

底內

點火

灸之

艾盡

再添

灸至

碗口

流出水

氣內

痛覺

止方

佳甚

次日

再灸

一次

必消

治乳癰

新起

結腫

疼痛

憎寒

發熱

但未成者

俱效

鹿角

用大

三寸

保安萬靈丹

治乳癰

初起

發熱

惡寒

頭眩

肢體

作痛

者

治乳癰

新起

結腫

疼痛

憎寒

發熱

但未成者

俱效

鹿角

用大

三寸

益氣養榮湯

治乳癰

初起

發熱

惡寒

頭眩

肢體

作痛

者

治乳癰

新起

結腫

疼痛

憎寒

發熱

但未成者

俱效

鹿角

用大

三寸

昏眩四肢

倦怠

或已

破潰

膿水

清稀

不能

收斂

飲食

減少

口淡

無味

自汗

盜汗

肢體

羸瘦

者

治乳癰

新起

結腫

疼痛

治乳癰

初起

發熱

惡寒

頭眩

肢體

作痛

者

治乳癰

新起

結腫

疼痛

憎寒

發熱

但未成者

俱效

鹿角

用大

三寸

治乳癰

初起

發熱

惡寒

頭眩

肢體

作痛

者

治乳癰

新起

結腫

疼痛

憎寒

發熱

但未成者

俱效

鹿角

用大

三寸

治乳癰

初起

發熱

惡寒

頭眩

肢體

作痛

者

治乳癰

新起

結腫

疼痛

憎寒

發熱

但未成者

俱效

鹿角

用大

三寸

治乳癰

初起

發熱

惡寒

頭眩

肢體

作痛

者

治乳癰

新起

結腫

疼痛

憎寒

發熱

但未成者

俱效

鹿角

用大

三寸

治乳癰

初起

發熱

惡寒

頭眩

肢體

作痛

者

治乳癰

新起

結腫

疼痛

憎寒

發熱

但未成者

俱效

鹿角

用大

三寸

治乳癰

初起

發熱

惡寒

頭眩

肢體

作痛

者

治乳癰

新起

結腫

疼痛

憎寒

木香餅木香餅用生地黃二物和勻患上裝治一切氣滯結腫成核或痛或閃胸風寒所傷木香錢五生

地黃一兩石木香為末同地黃和勻量患處大小作餅貼上以熱熨斗熨之堅硬木痛者開日熨之徐曰

外治良法

乳癰應用方 十全大補湯 八珍湯觀 逍遙散 水蠅散 小柴胡湯觀 托裏消毒散觀 阿魏

化瘡膏見

附骨疽論第三十四附

夫附骨疽者乃陰寒入骨之病也人之氣血壯實雖遇寒冷而不入骨凡入者皆由體虛之人夏秋露卧寒溼

內襲或房慾之後益覆單薄寒氣乘虛入裏遂成斯疾初起則寒熱交作稍似風邪隨後臂腿筋骨作痛不熱

不紅疼至徹骨甚者曲伸不能轉側日久陰寒為陽寒化為熱熱甚而腐肉為膿此疽已成也凡治此症初起

寒熱交作痛時便用五積散加牛膝紅花發汗散寒通行經絡或萬靈丹發汗亦可次以天防風湯行經活血

溼補虛又有生於尻臀部位漫作瘡者徐曰此非宜內托羌活湯腿內近膝股漫腫木痛者內托耆耨湯腿

外側者內托酒煎湯初起通用人參敗毒散徐曰此非加木瓜牛膝蘇木紅花虛者十全大補湯加羌活防己牛膝

已成欲作膿者附子八珍湯膿成脹痛者即針之膿稠而黃體實者十全大補湯膿清白色體虛者保元大成

湯食少體倦者香砂六君子湯脾虛寒熱者補中益氣湯以此調理可也又有風溼相乘之症初起寒熱交作

次傳腿腫作痛其形光亮微紅發熱按之如泥不即起者宜當歸拈痛湯或茯苓佐經湯同服萬靈丹和之以

上之症皆由元氣不足中來不可誤用損脾泄氣敗毒等藥外禁寒涼等法如誤用之必致氣血冰凝肉肉來

腐日久化為污水敗膿流而不禁終死又有房慾勞傷寒熱互變氣血乖違經脈橫解受病日深以成斯疾者

徐曰此其患大股漸腫如冬瓜上過臍腹下至足底牽連漫腫皮色不紅日久潰膿色白腥穢腫仍不消

痛仍不減元氣日衰身體縮小唇舌乾焦二便枯秘諸藥不效飲食不進終為不治又有鶴膝風乃足三陰虧

損之症論曰初起寒熱交作時亦宜五積散加牛膝紅花或萬靈丹發汗俱可如汗後腫痛仍不消減此陰

寒深伏以天防風湯溫經絡重者兼灸膝眼二穴敷以琥珀膏亦可漸漸取效如以上之法俱不效者終成

痼疾不必強藥消之。只宜先天大造丸。史國公藥酒終年常服。亦可轉重就輕。徐圖步履也。

附骨疽看法

初起身微寒熱。飲食如常。結腫微紅。疼不附骨者順。已成舉動自便。結腫成囊。疼痛有時。膿易成者吉。已潰膿稠。腫消痛減。身體輕便。睡穩不熱者吉。潰後元氣易復。飲食易進。內肉易實。膿水易乾者吉。初起身發寒熱。漫腫色白。肢體牽強。疼痛附骨險。已成舉動不便。通腿漫腫。不熱不紅。不作膿者險。已潰膿清水稀。氣穢。腥臭。腫痛不消。形體日削。有死潰後脾胃虛弱。飲食無味。口渴不止。唇白皮枯者死。徐曰。看法亦與諸症同。

附骨疽治法

初起發熱惡寒。身體拘急。腿脚腫痛。脈浮緊者散之。已成腿脚腫痛。皮色不變。上下通腫者。散寒溫經絡。寒熱作腫。色白光亮。按之如泥不起者。宜健脾滲濕。身體無熱惡寒。脈遲而濇。腿腫不熱者。養血溫經絡。暑中三陰脈洪。而數。腿脚掀腫。口乾便燥者。宜下之。已潰膿水清稀。飲食減少。形體消瘦者。補中健脾胃。潰後腫痛不減。膿水不止。虛熱不退者。溫中養氣血。愈後筋骨牽強。屈伸不便者。宜滋養氣血。通利關節。徐曰。亦與症同法。

附骨疽治驗

一男子中寒。發散未盡。大腿腫痛。脈浮數而無力。此風寒未盡。內虛故也。用五積散。去麻黃。加牛膝二服。痰痛稍減。又用內托黃耆酒煎湯四服。全腫俱消。惟腿外側結腫一塊不退。此瘀血凝滯。欲作膿也。用托裏藥。俟膿熟針之。更服十全大補湯而斂。徐曰。此腿癰也。非骨疽。

一男子勞碌遇寒。每發腿痛。發則寒熱嘔吐。胸痞不食。此因氣懣。飲食不節。脾胃受傷。故不能運化。痰滯中。碗淫熱動而下注。為脚氣。投以開結導引丸二服。行去停痰。又用半夏佐經湯數服。嘔止膈利。更服附子六物湯數劑。消而不發。徐曰。此寒溼也。

一老人年六旬。過慾腎虛。致陰攣痺。脚膝無力。不能步履。外貼追風逐溼膏。內服三因勝驗丸而愈。

一男子右腿腫痛。兩月餘。余曰。膿成已久。何不開之。彼曰。二老醫同治。俱稱內消無膿。再請二老決之。俱曰無膿。但病者昏沈不醒。命在危篤。余強開之。出膿盈許。以獨參湯連進二服而甦。後以十全大補湯調理。百日外而

安。徐曰。此亦腿癰。

一男子房事後受陰寒。大腿無形作痛。至夜尤甚。不能步履。醫以散寒陰溼消痰止痛藥治之。其疼益增。余診其脉細澀而無力。此氣血不足。寒氣所乘之故。投以大防風湯二劑。疼痛頓減。又四劑而痊。徐曰。此亦寒溼。

一男子暑月慾後。當風睡眠。寒氣襲於左腿。遂致腫痛。寒熱交作。胸痞不食。以保安萬靈丹。急湯化服。洗浴發汗。以散骨寒毒。後以大防風湯。去羌活。加紅花。破故紙。溫暖腎經。通行經絡。腫痛漸消。血脈漸和。又以三因勝駿丸。間報調理。兩月而愈。徐曰。此外感風寒也。

一監生慾後受寒。致成腿痛。余以暖腎氣溫經絡散寒邪藥治之。彼以為緩。請內醫投表散之劑。外邪散而內虛。又以小柴胡湯等藥調理。別藥致虛熱發作。口燥咽乾。煩渴不已。又以知母石膏湯清其上。防風木瓜威靈仙等劑攻其下。此三字致病愈劇。仍請余治。其時患腿愈腫。其形縮小。相案既云愈腫。又云縮小。必有誤。余斷以必死。此症原屬腎經受寒。非附子破故紙不能通達關節。非羌活防風牛膝不能通行閉滯。非人參白朮炙甘草不能使脾氣行達四肢。非川芎當歸白芍熟地紅花不能養血活血。凡病從虛而入者。先補其虛。後攻之病。以上八字徐則却。今此症不加溫補。而發散解肌。以正風寒有餘之法治之。不死何待。後果死。徐曰。以上說症。皆非附骨疽。名實相背。

附骨疽主治方

五積散

五積散歸朴桂心枳殼乾姜術

蒼朮麻陳芍茯苓白芷甘草共姜行

治風寒溼毒。客於經絡。致筋攣骨痛。或腰脚酸疼。或偏身拘急。

或發熱惡寒頭痛者。

蒼朮二錢陳皮桔梗

川芎當歸白芍各一錢麻黃枳殼桂心乾薑

厚朴各六分白芷半夏甘草茯苓各四錢

水二茶鍾姜三片煎八分。不拘時服。頭痛惡寒者。加連鬚葱。

頭三根蓋汗為效。下部加木瓜牛膝。

徐曰。此方雜亂不切。治尻腎患癰。堅硬腫痛。兩尺脈緊數。按之無力。

內托羌活湯

內托羌活黃柏蒼朮紅花甘草當歸尾

桂枝秦艽陳皮防通治下體用此方

治尻腎患癰。堅硬腫痛。兩尺脈緊數。按之無力。

羌活黃柏防風歸尾

肉桂各一錢

黃耆一錢連翹甘草蒼朮陳皮各六分紅花五分

水酒各一茶鍾煎八分。食前服。

徐曰。此下體通治之方。

當歸括痛湯當歸括痛湯 治淫熱下注腿脚生瘡赤腫作痛或腰脚酸痛或下肢偏

身重痛或下部頑麻作癢或成血風二參知母要調均 當歸 防風 茵陳 蒼朮各一 苦參 升麻 白朮各七

葛根 甘草 黃芩 知母 澤瀉 豬苓 人參各五 黃柏各三 水二茶鍾煎八分食前服 徐曰此治

淫毒之方可擇而用之

內托黃耆湯內托黃耆湯 治淫熱腿肉近膝股患癰或附骨癰初起腫痛此太陽厥

陰之分也脈細而弦按之洪緩有力 黃耆 桂枝 木瓜 連翹各一 羌活 肉桂 生地

黃柏各五 水酒各一茶鍾煎一半空心服 徐曰與前法相近 槲案木瓜羌活肉桂三味徐園

內托酒煎湯內托酒煎湯 治寒淫發於腿外側少陽經分患癰或附骨疽堅硬漫腫

作痛或流至足陽明經作腫 黃耆 當歸各二 柴胡一錢 連翹 肉桂 升麻 牛蒡子各一 黃柏

甘草各五 水酒各一茶鍾煎一半食前服 徐曰意重前

茯苓佐經湯茯苓佐經湯 治足少陽經為四氣所乘以致腰腿發熱疼痛頭目昏眩

嘔吐不食胸膈不利心煩熱悶等症 茯苓 陳皮 半夏 白朮 蒼朮各一 藿香 澤瀉 甘草 葛

根 柴胡 厚朴 木瓜各五 水二茶鍾姜煎八分食前服 徐曰義重前方

附子六物湯附子六物湯 治四氣流注於足太陰經骨節煩痛四肢拘急自汗短氣

小便不利手足或時浮腫 附子 甘草各一 防己 白朮 茯苓各八 桂枝各五 水二茶鍾薑三片煎

八分食遠服 徐曰此治寒濕之方

麻黃佐經湯麻黃佐經湯 治風寒暑溼流注足太陰經腰足攣痺關節重痛憎寒發

熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛等症 麻黃 葛根 羌活 防風 蒼朮 茯苓 防己各一 桂心 細辛

甘草各五 水二茶鍾薑三片煎二枚煎八分食前服 徐曰此亦治寒溼之方義重前 槲案蒼朮桂心細

辛徐園

小續命湯小續命湯 治寒溼之氣中於三陽致身不熱所患煩疼或脚轉筋或腫

附子麻黃桂枝芍 防風防己共人參 薑汁甘草麻黃 附骨疽

或不腫或膝腿頑痺或時緩縱不隨或偏身百節攣痛或小腸疝氣攻衝 川芎 白朮 防風 人參 附

吧 附子 用 麻黃 桂心 黃芩 白芍 甘草 水二茶鍾煎八分入薑汁一匙和勻食前

服又暑中三陰所患必熱去附子減桂枝一半 徐曰此散風寒溼之總方諸方之祖也

大防風湯 羌活 獨活 桑寄生 秦艽 桂枝 芍藥 甘草 熟地 黃芩 川芎 杜仲 治三陰之氣不足風邪乘之兩膝作痛久則膝愈大而腿愈

細因名曰鶴膝風乃敗症也非此方不能治又治附骨濕皮色不變四肢通腫痰痛無奈及痢後脚痛緩弱不

能行或腿膝腫痛 人參 防風 白朮 附子 當歸 白芍 川芎 杜仲 黃耆 羌活 牛膝

甘草 熟地 水二茶鍾薑三片煎八分食前服 徐曰與前方亦相近

檳蘇散 檳榔 蘇合 散 用 木瓜 香附 陳皮 大腹 何桂 風溼 腳酸 麻 治風溼流注脚腫酸痛或麻痺不仁嘔吐不食 扶柳 紫蘇

木香 香附 陳皮 大腹 錢 木香 羌活 水二茶鍾薑三片煎白三豆煎一鍾空心服 徐

曰此方專治脚氣 檳榔 紫蘇 木瓜 大腹 皮 木香 徐圍

獨活寄生湯 獨活 寄生 桑寄生 秦艽 桂枝 芍藥 甘草 熟地 黃芩 川芎 杜仲 牛膝 熟地 真者各 甘草 獨活 二

茯苓 川芎 當歸 防風 白芍 細辛 人參 桂心 杜仲 秦艽 牛膝 熟地 真者各 甘草 獨活 二

水二茶鍾薑三片煎八分食前服 徐曰此亦公共之方 又曰此治下焦風寒溼痰雜犯之方雖藥味不純

而於義無害 檳榔 熟地 徐改生地 治厥陰經為四氣所襲脚膝無力左癱右瘓半身不遂手

神應養真丹 神應 養真 丹 木瓜 當歸 羌活 共 天麻 治厥陰經為四氣所襲脚膝無力左癱右瘓半身不遂手

足頑麻語言蹇澀氣血凝滯偏身疼痛者 當歸 川芎 白芍 天麻 羌活 熟地 木瓜 羌活 子

分等 右為細末入地黃膏加蜜丸如桐子大每服百丸空心溫酒鹽湯任下 徐曰此緩治之方亦無甚妙

義 三因勝駿丸 三因 勝駿 乳 膏 歸 麻 二 木 東 羌 防 治元氣不足真氣虛弱及諸虛被寒溼氣侵襲手足拳攣

脚指連脚而拘急走注疼痛筋脈不伸行步不隨常服益真氣壯筋骨黑髭鬚滑皮膚一切足弱鶴膝風症並

治

附子一枚要一兩 當歸 明天麻 牛膝 酸棗仁 熟地黃 防風各三 木瓜四兩 全蝎一兩 麝香

乳香 沒藥 木香 羌活 甘草各五錢 檳榔 草薢 肉蓯蓉 破故紙 巴戟法 蒼朮各一

右為細末煉蜜丸桐子大每服七十九空心淡鹽湯溫酒任下病近者七日年深者半月見效 徐曰此緩治

之法作丸方不外此

健步丸健步丸中用川烏 苦參 羌活 澤漆 胡 治生平好飲燒酒傷於脾肺膝中無力伸不能屈坐不能伸膝

脊腿脚沉重行步艱難者 苦參 羌活 防已 酒浸 羌活 柴胡 滑石 炒 花粉 甘草各五 防風 肉

桂各三 澤瀉一兩 川烏二錢 右為細末酒糊為丸如桐子大每服三十九空心溫酒送下 徐曰義重

大腹子散大腹子散蘇木瓜 羌活 赤芍 木通 治風毒脚氣上攻寒熱交作肢節煩疼心神壅悶

大腹子 柴蘇 木瓜 羌活 荆芥 赤芍 木通 獨活 桑白皮 青皮各五 枳殼一錢 甘草二

水一茶鍾薑五片葱白三莖煎八分空心服 徐曰此亦治脚氣之方重前義 相案煎藥加薑方書皆言幾

片而不言銖兩蓋以此物非取諸藥肆窮僻小戶不皆有數也然薑有大小片有厚薄味又極辛能掩諸藥三

片已覺其多此方各藥銖兩其輕而薑至五片是薑為政矣余願後之著方書者酌改銖兩為安不獨此方然

也

加味敗毒散加味敗毒散人參 羌活 前胡 胡 茯苓 治足三陽經濕熱毒氣流注脚踝掀赤腫痛寒熱如瘧自

汗惡風或無汗惡寒或惡聞飲食者 人參 羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎 桔梗 茯苓 枳殼

甘草 木瓜 蒼朮各八 水二茶鍾薑三片煎八分食前服使秘加炒大黃 徐曰此治風溼之方

千里健步散千里健步散有 細辛 白芷 羌活 治遠行兩脚腫痛若用之輕便可行千里甚妙 細辛

防風 白芷 烏草 右等分為末搗在鞋底內如底乾即以水微溼過搽藥著脚行走自不費力再不作腫

徐曰此風溼外治之方

雷火神鍼雷火神鍼功最奇 風寒溼毒經相宜 治風寒溼毒襲於經絡為患漫腫無頭皮色不變筋骨疼痛

起坐艱難不得安臥者。斬艾三 丁香分二 麝香分二 丁脂研末與斬艾揉和先將夾紙作筒如指粗大以

艾藥灌入筒內疊實臨用以蕭山紙七層平放患上將筒點者一頭隔紙捺實針之待不痛方起針病甚者更

針一次七日後大瘡自發自取功效矣。徐四外治用處甚多然藥味亦尚多此未全

追風逐溼膏逐溼膏中羌活 川草二馬辛芷木 治風寒暑溼所傷致骨節疼痛筋攣不能步履或麻木溼

痺等症。 稀莖草 麻黃 川烏 草烏 海風藤 半夏 南星 羌活 單麻子切 桂枝各三 獨活

細辛 當歸 白芷 蒼朮 大黃各一 以上藥各切片用葱汁薑汁各二梳拌藥先浸一宿次日用香油

半觔而香油止半觔半字以誤 先將藥入鍋內慢火煎至葱薑二汁將乾不爆時方下油與藥相煎渣枯為度

細絹濾清每油一觔配飛過炒丹十兩為準將前油入鍋內煎滾至滴水成珠不散方下黃丹徐攪入其膏

已成再下礞淨松香淨末一觔四兩同熬化取下鍋來將盆頓穩再下乳香木香胡椒輕粉各末二兩白芥子

細末四兩漸入攪勻傾入鉢內盛貼用時熱湯頓化絞紙攤貼七日後諸病可痊百發百中。徐曰膏藥方勝

此者甚多不足取。桐葉油已煎至滴水成珠而每油一觔下炒丹十兩則不待再熬而已堅不可攤再下松

香一觔四兩及各藥末十二兩其堅如石矣此蓋著書者忘却熬膏時分兩隨筆填註也。

附骨疽應方 保安萬靈丹見腫 十全大補湯見腫 小柴胡湯見腫

外科正宗卷八

腸癰論第三十五

夫腸癰者皆溼熱瘀血流入小腸而成也。又由來有三。男子暴急奔走以致腸胃傳送不能舒利。敗血濁氣壅遏

而成者一也。婦人產後體虛多卧未經起坐。入或坐草艱難用力太過育後失運敗瘀以致停積腸胃而成者

二也。飢飽勞傷。擔負重物。致傷脾胃。又或醉飽房勞。過傷精力。或生冷並進以致血氣乖違。溼動痰生。腸胃痞

塞。運化不通。氣血凝滯而成者三也。總之初起外症發熱惡寒脈孔而數。皮毛錯縱。腹急漸腫。轉側急痛。大便

墜重。小便澀滯若淋。甚者臍突腹脹轉側水聲。此等並見則內癰已成也。初起未成時小腹殷殷作痛。儼似奔

豚。小便淋瀝者。當大黃湯下之。瘀血去盡自安。體虛脈細不敢下者。活血散瘀湯和利之。已成腹中疼痛脹滿