

傷寒論 卷四十六

增輯陳修園醫書七十種

上海廣益書局 壬士印行

辨陽明病脈證

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太陽陽明者蓋以陽明之上燥氣至之本太陽不解太陽之津液為其所燥脾約是也正陽陽明者蓋以燥氣者陽明之本也天有此燥氣人亦有而筋約所謂此燥氣入過無中見太陰濕土之化所謂胃家實是也少陽陽明者蓋以少陽主之若病在少陽誤發其汗誤利其小便則水穀之津液耗竭而少陽之相火熾盛津竭則曾中燥火煩而實則大便難是也○此一節言陽明有太少正之分也

問曰何謂陽明之為病燥氣為陽明之本氣燥氣盛於上胃家實也○此復申明正陽陽明之為病也按沈堯封云此是陽明證之提綱後稱陽明證三字慎有胃家實在內胃家實言以手按胃中實硬也如大腦胸證後之石硬即名實熱痞子故證按之心下濡即名虛煩夫心下俱以濡硬分虛實何獨胃中不以濡硬分虛實乎此說照柯韻伯之論相未裏雖非正解亦可存參

問曰何緣得陽明病答曰太陽之津液從胃而生患府水穀而生患因轉屬於陽明其不更衣內之實實內既大便必難通而者此名屬之太陽轉陽明也○此一節承上章太陽陽明病而言也然重申胃家實之旨是陽明病總綱

問曰有諸中者陽明病外證云何答曰胃熱之外見者肌肉之中身熱與太陽之表熱不同也熱氣蒸蒸然汗溢於外名曰汗自出與太陽之表寒已不惡寒更熱已反惡熱也只因有胃家實之病根即是熱盛汗出之病證不故不待解惡寒將自罷燥氣即自汗出而惡熱也此陽明之證○此一節補出陽明外證合上節為一內外之總綱

問曰身熱不惡寒既得病有始得之一日不發熱而惡寒者何也答曰陽明主金氣金氣微寒也邪初入故惡寒及邪既入於肌肉之分即從熱化雖得之一日不待解惡寒將自罷內出即自汗出而惡熱也此陽明之證○此承上文不惡寒反惡熱而言也但上文言陽明自內達外之表證此言風寒外入之表證

問曰陽明病脉症寒何故自罷答曰陽明與他經同以其不居中土也

問曰陽明病脉症寒何故自罷答曰陽明主金氣金氣微寒也邪初入故惡寒及邪既入於肌肉之分即從熱化無所復

傳一曰表氣通始雖煩惡寒而二日為陽明主氣之期正傳而邪亦傳正自止此所以胃家實為陽明病根也○此復設問答傳於太陽耳

以明寒熱自罷之故並指出胃家實之根也

上文歷言陽明本經之自無病此復申明太陽轉屬陽明之義除過汗亡津液外又有此汗出不徹而轉屬不因發汗

而轉屬令常變而並言之也

乘其氣而極轉外出矣今傷寒三日陽明而肺大不能從少陽之樞而解也述自此以上六節論陽明之氣主表而外合太陽主裏而內關津液之義也按此即高士宗所謂讀論者因證而識正氣之出入因治而知經脈之循行則取之有本用之無窮矣

陽明在太陰正氣而熱相爲禦傷寒陽勝今浮而緩熱今此手足自溫是為陽明不在熱在太陰太陰者熱相并也。其當發黃治小便自利者得以不能發黃至七日已八日 值陽明主氣之期遂移其所 而熱則腸乾且大便無有硬者此為陽明也○此節合下節下泄故

明陽明與太陰相表裏之義也

述此言陽明之氣不特與太陰為裏裏抑且中合於少陽外合於太陽也陽明本病之本氣自病風自為風寒自為寒可於食之若能食名中風以風能鼓動不能食名中寒以寒能閉拒陽明之氣也然此特初病則然久○此一節以食而辨風寒之氣即以食而驗陽明之胃氣因正而辨邪因邪而識正善讀者能會心於文字之外則得矣

試論陽明中風病。胃為陽土，風為陽邪，飲食即此可以定其為中風矣。然病初時在陽明，小便當利，大便當硬。今小便反不利，大便反自調。是津液既得入於胃，但不得外於膀胱也。

之陰水以相合也少陰主骨其人骨節皮肉之間筋骨如有熱狀以此陽不遇陰郁然發狂濶然汗出而自解不能上合於陽明故陽明病雖以胃家實為大綱而治者當剗刻於虛寒上著服能食今之虛矣醫者反攻其熱則虛不受攻寒必噦所以然者胃中虛冷故也此胃氣存亡之頭頭不得不再為可嘔○以其人胃本虛故攻其熱必噦○此一節言陽明中氣虛寒之為病也

蓋陽明旺於申酉病氣得天時之助也然此言陽明之表證從微汗而解若胃家實之證值旺時更見發狂譫語矣○此言陽明欲解之時作小結也

陽明病脈宜大運是經脈不能運氣於胃也內經云食氣入胃滿氣歸心淫精於脈脈氣流食難用飽飽指於經脈而反遲緩可知食氣散於各經之中自不厭其飽若不能散遠止留滯於胃故○此言陽明病胃氣實則不能食可以知其胃氣能食今之虛矣醫者反攻其熱則虛不受攻寒必噦解之義也脈而為厥則愈蓋以累則為陰陰氣微即戰慄汗脈若轉通厥則愈而陽氣平戊癸合矣

此言陽明中風也

陽明病欲解時從申至戌上蓋陽明旺於申酉病氣得天時之助也然此言陽明之表證從微汗而解若胃家實之證值旺時更見發狂譫語矣○此言陽明欲解之時作小結也

陽明病雖以胃家實為大綱而治者當剗刻於虛寒上著服能食今之虛矣醫者反攻其熱則虛不受攻寒必噦所以然者胃中虛冷故也此胃氣存亡之頭頭不得不再為可嘔○以其人胃本虛故攻其熱必噦○此一節言陽明中氣虛寒之為病也

胃氣虛則不能運氣於胃也內經云食氣入胃滿氣歸心淫精於脈脈氣流食難用飽飽指於經脈而反遲緩可知食氣散於各經之中自不厭其飽若不能散遠止留滯於胃故○此言陽明病胃氣實則不能食可以知其胃氣能食今之虛矣醫者反攻其熱則虛不受攻寒必噦解之義也脈而為厥則愈蓋以累則為陰陰氣微即戰慄汗脈若轉通厥則愈而陽氣平戊癸合矣

如故所以然者胃虛不能運氣於經脈也○此一節言食氣入胃胃氣不能淫精於經脈也

胃氣虛則不能運氣於皮毛○陽明病法當多汗令反無汗其身如蟲行皮中狀者此以胃久虛不能輸精於皮毛也

胃氣虛則不能運氣於皮毛○陽明病法當多汗而反覺無汗而小便利水液下行也至二日王氣之二日不拘日數但覺嘔而欲食知為陽明胃熱而非陽明胃寒能食矣由是熱氣上衝肺受火燥而發欬其人必嘔痛若不飲不嘔手足不厥者為寒氣已除而陽明正氣頭不痛○此節言陽明之氣合寒氣而上逆於頭不能灌溉於四旁也凡言邪即以言正言正既而上逆於咽不得流通於下也程扶生云陰邪下利故無汗而小便利風邪上行故不惡寒而頭眩寒則嘔不能食風則能食寒則頭痛風則嘔痛是風寒入胃之辨也按雖本草之意不重在此而亦不可不知○欬出於肺當云喉嚨痛令胃熱甚則嘔痛二者相連氣必相侵

外四旁也

禹言中風陽明病其證不然但頭目眩此證不在陽明提綱之內且有陽氣逆於上而陽明病他證無論四肢也於先言中寒氣逆於上而陽明病法當多汗而反覺無汗而小便利水液下行也至二日王氣之二日不拘日數但覺嘔而欲食知為陽明胃熱而非陽明胃寒能食矣由是熱氣上衝肺受火燥而發欬其人必嘔痛若不飲不嘔手足不厥者為寒氣已除而陽明正氣頭不痛○此一節言陽明之氣合風熱而上逆於咽不得流通於下也程扶生云陰邪下利故無汗而小便利風邪上行故不惡寒而頭眩寒則嘔不能食風則能食寒則頭痛風則嘔痛是風寒入胃之辨也按雖本草之意不重在此而亦不可不知○欬出於肺當云喉嚨痛令胃熱甚則嘔痛二者相連氣必相侵

更有屬於陽明病其氣不能外轉於皮毛則無汗不下轉於中土之證

皆言陽明之氣鬱於中土不得外達而下輸也

對於中土若誤陽明病醫者不知所以無汗之被火周身之氣燥極而熱更益其熱故以火強迫其汗出即被火不外越但上攻於額上而微汗出又不得下小便不利者

明之脈起於鼻行髮際至額

明原王病今診脈浮而緊者仍見太陽表證無汗之脈陽明被太陽之必乘其所旺邪外乘則陽氣不能宣發而為熱故之必申酉時而潮熱水之發作有定時若但浮而不者則陽氣盡浮於表及目而陰血歸肝之項兩不相隨必陽盜去汗出○述此三節言陽明主裏復外合於表氣內通於經脈復還於胃中也

陽明之脈起於鼻，太陽明之病，目無不燥，若熱在上中，還出挾口。今口乾，於經其人，必發渴也。

陽明病本自汗出醫更重發汗外熱病已差而尚微煩不了了者此大便必硬故也津液為之發亡其津液胃中乾燥故令大便硬今姑不問當問其小便日幾行若汗出本日小便日三四行今於微煩之日止再行故知大便不久自出蓋以大小便俱大便也此胃府實大便硬亦有不此下者醫人不可不知也○此言陽明之津液復還於胃中也

陽明證既知有不必下者傷寒嘔多虛胃氣既虛雖有陽明之

陽明證既知有不必下者傷寒嘔多虛胃氣脫虛之陽明胃氣雖有陽明之陽明證切不可攻之○此一節言胃氣虛者不可下也○述陽明有胃氣有悍氣有燥氣胃氣者柔和之氣也悍氣者慄悍滑利別走陽明者也燥氣者燥金之氣也病在悍氣者不可攻病在燥氣而胃氣虛者亦不可攻故此三節俱言不可攻也○按師言且不可非坐視而不救也必有所以可者在正面旁面對面皆可以悟其治法若常器之補亡論必處處補出方治無論其機不著曆也即有偶合之處反令爲飛魚躍水流花放活潑文章俱成糟粕長洲汪苓友多宗其說何其陋歟陽明病外有身熱自汗不發寒反惡熱之謠便知其內爲胃家實之證心下硬滿者止在心下尚未及腹止是硬滿而陽明病但胃家實只指不下利而言務宜活看亦知其實處即是虛處若死若利能通利氣盡虛而利去而邪亦不留故愈○此一節言虛而假實者不可

仲盛硬不可攻之誤攻之而胃氣敗利遂不止者死若其利自止者腐去而邪亦不留假愈○此一節言虛而假實者不可

陽明病但胃家實只指不下利而言務宜活看亦知其實處即是虛處若心下硬滿者不兼屬此陽明水穀空虛胃無所停虛硬不可攻之誤攻之則穀氣盡利遂不止者死若利能止是其人胃氣尚在猶愈虛滿而邪亦不留故愈○此一節言虛而假實者不可

下也△受葉薛步雲按心下為陽明之臟腑實腹必虛氣從虛開是陽明假實證攻之是為重虛

白

內經云中於面則下陽明以陽明病通圓令見赤色為陽氣怫鬱於表不得越故必發熱顏色之赤黃內經云三焦膀胱者腠理毫毛共應以三焦主腠理膀胱應之○此一節言陽明胃府不和宜與調胃承氣也○此一節言外實內虛者不可下也

不可攻者既明而可攻之謂攻之謂氣徒虛津液大必耗不得越故也○此一節言外實內虛者不可下也

攻者更不可以不講陽明病不吐不下可知其胃氣虛也○此一節言外實內虛者不可下也

君火相合故也胃氣雖曰不虛却是不和可與調胃承氣湯初

入於胃乃可以指其實在曰有潮熱者此外欲解可攻裏也

又必通身熟蒸之汗變為手足濶然之汗熱與汗俱微止

露出胃所主之四肢為本證真面目乃可指其實在曰

喘息為潮熱知其熱邪虛

其身必重嘔吐而

短氣腹滿勢必上逆而

喘息為潮熱知其熱邪虛

其人汗出多微發熱惡寒者外未解也不惡寒而

即其熱不潮為胃寒未可與大

承氣湯若其腹大滿便不通者凡不見潮可與小承氣湯微和胃氣勿令大泄下

大承氣湯方 大黃四兩酒洗 厚朴半斤去皮 枳實五枚炙 芒硝三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓納大

黃煮取二升去滓納芒硝更上火微煮一兩沸分溫再服得下餘勿服△武陵陳氏方云名承氣殆即亢則害承乃

制之義乎亢極反乘勝已之化承者以下承上也夫天地一理萬物一氣故寒極生熱熱極生寒物窮則變未有亢

極而不變者傷寒邪熱入胃津液耗真陰虛陽勝陰病所謂陽勝陰虛汗之則死下之則愈急以苦寒勝熱之劑救

將絕之陰虛亢盛之陽承氣所以有挽回造化之功也然不言承亢而言承氣何哉夫寒熱流轉不過一氣之變遷

而已用藥制方彼氣機之不可變者力難矯之亦第就氣機之必變者而一承之耳設其氣有陽無陰一亢而不可

復則為脈澀直視喘滿者死何則以其氣機已絕更無可承之氣也由是言之聖人雖盡人工之妙止合乎天運之

常耳不云承氣而云何○按陳氏此註必須熟讀

小承氣湯方 大黃四兩 厚朴二兩去皮 枳實三枚大者炙 右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服初服湯

更衣不爾者蓋飲之若更衣者勿服之

胃合海水無病之人亦日日有潮但不陽明病其有潮熱又大便微硬者方可與大承氣湯若大不硬者即不可與之加

覺耳病則氣隨潮而發現於外故凡陽明病其有潮熱又大便微硬者方可與大承氣湯若大不硬者即不可與之加

上海文華書局印行

上海文華書局印行

微以潮熱為可攻也。然若其不大便已六七日未散必其果恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯入腹中下轉而失氣者此有燥屎乃可以大便攻之。若不轉失氣者為胃氣此但初頭硬後必溏不可攻之。攻之謂胃氣必脹滿不能食也。試期渴之人欲飲水者與水則噦水且不宜於胃而况攻下乎。惟其後復發潮熱者必大便復硬但溏者既去則而甚少也。止滯於自至直視而譴語則危矣。喘滿者脾肺不交血氣加而更加。喘滿者氣脫於上主死及下利者氣脫於下亦生死○此章統論譴語各證之治法也。譴語之時聆其聲有不正之聲輕微重複之語即是鄭聲註家分而為兩皆相沿之誤也。故止首節提出鄭聲而後無屎各有所主而胃氣虛者慎不可攻也。

陽明譴語其中有虛實之不同死之各異者不可不知。夫陽明實則語皆在譴語虛則聆其所語如鄭聲之聲而病名曰譴語虛則而不正輕微重複名曰鄭聲鄭聲即重語也。蓋譴語原非死以致精氣不直視而譴語則危矣。喘滿者脾肺不交血氣絕死若脈不短自和者病雖不死○此言亡陽譴語也。

心液亡陽而善倍者汗為陽中之太陽發汗多虛矣。若重發汗者心液為陰陰虛於內則心主之陽無所附而遂亡於外矣。亡其陽則神氣譴語脈乃脈短者心液氣死若脈不短自和者病雖不死○此言亡陽譴語也。

有亡陰而傷寒若吐若下後不解其陰液亡矣。不大便五六日上至於十餘日陽明旺於申酉日晡所邪氣隨陰液亡故不惡寒。且熟甚神昏無獨語無所見而如見鬼狀若劇者神識不發則不識人。陽奔於外循衣摸牀陰孤於內而陽脫於微喘於目故直視此陽熟甚而陰液亡其生死只在一脈弦者為陰氣生血若脈濶者為陰氣生血若脉濶者已竭必死病勢尚微者無以上之劇證但見發熱譴語者以大承氣湯主之。若一服利即止後服不當亦所以亡陰也可不慎歟。○此言亡陰譴語也。○按柯氏云吐下後不解病有微劇之分微者是邪氣實當以下解劇者邪正交者當以脈斷其死生弦者是氣實不失為下證故生澀者是正氣虛不可更下故死二字從治病者看出又是一解却是正解。

有亡津液而譴語者此陽明裏謂當其脈陽明病其譴語實若發潮熱脈滑而疾者此陽明裏謂實也。小承氣湯主之然服之因其證為腹中轉失氣者更服一升若不轉失氣勿更與之設明旦不大便脈反變清微溫者則氣衰體血少此裏虛也裏法邪盛正為難後

治熱邪雖不可更與承氣湯也○此以脈而辨謬語之虛實前石斑大承氣以小承氣為法今欲與小承氣即以小承氣則以救逆當臨時審其所急不可預有成見

間有熱室而讐語者以衛任二脈為血室而入血室則陽明病熱逼於下血下血者神脫神此為熱入血室何以為血室男女皆起於胸中與陽明合故陽明病熱逼於下血而即讐語者皆也。此為熱入血室而以爲血室男女皆謂之在男絡唇口而在女絡陰戶而稱之在女門。但頭汗出者汗蒸也肝統諸經之血事以時下是也。但頭汗出不到者汗蒸也肝統諸經之血。

此言下血譖語也

謠語亦有三陽合病者太陽陽明少陽合而病腹滿陽明經熱合於前也身重合於後也難以轉側少陽經熱合於側也三證見而一

病語者大有陽二陽并一陽併病復言則氣已歸脾則陽無太陽證罷但有發潮熱手足熱汗出大便難而譫語者

明結邪之下之則愈宣大承氣湯○此言二陽併病而為譖語也

陽明表證少而裏證多下法之外發汗尚宜詳慎
而溫表更無論矣然而病兼表裏又另有其法

陽明病在表則浮而利之

於裏緊咽連胃院胸開竅於口陽明之

苦手太陰肺主天是太陰脾主腹滿而喘此病陽明之

苦地地氣不升天氣不降故腹滿而喘之裏也

也可轉其機若誤發其汗則傷腎躁傷心液憲陰液既傷則陽反增譖語若誤加燒針則經脈必見慄惕水火不相容

不得眠若下之則胃中空虛客氣乘虛動膈又從膈而上

引清液以至之○此言陽明病兼表裏非汗下溫針所能治也

然梔子豉湯止為熱邪乘心之劑若前證外而更加

渴亦恐不能兼清陽明經氣之燥

甚而為邪亦宜梔子豉湯以下陷交則為大熱

渴而進一步言也

白虎加人參湯止清若脈浮發熱渴欲飲水如前證外而更加

小便不利證者為陽明累及太陰脾氣不能散精歸肺通調水道下

陽時經氣之燥熱為本方不失為陽明之治法以

清熱所致也第運脾調肺以導水又必以清熱滋

陰為本方不失為陽明之治法以

猪苓湯主之○此承白虎加人參湯又進一步言也

猪苓湯方

猪苓去皮

茯苓

阿膠

滑石碎

澤瀉兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓納下阿膠

烊消溫服七合日三服

猪苓湯助脾氣之轉輸肺氣之陽明病汗出過多而渴者為津液外越以致中乾作渴非不可與猪苓湯以汗多胃中燥

通調利小便甚為得法矣若其故也○自陽明病脈浮而緊至此看似四節寔是一節細玩其段段相承上下聯絡以見

傷寒不可執定一法用藥當如轉環也

且陽明中有寒冷燥熱之分不可謂之虛寒夫虛則脈浮而脈遲陰癸水而獨主乎外則水津不布而渴也即小便不利不可謂之虛寒夫虛則寒寒則失其消穀之用每曲食少而至於不升故下利清穀而不能止者以

四逆湯主之

述此節言陽明下焦虛寒也本章凡三節以上中下三焦論陽明有寒冷燥

熱之病也

再言中焦若胃中虛冷視下焦之生陽不啓者彼為大虛此為土虛其土虛亦本之虛冷

於火虛虛極則寒寒則失其消穀之用每曲食少而至於不能食者若復水則兩寒相噦此

論陽明中焦虛冷也

再言上焦經脉之脈浮發熱熱猶經脈而口乾鼻燥其能食者熱在經脈不傷中焦則發熱○此言陽明上焦經脈燥熱也

陽明王闔若終開而無開機則死矣所以言之不厭陽明病外證於不結胸上通於心火心中憤農下後虛故飢不能食陽明之津液主消渴於上下今陽明氣虛其津液不能周流遍布惟上蒸於頭故但頭汗出無汗者上下以之施子攻湯王之能開陽明之關須記之○此言陽明之氣不得交通上下而為栀子豉湯證也

述

合下五節論陽明王闔貴得樞轉

以出若闔於心胸腹胃之間無開轉之機則死矣

其或薦於胸陽明病發潮熱則大便應硬小便應利矣今內而外出入於心胸游行於腹胃靡不藉少陽之極今陽明病肺中焦不治而為區上焦不通火

止逆於胃膈之間也至

小便自可知其氣不涉於大小二便而得由樞以出也不得由樞以出遂致三焦不

止

於胸而達

而

大便

中焦不治而為區上焦不通火

古上有

心現

白脂者可與小柴胡湯

調和三焦

上焦得通而白津液得下而大胃氣因

之

之所以然者而深論之

陽明中風渺脈弦脈浮脈

大開矣乃其氣王闔又不能得樞開而腹都

滿闔於脇下及心作痛以久按其心腹之病虛氣不通以久按之則闔而復闔也陽明之脈起於鼻

而得汗氣闔於內津液不得外達故

鼻乾不得汗陽明隱

行於肺土內而一身及面目悉黃脾不能為胃

小便難陽明之氣旺於申酉有潮熱陽明氣逆

時時嘯三陽之脉清

耶感於耳前後腫醫者取足陽明之經隨其責而刺之故雖刺之少差不外病

而解病過十日又當三陰

厥故若脈續浮者如其不涉於陰仍欲

經故與小柴胡湯

以轉其氣

脈但浮別無餘證者是病機欲從太陽

與麻黃湯

以助其開若不尿腹滿加噦者是不從太陽之開少

夫不尿則甚於十日前之腹部滿時噦矣樞轉不出逆於三陰謂非不治之證

述

此節言陽明王闔心指少陽之樞太陽之開若

闔而不能開轉則一息不運鍼機窮矣故經曰太陽為開陽明為闔少陽為樞三經者不得相失也

以上各法無非使氣機之轉也陽明病自汗出不可再發其汗見小便自利者此為津液內竭不待言矣然大便硬不可攻之當獨自欲大便宜亟前導而通之若土瓜根及與大猪膽汁皆可為導述此言陽明氣機總要其於雖硬不可攻之當獨自欲大便宜亟前導而通之若土瓜根及與大猪膽汁皆可為導述此言陽明氣機總要其於

益煎導方 蜜七合一味納銅器中微火煎之稍凝似鉛狀攏之勿令焦著欲可丸併半捻作挺令頭銳大如指長二寸許當熟時急作冷則硬以納穀道中以手急抱欲大便時乃去之

猪膽汁方 大猪膽一枚瀉汁和醋少許以灌穀道中如一食項當大使出

陽明可汗之症亦有在肌在表之分故先言其陽明病虛則脈遲邪平肌腠固肌腠汗出多微惡寒者表未解也可發汗在肌蓋太陽以皮毛為表陽明以肌腠為裏

宜桂枝湯○此節合下節言陽明病在肌腠而可以汗解也蓋陽明以肌腠為表在太陽則謂之解肌在陽明則謂之發汗也

陽明病邪在肌腠浮邪在表則表氣拒無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯

述

此陽明之表證表脈也二證俱是太陽而

屬之陽明者不頭痛強項故也要知二方全為表邪而設不為太陽而設見麻黃證即用麻黃湯見桂枝證即用桂枝湯不必問其為太陽陽明也若惡寒已罷則二方所必禁矣

熱有鬱於氣分者陽明居中土而色黃陽明病若發熱汗出此為熱越不能發黃也若熱氣蒸於頭上但頭汗出而身無汗汗倒頭而還能下行

而小便不利不能上渴飲水渴者此為寒熱在裏土鬱身必發黃以茵陳蒿湯主之

述

此言熱鬱氣分而為茵陳蒿

湯證也合下節言陽明為燥熱之經繩統氣血故可病於氣而亦可病於血也

茵陳蒿湯方

茵陳蒿六兩

施子一枚

大黃二兩

去皮

右三味以水一斗先煮茵陳減六升納二味煮取三升去滓

分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

熱有鬱於血分者內經云上氣不足陽明證具人善忘者乃血隨氣行必有蓄血所以然者本有久瘀之血停積於下心下氣有餘久之不以時上則善忘俱併於下故必有蓄血

正血瘀血久

停於下而不得故今善忘陽明主屎雖硬而大便反易血久則黑火極其色必黑宜抵當湯下之

述

此言熱鬱

血分而為抵當湯證也○師辨太陽蓄血證必驗其小便利辨陽明蓄血證必驗其大便易亦各從其府而言之

大承氣為陽明之攻藥然胃實可攻胃虛不可攻陽明病既下之而熱邪乘心中懊憆而煩絕似瘧疾之施子初頭硬後必溏

其

於事不可不攻若腹只微滿為中土初頭硬後必溏

其

不可攻之

憑辨其之有無也

若有燥屎者宜大承氣湯

達此章凡六節五節俱論大承氣湯可以攻胃實不可以攻胃虛末節又提虛寒一條以結之第實有按少腹按之

軟而不拒按者無燥屎也小腹硬而拒按者有燥屎也此辨證之捷訣

何以知胃中有燥屎也然病人不大便五六日邪入下脫繞於臍作痛煩極而躁隨所班發作有時者此有燥屎故使不辨之有法陽明病下之後病人不大便五六日及陽中環繞於臍作痛煩極而躁隨所班發作有時者此有燥屎故使不

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

然謂實之證必以脈實為憑否則又須分別者為病宜下之若脈浮虛者為病宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯蓋以脈為憑不外以日晡所發熱而達認為裏實也

之虛實以辨寒熱以施汗下不可概與承氣也

脈實固宜下矣然有大下後六七日不大便煩仍不解腹仍滿痛者此有未盡燥屎也所以然者以胃為水穀之海能本有宿食未下有燥屎者又有驗之之變法矣而未病人小便不利若津液還入胃中則大便下而大便結聚不下而乍難中具未結者

則六七日所食之物又為宿食所以用得大承氣

下後有燥屎既詳其驗法矣而未病人小便不利若津液還入胃中則大便下而大便結聚不下而乍難中具未結者旁流乍易又於日時而微熱氣滿不能卧者皆有燥屎也宜大承氣湯

述此承上文下之而言也此證著限在六七日以六七日不大便此又識燥屎之變法醫人不可以不知也

雖然陽明實熱之證固多而虛

寒者亦復不少胃主容穀今食穀欲嘔者屬陽明胃氣也以吳茱萸湯主之若得此湯而反劇者人必疑此湯之誤而

表裏其食穀欲嘔者是陽明虛寒見太陰為中焦之胃氣虛寒也服吳茱萸湯之後反劇者是太陰虛寒見陽明之燥氣其病機而向也書曰若華不解眩厥瘧而向也疾不瘳其斯之謂歟

述

上五節論陽明實熱之證此節又提虛寒一條以結上文五節之意

吳茱萸湯方

吳茱萸一升

人參三兩

生薑六兩

大棗十二枚擘

右四味以水七升煮取二升去滓溫服七合日

三服

前言太陽陽明合証太陽病寸緩氣虛關浮氣虛尺弱氣虛其人發熱汗出復惡寒皆為桂枝證重申其神屬之義又發但心下痞非本有之證者此以醫下之所致也如其不誤下者邪熱入裏則罹太陽之病本寒從陽明之發也病人不惡寒而但渴者此太陽轉屬陽明也其小便數者津液下泄大便必硬是硬為津液之不足不更衣十日亦無所便痛之苦也若津液渴欲飲水宜少少與之以潤其便因其以通權法救之蓄其實陰水渴者又宜五苓散助脾氣之轉樞而使水津之散布夫曰十日無所苦永宜惟助脾氣以轉樞多飲淡水以出汗則內外俱暢消渴者或異或同可分可合亦視治者之活法耳此散不能養液但以陽明病而轉屬陽明者或異或同可分可合亦視治者之活法耳

陽陽明也首節統論轉屬之意次節甚言津液之不可亡三節四節中言亡津液遂成胃熱脾弱之症五節言發汗轉屬陽明六節言吐後轉屬陽明七節總言發汗吐下皆能轉屬陽明皆所以亡津液也

津液根於身脈，寸緩陽微而汗出少者，陰陽為自和也。汗出多者，陰液亡而陽為太過，此皆自出反覆成故。陽為太過之汗也。若陽脈不微，實證者因發其汗而出多者，亦為太過太過為陽亢，絕而不屬於裏，何也？亡其津液而大便因硬也。○上節亡津液是本旨，而五苓散特為轉屬證之變治，非亡津液之至方。此節復足上文亡津液之意，而治法自在言外。汪金友云：即用下麻仁丸，愚以為麻仁丸未盡其量。

陽絕於裏，具脈奈何？蓋胃土為陽氣以和之，若病人脈浮而芤浮為亢陽，乳為孤陰，浮乳相搏，則胃陽之氣而生熱，熱則津液愈竭，其陽亢則陰陽相絕，所謂陽絕於裏者如斯。○此又承上文而申言陽絕之脈。○愚按浮為陽之陽，言陽邪也；其陽之陽，言人身之陽氣也。陰虛不能大陽，謂之於手之氣口剛，芤診之於足趺之陽，脈浮而芤浮，則胃陽之氣強，澀則脾之津液而小便數浮澀相搏，其津液不能大便，則難矣。脾土為胃行其津液也。津液鮮少，則真脾奈何？為窮約麻仁丸主之。萬胃之陽即扶脾之陰也。○此從上文陽絕之脈而補出陰虛之脈，出其方法也。

麻仁丸方

麻子仁二升

芍藥半斤

枳實半斤

大黃一斤

厚朴一斤炙

杏仁一升去皮

右六味為末，煉

蜜為丸，桐子大，每服十丸，日三服，漸加以知為度。

〔有汗後而轉屬者，如頭暈、心煩、口渴、舌苔白膩等症，發熱者，乃熱邪內陷，與陽明水屬於肺也。必也金底抽薪，調胃承氣湯。〕

王之述

此言熱邪由汗後而入於胃府也。○陽明者無形之氣化也；胃者有形之胃府也。

〔有吐後而轉屬者，夫有形之物傷寒，吐後則上膈之腹仍脹滿者，乃中下之實也。宜與調胃承氣湯。○此言吐後而熱邪仍留在於胃之上，膀胱宜吐而越之，今卻已去而未解也。宜利小便。〕

而未解也。

總而言之，太陽病若吐，若下，若發汗，則津液亡矣。津液亡於外，則燥熱甚於內，故微煩，又走其小便之大，凡得病二日，算至三日，始滿二日，值陽明主氣之期，陽明自得之病，不無太陽柴胡證，胃熱上乘，煩極而躁，胃居於心下，心下硬，能食，今病安則邪實於胃，故心下硬，而小便不利，之宜。

○此論發汗吐下後，皆可以轉屬於陽明也。

〔非關轉屬其病，為得病二日，算至三日，為氣血之主，邪勝則不能自振，故脈弱，調轉屬故，不無太陽柴胡證，胃熱上乘，煩極而躁，胃居於心下，心下硬，能食，今病安則邪實於胃，故心下硬，而小便不利，之宜。以小承氣湯不及，而大下之宜。〕

小安至六日，仍不大，與小承氣湯加至一升，慢得大便而止，甚矣。小承氣湯，不可多用也。如此，若下硬，其下硬，其不，不大便，至六七日，似可以大下，無小便，者，津液尚還，雖不能食，而與諸語，潮熱有躁，但初頭硬後，必溏，未定成硬攻之必溏，須待小便利，屎定，成硬，乃可攻之。〕

〔證入胃中，雖不能食，而與諸語，潮熱有躁，但初頭硬後，必溏，未定成硬攻之必溏，須待小便利，屎定，成硬，乃可攻之。〕

宜大承氣湯

其矣水氣湯之不可勝用也如此

述此章凡五節論陽明自病非關轉屬首節反覆辨論以示不可轉攻之意後四節

又於陽明中從內經悍氣之首悟出悍熱之氣為病最急又不可泥於不可輕攻之說徐徐緩下以成良救之患也
然亦不可拘於不輕下之說以誤事也陽明有悍熱之氣為害最速不如靈樞篇云胃氣上注於肺不可其悍氣上
衝頭者循咽上走空竅循眼系入絡腦出頤下客主人循牙車合陽明併下人迎此衛氣別走於陽明故陽明上下具動
若傷寒六七日為一經已過具得熱之氣目中不了了睛不和其悍熱之氣別走陽明上循無表裏證他其無其無表裏證故大便不緩
醫難惟其無身不大熱其無表裏證故微熱者此得氣之為實也急下之宜大承氣湯急下之以致其陰述此言陽明悍熱為病是
其難表證故而止

當急下又不可拘於小便利而後下之也不了了者病人之目視物不明了也睛不和者醫者視病人之睛光或昏暗
或散亂也○按此證初看似不甚重至八九日必死若遇讀薛立齋張景岳書及老秀才多閱八家書慣走富貴門者

從中作主其死定矣余所以不肯為無益之誤止令拂衣而去矣

又下者宜陽明病審發熱為熱氣之汗多者為熱勢炎炎而津液盡急下之宜大承氣湯○此言悍熱之氣內出迫其津液
急下者出亢陽無陰緩則無及留於腹其病不解

外亡者之宜急下也魏子云止發熱汗出無燥渴硬實之證而亦急下者病在悍氣愈明矣

熱之氣不上走於空竅而下循於臍腹者亦宜急下也○以上為陽明三急下證

三急下之外又有不可以言急而腹雖不痛滿不減即減一二不足言難不甚當下之偶減分亦不足言危亦當下之
亦不可以姑緩者醫者不可不明而常以其病在陽明無形之悍氣從有本氣不宜大承氣湯方足以

述

承上文而言腹滿痛者固宜急下若不痛而滿云云雖不甚急而病在悍氣非下不足以濟之也閻曰三急下證本經並不說出悍氣茲何以知其為悍氣也答曰陽明有胃氣有燥氣有悍氣悍氣者別走陽明而下循於臍腹素問脾論云衛氣者水穀之悍氣也其氣慄疾滑利不入於脈循皮膚之中分肉之間薰於盲

膜散於胸腹目中了了睛不和者上走空竅也發熱汗多者循皮膚分肉之間也腹滿痛者薰盲膜而散胸腹也慄悍之氣傷人甚捷非若陽明燥實之證內歸中土無所復傳可以緩治也故下一急字有急不容待之意焉所謂意不盡言也學者得其意而通之則緩急彼分輕重立見庶不臨時舛錯也○按仲師自序云撰用素問九卷可知傷寒論全書皆素問之菁華也錢塘張氏註中補出悍氣二字可謂讀書得間然長沙何以不明提此二字乎可知傷寒論字字皆經却無一字引經撰用之所以入神也

今病取審脈而知其順與否。陽明為金土火合病，目土受木剋，必下利。若陽明脈大與其脈不負者，與病順也。若見少陽之脈弦而不見陽明之脈大為陽明，負陽氣為失也。然木火固能乘其所勝而剋金土，金土却互相剋，則兩敗名為負也。蓋陽明陽明則下利，少陽自於脈滑而數者，乃有宿食也。陽明戊土有餘，少陽初生之甲木鬱於土中不得暢達，當下之以平土中之欬，宜大承氣湯。此言陽明少陽合病，審其應下者，下之中寓土鬱鬱之木，繫達之二義。

陽明土勝少陽木屈則為頑土，故木不可太勝土亦不可太旺，平則治偏則病也。

病有不在陽明之經脉而在於陽明之絡者，不可病人外無頭痛惡寒之證，而內無諸熱滿之裏證。發熱七八日，值陽明主氣之期，陽不退則陰淫日劇，而為熱，胃得熱則消穀善飢，至六七日再值陽明主氣之期，若其脈浮而數，仍不解，是焰熱不因下而除，反乘下後內虛而合，而為熱，則消穀善飢，此證為大不可也。假令已下，其脈浮而數，仍當湯大抵當湯為攻癥之的方，雖不直斷之曰五之而僅商之曰宜看，蓋欲忘如狂等證而復用此劑而得宜也。若脈解而數不解，而且下利不止，是血不為瘀而下奔之熱，必又陷腸胃，而便膿血也。此證溫創有瘀花湯寒劑有白頭通而下此而易知，不必特立一方而治也。○此論邪干陽明之絡處方，宜詳慎而靈活也。

陽明之裏，即是太陰，合其傷寒，法應於汗，所以使發汗已通，與日俱為黃，所以然者，暴感之寒邪，機以本有寒濕病氣，則為黃，請先言寒濕，熱從汗越也。乃發汗已通，與日俱為黃，不可下也。常於寒濕中求其法，可下而此當真武皆正方也。時法加入茵陳蒿亦妙。述此章凡四節，論陽明之熱合太陰之濕而為發黃證。

濕熱之黃，傷寒七八日，又當再經之期，身黃如橘子色，於裏故小便不利，其腹微滿者，因小便不利，茵陳蒿湯主之。此言濕熱之發於外也。

傷寒不勝於外，而身黃發熱，別證者，以梔子柏皮湯主之。此言濕熱之發於外也。

梔子柏皮湯方 梔子一升，甘草一兩，黃柏二兩，右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服。

傷寒未勝，就在裏，與太陰之身，心發黃，以麻黃連翹赤小豆湯主之。○此言濕熱之發於內也。

乃太陽之標熱下合太陰之濕熱，陽明之發黃亦陽明之燥熱內合太陰之濕化，若止病本氣而不合太陰，俱不發黃，故曰太陰者，身當發黃，若小便自利者，不能發黃也。

麻黃連翹赤小豆湯方 麻黃二兩，赤小豆一升，連翹二兩，杏仁四十個。

大棗十二枚

生梓白皮一升

桔梗

生梓白皮一升

生

張仲景傷寒論原文淺註卷五

辨少陽病脈證篇

少陽者少陽之為病奈何內經云少陽之上相火口苦咽乾又云少陽為甲木風之提綱主少陽之氣化而言也△柯韻伯云太陽主表頭痛項強為提綱陽明主裏胃家實為提綱少陽主半表半裏之位仲景特揭口苦咽乾目眩為提綱至當不易之理也蓋口咽目三者不可謂之表亦不可謂之裏是表之出表處所謂半表半裏也三者能開能闔恰合樞機之象苦乾眩者皆相火上走空竅而為病也此病自內之外人所不知惟病人自知診家所以不可無問法○三證為少陽病機兼風寒雜病而言

少陽之脈從耳後入耳中出走耳前少陽中風風擾其經道故兩耳無所聞少陽之脈起目角眎之氣若為少陽自不可吐下以傷上下二焦之氣馬之氣若受之風邪則因吐而傷少陽三焦之氣因下而傷少陽膽木而驚○此言少陽自受之

風邪戒其不可吐下也上節提其總綱專就氣化而言此節補出經脈病治就經脈而言也

少陽寒脈現出本弦並現出寒細少陽之脈頭痛少陽之上相火之氣而生煩者陽經氣之細上頭角故頭痛火王之氣而發熱者露出相火屬少陽自受之少陽主樞非不可發汗惟小柴胡湯加發汗喝其津液則發謔語夫樞者少陽減為對證若致胃証則推而言之胃為五臟六腑之本皆心包而煩其決斷之職而悸可以少陽屬胃之一說悟之也○此言少陽自受之寒邪戒其不可發汗也○合上節

所謂少陽有汗吐下三禁是也漢文辭短意長讀者當於互文見意

若已經吐下發汗三禁之病何本太陽標陽病不解與少陽相大為一轉入少陽者少陽不得脇下鞭滿氣不和則寒邪也少陽為病而謂之轉屬今因不解而轉則得少陽之氣而不能食不能由故往來寒熱然尚未吐下中氣猶未傷也脈沉緊者福逆隨其所以法救治之○此言已犯吐下發汗之禁當審其救治之法也補出溫針見溫針雖不常用而之自為病也

少陽為病何外又加溫針助火乘傷經脈證謂之轉屬此為少陽標陽病或犯吐下而犯溫知犯何逆隨其所以法救治之○此言已犯吐下發汗之禁當審其救治之法也補出溫針見溫針雖不常用而之自為病也

其為禍更烈也時醫輒用火灸更以人命為戲矣

太陽主開陽明三陽合病則開闔福俱病矣開闔之期若無外則三陽之部伍今脈見太陽明而不出內氣行於陰故大二陽浮大上於少陽上是二陽開闔之機俱逆於少陽主闔少陽主福俱病矣開闔之期若無外則三陽之部伍今脈見太陽明而不出內氣行於陰故

但欲眠睡謂目為陽合目為陰目合之項內則外失所汗○此雖三陽合病而以少陽為主也龐安常

云脈不言弦者隱於浮火也

邪在少陽入陰最近此以循次而言傷寒六七日得少陽之樞轉止一周已過又當來復於太陽之期若無大熱其人煩躁者此為太陽已去故身無入少陰故躁也是可見福有權則轉外樞失職則內入當於少陽一經三致意也推而言之於陽即從裏而入於陰矣而少陽直入於臟陰者亦然今醫者止守日傳一經之說必以太陽傳入陽明傳入少陽少陽傳入太陰等經矣豈知經氣之傳有定至於病氣或隨經氣而傳或不隨經氣而傳變動不居有如是哉○此從少陽而推廣傳經之義也

然亦有以傷寒三日為少陽主氣之期亦陰陽交換次受邪邪入太陰則不能食而嘔矣乃其人反能食而不嘔其病不除經而入於太陰太陰為三經知為三陰俱不受邪也○此言少陽亦有以次而傳與上文互相發明述此當與太陽篇至七日以上自愈者以行其經盡節合看則傳經了然

傷寒三日乃少陰主氣之期少陽本弦脈轉而小者即少陽之病亦經曰大為病進小為病退者此也○此承上文而言少陽之病欲自己也

少陽病欲解時從寅至辰上蓋以少陽之氣旺於寅卯辰上而其氣已化陽氣大旺正可勝邪故也○此言少陽病之得旺時而愈也

愚按少陽病脈證并治法仲師原論只十條註家因寥寥數條疑其散失不全或疑為叔和散編入諸經辨論不一余向亦信從之自甲寅至庚申每日診病後即謝絕應酬與傷寒論金匱二書為寢食方知前此之所信從者誤論也今姑節錄其說而辨正於後起今古而同堂諒韻伯平伯諸先生當亦許余為直友也△柯韻伯云六經各有提綱則應用各方法如太陽之提綱主表法當汗解而表有虛實之不同故立桂枝麻黃二法陽明提綱主胃實法當下解而實亦有微甚故分大小承氣少陽提綱有口苦咽乾目眩等證法當清火而火有虛實若邪在半表則製小柴胡以解虛火之遊行大柴胡以解相火之熱結此治少陽寒熱往來之二法也若邪入心腹之半裏則有半夏瀉心黃連黃芩等劑叔和搜採仲景舊論於少陽太陰二經不錄一方因不知少陽證故不知少陽方且著論翼將小柴胡湯大柴胡湯