

卷六

耳 目 鼻 牙 咽 喉 瘡 瘍 調 經 淋 帶 崩 漏 胎 前
產 後 癰 疽 熱 入 血 室 幼 科 要 畧 痧 疹

增補臨證指南醫案

上海文益書局印行

臨證指南醫案卷六

古吳葉桂天士先生著

錫山華南田岫雲全較

(耳)

風溫

某溫邪上鬱耳聾右脹薄荷 馬勃 桔梗此當 連翹 杏仁 通草
某二先起咳嗽繼而耳聾脹痛延綿百日不愈此體質陰虧觸入風溫未經清理外因傷及陰分少陽相火陡起故入暮厥痛愈劇當先清降再議育陰 苦丁茶 鮮菊葉 金銀花 生萊豆皮 川貝母 鮮荷葉梗 益元散

某風溫發熱左耳後腫痛惡感外症 乾荷葉 苦丁茶 馬勃 連翹 杏仁 黑梔皮
畢三壯年脈來小促數自春月風溫咳嗽繼以兩耳失聰據述苦降滋陰不効是不明虛實經絡矣內經以春病在

頭膏梁之質厚味酒醴助上痰火固非治腎治肝可效每晚卧時服茶調散一錢
又 鮮荷葉汁 羚羊角 石膏末 連翹 元參 鮮菊葉 牛蒡子 午服

又 照前方去牛蒡菊葉加鮮生地鮮銀花
葉 火風侵竅耳聾 連翹 薄荷 甘菊 淡黃芩 苦丁茶 黑山梔

暑

顧二暑邪鬱閉耳失聰 鮮荷葉 鮮菊葉 苦丁茶 夏枯草 蔓荊子 連翹 淡黃芩 黑山梔
某心左耳聾痛舌白脈數體質陰虛挾受暑風上焦氣熱宜用辛涼輕藥 鮮菊葉 黑山梔 飛滑石

上鬱

某二暑熱上鬱耳聾作脹咳嗽當清氣熱 杏仁 連翹 殺 淡竹葉 川貝 白沙參 六一散
某頭重耳聾脹目微赤少陽相火上鬱以辛涼清解上焦 連翹 羚羊角 薄荷梗 黑山梔皮 小生香附

某風木之鬱耳脹欲閉 連翹 羚羊角 薄荷梗 苦丁茶 夏枯草花 黑山梔皮 以上俱當外治
倪三因大聲喊叫至石耳失聰想外觸驚氣內應肝膽膽脈絡耳震動其大風之威亦能鬱而阻竅治在少陽

忌食腥 青蒿葉 青菊葉 薄荷梗 連翹 鮮荷葉汁 苦丁茶
汪耳聾咳嗽形體日瘦男子真陰未充虛陽易升乘竅書云膽絡脈附耳先議清少陽鬱熱以左耳為其故也

桑葉 藥大

丹皮

連翹

黑山梔

青蒿汁

象貝母

方極清和
可喜

補腎

卷六

心腎
上美

丁腎開竅於耳。心亦寄竅於耳。心腎兩虧。肝陽亢逆。故陰精走洩。陽不內依。是以耳鳴。時開但病在心腎。其原實由於鬱。鬱則肝陽獨亢。令膽火上炎。清晨服丸。藥以補心腎。午服湯藥。以清少陽。以膽經亦絡於耳也。

水煎熟地

麥冬

龍板

牡蠣

白芍

北味

建連

磁石

茯神

沉香

辰砂

為丸

顏夏枯草

丹皮

生地

山梳

女貞子

赤苓

生甘草

防己

氣閉

桃三氣

宜外治通竅

鮮荷葉

杏仁

厚朴

廣皮

木通

連翹

腎虛

金心下

耳鳴失聰

磁石六味

去莖加川斛

龜甲遠志

王

腎竅開耳

膽絡脈亦附於耳

凡本虛失聰

治在腎

邪于竅閉

治在膽

乃定例也

今年已六旬

脈形細數

是皆腎

陰久虧

肝陽內風

上旋蒙竅

五行有聲

多動真氣

火風然非

苦寒直降

可致填陰

重鎮滋水

制木佐以

鹹味入陰

藥理當如是

議熟地

龜板

鎖陽

牛膝

遠志

茯神

磁石

秋石

莢肉

五味

某

八十耳聾

乃理之常

蓋老人雖健

下元已怯

是下虛上實

清竅不主

流暢惟固

補下焦

使陰火得以

潛伏

磁石

六味

加龜甲

五味

遠志

腎開竅於耳

心亦寄竅於耳

膽絡脈附於耳

體虛失聰

治在心腎

邪于竅閉

治在膽經

蓋耳為清空之竅

清陽

文會流行之所

一受風熱火鬱之邪

與水衰火實

腎虛氣厥者

皆能失聰

故先生治法

不越乎通陽鎮陰

益腎

補心清膽等法

使清靜靈明之氣

上走空竅

而聽斯聰矣

如溫邪暑熱

火風侵竅

而為耳聾

痛脹者

用連翹山

梳薄荷竹葉

滑石銀花

輕可去實

之法輕清

池降為主

如少陽相火

上鬱耳聾

腫脹者

用鮮荷葉

苦丁茶

青菊

葉夏枯草

蔓荊子

黑山梳

羚羊角

丹皮

辛涼味薄

之藥清少

陽鬱熱

兼清氣熱

為主如心

腎兩虧

肝陽亢逆

與

內風上旋

蒙竅而為

耳鳴

暴聾者

用熟地

磁石

龜甲

沉香

二文

牛膝

鎖陽

秋石

山茱

白芍

味厚

質重之藥

壯水

制陽填陰

鎮逆佐以

酸味入陰

鹹以和陽

為主因症

施治從虛

從實直如

庖丁之道

耳聾之法

端然大段

不過清上

鎮下二條

案中

方

極穩當

至於外治

之法及虛寒等症

則不可不知也

風溫 某風溫上鬱目赤脈左弦當用辛以散之桑葉 夏枯草 連翹 草決明 赤芍
燥熱 某三失血後復受燥熱左目赤痛當以辛涼清之鮮菊葉 冬桑葉 生甘草 赤苓皮 萊豆皮 稽豆皮

暑濕 飽八秋風化燥上焦受邪目赤珠痛連翹 薄荷 黃芩 山梔 夏枯草 青葙葉 苦丁茶 桑皮
席用淡滲漸安是暑入氣阻熱蒸溼鬱勿取大辛大苦之開池微清邪中上治法

上鬱 顧四頭額悶脹目赤 羚羊角 夏枯草 草決明 山梔皮 連翹 生香附
木火 潘戒飲濁減十四略可加穀近日竟夕無寐目珠赤痛陽升不交於陰暫停妙香散 此症宜養血

桑葉 丹皮 夏枯草 黑山 川貝 苡仁

陸軀鬱勃氣火翳遮目睛高年苦辛難進夏枯草 穀精草 草決明 望月砂 生香附 連翹 山梔皮

某頭面風腫目起星是氣中熱 羚羊角 夏枯草 薄荷梗 穀精草 生香附 連翹 山梔皮 望月砂

汪脈左弦左目赤痛淚多桑葉 丹皮 草決明 小胡麻 夏枯草 穀精草 萊豆皮 黑梧豆皮

汪目痛偏左醫膜紅絲診脈左弦滑由肝膽氣熱所致草決明 冬桑葉 夏枯草 穀精草 小胡麻 丹皮 宜用點藥

某十肝火上升目眶紅腫連翹 赤芍 菊花葉 黑梔皮 苦丁茶 夏枯草

江脈數右大鬱久熱生目障心痛夏枯草花 小生香附 金石斛 半夏麴 茯苓 橘紅

某八目胞浮腫不飢不運桑皮 茯苓皮 錢三 大腹皮 廣皮 錢一 薑皮 錢五 苡仁 錢半 通草 錢一

王軀高年目暗已久血絡空虛氣熱來其空際攻觸脈絡液盡而痛當夜而甚乃熱氣由陰而上想外科用酒調末

藥必係溫散攻堅因此而痛虛症可知 羚羊角 連翹心 夏枯草 青葙葉 全當歸 川桂枝 丹皮

葉微寒汗大出下有痔漏左眼睚疾痛此陰傷火鬱不可作時邪泛治六味去萸加芍蔓荊子丹皮重用

某三右目多淚背脹心嘈雜陽明空虛肝陽上擾使然當調補肝胃嫩黃芪 錢三 當歸 錢半 白芍 錢半 茯神 三錢

祝八當夏形懶不耐大氣發泄入冬兩目無光精氣無收藏凡五臟精華皆聚於目失藏失聚內之生真不獨一臟

虛陰 營陰 肝風 腎虛 火鬱 陰虛 虛熱 血絡 臨濕 脾肺

肝陰 某三 脈瀉細左目痛淚熱腎腰此肝陰內虧厥陽上越所致 冬桑葉錢 炒枸杞半 小胡麻半 望月砂錢

某三 目痛無光 製首烏六 枸杞子二 柏子仁兩 細生地兩 石決明兩 小胡麻三 望月砂三

刺疾黎兩 冬桑葉半 黃菊花兩 用稽豆皮八兩 設精珠三兩煎濃汁泛丸每服五錢開水送

某 腎脹目昏心中嘈雜當治肝腎 熟地兩 枸杞子三 桑椹子二 沙苑二 石決明兩 茯神兩

女貞子兩 青鹽兩 黃菊花一 川斛兩 加蜜凡早上開水送四錢

某三 脈瀉皆痛右目當風多淚當治肝腎 製首烏 枸杞子 炒歸身 桑椹子 沙苑子 茯神 此當風

某五 遺止心嘈目淚仍是陽氣過動當填陰和陽 熟地 杞子 天冬 萸肉 五味 生地 山藥 蜜丸

某 腫神散大左偏頭痛先損左目是焦煩鬱勃陽升化風劫傷血液使然法當兼補肝腎

熟地 不須此方 枸杞子 山萸肉 五味 茯神 菊花 生神鉗 設精草 山藥

眼科一症古有五輪八廓七十二問之辨傳氏又分為一百零八症因名目太多徒滋感亂至於見症楊仁齋

已備論具載景岳但陰陽虛實寒熱標本施治不可紊亂經云五臟六腑之精華皆上注於目又云目者肝之

竅也肝與膽為表裏肝液膽汁充足目乃能遠視故無論外感與內症皆與肝膽有關係焉夫六淫之邪惟風

火燥居多兼寒兼溼者亦間有內起之症肝膽心腎為多他臟亦間有之若夫論治則外感之症必有頭痛寒

熱鼻塞筋骨痠疼脈見緊數或浮洪一切表症方可清散至於內因之症有虛實之殊實者肝膽之風熱盛也

凡暴赤腫痛脹開難開翳膜膠淚酸瀉作癢斑瘡入睛皆實症也當除風散熱虛者腎經之水火衰也凡久痛

昏瞶青盲雀目內障昏朦五色花翳迎風淚出皆虛候也治宜壯水益火若陰血雖虧而風熱未盡則當審其

緩急相參而治若久服寒涼虛陽轉盛則當補以甘溫從乎反佐至於紅色淺淡而紫者為虛熱鮮澤而赤者

為實熱腫神內湧白睛帶赤者為熱症腫神青綠白睛枯槁者為寒症腫脹紅赤眼珠刺痛夜則尤甚目不能

開而視物猶見者為邪火熾盛若白睛通睛珠不甚痛或全不痛目仍能開而視物不見者為真火不足當細

抄錄眼科
通食諸以
批書之體

致成外障。譬之鏡受污垢。必當濯磨。須用點藥。若但服藥。必不能愈。至於內障之症。但宜服藥。倘用點藥。徒傷其氣血。必無益。而有損。更當知。目皆白珠。屬陽。故晝痛。點苦寒藥。則可致腫。子黑睛。屬陰。故夜痛。點苦寒藥。則反劇。是外治之治。亦當以陰陽區別也。若夫偏正頭風。屬氣虛。屬者。朝重暮輕。血虛痛者。朝輕暮重。亦有外感內因之別。此症當以補養正氣為主。略兼治表。倘察以風熱而論。專以表散最易損目。更有肝陰虧耗。木火上炎。頭痛惡心。肩稜骨痛。不欲飯食。眼胞紅腫。睛珠刺痛。眵淚如膿。白睛如絲。目珠上竄不下。不得寤寐。甚至顛頂腦後。如破如裂。此內發之風也。夫肝屬木。木主風。熱盛化風。其體必本陰虧。男子或有遺精白濁。腸風痔漏。下血等疾。女子或犯淋帶崩漏諸症。此係陰傷陽升。內風沸起。大忌發散。宜用育陰熄風。柔肝滋腎等法。或可救十中之四五。凡羌活防風川芎細辛。薑本升麻等藥。皆不可用。倘或失治。必致膏傷低陷。青黃膜出。致成癰疾。而不可救。專是科者。不可不留意焉。葉先生雖非眼科。專科。觀其案內諸法。真補前賢之未備。較之慣用苦寒升散。及概用點藥者。不啻如霄壤之殊矣。學者當細心而參玩之。

眼科自有專家。其現在各主治之方。案中雖未必切中。然清涼和平。無苦寒溫補等。鮮反勝于近日之名。為眼科者。醫理苟明。則無不通矣。若欲深求。則有專門之書在。

清邪
室氣

鮑氏兩三年鼻塞。不聞清涕。由口噓出。而氣室仍然。大凡頭面諸竅。皆清陽交會通行之所。就外邪來乘。亦必露露無質。清邪邪鬱既久。氣血失其流暢。進藥攻治。必不效驗。欲治其病。須查手太陰自少商穴起。藥外治。施鍼刺以泄邪流氣。乃一法也。無方。

泄邪流氣乃一法也。無方。

徐四頭面諸竅。皆清陽遊行之所。邪處於中。則為堵塞。陽氣不司流行。必畏寒形顏。內痺必鬱而成熱。有鼻柱軌。鱗

矣。論理當用通聖散。遠處江外。倉猝就診。不可輕投。用輕可去實。苦丁茶。乾荷葉邊。蔓荊子。連翹心。

毛四熱壅肺氣失降。鼻柱室痺。宜外治。如母。水梨肉。川貝母。水煎膏。不成方。飛滑石。白芷。

梅臧降滋填鼻淵。止得寐。用虎潛法。減當歸陳皮。加天冬淡菜膠脊筋丸。蔓荊子。連翹心。

沈氏素有痰火。氣逆。春令地中陽升。木火化風。上引巔頂。腦熱由清竅以泄越。耳鳴鼻淵。甚於左者。春應肝膽。氣火

自左而升也。宜清熱散鬱。平涼達於頭而主治。羚羊角。黑山梔。苦丁茶。青菊葉。飛滑石。

熱壅
肺氣
鼻淵

增品登音... 鼻昇

另有治法

此等方皆
有專治之
方大抵以
清火驅風
保肺為治
而藥不中
於理無益
致所以醫
貴極群
害也

精虛

溫邪 火 陰虛 火炎 牙痛 後發 風熱

夏枯草花 又 照方去滑石加乾荷葉生石膏

又 性情燥急陽動太過氣火上升鬱於腦竅由春深加病失其調達之性輕言春氣病在頭也考五形六氣迅速變化莫如火風腦熱脂泄而為鼻淵隨道失和結成癭核夫東垣升陽散火丹透總治諸鬱咸取苦辛為法然藥乃片時之效得能久安以怡悅心志為要旨耳連翹心土貝母海藻昆布黑山桅川芎小生香附鬱金 羚羊角 夏枯草 乾荷葉邊 生研末青菊葉汁法九若丁茶煎湯送二錢五分

汪

形瘦尖長實乎木火陰精不足腦髓不固鼻淵淋下並不腥穢暖天拍止遇冷更甚其為虛證顯然明白醫者愈以風寒中腦主治發散滲泄愈耗正氣豈但欲愈勞法是憂用天真丸

經云肺和則鼻能知香臭矣又云膽移熱於腦令人辛頰鼻淵傳為齕齕瞋目是知初感風寒之邪久則化熱熱鬱則氣庫而塞矣治法利於開上宣鬱如蒼耳散防風通聖散川芎茶調散前花茶調散等類先生則佐以荷葉邊苦丁茶蔓荊連翹之屬以治之此外咸宜辛散也內熱宜清涼者如腦熱鼻淵用羚羊山桅石膏滑石夏枯草青菊葉苦丁茶等類苦辛涼散鬱之法也久則當用鹹降滋填如虎潛藏辛再加鎮攝之品其有精氣不足腦髓不固淋下無腥穢之氣者此勞怯根萌以天真丸主之此就案中大概而言之也然症候錯雜再當老前賢之法而治之華玉堂

牙

某

陰虧體質溫氣上蒸齒痛連及頭顱用玉女煎

某

火鬱鎮頂屬厥陰上結核齕腫犀角 羚羊角 元參 知母 生甘草 連翹 黑山桅 銀花 夏枯草

王

酒客牙宣衄血疫血形寒內熱食少陰藥濁味姑緩小黑豆皮 人中白 旱蓮草 川斛 左牡蠣

徐

二脈細數上出體屬陰虛內熱牙癰後治外煩車穴開口不能張其病在絡藥難難效擬進宣通絡痺方

汪

風熱上蒸齕脹頭痛當用清輕上焦活水蘆根 國圖滑石 西瓜翠衣 生萊豆皮 連翹 銀花

牙症不外乎風火虫虛此但言其痛也其他如牙宣牙挫牙齒牙疳牙癰牙疳牙毒骨槽風走馬牙疳之類皆由

於溼火熱毒蘊結牙床須分上下二齒辨明手足陽明及少陰之異又當察其專科而任之華玉堂

咽嗑

風火

風火上鬱項腫咽喉痛

連翹

射干

牛蒡子

馬勃

萊菔皮

肺燥

風火上鬱咽痛頭脹宜用辛涼

西瓜翠衣

滑石

連翹

桑皮

射干

杏仁

熱

汪三左脈弦數咽痛脫悶陰虧體質不耐辛溫當以輕藥暫清上焦

桑葉

生萊菔皮

白沙參

元參

川貝母

川貝母

熱

王仁勞傷恐有癰腐進辛潤宣血初服身痛繼漸平復但喉間緊痺而呼吸飲食仍不覺其苦服白仍帶黃議清肺

中氣熱治

百部

大沙參

鮮枇杷葉

活水蘆根

川貝

上受

徐六老勞咽疼生雞子白枕

橘根根鬚

刮北沙參

炒麥冬

川石斛

生甘草

生甘草

瘰癧

楊未病陰氣走泄為虛癰濁上受則實咽喉腫痺上戴邪蒙日暮昏煩陰傷目熾肌膚柔白氣分不足此醫藥難

宜涼解清上但不可犯及中下

連翹

鬱金

馬勃

牛蒡子

竹葉心

瘰癧

又上焦之病都是氣分氣室則上下不通而中宮遂脹熱氣蒸灼喉舌瘡蝕清氣之中必佐解毒皆受重藥之累瘁

銀花錢

川貝錢

馬兜鈴

連翹心

川通草

白金汁

瘰癧

孫四腎液不收肝陽上越頭脹流涕咽喉微痛六味加牛膝重前五味

甜杏仁

花粉

川貝

甘草

桔梗

瘰癧

伍四咽喉痛痺發時如有物阻隔甚至痛連心下每晚加劇是陰液日枯肝臟厥陽化火風上灼法以柔劑微甘以

緩其急耳

但氣必咳中有細痰無功

細生地

天冬

阿膠

生雞子黃

瘰癧

陳三陰陽交虛營衛欹斜為忽冷忽熱周身骸骨皆痛百脈皆損秋奉天氣已降身中氣反泄越汗出喉痺陽不入

於陰致目為動搏耳夫咽喉之患久則喉痺喉宣妨阻受納最不易治從少陰咽痛例用猪膚湯旬日喉痛得緩

對症轉方

張三陰損三年不復入夏咽痛拒納寒涼清咽

反加泄瀉則知龍相上騰若雷光火灼雖傾盆暴雨不能

撲滅必身中陰陽協和方息此草木無情難致耳從仲景少陰咽痛用猪膚湯主之

增

陰虛

火

咽

喉

咽

喉

咽

喉

瘰癧

張三陰損三年不復入夏咽痛拒納寒涼清咽

反加泄瀉則知龍相上騰若雷光火灼雖傾盆暴雨不能

撲滅必身中陰陽協和方息此草木無情難致耳從仲景少陰咽痛用猪膚湯主之

增

上海

文

益

書

又陰涸於下。陽熾於上。為少陰喉痛。乃損法之末傳矣。用猪膚甘涼益坎。有情之屬而效。今由膝消燥殆盡。下焦易冷。髓空極矣。何暇以痰嗽為理。治病無有不效。顧者議消瀉之補。味鹹入腎可也。

牛骨髓四 羊骨髓四 猪骨髓四 療角膠四 用建連 五兩 山藥五兩 芡實二兩 同搗丸

金二臟液不充。陽氣虛風鼓動。病起喉辣心震。頻頻舉發。多因勞怒。用內經甘緩一法。

人參 炙甘草 白芍 炙甘草 茯神 小麥 又 復脈湯去桂

內經云。一陰一陽結謂之喉痺。此是一陰者。手少陰君火。心之脈氣也。一陽者。手少陽相火。三焦之脈氣也。夫二經之脈并終於喉。故氣熱則內結。結甚則腫脹。脹甚則痺。痺甚則不通而死矣。即今之所謂喉痺。喉風。喉蛾等類是也。夫推原十二經。惟足太陽別下項。其餘皆奏咽喉。然內經獨言一陰一陽結為喉痺者。何也。蓋以君相二火獨勝。則熱且痛也。愚歷致咽喉湯方。皆用辛散鹹軟。去風痰解熱毒為主。如元參升麻湯。聖濟濟透關散。及玉輪匙。如聖散。普濟消毒飲子。皆急於治標。而緩於治本。恐緩則傷人。故以治標為急耳。又嘗考仲景傷寒論。咽喉生瘡等症。每用甘草桔梗。半夏散及湯為主。一為少陰水虧。不能上濟君火。以致咽喉生瘡。不能出聲。故以半夏之辛滑。佐雞子清利。痰通聲。使以苦酒入陰。劫涎飲瘡。桂枝解肌。由經脈而出肌表。悉從太陽開發。而半夏治咽喉痛。可無燥津涸液之患。一為陰火上結。而為咽痛。故用生甘草甘涼泄熱。功在緩腎急。而救陰夜。佐以桔梗。開提足少陰之熱邪。如腎液下泄。不能上蒸於肺。致絡燥而為咽痛者。仲景又有猪膚一法。潤燥解熱。緩中。使其陰陽協和而後愈。是固本而兼治標者也。如風火上鬱。陰虧脈數。而為咽痛者。先生又有辛涼清上諸法。如咽喉緊痺。氣熱而為咽痛者。又有清肺中氣熱一法。如情志鬱勃。相火上炎。而為咽痛者。則又有降氣開濁一法。如腎液不收。肝陽上越。而為咽痛者。宗錢氏六味湯。如陰陽交虛。龍相上灼。而為咽痛者。宗仲景猪膚湯法。鄒滋元

補腎湯

凡病屬於經絡臟腑者。皆煎丸之所能治。一為形體乃九竅則屬有形之病。實有邪氣凝結之處。藥入胃中。不過氣到耳安。能去凝結之邪。故煎丸之功。不過居其半耳。若欲速效。必用外治之法。以應手而愈。博考方書。處處求秘法。自能得之。此老尚未知之也。故其治有形諸病。皆非所長。又外治之法。上古所鮮聞。因其用針灸之術。通神入妙。何必外治。此則外治之最者。也。復世針灸法。不傳於是乎。以藥代針。而多外治之法。若針灸既廢。而外治之法。亦不講。則天下之病。即使藥之當祇能愈其半耳。其外症之必需外治者。竟無通理。此亦醫道之一大闕也。後之學者。須知之。

〔瘡瘍〕

楊心瘡癰四肢偏多。長夏入秋。懶倦欲眠。乾咳無痰。頗知味所納已少。此陽明胃陰。因熱致耗。即熱傷元氣之徵。當與甘藥養胃陰。以供肺。如金匱麥門冬湯。去半夏。加黃芪皮。

吳心脈不浮大。非關外風。初起右掌二指。已不屈伸。頭面身半以上。常有瘡泡之形。此乃陽明脈絡內留溼熱。若非癰氣吸入。定然食物中毒。姑與宣解緩攻。連翹 犀角 赤芍 酒煨大黃 荊芥 片薑黃

又能食。二便通調。臟腑無病。初因膿瘡。瘡愈有泡。自面及肢體。至於右指掌。屈伸皆痛。為脈絡留邪。以致隧道為壅。前方辛涼入血。先升後降。已得小效。今製清脈絡。羅熱藉酒力以引導。通後營衛。亦一法也。

銀花

連翹

犀角

生大黃

荊芥

丹皮

黃芩

川芎

當歸

澤蘭

羚羊角

金四血舍空。隙內風蠕動。外以熱湯。泡洗。溼熱蒸襲肌表。遂有裂膿流水。況周身漸加麻痺。陽脈亦衰。圖治之法。清營以熄內風。疎利溼熱。以肅隧道。辛辣腥鮮勿進。尚可緩以計功。

製首烏

鮮生地

柏子仁

川斛

黑糯米

虎骨

蠶沙

黃柏

草薢

熬膏

吳瘡癰之後。溼熱未去。壅阻隧道。水穀下咽。亦化為痰。中焦受病。故不知飢餓。痰氣上干。漸至喘悶矣。但服藥四十劑。純是破氣消滯。胃陽受傷。痰氣愈不得去矣。半夏 茯苓 紫老薑 炒粳米

又瘡癰大發。營衛行動於脈中。脈外可免腹滿之累矣。第穀食尚未安適。猶是苦劣多進之故。胃陽未復。仍以通調利溼主之。半夏

改仁

金石

茯苓

澤瀉

熟首烏

丹皮

丹參

菟蔚子

銀花

地丁

秦以久熱瘡癰五六年。環口燥裂。溺澀莖痛。鮮生地 熟首烏 丹皮 丹參 菟蔚子 銀花 地丁 紫草 共熬膏

王血熱風動膚癢

荊芥

防風

地膚子

赤芍

銀花

小生地

木通

甘草

張初因嘔吐。是肝胃不和致病。故辛香剛燥愈劇。然久病必入血絡。熱則久瘡不愈矣。夫火皆令燥。液易飢易飽。間有嘔逆。斯胃病仍在。凡呆滯藥味。皆非對症。三角胡麻 冬桑葉 生首烏 杏仁 鬱金 佩蘭葉 熟自熬膏

楊封身瘦久瘡

血分有熱

精通之年

最宜安養

脈象非有病

生首烏

三角胡麻

冬桑葉

生首烏

杏仁

鬱金

細生地

有細生地

地骨皮

金銀花

丹皮

生白芍

生甘草

蜜

凡早服

癰

風熱腫

疔

瘰癧核

瘰

乳

王^三乳來清淨久瘡變紅未罷是衛陽疎豁不耐寒腫初受客邪不解混處氣血浸淫僅在陽分肌腠之患議升舉一法氣壯斯風溼盡驅人參生黃芪川芎當歸防風殭蠶蟬蛻炙草生薑大棗

蔣^四鼻瘡口瘡尿黃膚熱冬瓜皮

鄒^三瘡因於溼久而變熱壅於經隧變現瘡疾疥癬己釀風溼之毒混在氣血之中邪正混處搜逐難驅四肢為甚

姑從陽明升降法連翹赤芍白殭蠶白鮮皮防風升麻滑石酒浸大黃

汪^三風熱既久未解化成瘡癰當以和血驅風當歸赤芍川芎夏枯草花牛蒡子製殭蠶

金^三頭巔熱癰未能泄邪此身熱皆成膿之象辛涼兼理氣血可愈連翹犀角銀花丹皮元參青菊葉

某^三風熱毒閉項後腫竹葉滑石蘆根牛蒡馬勃薄荷葉黑山梔連翹川貝生甘草

王^三疔毒咯血失血都是暑入陰傷竹葉心元參心鮮生地黑稽豆皮夾冬知母當用解毒

屠^三秋痢半年未愈癰堅硬痛癰膿鬱久成熱腑經病可冀其愈夏枯草病香附茯苓以仁丹皮

康^三頸項結核腹膨足腫肝木犯中痰氣凝滯夏枯草三牡蠣兩澤瀉兩茯苓兩半夏兩

厚樸兩橘紅兩神龜兩生香附一兩水磨汁泛丸

某^三氣鬱痰核夏枯草生香附丹皮山梔連翹鬱金赤芍橘紅

王^三脈左數右長頸項結癰時生地三丹皮兩犀角兩生夏枯草兩生鉤藤兩

黑山梔兩土貝母兩生薄荷五

陳^三躁急善怒氣火結癰燥筋為痛熱鬱化風氣阻痺塞則腹鳴脘脹苟非開懷歡暢不能向安

土貝母山梔瓜蒌皮鬱金白芥子海藻夏枯草昆布

沈^三肝氣鬱遏宿痞乳癰川棟子夏枯草薄荷梗丹皮黑山梔瓜蒌實青橘葉香附汁

劉^三乳房為少陽脈絡經行之所此經血氣皆少由情懷失暢而氣血鬱痺有形而痛當治在絡恐年歲日加竟成

沈^三癰非癰腫之症乳岩之北也以脈不浮數在寒熱辨之柴胡之方夏枯草歸身白芍川貝茯苓甘草

某^三乳房結核是少陽之結此經絡氣血皆薄攻之非易恐虛育有年釀為瘍症耳

青蒿

香附

橘葉

青荷葉

丹皮

澤蘭

鬱金

當歸鬚

流注

孫因頃忽失血以來致頸項左右筋腫痛連背部此屬鬱傷氣血經脈流行失司已經百日不痊竟有流注潰膿延綿之憂治在少陽陽明小生香夏枯草鮮菊葉薄荷梗黑山梔鉤藤丹皮鬱金

暑瘍

陳脈左數實血路有熱暑風溼氣外加遂發疹塊壅腫搔癢是屬暑瘍杏仁連翹滑石寒水石銀花

程瘍毒熱症與參芪不效即當清解為是消導亦是未合今者身熱正晡神識欲昏便溇潮亦煩渴是暑氣攻入內侵脾胃有煙厥之變昨用宣肺解毒雖與暑邪無益然亦無害若加黃芪又屬相反大凡熱氣蒙閉清竅都令神昏當以牛黃清心丸清痰氣之阻使其竅開況暑門中大是有法與解毒勿悖矣

季初病溼熱在經久則痰熱入絡膿瘍日久多未已漸至筋骨熱痛金匱云經熱則痺絡熱則癢數年宿病勿事連

攻犀角連翹心元參丹參野赤豆皮細生地薑黃桑枝午服夜服瘥瘳

某三瘡瘍服涼藥陽傷氣阻脫悶不運腹膨最怕瘍毒內閉急宜通陽厚樸廣皮薑皮茯苓皮連皮杏仁

某服瘍科寒疑之藥以致氣冲作脹喘急不卧無非濁陰上攻議求復丹桂枝木澤瀉大腹皮

顧五脈微小潰瘍半月餘腫未消膿水清稀浮腫汗出嘔惡惡食此胃陽垂敗癰毒內攻欲脫太陽失煦則陰液不承元氣散則毒愈瀰漫清解苦寒究竟斷伐生陽議甘溫胃受培植其本冀陷者復振余非瘍醫按色脈以推其

理耳加桂理中湯非瘍科方大詳

桃根潰瘍久不愈氣血耗盡中宮營液枯涸氣不旋轉得湯飲則度涎上湧勢如噴瀉況久恙若是藥餌難挽勉擬

方人參不咸炒參冬代赭石化橘紅

胡納食主胃運化主脾癰瘍痛潰臥床不得舒展臟腑氣機呆鈍何疑外科守定成方茂術歸地不能補托氣血

反難滯於裏出納之權交失且是症乃水穀溼氣下垂而致結於足厥陰手陽明之界若溼熱不為盡驅藉補托

以冀生機養賊貽害焉能濟事金石斛錢槐米半錢金銀花錢三茯苓錢晚蠶沙錢寒水石錢

徐營傷心辣納食無味此傷痛太虛當調其中人參歸身炒白芍木瓜熟朮廣皮茯神炙草

某膿血去多痛猶未愈胃傷不嗜穀口無味左關尺細弱無力正虛之著據理進藥仍宜補托

此論極正也方不長以此非

瘡瘍包圍
以當大補
等血藥消
毒清火刀

瘡瘍

肝癰

腸癰

痔

人參 熟地 玉竹 柏子仁 歸身 丹參 茯神 棗仁 遠志
某 瘡潰膿血去多元真大耗脈無力不嗜食惡心中州不振寐則驚惕神不守也以養營法
人參 熟地 廣皮 茯神 炙草 歸身 白芍 五味 棗仁

某 瘡瘍損食身熱六味湯加青蒿
曹 因瘡過進寒涼遂患腰痛牽引脊脅今晨起周身不得自如刀經脈絡脈之中氣血流行失暢久病諒非攻
逐議兩和方法 羚羊角 當歸 黃芪 白蔘 桑葉

顧 潰瘍不合成漏脂液淡去必腸絡空際內風暗動攻胃則嘔逆吞酸腹痛泄瀉不食津液不升古焦黑不渴飲
內外兼病難治之症 人參 同煎 炒烏梅肉 炒黑川椒 茯苓 生淡薑 炒廣皮 白芍 機

顧 久損漏瘡胃減腹痛議用戊己湯意 人參 茯神 白芍 炙草 炒菟絲子
王 腹痛久屈伸不得自如經脈絡脈呆鈍氣痺血瘀鬱蒸上熱旬日頻頻大便必有血下復喘促煩燥不飢不食並
無寒熱汗出全是錮結在裏欲作內癰之象部位臍左之上內應于肝癰者壅也血結必入於絡吐痰口氣皆臭

內癰已見一斑矣 此是腸癰 炒桃仁 新絳 降香末 野鬱金汁 紫苑 冬瓜子 金銀花
某 臍旁紫黑先厥後熱小腹痛如刀割二便皆澀兩足筋痠有腸癰之慮 老韭白 腸癰 當歸 桑葉 小茴香

某 古焦黃小腹堅滿小便不利兩足皆痠溼熱結聚六腑不通有腸癰之慮 川棟子 小茴 通草 青蒿 黑山柈

某 壯熱旬日周身筋脈牽掣少腹堅硬小便淋瀝忽冷忽熱欲釀膿血刀腸癰為病倣孫真人壯丹皮大黃湯主之
戴 痔瘡下血溼熱居多今色衰微顯是虛寒無速效法則當補脾胃因痔瘡猶痛腫勢尚存佐以淡滲通腑

生於木

生兔絲粉

生髮牙末

生白蠟

外症本有專科先生並非瘍醫然觀其憑理立方已勝專科什伯矣何以惜其案無多法亦未備余不敏速大
凡瘍症雖發於表而病根則在於裏能明陰陽虛實寒熱經絡俞穴大症化小小症化無善於消散者此為上
工其次能審明五善七惡循理用藥其刀鍼砭割手法靈活敷貼薰洗悉遵古方雖潰易斂此為中工更有不
察症之陰陽虛實及因鬱則營衛不和致氣血凝滯釀成瘍症但知概用苦寒攻逐名為清火消毒實在敗胃

經血

後期
傷寒
脈虛

肝犯

肝脾

賊生。逆至胃氣一敗。則變症蜂起矣。人有藉稱以毒攻毒秘方。輒敗毒藥。僞就丹丸。隨症亂投。希冀取效。於目前。不顧貽禍於後日。及問其經絡部位。症之順逆。概屬茫然。此殆下工之不如也。至於外治之法。瘍科尤當究心。若其人好學深思。博聞廣記。隨在留心。一有所聞。即筆之於書。更能廣博醫籍。搜採古法。海上實有單方家。傳宣無神。秘其所製數貼丹膏。俱臨症。歷試百驗。能隨手應效者。即上工過之。亦當為之遜一籌矣。華玉堂

調經

張二經先期色變。腐膜刺痛無定所。晨泄不爽利。從來不生青。由情懷少歡。怏多愁悶。鬱則周行之氣血不通。而脈

絡間亦致間斷。當以通劑。川芎當歸肉桂。此則有火。生艾小茴。有香附。此

桃二久數背寒。晨汗。右臥咳甚。經事日遲。脈和數而虛。設減不欲食。此情志鬱傷。延成損損。此症非清寒肺藥所宜

黃芪 桂枝 白芍 炙草 南棗 飴糖

肺為氣出入之道。內有所傷。五臟之邪。上逆於肺。則咳嗽。此則久嗽背寒。晨汗。全是肺氣受傷。而經事日遲。不

但氣血不流行。血枯肝閉。可想而知。脈數虛火也。虛則不可以清寒。況設減不欲食。中氣之饒。甚可復以苦

寒損胃乎。與黃芪建中。損其肺者益其氣。而桂枝白芍。非斂陰和血之妙品乎。

秦二氣衝心痛。嘔涎。氣墜少腹為滿。經來後期。其色或淡或紫。病在衝脈。從厥陰陽明兩治。

此是血枯之病。川連 小茴 川棟子 歸尾 炒半夏 茯苓 桂枝 橘紅

華三鬱傷肝脾。是因懷抱不暢。致氣血不和。逍遙散減白朮。加山查香附。不欲其守中。務在宣通氣血耳。今經來日

遲。鬱痺宜通。而氣弱不主統血。況春深泄氣之候。必佐益氣之屬。方為合法。歸脾湯

又向有鬱傷肝脾。用逍遙散歸脾湯甚合。今因動怒。少腹氣衝。過胃上膈。咽喉腫痺。四肢逆冷。遂令昏迷。此皆肝

木橫逆。甚則為厥。夫肝臟相火內寄。病來迅速。皆動極之徵。為肝用太過。宜制其用。前此攻伐守補。不可用矣。

安胃理中丸去黃柏細辛。柴胡 灼白芍 黃芩 鬱金 香附 茯苓 蘇梗 神鉅

婦人全以血為主治血為事
處處用藥胡而近日自附天土
天土附身不用藥胡
豈非夢境

此理明詞達

血熱 腹痛 奇脈 虛寒

肝腎 虛寒 衝脈 肝陰

肝腎 奇脈 陰虛

又諸恙未減腹但痛不墜 逍遙散白朮甘草加鬱金香附神麴

許八經閉寒熱便澀腹痛 加味道遙散去山梔

某血虛內熱經不至 加味道遙散去朮

某經遲腹痛風疹格血不貫久鬱成熱法當通利 京隔去芒硝加丹皮赤芍

孫九奇脈下損經遲腹痛先用當歸建中湯續商八脈治法 歸建中湯

又久嗽遇勞寒熱 歸芪建中去薑

謝三能食不運腹泄經事愆期少腹中大乾涸而痛下焦麻痺衝心嘔逆腹鳴心辣八脈奇經交病

人參 茯苓 艾葉 製香附 淡從蓉 淡骨脂
王三脈右緩左澀經水色淡後期嘔吐痰水食物畢個三載餘不孕此久鬱凝痰滯氣務宜宣通從陽明厥陰立方

半夏 廣皮 茯苓 厚朴 芽朮 淡吳萸 小香附 山查肉 薑汁法凡

又三月中用年溫膏方度察自下胸次寬嘔逆獲今喜暖食惡寒經遲至五十餘日來必色淡且少議用溫養

街任栽培生氣方法 八珍去朮草地加小茴肉桂斷艾香附紫石英河車膠丸

朱二經水一月兩至或幾月不來五年來並不孕育下焦肢體常冷 是衝任脈損無有貯蓄煖益腎肝主之

人參 河車膠 熟地 砂仁製 歸身 白芍 川芎 香附

程七三十年不孕育其中幻病非一病人述經期遲至來期預先三日周身筋骨脈絡牽掣痠楚不得舒展凡女人

月水諸絡之血必壅集血海而下血海者即衝脈也男子藏精女子繫胞不孕經不調衝脈病也腹為陰陰虛生

熱肢背為陽陽虛生寒究竟全是產後不復之虛損感見病治病之候有終身不孕淹淹之累肝血陰虛木火內

寄古人溫養下焦必左涼肝堅陰勿執經後期為氣滯亂投破氣剛藥劫陰

朱經云陽維為病苦寒熱腰上平水雪甚少冬失其藏春半湖濕地氣汁池以肝腎血液久虧之質春生力淺入
脈隸于肝腎一身綱維云衛任可也八脈之束固之司陰弱內熱陽微外寒矣脊脊常痛經事愆期血海漸涸久

此藥能治一切虛損之症，如氣血兩虧、精神不振、腰酸背痛、頭暈目眩、失眠健忘、食慾不振、消化不良、婦女經水不調、赤白帶下、產後虛弱、小兒疳積、驚風、咳嗽、痰多、哮喘、肺癆、瘰癧、癰疽、疔瘡、無名腫毒、一切瘡毒、無不神效。此藥乃選用上等名貴藥材，遵古法炮製，功效顯著，誠為補虛之聖藥也。

陰虛 痛經 鬱血 帶下

延虛怯情景已露，方道遙散。固女科聖藥，大意重在肝脾二經。因鬱致損，木土交傷，氣血痺阻，和氣血之中，佐柴胡微升，以引少陽生氣。上中二焦之鬱勃，可使條暢。今則入暮病劇，天曉安然，顯是肝腎至陰損傷，八脈不為約束，故熱無汗至陰深遠。古人謂陰病不得有汗也。當宗仲景甘藥之例，勿取氣平助陽可矣。

炙甘草此方 阿膠 細生地 生白芍 麥冬 牡蠣 無汗不得用此

某陰虧內熱，經事愆期。雄烏骨雞 小生地 阿膠 白芍 枸杞 天冬 茯苓 羌蔚子 女貞子

桂枝 右十味用青蒿汁重便，醱酒熬膏，加蜜丸。小生地 丹皮 知母 花粉 生龍甲 澤蘭

張三寒熱間日，經來腹痛。宜再清寒熱之藥，古人凡見表症未有下先治其表者。小生地 丹皮 知母 花粉 生龍甲 澤蘭

某二先腹痛而後經至，氣滯為多。晨泄腹鳴，亦脾胃之病，與下焦凝泄則異。

川芎 當歸 香附 煨廣木香 查肉 茯苓

某六寒熱無汗，經先腹痛，喉中燥癢，咳逆，食物不思。此鬱傷氣血，八脈主病。姑先與澤蘭湯。

歸身 澤蘭 丹參 白芍 柏子仁 茯苓 此方無著

周以室女經水不調，先後非一，來期必先腹痛，較之平日為重。飲食大減，始於初夏，入秋下焦常冷，腹鳴忽瀉，忽結。

究脈察色，是居室易於鬱怒，肝氣偏橫，胃先受戕，而奇經衝任，踰維脈皆肝胃屬。結脈不循序流行，氣血日加阻。

痺失治，以結癥聚，症瘕之累。南山查 生香附 延胡 當歸 青皮 三棱 蓬朮 牛膝 川棟子 蔥白汁丸

顧經來筋掣腹痛，常有心痛，乾嘔，此肝氣厥逆，衝任皆病。務在宣通氣血，以調經溫燥，忌用自可得效。

川棟子 丹皮 炒查錢 胡連 延胡 澤蘭 歸身 生白芍 錢

又柏子仁丸 此衝任脈有寒 川芎 當歸 香附 小茴 烏藥 茯苓 紅棗

費鬱傷絡，脈痛經。此衝任脈有寒 川芎 當歸 香附 小茴 烏藥 茯苓 紅棗

經水紫黑，來時嘈雜，脈絡收引而痛，經過帶下不斷，形瘦日減，脈來右大左弱，上部火升，下焦冷徹，骨中陰陽。

乖違焉得孕育。閱醫都以補血膏劑，宜乎鮮效。議通陽攝陰法。宜用溫經法。當歸 柏子仁 炒山查

內經用此 鮑魚 生地 淡從蓉 天冬 當歸 柏子仁 炒山查

先補白機
把樣查機
淡菜五兩
本單及方
書所要用
道收用不
道此醫
道之一藥

補臨證指南醫案

卷六

牛膝

茯苓

紅棗新艾湯法丸

朱

脈數右肩痛痿經不調經來氣攻觸皆性躁氣分有熱

李

酸入裏氣血呆鈍痛自心胸脹及少腹音經行三日今四日猶未已為凝滯所致痛脹何疑讀內經通意以

王

苦辛泄降胸脫脹悶已舒此收血皆肝膽氣火上逆必經來可安南山楂桃仁黑山枕降香末老薑白汁

朱

當節令呵欠煩倦秋深進食微有惡心病起至今月事不來夫衝任血海皆屬陽明主司見症胃弱此陰柔臟

滯

當停以理胃陽為務人參半夏麴廣皮白茯苓生益智仁煨薑見寒症方可用

某

脈數形疲咳經閉半年已經食減便溏浮腫無清收通經之理扶持中土望其加穀四君子湯飲者不宜

某

六三經閉兩月脫痺嘔惡此氣室不宣胃陽凝鈍使然當用和中為主半夏麴老蘇梗茯苓廣皮川斛

某

夏令寒熱經阻少腹痛脹血結洞瀉不爽乃內傷氣血不和兼有時令濕邪

茯苓皮

大腹皮生益智厚朴錢達義虎分青皮子五分炒研煎清湯送

又

服五劑後氣已略平葱白丸用生新艾分茯苓皮大腹皮青皮小香附延胡炒山查炒砂仁

某

脈數經閉腹脹足腫此為水病名為血分茯苓皮大腹皮青皮小香附延胡炒山查炒砂仁

顧

經停四月腹滿尻脾足肢盡腫食納脹悶不化大便溏瀉不實女料認為胎氣恐未必然方書謂先經斷而後

腫脹者治者血分

失血是病名生白朮厚朴大腹皮羌葶子椒目小黑糯米皮

傳

大凡痞滿在氣燥實在血腹脹經水仍來大便微澀固是氣分病也下之暫愈氣得泄也繼而腹脹經水不來

何

氣與血俱病也病非輕渺議中滿分消方法生於朮猪苓澤瀉椒目雞內金青皮汁厚朴

鄒

十腰已下腫經閉四月腹滿瀉不爽議開太陽導其氣阻水濕牡蠣澤瀉猪苓生白朮防己椒目

王

三居經三月痞悶腹脹無性脈發現詢知勞碌致病必屬脾胃陽傷中氣愈餒衝脈之血貽注洵有諸矣

虛氣

虛血

氣滯

腹脹

不運

陽虛

脾胃

經閉

食酸

氣分