

救迷良方
太乙神鍼
平辨脈法歌括
本草經百種錄
食物秘書

增輯
陳候園醫書七十種

上海廣益書局
印行

廿五

救迷良方序

奇浦何氏世精軒岐之術著作甚多此救迷良方乃書田翁晚年所作治煙癮方也侯官林君書嘗刻於楚省再刻於粵東而此間反剽傳本翁哲嗣鴻舫長治以昧予爰並刊之道光三十年庚戌六月金山錢培名附識世人未吸鴉片時亦能說人誠人及至臨場染指則名多方解說其入迷之故有四或以應酬為趨時或白以喫為便宜或借為房中之藥或信為却病之方自謂必不成癮乃始而掩飾繼而回護終而沉酣向之說人誠人者未幾而與之俱化矣此由時勢使然非言語所能勸誠雖百萬廣長古亦無能為役多見其不知量也此刻救迷良方為直龍悔禍者聊備一籌其意即有良約豈能強不欲醫者而使之服況徒方手予之嘵嘵不置惟恐他日一時不謹便導我先路者反唇相譏故書此以自警鴻舫屬校因書以歸之

道光庚戌七月之望南滙張文虎嘯山識

救迷良方

青浦何其偉書因氏輯

右軍有言死生亦大矣豈不痛哉蓋痛夫有生之難而致死之甚易也知其難而愛之保之尚不免疾厄之夭折況明導以速死之路而甘心蹈之至喪身斬嗣而弗顧不痛之尤痛哉頃者阿片之流毒徧海內矣嗜之而死雖億兆人莫足恤然豈無將死未死忽幡然悔懼求延殘息於頃刻者是不可不有以蘇之我欲生即生良方具在焉若朝既欲生夕又忘死一念為人而一念為鬼則亦未如之何也已

道光十三年癸巳季春月望日閩中大君子命竹簫山人書於蘇撫節署手政堂之西廡

鵲丹又名長生丹取南瓜根藤花葉及瓜滌淨搗爛絞汁服之風癰盡去未結疔者更佳雖吞生煙服之亦愈按本草南瓜甘

溫無毒補中益氣又截其藤有汁極清如露西洋人以治吞生鴉片煙者卽此故秘其方詭也則亦可以治癮矣 南

於初夏種子五月藤蔓開花六月結瓜七月以後瓜熟藤枯不能濟緩急之需得心救苦難者於盛夏時將瓜藤花葉取

而搗汁置瓮中膏藏待用可也 沿黨參一兩 綿黃耆一兩 粉甘草五錢 熟地黃二兩 當歸身酒洗一兩 升麻

蜜三錢
野白木一石米泔水浸透蜜水蜜
上肉桂五錢去皮鉗末
金櫻子六錢去毛
白芍藥水炒一兩
柴胡三錢
當粟殼八錢
廣陳橘皮五錢

五味子錢五 廣木香錢五 右為細末煙灰五錢煉蜜為丸如桐子大硃砂為衣每服三錢開水下 此藥為救人身家性

命起見於煙癮未來之前服三錢每次遞減二分服之九服可以斷癮

戒鴉片煙第一真驗良方序

今世之喪家敗德者稱挾邪擣蒲戲而止矣孰知煙之為害更有甚於此二者夫挾邪擣蒲而不悟禍斯及矣設一悟

而卒然去之固自易易若鴉片之為害即使痛深悔悟亦必有不可得而去者而其欲去之心即遷善之機是宜為之設

去補救然歷究古方無解鴉片煙毒之藥鄙疑有是病即有是藥有是藥即有剋制之物爰據醫經審求治理放諸葯性

參之古去編輯成方以之戒絕煙癮頗有試驗用時刻方傳送渾中毒者熏煙癮如激蕩則某之厚望也夫

本云杭州汪翥庵著

引論

下通肺心肝腎吸則氣因之而下墜呼則氣出而上越呼吸之間脾居中主受納穀氣以榮手血氣而烟之入也則由氣管呼吸往來積垢於五臟之中與受納飲食之腸胃食管截然兩開夫氣管為清虛之府本不能容受纖毫微末故雖顯粒滴水誤入其中即為咳逆必出之而後快煙乃有氣無形之物隨呼吸而漸積五臟之內而鴉片其味滿故滯其性熱故毒其色青黑故入肝腎其臭香故走而不守一吸而能入於內筋骨髓之間一呼而出又能達於皮毛髮膚之妙故一入五臟則徧體內外上下無處不到觀有引之人食才下咽則自頂至踵其舒暢有不可言語形容者此其明驗也始則由漸而常繼則由常而熟及其熟也臟腑賴煙而後快精神賴煙而後爽耳目手足賴煙而後安一旦無煙浸潤其間則腎先苦之腎苦則呵欠頻頻肝困因之肝困則連連涕淚肺亦生痰矣蓋脾主信脾之感也如此則五臟交相困矣五臟交困衆體無所秉令輕則一身痿軟重則諸痰蜂起則又何病之不作哉嗟呼此之所謂引也既知所以起引之由故知所以用約之法其法變食為吞在引之輕者及體之壯者即無法無方亦不難戒今專為受引輕重體氣弱者立法

醫論

受引之病前論詳矣治引之術以煙灰為君附子為用取其走而不守能通行十二經也佐以柴胡之左旋佐以升麻之右旋沉香直達下焦四者相合直通上下表裏頃刻而能過於周身矣盡食煙之人中氣鮮有不傷者中氣傷則穀食不化身體困乏而軟弱故用參耆以補肺氣白朮以補脾氣陳皮木香以導取諸氣此皆所以固中州之根本也根本既固再有當歸連相以涼血而滋衰弱之陰火且連相能殺附子之毒以生一源之水而制二相之火使無夢遺等症至氣血兩虛之人難保無眩暈然暈非天麻不止故加天麻用甘草者不但可補中並可以益血而協和諸藥也方中和氣補脾土雖寒熱並用而藥味不雜亦不相持製方之義然也況此方斷癮之善有妙不可言者以諸藥和吞於胃行氣於五臟旁通於經絡俄頃之間即能透徹頂踵淡醴綸肌無處不到較之改煙過引尤為快暢諸病不作煙癮不來其中有沉香木香芳馥之氣升降於其間藉附子氤氳之氣周旋於臟腑經絡之類曰習積慣旬日之後臟氣與煙拒格不但不思次吸即聞之亦有苦味若勉強三五筒未有不作嘔吐者至是聞臭食苦嘔吐不納雖下愚亦知可以毅然悔悟而返矣更有補中益氣固精養血之藥每日去有煙灰之凡一粒以減其引加補正丸二粒以補其正使正氣日足邪氣自無所容縱至重之引至弱之體依法治之未嘗不可猝然一悟而去之易易也雖然癮又有說焉如服食有效可已而不已

可戒而不戒猶戀戀於燈前枕畔則煙癮易治心癮難醫甘成附骨之疽死而後已雖有換骨仙丹亦未如之何也矣可不戒哉願天下有志者一經洗清腸胃視鴉片如不共戴天之仇庶不負斯方之運矣

忌酸丸即斷名之忌酸者何因乎藥所忌也何忌乎酸味酸味與烟性相反也故本草綱目諸約皆有所忌在鴉片者與酸物齊下可使斷腸此方以煙灰為君其性尚存切忌酸物故名曰忌酸使人顧名思義不致有所觸犯云爾 洋參

生用錢 白木二錢 當歸二錢 黃柏四錢 黃連四錢 炙草三錢 陳皮二錢 天麻三錢 柴胡三錢 木香

五分錢 升麻五分 黃耆三錢 沉香五分 附子七分 生

右藥共為細末加鴉片灰七錢入石膏杵春如泥麪糊為丸如桐子大秤準分兩若干如有癮一分計算吞丸內有煙

灰一釐二毫為度若有癮一錢則吞丸有煙灰一分二釐為度必以飯前吞下否則不驗初吞一二日或加吞少許令

微有醉意則便不思吸矣吞定三五日後每日按減一粒加入補正丸二粒換次減却純服補正丸旬日半月煙引淨

盡腸胃為清虛之府矣補正丸方開後 洋參五錢 白木三錢 黃耆三錢 炙草三錢 柴胡半錢 升麻三錢 黃連

錢四 黃柏四錢 當歸三錢 沉香二錢 煨天麻錢 右藥共為細末麪和為丸如桐子大附忌酸丸加減法夢遺者加龍骨

牡蠣粉紅白痢者加黃芩諸痛者加重木香再加延胡索咳嗽者加紫苑欬久花枇杷葉毛法欬咳甚者加杏仁阿膠

熱痰者加川貝母枯礬錢 寒痰者加半夏南星 下焦火旺陽舉而壯者加重黃柏知母 目眩者加丹皮白菊花

小便短者加豬苓澤瀉 水瀉者加茯苓車前子 氣短促而腎不納者加破故紙蛤蚧尾 以上所加藥品並為丸

或煎湯作引送下亦可 忌酸丸方如身體弱者可去洋參換沙參並去炙草以防黨參代之亦可無頭暈者不必用

天麻身壯引輕者只用忌酸丸不須補正丸按日換次減却亦無不可

戒鴉片烟方

此方不拘年分之久長大引之已成如能照法戒定並無難過毛病由來秘而不傳茲因廣南洋行醉飲鬼子謀得此方

試驗屢效 沉香八錢 肉桂錢 川貝母錢 洋參錢 炮姜五錢 白豆蔻錢 木香八錢 陳皮錢 礞石錢 建蓮六錢

丁香六錢 半夏錢 粟殼錢 川烏六錢 如另加珍珠犀角五分其效更速 右方共為細末加用鴉片烟二錢燉化和

藥末為丸如太乾不能成丸再加飯湯少許須用硃砂為衣分丸四百粒如一分引者每日飯前兩丸重引遞加引止約

改米良方

即止服完後尚不能止須用第二料約料同惟灰煙只可加用一錢五分候引全退始止倘願再服此方可不必加只用原方約料為丸每日服之更為妥便倘尚有些微煙引未能淨盡脫除須用第三料然煙灰只可加用五分矣第世人好此者與致正讓雖見此方未必肯立志戒定此方雖妙仍屬無益煙之誤事害人不不可勝言水窮山盡病入膏肓始知此方之可貴豈不遲哉

又方二

西黨參

金櫻子

四錢

薔果殼

五錢

黃耆

懷牛膝

當歸

廣木香

杜仲

白茯苓

續斷

升麻

茯神

加紅棗

蓮心

引頭

劉加煙灰

二劑

加灰

三劑

劉加灰

五劑

加灰

每日常起空

心煎服

次煎晚間服

丁香

檀香

枯礬

伏鹽

白芷

蒼朮

草烏

白豆蔻

槐寔

橘紅

杜仲

古月

長治案古月即胡

白朮

五味

川烏

右共為細末

每藥一兩對鴉片煙灰四分

將米湯化開

然後將藥末冲下

煉為丸如黃豆大

用硃砂為衣每

然後將藥末冲下

煉為丸如黃豆大

用硃砂為衣每

一分引服二丸

或五日或十日減一丸

亦可此方斷引最靈

新得戒烟良方

此方自上海傳來

川貝母

去心

鴉片灰

四錢

右四味以清水十餘碗入鍋

煎至極濃為

生甘草

赤砂糖

川貝母

去心

鴉片灰

四錢

右四味以清水十餘碗入鍋

煎至極濃為

度

將滓滲出取汁置瓷器內

攪靜室無人行走之處

每朝以開水溫燉服一酒盃

睡時再服一盃無有不效即不能

絕仍照前方煎服無有不癒者

絕仍照前方煎服無有不癒者

絕仍照前方煎服無有不癒者

絕仍照前方煎服無有不癒者

絕仍照前方煎服無有不癒者

絕仍照前方煎服無有不癒者

絕仍照前方煎服無有不癒者

絕仍照前方煎服無有不癒者

絕仍照前方煎服無有不癒者

絕仍照前方煎服無有不癒者

絕仍照前方煎服無有不癒者

絕仍照前方煎服無有不癒者

卷中所錄諸方以鴉片為第一次則新得良方藥僅四味亦甚簡易餘方並存以備米用

卷中所錄諸方以鴉片為第一次則新得良方藥僅四味亦甚簡易餘方並存以備米用

卷中所錄諸方以鴉片為第一次則新得良方藥僅四味亦甚簡易餘方並存以備米用

卷中所錄諸方以鴉片為第一次則新得良方藥僅四味亦甚簡易餘方並存以備米用

卷中所錄諸方以鴉片為第一次則新得良方藥僅四味亦甚簡易餘方並存以備米用

卷中所錄諸方以鴉片為第一次則新得良方藥僅四味亦甚簡易餘方並存以備米用

卷中所錄諸方以鴉片為第一次則新得良方藥僅四味亦甚簡易餘方並存以備米用

卷中所錄諸方以鴉片為第一次則新得良方藥僅四味亦甚簡易餘方並存以備米用

卷中所錄諸方以鴉片為第一次則新得良方藥僅四味亦甚簡易餘方並存以備米用

卷中所錄諸方以鴉片為第一次則新得良方藥僅四味亦甚簡易餘方並存以備米用

卷中所錄諸方以鴉片為第一次則新得良方藥僅四味亦甚簡易餘方並存以備米用

道光甲辰重九訪

鴻舫何兄於對門彭氏寓齋談次出其

先尊公書田先生所輯救迷良方喜得未曾有爰假歸

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

錄副方論言金玉真大醫王之黃昏湯也惜溺此者食而甘之何小浮山人潘曾沂識

太乙神鍼方

艾絨西三

硫黃錢二

真麝乳香

沒藥

松香

桂枝

杜仲

枳殼

皂角

細辛

川芎

獨活

川山甲

雄黃

白芷

全蝎各一

右為末稱準分兩和勻預將大紙裁定將藥鋪于紙上厚分許層紙層藥凡三層捲為大指粗細杵令極堅以桑皮紙厚糊六七層再以雞蛋清通刷外層務須陰乾勿令洩氣

用鍼法

一用鍼先審是何病症取何穴道用筆塗記其穴以紅布七層安于穴上候鍼

一將鍼向燈上燒透對正穴道放於紅布上候藥氣溫熱漸退肌腠直入病裏便覺氣血清爽應效之速難以言傳若太熱將鍼畧提起俟熱定再鍼以七記數少則一七多則七七

一燒鍼務令著透輕重浮沉按須得法鍼火若滅再燒之

一用過藥鍼以極乾竹筒封藏勿令受潮洩氣便可復用

一宜天氣晴和明瞭淨几密室無風之處敬謹焚香如法用鍼登時奏效更須擇吉若遇人神所在之日不宜鍼灸切須忌之

一鍼後靜臥片時使藥氣周流暢達於臟腑脉絡之間然後起飲醇酒數盃借酒力以行藥氣微醺為度切忌冒風一鍼後務宜謹攝起居保養元氣禁止房事樽節飲食

逐日人神所在不宜鍼灸


初一在足 初二在足 初三在足 初四在足 初五在口 初六在手 初七在內 初八在腕 初九在足 初十在足 十一在足

十二在足 十三在足 十四在足 十五在足 十六在足 十七在足 十八在足 十九在足 二十在足 廿一在足 廿二在足


廿三在足 廿四在足 廿五在足 廿六在足 廿七在足 廿八在足 廿九在足 三十在足

穴道取寸法以男左女右手中指第二節屈指兩紋尖相去為一寸取稿草心或薄篋片量之

穴道圖仰面



穴道圖合面



凡中風頭風風癰角弓反張忘前失後氣絕脫肛目淚耳聾鍼百會穴

從鼻直上入髮際五寸旋毛陷中可容指處醫宗金鑑云直上兩耳尖頂陷中

凡腦冷鼻塞腦漏汗不出目睛痛鍼上星穴

從髮際直上髮寸或從眉心上四寸

凡頭疼目眩出淚流涕鍼神庭穴

從鼻直上入髮際五分即眉心上三寸五分

凡喉嗆喉風哮喘氣噎肺癰咯血喉中有聲鍼天突穴

結喉下二寸陷中

凡心腹疼痛驚悸疾伏梁氣蠱狀如覆盆黃疸積塊熱病腹鳴飲食不化虛勞時症血疾風癰等症鍼上腕穴

腕上五寸

凡翻胃吐食心下脹滿狀如伏梁傷寒飲水過多腹脹氣喘寒癖飲食不進赤白痢面色痿黃五隔鍼中腕穴

腕上四寸

凡肚腹堅硬症瘕氣塊小便赤澀身體羸瘦翻胃氣脹不嗜食飲食不化鍼下腕穴

腕上二寸

凡男子陽事久憊婦人經水不調及滯氣成塊狀若覆盆腹脹氣喘心膈下冷痛面赤臟氣虛憊真氣不足一切氣疾不

化肌瘦四肢無力勞脈七疝腹脹結塊脫陽陰症囊縮婦人臨行房羸瘦崩中月事不調產後惡露不止繞臍絞痛悶

著腰痛小兒遺尿鍼氣海穴

臍下一寸五分

凡男子遺精白濁臍下冷痛小便痛澀遺精血婦人赤白帶下經水不調胞門閉塞胎漏下血產後惡露不止鍼關元

凡男子奔豚搶心遺精失精五淋七疝小便赤澀婦人經水不調不受胎孕冷氣積聚冲心臍下結塊失精無子胎衣不下惡露不行血結成塊子門腫痛小腹寒痛陰痒痛臨經行房瘦弱鍼中極穴

凡目痛內障赤白翳腫膈下痛鍼臨池穴

凡兩額暴痛口眼歪邪牙關緊閉失音不語鍼客主人穴

凡傷寒結胸咳嗽吐膿肚腹膨脹霍亂吐瀉婦人熱入血室產後飲食不進鍼期門穴

凡夾臍痛冲心腹痛赤白痢疾泄瀉飲食不化男子一切血損婦人結血成塊鍼天樞穴

凡手臂痠痛不能攝物鍼肩髃穴

凡偏風不遂兩手拘攣捉物不得臂細無力肘內寒冷而痛傷寒餘熱不盡舉體痛癢如蟲啗皮脫癰癰瘡癰疾癰癰鍼曲池穴

凡風痺手臂不舉汗出中風小兒慢驚痰癰鍼尺澤穴

凡手臂不仁肘彎難伸偏風疼痛頸項紅腫齒痛癰癰鍼手三里穴

凡兩腿麻木左癱右瘓行步不得一切脚氣鍼風市穴

凡疝氣遺溺失精足痿不能行鍼三陰穴

凡十般水腫四肢厥逆咽喉引痛久瘧不食惡聞人聲口歪齒齬鍼內庭穴

凡白濁溺難腹脹心痛咳逆吐血煩悶短氣手足浮腫四肢厥逆而冷鍼行間穴

凡小腸疝氣小便頻數陽縮入腹陰囊偏大臍腹腫脹而痛尸厥如死脚氣紅腫行步艱難婦人血崩鍼大敦穴

凡耳聾虛鳴脫頤口喎頰腫牙痛鍼風池穴

凡五勞七傷偏身發熱諸般瘧疾鍼大椎穴

凡五勞七傷偏身發熱諸般瘧疾鍼大椎穴

凡脊脊強痛效吐不止癲狂謔語癰發熱鐵身柱穴

大椎穴下三節骨下開按其穴中

凡上氣喘不得臥鐵靈臺穴

第六節骨下安

凡腰腹引痛頭疼如破裏急癰瘕鐵命門穴

十四節骨下安中

凡腰膝脊痛不能俯仰足痺不仁婦人月水枯閉鐵腰俞穴

尾尻骨節上安

凡傳尸骨蒸肺痿吐血咳嗽胸膈氣喘鐵肺俞穴

三椎骨下兩旁各開一寸五分金鑑云

凡五勞七傷諸虛百損肺痿咯血咳嗽吐痰寒熱往來四肢無力人身百病無不主之鐵膏肓穴

四椎骨下兩旁各開一寸五分金鑑云正坐曲

脊從脾骨上角按至脾骨下面其間當有四肋三間按其中一間空處是其穴也

凡血症心痛翻胃吐食自汗四肢怠惰鐵膈俞穴

七脊下各開二寸正坐取之

凡多怒躁急氣促效逆目眩黃疸鐵肝俞穴

八脊下各開二寸

凡骨蒸勞熱舌乾咽痛頭疼目黃食不下乾嘔并諸血症鐵膽俞穴

第九脊下金鑑云各俞皆去脊中二寸故不從寸半之說

凡諸般黃疸四肢不收痺痛脇疼久患泄痢翻胃吐食膈氣積聚痰瘰寒熱鐵脾俞穴

十脊骨下各開二寸

凡胃寒腹脹腸鳴翻胃嘔吐小兒羸瘦鐵胃俞穴

十一脊骨下各開二寸

凡腎經虛憊腰痛如折便血出精陰痛身熱耳聾目眩膝攣足寒鐵腎俞穴

十三脊下各開二寸亦有金鑑云與脾平

凡五痔腸癖兩腎尖痛泄瀉久痢陰汗濕癢腸風脫肛鐵會陽穴

尾尻骨兩旁各開二寸尻骨節上兩旁各開一寸半亦可金鑑云五分

凡狂陽煩悶驚風掣肘不得屈伸鐵腕骨穴

手外側腕起骨下陷中即小指上處

凡鼻血不止唇吻不收瘡不能言口噤偏風風疹頭痛鐵合谷穴

大指次指歧骨陷中即虎口兩又骨縫中

凡中風中痰半身不遂腰膝強直股痛相引腰脇不得轉側諸風寒濕風痺風疹等鐵環跳穴

在脾指中側跗屈上足仰下足取之足後強到處即

是大腿曰股股上曰髀髀骨之下大腿之上兩骨合縫之所曰髀髀當環跳之處也

凡五勞七傷翻胃腸鳴氣膈肚痛痞脹胸膈蓄血咳嗽稠痰膝腿酸痛足痿失展鐵足三里穴

膝下三寸行外膝尖手掌按膝頭中指尖

到處股外旁也膝蓋骨下三寸在髀骨外股兩肋肉分宛宛中平坐垂足取之在背金鑑作大筋時

以上按穴治病不可舛誤如遇週身疼痛跌蹠損傷骨節疼痛瘀血不散及癰疽發背對口疔瘡疾核癰瘰一切無名

腫毒各於患處鍼之痛者鍼至不痛不痛者鍼至痛即愈倘水陸舟車客途旅次以及窮鄉僻壤無藥之處帶備神鍼見病即鍼鍼到病除真屬快事不但保身無可積德願同志廣為傳布以濟世焉

附太乙神鍼灸法

用生姜一大片厚二分許中穿數小孔平放應針穴道之上用麪捏一小碗如酒盃大碗底亦穿數小孔將神針內藥料折出再加蘄艾絨少許捏作團置於碗內點燃平放于姜片之上傾刻之間藥氣即可透入如覺甚熱將姜片畧畧抬起停片刻即再放下看碗內藥將燃盡取起另換每次換藥三四回便可收止每日或一次或兩次不拘

太乙神針有兩種用法一將針懸起離布寸許藥氣自能隔布透入一將針寔按布上藥氣更易透入然懸起一法取效較緩寔按一法輕則布易燃重則火易滅均有微礙不如以針為灸較為妥當取效亦速今夏余右臂患麻左臂作痛數月未痊山陰唐煜軒大令以所製太乙神針授余先用懸針法痛麻雖減而未能脫然繼用寔按法若其不便因變而為灸又思灸法皆用艾作團點著置所患處若團小則藥力不濟團大則皮膚易傷故用麪碗隔姜灸之收束艾火不使零星散亂而藥氣溫暖半刻許已直透病真頓覺肌腠筋絡之間氣血暢達余每日灸一次凡三日而所患若失竊謂此法可為太乙神針之助用敢詳疏其法刊附書後公諸世人

咸豐六年十二月朔滄洲葉圭書識于濟東道署

同治甲子春奉檄赴漢督銷淮鹽偶因渡江閃腰痛楚不可行坐蓐好王省三司馬授此針法試效如神原刻穴圖病原間有舛誤因畧加考證重授梓人以廣其傳委水張文瀾識

平辨脈法歌括

壁山黃 鈺寶臣編 男道階 道真 校字

南雅堂醫書外集

平脈法

脈有三部陰陽流通呼吸出入上下於中秋浮冬沉春弦夏洪察色觀脈大小不同三部之分尺寸及關營衛流行不失
衡證腎沉心洪肺浮肝弦此自經常不作病占倘有參差虛是見焉變化相乘陰陽相子風則浮虛寒則牢堅沉潛水蓄
支飲急弦動則為痛數則熱煩設有不應如變所緣三部不同病各異端太過可怪不及亦然審察表裏三焦別焉來疾
去遲內虛外寒來潮去大病裏可必來大去小在表無疑上潮小者其汗自越下潮小者厥病關格頭無汗生有汗則劇
衛盛名高營盛名章高童相搏其名曰綱衛弱曰牒營弱曰單牒單相搏名損無遺衛和曰緩營和曰遲緩則陽長遲則
陰滋遲緩相搏剛柔相宜是名曰弦色光肉肥肥人責浮瘦人責沉有若是者其病以成心肺俱浮肝腎俱沉脾主肌肉
中候可明假令下利三部脈伏尺中小見腎氣可續若見損脈必至危篤浮表沉裏數府遲藏浮大濡等和緩有象厥陰
肝木其脈微弦濡弱而長縱病亦安純弦者死肝藏傷殘倘得毛浮至秋難痊少陰心火洪大而長夏月得此雖病無傷
太陰肺金其脈毛浮得數則劇遲緩可瘳數受火尅癰腫堪憂少陰腎水沉滑如經翁奄與沉滑脈以名翁為正陽沉為
純陰陰陽和合關尺自平陽明微沉僅能飲食少陰微沉股汗陰濕脈有相乘有縱有橫水火金木乘以縱名火水木金
厥名曰橫火行乘木水行乘金是名曰逆倒施而行金水木火順名相生縱橫最重順逆猶輕乘藏乘府陰陽攸分浮數
乘府遲瀉藏陰寸口脈微曰陽不足陰往來之惡寒可下陰不足者遲脈見弱陽往來之發熱時作陽結浮數陰結沉遲
是皆實症有傷津液陽結之症身輕能食大便不通期十七日陰不能食大便反硬十四日劇早圖且慎陽浮陰弱筋急
血虛其脈沉者營氣衰微衛氣脈浮汗出如珠陽結之脈謁如車蓋如循長竿陰結之概如羹上能陽氣衰微如瀉漆絕
必亡其血細如蛛絲陽氣必微下不至關陽絕之源上不至關陰絕之愆此皆不治死于尅焉陽氣前絕陰氣後竭其人
已死身必青色陰前陽後色赤心熱脈病人安是曰行尸主卒眩仆短命有期人病脈好名曰內虛以無穀神雖困可醫
肺絕之症汗出不流毛髮自潤氣喘不休脈浮而洪身汗如油液亡氣脫喘而不休水漿不下胃氣尤壞身不仁營衛
已敗乍靜乍亂精神亦敗此皆命絕由斯可斷心絕之症陰盡陽留體如烟熏直視搖頭肝絕之症唇吻反青四肢掣習

見於脾經脾絕之症在汗發黃環唇紫黑真土已傷腎絕之證狂言失志漫便遺矢目反直視病家來請告以病情人若發熱身體痛疼師到診之病人安臥其脈沉遲絕不浮大知其已差元約可賀假云腹痛病人自坐師到診之脈浮而大沉細不形定愈元錯來請人云發熱煩極明日師到靜臥向壁脈復自和其愈可以入有詐病醫貴識破師到不驚向壁安臥三言三止脈之嚙嚙假令脈和詐言沉河當煩吐下鍼灸宜多數十有處其病乃瘥詐病詐治妙法無過持脈之時可望而知大和呻病風則言遲緩頭裏痛表強行遲坐夜短氣腰痛坐依心痛護腹如懷卵遺懼如循絲面白脫色數日不飲口乾脈滿蓋滯脈浮色乍赤白假令人病脈症相應作湯與服食頃變更吐利腹痛大異前症是名災怪失於先問吐利之作非關此藥舊時所服今乃發作故曰災怪以警先覺四診之法望聞問切上中下工於此分別自古及今語多妄說長沙心法且於平脈撮成短句以承先哲

辨脈法

陽脈浮大滑動於數陰脈沉濡微並弱陰見陽生陽見陰惡緩止曰結數止曰促結則陰盛促則陽動而中止不能自還其名曰代病必難痊動脈之源陰陽搏擊陽動汗出陰動發熱形冷惡寒三焦傷賊動脈之狀頗似數脈見於關上頭尾俱減形如豆大動搖厥厥脈浮而緊狀如弓弦按之不移是名曰弦弦而大者減與孔脈弦減為寒孔則虛厄寒虛相搏此名為芤婦人得此半產漏下男子得此失精亡血脈有弦緊浮滑濡瀦此六脈者名曰殘賊陰陽俱緊中邪可怕清邪中上濁邪中下陽中於邪頭強頸攣發熱頭痛腰痛痠痠陰中於邪必主內慄表氣微虛裏氣微急便弱妄出足膝冷逆三焦相瀦內外不通上焦拂鬱口爛斷盡中焦不治胃氣上衝脾氣不轉營衛不通衛氣前通小便黃赤熱氣所過癰腫可必盛氣逆者噎嗝咽塞寒為熱擁自下凝血陰陽俱厥脾氣孤弱五液注下下焦不關清便下重便難且數臍築痛命難全活清濁者混慎勿妄治七日微熱邪退可俟大發熱者邪氣猶至惡寒欲嘔腹痛欲利至於吐利緊去人安若脈轉遲能食自發脈浮而大浮虛大是在寸為格關候在尺關則不通格則吐逆脈浮而滑浮陽滑是陽是相搏其脈數疾衛氣失度發熱汗出此為不治證屬不足脈浮而數風熱相搏澀浙惡寒表邪始作若不發熱有隱痛處蓄積有膿飲食如故脈浮而大風虛氣強風氣相搏隱疹身痒久為痼癩世風名彭諸微亡陽諸濡亡血諸緊為寒諸弱發熱是諸脈見來寒則厥鬱昌不仁胃虛脾瀦口急不言外戰內慄驚為寒寔亦主虛冷亡汗若吐欬者欬冷胃虛下利皆令脈緊寸微天

繫多汗虛損陰盛陽亡從茲以診病人之脉微弱而瀋腎誤吐下其人亡血陽微惡寒陰微發熱夏欲覆衣裸欲冬月脉微而緩表虛裏實微則衛疎緩則胃寔穀入於胃脉道乃行水入於經其血乃成血多氣少失其常經三焦絕道名曰血崩脉微而瀋營衛不行三焦無仰體痺不仁營氣不足口噤身疼衛氣既虛惡寒又呻上焦不歸噫而作吞中焦不歸穀食內傳下焦不歸遺洩失精衛衰色黃營衰色青根葉枯槁寒慄噤噤逆吐沫上焦以明脉弱而遲血寒氣微血寒發熱氣微內飢饑不能食中滿而虛脉弱而緩中焦已虛脾氣不足胃氣有餘食卒不下吞酸而噫氣填膈上內傷飲食跌陽之脉獨取乎遲兼和緩象胃氣常治浮則傷胃數則動脾此非本病誤下所為營衛內陷其數先微因是而知脾氣不治脉反更浮和氣獨留潮熱發渴穀食難投使鞭氣噫遲緩乃瘳數脉不退惡瘡可憂跌陽浮瀋少陰如經其病在脾下利當行少陰沉滑斯為如經滑而數者屎膿已成跌陽伏瀋三焦氣寒吐逆便閉名曰關格跌陽滑緊胃寔脾強持實擊強痛還自傷如手把及坐自作瘡跌陽沉數寔熱消穀此為易治緊則病篤大而緊者當即下利脉寔病虛其症難治脉微而繫虛寒相應微緊相搏短氣之症跌陽不出身冷膚鞭脾不上下營衛俱病跌陽浮乳衛衰營傷肌肉甲錯體瘦羸危浮乳相搏宗氣衰歎皮肉脂髓四屬斷絕脉繫而浮寒與氣共浮為腹滿緊為絞痛浮緊相搏寒氣內關腸鳴而轉轉即氣動膈氣乃下趨泄而洞少陰脉伏陰腫而痛跌陽脉和少陰脉負土能制水大順以固少陰之脉弱而兼瀋弱者微煩瀋者逆厥少陰脉伏腎少精血陽氣迫促上入胸膈逆氣反聚心下血結陽氣退下陰股間熱令身不仁此為尸厥當刺期門並刺巨關辨脉之法具於此中熟讀玩味其用無窮平脉辨脉上下二篇始自仲景叔和所傳畧術要領撮成四言神而明之是在後賢

平辨脉法歌括終

