

卷十三

心臟八

心臟脉論

心虛實

心旁

脉極

脉虛實

心腹痛

胸痺

頭面風附頭眩等

十四

小腸脉論

小腸虛實

舌論

風眩

風癰

風虛驚悸

好忘

孫真人備急千金要方卷十三

長洲張璐路三衍義
南沙席世臣郢客校

心臟方凡八類

心臟脈論第一論一首

論曰心主神神者五臟專精之本也為帝王監領四方夏王七十二日位在南方離宮火也有生之來謂之精兩精相搏謂之神所以任物謂之心神者心之藏也舌者心之官故心氣通於舌舌和則能審五味矣心在竅為耳夫心者火也腎者水也水火相濟心氣通於舌舌非竅也其通於竅者寄見於耳左耳丙右耳丁循環炎宮上出脣口知味榮華於耳外主血內主五音心重十二兩中有三毛七孔盛精汁三合神名响响主藏神號五神居隨節應會故云心臟脈脈舍神在氣為吞在液為汗心氣虛則悲不已實則笑不休心氣虛則夢救火陽物得其時則夢熾灼心氣盛則夢喜笑及恐懼厥氣客於心則夢邱山烟火凡心臟象火與小腸合為腑其經手少陰與太陽為表裏其脈洪相於春王於夏夏時萬物洪盛垂枝布葉皆下垂如曲故名曰鈞心脈洪大而長洪則衛氣實實則氣無從出大則榮氣萌萌洪相薄可以發汗故名曰長長洪相得即引水漿灌漑經絡津液皮膚太陽洪大皆是母軀幸得戊己用牢根株陽氣上出汗見於頭五內乾枯胞中空虛醫反下之此為重虛脈浮有表無裏陽無所使不但危身并中其母夏脈如鈞夏脈心也南方火也萬物之所以盛長也故其氣來盛去衰故曰鈞反此者病何如而反其氣來盛去亦盛此謂太過病在外其來不盛去反盛此謂不及病在內太過則令人身熱而膚痛為浸淫不及則令人煩心上見咳唾下為氣泄心脈來累累如連珠如循琅玕曰平夏以胃氣為本心脈來喘喘連屬其中微曲曰心病心脈來前曲後居如操帶鈞曰必死真心脈至堅而搏如循薏苡子累累然色赤黑不澤毛折乃死夏胃微鈞曰平鈞多胃少曰心病但鈞無胃曰死胃而有石曰冬病石甚曰今病心臟脈脈舍神怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破胭脫肉毛色悴天死於冬手少陰氣絕則脈不

通少陰者心脈也。心者脈之合也。脈不通則血不流，血不流則髮不澤，面黑如漆，紫者血先死，壬篤癸死。

水勝火也。心死，臟浮之實如豆，麻，擊手按之益躁疾者，死。夏心火王，其脈浮大而散。一作洪曰：平反得弦

細而長者，是肝之乘心，母之歸子為虛邪。雖病易治，反得大而緩者，是脾之乘心，子之乘母為實邪。雖病

自愈，反得沉濡而滑者，是腎之乘心，水之尅火為賊邪。大逆十死不治，反得微澀而短者，是肺之乘心，金

之陵火為微邪。雖病即瘥，腎乘心必癰。左手關前寸口陰絕者，無心脈也。若心下熱，痛掌中熱，時時善

嘔口中傷爛，刺手少陽治陽，左手關前寸口陰實者，心實也。是心下有水氣，憂恚發之，刺手心主治陰。

心脈來累累如貫珠，滑利，再至曰平，三至曰離經，病四至脫精，五至死，六至命盡。手少陰脈也。心脈急

甚為瘰癧，微急為心痛，引背食不下，緩甚為狂笑，微緩為伏梁，在心下上下行，有時吐血，大甚為喉痹，微

大為心痺，引背善淚，出小甚為善噦，微小為消痺，滑甚為善渴，微滑為心疝，引臍小腹鳴，濇甚為瘡，微濇

為血溢，維厥耳鳴顫疾。心脈搏堅而長，當病舌卷不能言，其濡而散者，當病痛渴自己。渴一作聚赤脈之

至也。喘而堅，註曰有積氣在中，時害於食，名心痺，得之外疾，思慮而心虛，故邪從之。扁鵲曰：心有病則口

生瘡腐爛。心在聲為笑，在變動為憂，在志為喜，喜傷心，精氣并於心則喜，心虛則悲，悲則憂，實則笑，笑

則喜。時主夏病者，時間時甚，知其源取其腧，觀其應審其害。病先發於心者，心痛一日之肺喘咳三

日之肝脇痛，支滿五日之脾閉塞不通，身痛體重三日不已，死。冬夜半夏日中，病在心，日中慧，夜半甚

平旦靜，假令心病北行，若食豚魚得之，不者當以冬時發，得病以壬癸日也。凡心病之狀，胸內痛，脇

支滿兩脇下痛，膺背肩甲間痛，兩臂內痛，虛則胸腹大，脇下與腰背相引而痛，取其經，手少陰太陽舌下

血者，其變病刺郄中血者。心脈沉之小而緊，浮之不喘，苦心下聚氣而痛，食不下，喜咽唾，時手足熱煩

滿時忘不樂，喜太息，得之憂思。心病其色赤，心痛短氣，手掌煩熱，或啼笑罵悲，思愁慮面赤身熱，其

脈實大而數，此為可治。宜服關宜服春當刺中衝，夏刺勞宮，季夏刺大陵，皆補之。秋刺間使，冬刺曲澤，皆

瀉之。此是手心胞絡經又當灸巨闕五十壯，背第五椎壯百。邪在心則心痛，善悲時眩仆，視有餘不足而調

其輸 憂愁思慮則傷心 心傷則苦驚喜忘善怒 心中風者翕翕發熱不能起 心中飢而欲食則嘔

心中寒者其人病如噉蒜齏狀劇者心痛徹背背痛徹心如蠱注其脈浮者自吐乃愈 心傷其人勞倦

頭面赤而下重 心中痛徹背自煩發熱當臍跳手其脈弦此為心臟傷所致也 邪哭使魂魄不安者血

氣少也 血氣少者屬於心心氣虛者其人即畏合目欲眠夢遠行而精神離散魂魄妄行陰氣衰者即為

癰陽氣衰者即為狂五臟者魂魄宅舍精神之所依托也魂魄飛揚者其五臟空虛也即邪神居之神靈

所使鬼而下之脈短而微其臟不足則魂魄不安魂魄屬於肝魄屬於肺肺主津液即為涕泣出肺氣衰者

即泣出肝氣衰者魂則不安肝主善怒其聲呼 心水者其人身體腫重而少氣不得卧煩而躁其陰

大腫 真心痛手足清至節心痛甚者旦發夕死夕發旦死 心腹痛懊懷發作腫聚往來上下行痛有

休作心腹中熱善渴涎出者是蛇咬也以手聚而堅持之無令得移以大針刺之久持之蟲不動乃出針

腸中有蟲蛇咬皆不可取以小鍼 心脹者煩心短氣卧不安 凡心脈急名曰心疝小腹當有形其以

心為牡藏小腸為之使故小腹當有形 診得心積沉而扎時上下無常處病胸滿悸腹中熱面赤咽乾

療也 心病為瘥者令人心煩甚欲得清水反寒多不甚熱方見前第十卷若其人本來心性和雅而忽弊急反

於常白朮酒主之方見前第八卷或言未竟便佳以手剔腳爪此人必死禍雖未及名曰行尸此心病聲之候也

虛則補之實則瀉之不可治者明以察之 赤為心心合脈赤如雞冠者吉心主舌舌是心之餘其人火

形相比於上徵赤色廣眇兌面小頭好肩背髀腹小手足行安地疾行搖肩背肉滿有氣輕財少信多慮

見事明了好顧急心不壽暴死耐春夏不耐秋冬感而生病主手少陰寒寒則憂不能傷易

應之正赤色小理者則心小小則邪弗能傷易傷以憂粗理者則心大大則虛虛則寒寒則憂不能傷易

傷於邪無羈肝者則心高高則實實則熱熱則滿於肺中悶而善忘難開以言羈肝小短舉者則心上下

則藏外易傷於寒易恐以言羈肝長者則心堅堅則藏安守固羈肝弱以薄者則心脆脆則善病消瘴熱

中羈肝直下不舉者則心端正端正則和利難傷羈肝向一方者則心偏傾偏傾則操持不一無守司也

下云若羈肝小短薄弱而下則心下下則虛虛則傷寒病憂志內損心暴痛而好唾清涎口臭蟲齒病後唇齒若羈肝高起則心高高則實實則熱熱則滿於心悶而善忘恐悸喉燥口痛牙癰舌傷小兒則便秘

口重舌驚口聲嘶凡人部分陷起者必有病生小腸太陽為心之部其處陷起即病生矣藏舍內外部亦

方見頭面方中內外沉濁屬內浮清居外若外病內入小腹滿起內病裏出所部陷沒外入內前治陽後補陰內出外前

補陰後瀉陽陽則實熱陰則虛寒在陽主外在陰主內凡人死生休咎則藏神前變形於外人心前病則

口為之開張若心前死則枯黑語聲不轉若天中等分篡色應之必死不治看應增損酌賒促賒則不

出四百日內促則不延旬月之間心病少愈而卒死何以知之曰赤黑色黧黧如博暮見頰度年上此必

卒死心絕一日死何以知之兩目回直視肩息立死凡面赤目白憂患慮心氣內索面色反好急求

棺槨不過十日死又面黃目赤不死如衄血血死吉凶之色若在於分部臍臍而見赤黑入口此必死

不出其年名曰行尸若年上無應三年之中病必死矣 夏火心脈色赤主手太陽也夏取盛經分膝夏

者火始治心氣始長脈瘦氣弱陽氣留滯熱重分膝內至於經故取盛經分膝絕膚而病去者邪居淺也

所謂盛經者陽脈也 其脈本在外踝之後應在命門之上三寸命門者在心上一寸也脈根在少澤少

澤在手小指端 其筋起於小指之上結於腕上循臂內廉結肘內兌骨之後彈之應小指之上入結腋
下其支者後走腋後廉上繞肩甲循頸出足太陽之筋前結於耳後完骨其支者入耳中直出耳上下結
於頸上屬目外眥 其脈起於小指之端循手外側上腕出踝中直上循臂骨下廉出肘內側兩骨之間
上循臑外後廉出肩解繞肩甲交肩入缺盆向腋絡心循咽下膈抵胃屬小腸其支者從缺盆循頸
上頰至目銳眥却入耳中其支者別頰上頰抵鼻至目內眥斜絡於顙合手少陰為表裏少陽本在兌骨
之端應在背後同會於手太陰 其手太陽之別名曰走正上腕五寸內注少陰其別者上走肘絡肩髃
主心生病病寔則小腸熱熱則節弛弛則陽病腸脈大反逆於寸口再倍病則噤痛頰腫耳聾目黃卧不
能言悶則急坐虛則小腸寒寒則生蛇蛻則陰病陰脈反小於寸口過於一倍病則短氣百節痛筋急頸
痛不能轉顧此盡是手太陽小腸經筋脈支別為手心主之別名曰內關去腕五寸甲乙作出於兩筋間
循經以上繫於心包絡心系氣寔則心痛虛則為煩心取之兩筋間 手心主之脈起於胸中出屬心包
下膈歷絡三焦其支者循胸出脇下腋三寸上抵腋下循臑內行太陰少陰之間入肘中下臂行兩筋之
間入掌中循中指出其端其支者別掌中循小指次指出其端也是動則病手心熱肘臂攣急腋腫甚則
胸脇支滿心中澹澹大動面赤目黃善笑不休是主脈所生病者煩心心痛掌中熱為此諸病甚則瀉之
虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者則寸口大一倍於人迎虛者則寸
口反小於人迎 手少陰之別名曰通理在腕後一寸別而上行循經入咽中系舌本屬目系其寔則大
膈虛則不能言取之掌後一寸別走太陽 手少陰之脈起於心中出屬心系下膈絡小腸其支者從心
系上挾咽系目系系目系一作循胸出脇其直者復從心系却上肺出腋下下循臑內後廉行太陰心主之後下肘
內廉循臂內後廉抵掌後兌骨之端入掌後內廉循小指之內出其端是動則病噤乾心痛渴而欲飲是
為臂厥是主心所生病者目黃脇滿痛臑臂內後廉痛厥掌中熱痛為此諸病盛則瀉之虛則補之盛者
則寸口大再倍於人迎虛者則寸口反小於人迎 手少陰之脈獨無輸何也曰少陰者心脈也心者五

臟六腑之大主為帝王精神之所舍其臟堅固邪不能容容之則傷心心傷則神去神去則身死故諸邪在於心者皆在心之包絡包絡者心主之脈故少陰無輸也少陰無輸心不病乎曰其外經腑病臟不病故獨取其經於掌後兌骨之端也夏三月主心小腸赤脈攢病其源從少陰太陽之氣相搏而停則榮衛不通皮肉痛起太陽動發少陰淫邪之氣因而作則臟腑隨時受夏疫病也其病相若腑虛則為陰邪氣所傷身戰脈掉提所不禁若臟實則為陽毒所侵肉熱口開舌破咽塞聲嘶故曰赤脈攢病方見傷寒卷中扁鵲云灸腎肝心三腧主治丹一作毒病當依源為治表治陰陽調和臟腑疾不生矣

心虛實第二

脈四首方十一首

心實熱

左手寸口人迎以前脈陰實者手少陰經也病苦閉大便秘不利腹滿四肢重身熱名曰心實熱也

石膏湯

治心熱實或欲吐吐而不出煩悶喘急頭痛方石膏一斤淡竹葉香豉各一升小麥地骨皮茯苓各三兩梔子仁三十枚右七味咬咀先以水一斗五升煮小麥竹葉取八升澄清次下諸藥煮

取二升去滓分三服

外台名瀉肺湯

衍義

靈樞云手少陰之脈獨無腧少陰心脈也心者五臟六腑之大主也精神之所舍也其臟堅固邪弗能容也容之則傷心心傷則神去神去則死矣故諸邪之在於心者皆在於心之包包受邪

則欲吐不吐煩悶喘急故宜石膏清熱降火為主但知石膏解利陽明熱邪不知本經原有中風寒熱心下逆氣諸治中藏梔子豉湯主心下懊憹為清膈熱之專藥竹葉解煩清心合地骨皮主五內邪氣熱中消渴以本經與枸杞同列不分不知實為地骨皮主治也小麥雖為肝穀能助少火而通心包與瀉心湯中用人參助長諸藥同意彼主乾嘔故用半夏此治心熱故用石膏淡竹同治心熱而所主各有攸宜也

半夏瀉心湯

治老小下利水穀不消腸中雷鳴心下痞滿乾嘔不安方人參黃芩甘草各一兩乾

姜一兩

黃連一兩

半夏半升

大棗十二枚

右七味咬咀以水八升煮取二升半分三服并治霍亂若寒

加附子一枚渴加栝蓂根二兩嘔加橘皮一兩痛加當歸一兩客熱以生薑代乾姜
大黃黃連瀉心湯 治心氣不足吐血衄血方 大黃^{二兩} 黃連^{二兩} 黃芩^{各一兩} 右三味咬咀以水三升

煮取一升頓服亦治霍亂

衍義 半夏瀉心湯在傷寒治心下滿而不痛在金匱治嘔而腸鳴心下痞千金借以治下利腸鳴心

下痞滿乾嘔似與心臟無關然痞滿雖屬太陽其瑕正在心下駸駸上犯心包不得不以芩連祛熱半

夏滌痰乾姜導火人參甘棗補正祛邪為務也 大黃黃連瀉心湯在傷寒治心下痞按之濡關上脈

浮之證在金匱治心氣不足吐血衄血與千金主治相同總取芩連以清三焦之火大黃以蕩六腑之

滯乃救心包蘊熱之專藥餘說見十卷傷寒門甘草瀉心湯下

心小腸俱實 左手寸口人迎以前脈陰陽俱實者手少陰與巨陽經俱實也病苦頭痛身熱大便難心

腹煩滿不得臥以胃氣不轉水穀實也名曰心小腸俱實

竹瀝湯 治心實熱驚夢喜笑恐畏悸懼不安方 淡竹瀝^{各二兩} 生地黄汁^{各二兩} 石羔^{八兩} 芍藥^{各二兩} 白朮^{各二兩}

人參^{各三兩} 梔子仁^{各三兩} 赤石脂^{各三兩} 紫苑^{各三兩} 知母^{各三兩} 茯苓^{各三兩} 右十一味咬咀以水九升煮十味至二升

七合去滓下竹瀝更煎取三升若須利入芒硝二兩去芍藥分三服

衍義 胃為五臟之本心為五臟之主胃氣不得轉運外則身熱內則便難包絡之火散漫無以主持

神識故用參朮茯神實其中土則火不致於乘虛內擾地黃芍藥石膏知母竹瀝梔子仁得以建清心

降火之功紫苑開結氣於上石脂固藥力於下也

茯神散 治心實熱口乾煩渴眠臥不安方 茯神^{各三十兩} 麥門冬^{各三十兩} 通草^{各三十兩} 升麻^{各三十兩} 紫苑^{各三十兩} 桂心^{各三十兩}

赤石脂^{各四十兩} 大棗^{各二十枚} 淡竹茹^{各一兩} 雞子大^{各一兩} 右十味治下篩為粗散以綿裹方寸匕井花水

二升半煮取七合時動裏子為一服日再

衍義 前竹瀝湯治胃氣不能轉運故用人參白朮杜心包火於內此以肺燥不能勝熱故用麥門冬

桂心蒸發津氣於上又以升麻通草上升下泄輔佐清熱導火之方紫苑赤石脂知母茯神與前竹瀝湯不殊也

安心散 治心熱滿煩悶驚恐方 白芍藥 遠志 宿姜 茯苓 赤石脂 來門冬 知母 紫苑 石膏 石參 人參 桂心 麻黃 黃芩 葶藶 甘草 右十五味治下篩為粗散

先以水五升浸竹葉一升煮取三升去滓者散一方寸七分以絹裏時動之煎取八合為一服日再

行義 此兼竹瀝湯茯神散二方之製方中麻黃遠志葶藶即茯苓散中升麻桂心來門冬之義人參甘草黃芩即竹瀝湯中人參白朮梔子之義三方合究其微則滋中寓清清中寓散散中寓清之法了然心目矣

治不能食胸中滿膈上逆氣悶熱方 灸心臍二七壯小兒減半

心虛寒 左手寸口人迎以前脈陰虛者手少陰經也病苦悸恐不樂心腹痛難以言心如寒恍惚名曰心虛寒也

茯苓補心湯 治心氣不足善悲愁憂怒衄血面黃煩悶五心熱或獨語不覺咽喉痛舌本強冷涎出作汗善忘恐走不定婦人崩中面色赤方 茯苓 桂心 甘草 紫石英 人參 麥門冬 三兩 大棗 赤小豆 右八味咬咀以水七升煮取二升分三服

行義 人參茯苓補手少陰氣分石英桂心補手少陰血分甘草大棗乃參苓之匡佐麥門冬赤小豆乃英桂之報使并開泄心包旺氣以療喉舌諸疾石英兼行足厥陰而主婦人崩中以其溫經散結也

半夏補心湯 治心虛寒心中脹滿悲憂或夢山邱平澤者方 半夏 宿姜 茯苓 桂心 枳實 橘皮 白朮 防風 遠志 右九味咬咀以水一斗煮取三升分三服

行義 茯苓補心湯兼調肝氣半夏補心湯兼調脾氣方中桂心宿姜溫補心脾枳實橘半溫理胃氣

茯苓佐桂心下導虛陽防風佐白朮上散濁濕遠志一味通心氣之專藥

牛髓丸

通治百病虛脊羸乏等方

牛髓

羊髓

棗膏

白蜜

酥各一

麥門冬

芎藭

桂心

當歸

茯苓一作神

甘草

羌活各三

乾地黄

乾姜各三十

人參

五味子

防風各一

白朮四十

細

辛十八

右十九味

切搗

十四味

篩別

研棗膏

和散

次內諸髓

蜜和攪

令相得

內銅鉢中

於釜沸湯中

煎取

堪作丸

如梧子大

酒服三十丸

稍加至四十丸

日再

衍義

牛髓丸

治百病虛羸

調五臟

以心為君

主諸臟之氣

靡不稟之於君

方用桂心

茯苓以補心

芎藭

當歸以調肝

乾姜白朮

以溫脾

人參麥冬

以益肺

地黃五味

以滋腎

甘草棗膏

以和胃

二髓蜜酥

以充髓

羌防細辛

以司督脈

而禦外邪

不但兼調五臟

并以交濟陰陽

則四維奠安

而九重益謐矣

心小腸俱虛

左手寸口人迎

以前脈陰陽俱虛者

手少陰與巨陽

經俱病也

病苦洞泄

苦寒少氣

四肢

厥腸辟名曰心小腸俱虛

大補心湯

治虛損不足

心氣弱悸

或時妄語

四肢損變

氣力顏色不榮

方

黃芩

附子各一

甘草

茯苓

麥門冬

乾地黄

桂心

阿膠各三

半夏

遠志

石膏各四

生薑

六兩

飴糖

一斤

大棗十二

枚

右十四味

取十三味

咀咀以水一斗

五升煮取五升

湯成下糖

分四服

衍義

方下所主

虛損不足

心氣弱悸

而方所用

反屬足少陰

巨陽之藥

其義云何

夫君主之令

良由

相火所司

故專取桂附

收攝虛陽

則麥門冬

阿膠茯苓

地黃之屬

得以上充

靈臺

其他半夏

甘草姜棗

飴糖寔其

土臟

黃芩石膏

清肅心包

遠志交通

心腎若腎志

不虧遠志

似可不用

水臟無泄

附子儘可

勿施語言

無妄心包

原無火擾

石膏亦宜

裁酌四肢

安和脾陽

猶能自強

姜棗飴糖

量減未為

不可師

古人方須要得

古人意活法

在心奚必固守

成則哉

補心丸

治臟虛善恐

怖如魘狀

及婦人產後

餘疾月經不調

方

當歸

防風

芎藭

附子

芍藥

甘草

蜀椒

乾姜

細辛

桂心

半夏

厚朴

大黃

猪苓

各一

茯苓

一作神

遠志

各二

右十

六味為末

蜜丸如梧子大

酒服五丸

日三不知加至十丸

冷加熱藥

行義 恐佈雖屬心腎之虛然如魔狀乃虛陽鼓激痰涎湧塞心包而成正虛邪實之象虛能受熱故用姜附實能受寒故用大黃獨倍用遠志引領諸藥歸就心包以建補虛逐實之功諸臟安和則君主泰然又何必專用補心之藥乎

心勞第三論一首 方一首

論曰心勞病者補脾氣以益之脾王則感於心矣人逆夏氣則手太陽不長而心氣內洞順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂關格病則生矣

大黃洩熱湯

治心勞熱口為生瘡大便苦難閉澀不通心滿痛小腸熱方

大黃 澤瀉 黃芩 芒

硝 梔子仁

各三兩

桂心

通草

石膏

各二兩

甘草

一兩

大棗

二十枚

右十味咬咀用水九升先以水一

升別浸大黃一宿餘八升煮諸藥取二升五合去滓下大黃煮兩沸去滓下芒硝令烊分三服

衍義

心勞則火氣內燔勞之太過則心氣內洞固宜補脾以益之土實則火不妄發君主自寧若火

氣方熾又須泄熱為務硝黃石膏群行泄熱惟取桂心為從治之導耳

脈極第四論一首 方一首

論曰凡脈極者主心也心應脈脈與心合心有病從脈起又曰以夏遇病為脈痺脈痺不已復感於邪內

舍於心則飲食不為肌膚咳脫血色白不澤其脈空虛口唇見赤色凡脈氣衰血焦髮墮以夏丙丁日得

之於傷風損脈為心風心風之狀多汗惡風若脈氣衰則熱熱則傷心使人好怒口為赤赤甚則言語不

快血脫色乾燥不澤飲食不為肌膚若脈氣虛則寒寒則咳咳則心痛喉中介介如哽甚則咽腫喉痺故

曰心風虛實候也

生地黃煎 治脈熱極則血色脫色白乾燥不澤飲食不為肌膚消熱止極強胃氣方 生地黃汁 生

麥門冬

赤蜜

各一兩

葶心

一作

遠志

人參

白朮

茯苓

芍藥

乾地黃

各二兩

甘草

二兩

六兩

生薑

四兩

右十三味

一味

咬咀

以水一斗

二升煮取

二升七合

去滓下地黃汁及蜜更煎

取三升半分四服

衍義 血枯氣脫脈極而咳故用二地芍藥以滋血參苓朮甘以益氣門冬歲蕤以潤肺萸心石膏以清胃遠志赤蜜以通心而行諸味膩滯之性也

灸法

胸中痛引腰背心下嘔逆面無滋潤灸上門隨年壯穴在俠巨關兩邊相去各半寸一炷 顏色焦枯勞氣失精肩臂痛不得上頭灸肩髃百壯穴在肩外頭近後以手按之有解宛宛中

脈虛實第五 論一首 方三首 針灸法二首

論曰凡脈虛者好驚跳不定脈實者洪滿凡脈虛寒之應主於心小腸若其腑臟有病從熱生則應臟寒則應腑也

防風圓 補虛調中治脈虛驚跳不定乍來乍去主小腸腑寒方 防風 桂心 通草 茯苓 遠志

麥門冬 甘草 人參 白石英 各三兩 右九味為末白蜜和丸如梧子大酒服之十九日再加至四

十九

衍義 脈虛而用桂心石英遠志當矣反用防風為主兼木通同入手足太陽引領人參茯苓等味歸

就心與小腸千金真旨於此稍露一斑特為拈出以開學人心目

升麻湯 治脈實洪滿主心熱病方 升麻 子芩 澤瀉 梔子仁 淡竹葉 芒硝 各三兩 生地黃 切一升

右七味咬咀以水九升煮取三升去滓下芒硝分三服

衍義 脈實洪滿心與包絡邪實之應心主血故用生地黃黃芩涼血為主然火逆上僭非芒硝梔子

竹葉澤瀉并通二陰不能旋折其威又需升麻開發於上分解纏隆之勢也

麻黃湯 調心洩熱治心脈厥大寸口小腸熱齒齲噤痛方 麻黃 生薑 各四兩 細辛 子芩 茯苓

芍藥 各三兩 白朮 二兩 桂心 一兩 生地黃 切一升 右九味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服須利加

芒硝三兩

衍義

心脈厥大言左寸沉伏而按之益大應指厥厥動搖故宜生地黃黃芩清利伏熱即以麻桂姜

不殊

鍼灸法

脈不出鍼不容穴在幽門兩旁各一寸五分是 心悶痛上氣牽引小腸灸巨闕二七壯

心腹痛第六

論一首 方二十六首 針灸法二十五首

論曰寒氣卒客於五臟六腑則發卒心痛胸痺感於寒微者為咳甚者為痛為泄厥心痛與背相引善厥如物從後觸其心身偃僂者腎心痛也厥心痛腹脹滿心痛甚者胃心痛也厥心痛如以鍼錐刺其心痛甚者脾心痛也厥心痛色蒼蒼如死灰狀終日不得太息者肝心痛也厥心痛臥若從心間痛動作痛益甚色不變者肺心痛也真心痛手足清至節心痛甚旦發夕死夕發旦死蛇心痛腹中痛發作腫聚往來上下行痛有休止腹中熱善涎出是蛇咬也以手按而堅持之勿令得移以大針刺之復久特之蟲不動乃出鍼心下不可刺中有成聚不可取於胸膈中有蟲蛇咬皆不可取以小鍼治寒氣卒客於五臟六腑中則發心痛方 大黃 芍藥 柴胡 升麻 黃芩 桔梗 硃砂

鬼臼

鬼箭羽

桂心

朴硝各二兩

右十一味

咀以水九升煮取二升七合

分三服

先分硃砂作

三服每服內一分攪勻服之得快利如痛不止宜服後方

赤芍

六兩

桔梗

杏仁

各五兩

右三味咀

咀以水六升煮取三升分三服

衍義

邪有寒熱之辨痛有臟腑之分而此統言寒熱臟腑者以寒邪伏久而蘊熱熱毒煥發於臟腑故用升柴開發於上硝黃蕩滌於下桂芍破寒熱而固結衛茅散賊風惡血鬼臼辟惡氣不祥丹砂攝浮游諸邪黃芩清肌表之熱桔梗利膈上諸氣氣血和而臟腑安痛當自止設得快利而痛猶未除者

此固結雖通而氣血未調也但須赤芍杏仁桔梗調血和營清膈利氣氣血平而痛自愈不得復行政擊也

九痛丸

治九種心痛并療冷衝上氣落馬隨車血疾等方一蟲心痛二症心痛三風心痛四悸心痛五去心痛此附子乾姜各二吳茱萸人參巴豆各一生狼毒四兩右六味為末蜜和丸如梧

子大空腹酒服三丸卒中惡腹脹痛口不能言者服五丸日一服連年積冷流注心胸者亦服之好好將息神驗金匱方用附子三兩干姜狼牙各一兩

衍義

金匱九痛丸本隸胸痺門後治九種心痛原方用附子三兩乾姜一兩意在辟除腎氣凌心也

千金改用姜附各二兩意在兼理胃中陳積也又原方用生狼牙一兩千金以其難覓改用狼毒四兩以狼毒性緩不若狼牙之力銳且千金首言蟲心痛故專殺蟲為務濟以巴豆吳茱萸之迅烈助以人參之振胃驅邪而方仍列心臟門者以諸痛靡不本於血病血則心之所主也喻嘉言曰九種心痛乃客邪之劇証即腎氣凌心脚氣衝心之別名也痛久血瘀陰邪搏結溫散藥中加生狼牙巴豆吳茱萸驅之從陰竅而出以其邪據胸中結成堅壘非搗其巢邪終不出耳

治九種心痛方

取當太歲上新生槐枝一握去兩頭咬咀以水三升煮取一升頓服

衍義

槐本虛宿之精益腎清心凡心痛屬血熱者宜之

桂心三物湯

治心中痞諸逆懸痛方

桂心各二兩生薑各二兩膠飴半斤

右三味取二味咬咀以水六升

煮取三升去滓內飴分三服

仲景用枳實五枚不用膠飴射後用枳實五枚白朮二兩為五味

衍義

桂心通心氣散血結生薑去穢氣通神明膠飴和脾氣緩急痛凡心痛之屬虛冷者宜之

崔氏烏頭丸

治心痛徹背背痛徹心方

烏頭六銖附子各半蜀椒各半乾姜各半赤石脂各半右五味

為末蜜丸如梧子大先食服三九日三不知少增之

范汪不用附子服如梧子二九崔氏用桂心半兩為六味

衍義

胸中陽氣不布陰邪襲據所以心痛徹背背痛徹心故金匱取崔氏烏頭赤丸更其名曰赤石

脂丸以烏附椒姜之辛烈破陰復陽石脂之重瀉填塞陰邪往來之路也

治心痛方

桃白皮煮汁空腹以意服之

崔氏用療
症心痛

治暴心痛或如中惡口中涎出不可禁止回回欲吐方

苦參一斤

右一味咬咀以水一石煮取二斗

去滓下苦酒二斗更煮取五升加大黃末熬和煮汁中煎令可丸并手丸之如梧子大每服以酒一升

浸三四十日一當倒腹吐不吐下利更酒浸苦參三斤浸久彌佳非止暴痛如肝骨節等痛凡是腹

中之疾悉主之又宿冷血結陰痺頻用有效大良

治卒中惡心痛方

苦參三兩

右一味咬咀以好醋一升半煮取八合強者頓服老小分二服○又方

桂心一兩

右一味咬咀以水四升煮取一升半分三服

治蟲心痛方

鶴虱為末蜜丸如梧子大服四十九丸蜜湯下日一服可加至五十丸慎酒肉○又方

虱一兩為末溫醋一盞和空腹服之蟲當吐出○又方

服漆一合方見後養生服餌篇中凡蟲心痛皆用漆主之

〔衍義〕

桃白皮活血通膈膜滯血 苦參汁入苦酒下大黃末治腹中熱血去宿冷血結陰癖者始由

冷積終變鬱熱也

卒中惡心痛輕者只用苦參苦酒煮服以湧泄之 桂心治痼冷結血 鶴虱治

蟲症心痛取蜜凡誘入蟲口也

鶴虱溫酒和服者取其上涌也 漆能殺蟲然須煨灰用之

五辛湯

治心腹疼痛方

細辛

蜀椒

桂心

乾姜

吳茱萸

芍藥

防風

苦參

甘草

當

歸

乾地黃

二梔子

烏梅

大棗

各十枚

右十四味

咬咀以水九升

煮取三升

分四服

〔衍義〕

細辛椒姜萸桂以散心腹結痛苦參梔子兼歸芍地黃以和營血蘊熱甘草大棗以和五辛二

苦之性并和胃氣行藥力也其妙用尤在防風開發衛氣以通蘊結於外烏梅宣播胃氣以收津液於內

犀角丸

治心腹久痛積年不定不過一時間還發其則數日不能食又便出乾血窮天下方不能瘥甄

立言處此方數日即愈

犀角

麝香

雄黃

桔梗

莽草

鬼臼

桂心

芫花

各半

甘遂

一兩

附子 光明砂各六貝齒五枚巴豆二十枚 赤足蜈蚣二枚 右十四味為末蜜丸如梧子飲服一九日

二漸加至三九以微利為度古今集驗無雄黃

衍義 心腹久痛積年不定而至便血不食此必毒邪伏匿於幽隱之處故立言專以犀麝雄黃等味

辟除惡毒為主明砂鎮心安神貝齒磨堅破血桂附鼓激諸藥之性也

高良姜湯 治心腹絞痛如刺兩脇支滿煩悶不可忍方 高良姜五兩 厚朴二兩 當歸各三兩 桂心各三兩

右四味咬咀以水八升煮取一升八合分二服日三若一服痛止便停不須更服强者作二服弱者分

三服

衍義 心腹絞痛而見脇滿如刺明係木邪凌上之寔症故用良姜厚朴溫散滯氣當歸桂心溫散結

血兼行心肝肺三經以破寒積也

當歸湯 治心腹絞痛諸虛冷氣滿痛方 當歸 芍藥 厚朴 半夏各二兩 桂心 甘草 黃芪各二兩 人

參各二兩 乾姜四兩 蜀椒一兩 右十味咬咀以水一斗煮取三升二合分四服羸弱人分六服小品云冷加

衍義 高良姜湯專主寒結暴痛當歸湯專主虛滿久痛故於前方裁去良姜之壯火易入乾姜以溫

中兼芍藥佐當歸半夏佐厚朴蜀椒佐桂心以除旺氣參芪甘草保元氣也

又方 治虛冷腹痛不下飲食食復不消膨脹者方 當歸 茯苓各五兩 黃芪 紫苑各四兩 高良姜

乾姜各六兩 鹿茸 桂心 肉苁蓉 昆布 橘皮各三兩 甘草二兩 烏頭二兩 大棗四十枚 桃仁一百枚 地骨

皮 法麴 大麥蘖各一升 右十八味咬咀以水一斗五升煮取四升二合分為五服下利加赤石脂

龍骨各三兩 渴加麥門冬一升

衍義 方中良姜乾姜合上二方之義麴蘖橘皮昆布即上方厚朴半夏之義鹿茸苁蓉即上方人參

保元之義桃仁即上方芍藥佐當歸之義烏頭即上方蜀椒佐桂心之義其他茯苓紫苑大棗地骨皮

專解二姜之辛燥也

又方 治寒冷腹中痛方小品云吳茱萸湯 當歸二兩 桂心 甘草 人參各一 生薑 五兩 半夏 小麥各一 吳茱萸二升

右八味咬咀以水一斗五升煮取三升分三服日三亦治產後虛冷

衍義 千金以南陽陽明例中吳茱萸湯去大棗之戀膈易甘草以緩痛當歸桂心助吳茱萸以溫血

小麥助人參以益氣生夏助生薑以滌痰清氣溫而痛自除乃南陽法中之旨故小品仍以吳茱萸湯名之

又方 治冷氣膈下往來衝胸脇痛引脇背悶者方 當歸 桂心 人參 甘草 吳茱萸 芍藥

大黃各二兩 茯苓 枳實各一兩 乾姜 三兩 右十味咬咀以水八升煮取二升半分三服日三並治尸症

亦佳外臺仲景方無茯苓枳實

衍義 前方意在祛痰故用半夏佐生薑以散結此方意在蕩寔故用乾姜佐茱萸以泄滿茯苓佐人

參以助氣芍藥佐桂心以和血枳寔佐大黃以導滯當歸和血甘草和中心腹諸痛之所必需以其人本虛邪實非人參姜桂不能助枳實大黃開結導滯之力也

又方 治久寒痼胸腹中痛時下利方 當歸 三兩 附子 一兩 乾姜 甘草 枳皮各二兩 右五味咬咀以水八升煮取二升分三服日三

衍義 胸腹久痛而至時下利陰邪浸淫已極非通脈四逆無以恢復元陽兼當歸之辛溫以和營血

枳皮之辛涼以清旺氣相取粵東高涼化州者為勝附以蜀川成都者為優

又方 治久寒痼疾胸腹中痛短氣時滯下利方 當歸 桂心各三兩 乾姜 四兩 附子 一兩 右四味咬咀以水八升煮取二升分三服日三

范汪無附子有甘草二兩云虛冷

衍義 此以前方除去甘草之甘緩相皮之辛散特進桂心配當歸姜附以峻溫營血也

溫中當歸湯 治心腹中痛發作腫聚往來上下痛有休止多熱喜涎出是蛇蟲咬也二三劑後若不效