




百會疽圖



百會穴在頂中央自面側觀之正對耳尖

頭部

百會疽 百會疽在顛頂結經屬督脉百會穴初如粟未漸如錢是似葡萄堅似鐵高腫熱實消毒火平塌陽虛溫補法連耳項動痰聲七日不潰命必絕此百會疽又名王頂發生在顛頂正中屬督脉經百會穴由膏粱太過火毒凝結而成初起形如粟未漸腫根大如錢甚則形似葡萄堅硬如鐵高火紅腫焮熱疼痛瘡根收束憎寒壯熱大渴隨飲隨乾口苦唇焦便秘煩燥脉見洪數者此屬氣實宜服黃連消毒飲以清毒火外

敷冲和膏若漫腫平塌紫暗堅硬舉痛根散惡寒便瀉脉見細數者此屬陽虛宜服十全大補湯以溫補之外敷回陽王龍膏若面赤過煩口乾不渴唇潤者屬陽虛浮泛宜服桂附地黃丸引火歸源更用生附子餅置兩足心湧泉穴各灸五壯以洩其毒初起貼琥珀膏已潰糝黃靈藥太乙膏貼腐盡再易生肌之藥治之若腫連耳項痰如拽鋸七日無膿不潰神昏命必絕矣

黃連消毒飲 蘇木 甘草 陳皮 桔梗 黃芩 黃蘗 人參 藁本 防己 防風 知母

羌活 獨活 連翹 黃連 生地黃 黃耆 澤瀉 當歸尾 水煎食遠溫服 散黃連消

毒清毒火諸般火證服最良蘇木甘草陳皮桔苓藥人參等防知母羌活獨活等連翹黃連生地黃黃耆澤瀉當歸尾服後最忌飲寒涼

冲和膏 回陽王龍膏 生肌散 十全大補湯 黃靈藥 太乙膏 桂附地黃丸 附子餅 琥珀

膏見後髮除瘡

俱見腫

俱見潰

見前

灸法

透腦侵腦疽圖



透腦疽生在百會穴前額會穴前

侵腦疽生在透腦疽前側下五處穴

透腦疽

透腦疽生百會前形如雞子痛而堅軟漫膿稀虛塌陷

紅硬膿稠實腫大此證生於百會穴之前額門之際亦由督脉經

火毒而成初如粟米漸如雞子堅硬疼痛瘡項塌陷根脚漫腫色暗

者屬虛若色紅腫硬頂尖膿稠者屬實速潰者順遲潰者逆

其腫潰內外治法俱按百會疽

侵腦疽 侵腦疽生透腦旁濕火攻發屬太陽穴名五處知其位紅

順紫逆要審詳此疽生於透腦疽側下由太陽膀胱經濕火而成穴名五處紅腫高起焮熱疼痛膿色如蒼蠅者屬氣血傷

實順而易治若紫腦無膿根脚散大者屬氣血兩虛逆而難治初起宜服制敗毒散汗之次服內疏黃連湯下之將潰服託

裡透膿湯已潰服託裡排膿湯外貼琥珀膏圍敷冲和膏其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門

託裡透膿湯 人參 白朮 穿山甲 白芷 升麻 甘草 節 當歸 皂角刺 生黃耆 青

皮 水三鍾煎一鍾病在上部先飲煮酒一鍾後熱服此藥病在下部先服藥後飲酒瘡在中部藥內凡酒半鍾熱服

方託裡透膿治癰疽已成未潰服之宜參朮甲並升麻草當歸黃耆刺青皮

荆防敗毒散 見項部 內疏黃連湯 冲和膏 見項部 託裡排膿湯 見項部 琥珀膏 見項部

佛頂疽

佛頂疽生在透腦疽之前上星穴

佛頂疽圖



佛頂疽屬督上星陰陽不調毒熱成不論虛實皆險證潰爛

黑陷必死此證一名頂門疽生於頭頂顛門之前屬督

脉經上星穴由臟腑陰陽不調熱毒上壅而成色紫堅硬腫

痛脉洪大而數者為實脉微細而數者為虛皆屬險證若潰

爛黑陷六脉散大神昏譫語二便閉結者為逆首尾內外治

法俱按百會疽

額疽圖



額疽 額疽生額火毒成左右膀胱正督經項臨集紫無膿重
 高聳根收紅腫輕註此證生前額正中者屬督脉經或生左右
 額角者屬膀胱經總由火毒而成初起瘡頂塌陷乾焦色紫不
 生大膿者其勢重而屬險也若紅腫高聳瘡根收束者其勢輕
 而屬順也初服荆防敗毒散汗之次服仙方活命飲消之將潰
 氣虛者宜服託裡透膿湯氣寔者宜服透膿散外敷冲和膏已
 潰宜服託裡排膿湯外貼琥珀膏其餘內外治法俱按癰疽潰
 瘍門

荆防敗毒散見項部

仙方活命飲見腫

託裡透膿湯見前

透膿散 冲和膏俱見腫

託裡排膿湯見項部

膏見髮際

勇疽圖



勇疽 勇疽背後太陽穴膽經怒火伏鼠形七日不潰毒攻眼
 黃膿為吉黑血凶註此證一名勇疽又名腦發疽屬足少陽胆
 經怒火而成生於目小肯之後五分生在太陽穴者無論左右
 皆可以生初起如栗漸腫疼痛形如伏鼠面目浮腫七日信膿
 不潰火毒攻精腐爛損目若十一日針出黃膿毒從膿解為順易
 治若出紫黑血者係氣虛不能化毒為逆難治初服仙方活命
 飲清解之毒甚宜服內疏黃連湯外敷二味拔毒散其將潰已
 潰內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門潰後避風忌水

仙方活命飲

內疏黃連湯

二味拔毒散俱見腫

髮疽

鬢

疳



鬢疳生在左右鬢角

鬢疳鬢疽三焦膽二經證由慾怒火凝成此經氣多而血少潰腐惟宜少見膿註此證發於鬢角屬少陽三焦足少陽胆二經由於相火妄動外受風熱更因性情急怒慾念火生凝結而成此二經俱屬氣多血少最難腐潰更兼鬢角肌肉澆薄不宜針灸候其自潰潰後不宜多見膿膿多者過耗血液難斂初起宜服柴胡清肝湯解之膿成者宜託裡消毒散托之外敷三味拔毒散已潰內外治法俱按癰疽潰瘍門

柴胡清肝湯

柴胡

生地

各一錢五分

當歸

赤芍

各一錢五分

川芎

連翹

各二錢

牛蒡子

各二錢五分

黃芩

生梔子

研

天花粉

甘草節

防風

各一錢

水二鍾煎八分食遠服

方柴胡清肝治怒證宣血疏通解毒良四物生用柴翹芩黃

梔粉甘草節防

託裡消毒散

二味拔毒散

俱現腫癰門

天疽銳毒



天疽生在耳後一寸三分高骨後

銳毒生在耳後一寸三分高骨後

天疽

銳毒

天疽居左銳毒右經屬胆腑生耳後謀慮太過鬱火成此處肉薄當急救註此二證左為天疽右為銳毒俱生耳後一寸三分高骨之後天者不盡天年謂之天銳者如鋒刃之銳利言毒甚也

得此二證愈者甚少初起俱如黍粒漸腫如瓜堅硬平塌紫暗不澤較諸瘡疼痛倍增名雖各異而左右耳後俱屬足少陽胆經由謀慮不決鬱火凝結而成此處皮肉澆薄氣多血少終屬險證急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任脉內薰肝肺惡毒添必致不救若

紅腫連潰者順堅硬黑陷者逆如果投方應證亦只十全四五也初宜服柴胡清肝湯消解之膿將成宜服託裡消毒散瘡者十全大補湯託補之外俱敷烏龍膏其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門

紅腫連潰者順堅硬黑陷者逆如果投方應證亦只十全四五也初宜服柴胡清肝湯消解之膿將成宜服託裡消毒散瘡者十全大補湯託補之外俱敷烏龍膏其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門

柴胡清肝湯見前 託裡消毒散 烏龍膏候見腫 十全大補湯見前

耳後疽圖



耳後疽生耳上稍之後角係穴開口有室隔下之處
左右相同

發達攻耳竅膿從耳竅出者名為內潰屬虛多服十全大補湯大抵少年得此證者具愈最緩老年得此證者易於成漏
十全大補湯見前

耳發圖



耳發生耳指間連耳輪通腫甚則膿帶耳竅
左右相同

外敷二味拔毒散其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門
仙方活命飲見腫 二味拔毒散見腫

耳後疽 耳後疽生耳指間三焦風毒胆火炎紅腫有頭

歛為順黑陷聾痛冷潰難註此證生於耳指之間無論左

右屬三焦經風毒兼胆經怒火上炎而成初起如粟漸增

腫痛小者如杏大者如桃若紅腫有頭焮熱易潰稠膿者

為順若黑陷堅硬聾痛引腦甚則項煩肩肘俱痛不熱遂

潰紫血者為逆初治法同天疽已潰內外治法俱按癰疽

潰瘍門又有初起失於託裡或誤食寒涼則毒必不能好

耳發

耳發三焦風熱成初椒漸若蜂房形赤腫疼痛生輪後黃

膿屬吉紫血凶註此證生於耳後屬三焦經風熱相搏而

成初如椒粒漸腫若蜂房將腐亦多眼孔歛赤疼痛腫連

耳輪蓋發者乃癰證之毒甚者也不可聽其自潰恐潰連

膿通耳竅當在十一日後剪破瘡頂出黃白膿者屬吉為

順出紫鮮血者屬凶為逆初起俱宜服仙方活命飲消之

耳根毒

御製醫書宗金鑑 外科要訣

耳根毒圖



耳根毒生耳垂後偏上縫中左右相同

養榮湯補之自斂

仙方活命飲見腫

荆防敗毒散見項部

透膿散見腫

託裡透膿湯見前使

紅靈藥 生肌玉紅膏 太乙膏 俱見

門 香貝養榮湯見項部

玉枕疽圖



玉枕疽生腦後在玉枕骨六上腦穴在脊脊六寸半

後四寸半

玉枕疽 玉枕疽屬督脈經證由積熱風邪乘枕骨微上

腦戶穴高腫為順紫陷山註此證由督脈經積熱外受風

邪凝結而成生在玉枕骨尖微上腦戶穴初起如果麻癢

相兼寒熱往來口渴便秘漸增堅硬大者如茄小如鵝卵

紅活高腫潰出稠膿者屬吉而順也若紫暗塌陷潰出血

水者屬凶險也初則俱服神授衛生湯消解之虛者宜服

託裡消毒散外敷冲和膏其餘內外治法俱按癰疽腫潰

瘍門

神授衛生湯

託裡消毒散

冲和膏

俱見腫

腦後發圖



腦後發在玉枕骨之下

腦鑠圖



耳鑠生在腦後入髮際一寸風府穴
天筋之中腕距中央勢如橫木

潰瘍門

桑柴烘法

父壯灸法俱見前卷

仙方活命飲見腫瘍門

十全大補湯見潰瘍門

黃連消毒飲見前百

回陽王龍丹

見腫瘍門

腦後發生在督經熱結風府栗腫疼紅活易潰稠
膿順紫暗難潰血山註此證屬督脉經枕骨之
下風府穴由積熱外受風邪凝結而成初如粟米
掀腫作疼痛引頭項肩項氣粗鼻塞漸大如盤如
盞紅活速潰出稠膿者順紫暗難潰時津血水者
逆初起內外治法按玉枕疽其餘內外治法俱按
癰疽腫潰瘍門

腦鑠腦鑠項後如橫木精涸毒火上乘生黑如竈烟牛唇硬木痛
未腐水流清急施桑柴法至痛火燎刺痛屬陽經速服仙方活命飲
若見七惡定然凶註此證先於膏脉經風府穴由陰精枯涸之毒乘
之而生初起形如椒粒起硬紫暗漸腫如橫木甚則上至巔頂下至
大椎色如灶烟硬若牛唇木膿皮先腐爛時流清水肌肉冰冷輕者
木痛重者毒氣將陷全不知疼宜急施桑柴烘法或艾壯灸法以痛
為度速服仙方活命飲以舒解其毒七日之後不發長不生大膿者
宜服十全大補湯救之投補藥不應者難治若初起熱如火燎刺痛
屬陽證速服黃連消毒散外敷回陽王龍膏此證若首尾純見五善
之證者屬順見七惡之證者屬逆也其餘內外治法俱按癰疽腫

油風圖



油風生頭髮內毛髮脫落成片皮膚色紅光亮甚痒亦生鬚眉間及面部

油風 油風毛髮乾焦脫皮紅光亮養難堪毛孔風襲致傷血養真海艾研血瘰此證毛髮乾焦成片脫落皮紅光亮瘰如蟲行俗名鬼剃頭由毛孔開張邪風乘虛襲入以致風盛燥血不能榮養毛髮宜服神應養真丹以治其本外以海艾湯洗之以治其標若耽延年久宜鍼砭其光亮之處出紫血毛髮庶可復生

神應養真湯 羌活 木瓜 天麻 白芍 當歸 羌絲子

熟地酒蒸 川芎 等分為末入地黃膏加蜜丸桐子大每

服百丸溫煮酒或溫湯任下

防神應養真治油風養血消風髮復生羌歸木瓜天麻芍羌絲熟地與川芎

海艾湯 海艾 菊花 薑本 蔓荊子 防風 薄荷 荆穗 藿香 甘松 各二

水五六碗同藥煎數滾連湯共入服

口鉢內先將熱氣重面候湯少溫用布蘸洗日洗二三次洗後避風忌魚腥發物

防神應養真油風瘰先黃後洗善消風

菊薑蔓荊風薄穗藿香海艾與甘松

白屑風圖



白屑風生於頭面作痒抓起白屑皮脫去起其燥癢倍增

白屑風 白屑風生頭與面燥癢日久白屑見肌熱風侵成燥化換肌潤肌醫此患註此證初生髮內延及面目耳項燥癢日久飛起白屑脫去又生由肌熱當風風邪侵入毛孔鬱久燥血肌膚失養化成燥證也宜多服祛風換肌丸若肌膚燥裂者用潤肌膏擦之甚效

祛風換肌丸 大胡麻 蒼朮炒 牛膝酒洗 石菖蒲 苦參 何首烏生 花粉 葳靈仙各二 當歸身 川芎 甘

草略生 右為細末陳煮酒跌丸菜豆大每服二錢白滾水送下忌魚腥發物火酒 歌方換肌丸治白屑風燥癢日增若虫

行風燥血分失潤養疊起白屑落復生歸苦胡麻蒼朮膝菖蒲花粉草葳靈苦參何首烏為末煮酒跌丸菜豆形

潤肌膏 香油四兩 奶酥油二兩 當歸五錢 紫草一錢 將當歸紫草入二油內浸二日文火煉焦去渣加黃蠟五錢

溶化盡用布濾傾盤內不時用柳枝攪冷成膏每用少許日搽二次
 歸紫草煤焦加蠟濾攪凝

禿

瘡



禿瘡生於頭皮腫癢抓破津水結白膜多生疣聖

禿瘡

禿瘡風熱化生蟲蟻癢難堪却不疼白如錢生髮內宜服通聖
 擦膏靈此證頭生白如小者如豆大者如錢俗名錢癬又名肥
 瘡多生小兒頭上癢難堪却不疼痛日久延漫成片髮焦脫落
 成禿瘡又名癩頭瘡由胃經熱生風而成宜用防風通聖散料醋
 酒浸焙為細末每服一錢或二錢量其壯弱用之食後白滾湯調
 下服至頭上多汗為驗初起肥瘡宜擦肥油膏用久則效已成禿

瘡者先宜艾葉鍋裏煎湯洗淨瘡如再用豬肉湯洗之隨擦躑躅花油以殺蟲散風蟲死則瘡止風散則髮生血潮則肌膚
 潤久擦甚效

防風通聖散 防風 當歸 白芍 芒硝 大黃 連翹 桔梗 川芎 石膏 黃芩 薄荷 麻黃 滑石 荆芥 白朮 山梔 甘草 共為末 防風通聖治禿瘡胃經積熱致風傷連翹梔子麻黃結白朮

歸身滑石防黃芩甘草石膏薄荷荆芥并硝黃芩末酒拌晒乾碾白湯調服發汗良

肥油膏 番木鱉 當歸 葵蘆 黃蘗 苦參 杏仁 狼毒 白附子 鱉 鯉魚胆 用香油十兩將前

藥入油內熬至黑黃色去渣加黃蠟一兩二錢溶化盡用布濾過罐收每用少許用藍布裹於手指蘸油擦瘡 肥油膏

能治肥瘡散風殺蟲長髮強黃蘗苦參白附子番木鱉狼毒杏仁良葵蘆當歸鯉魚胆煤焦入蠟寒奇方

躑躅花油方 躑躅花根四兩搗爛用菜油一盞煤枯去渣加黃蠟少許布濾候冷青布蘸擦日用三次既帽戴之勿令見風

歌躑躅花油療禿瘡驅蟲止癢搽之良躑躅花根研極爛菜油煤枯入蠟強

外科要訣 樓站癬

蜈蚣癰圖



如蜈蚣串穴之狀宜貼紺珠膏拔盡膿毒將所串之空皮剪通使無藏膿之處用米泔水日洗一次乾撒生肌散貼萬應膏甚效有因瘡口開張日久風邪襲入以致瘡口周圍作癢抓破津水相延成片形類黃水瘡者宜用敗銅散搽之忌魚腥發物

三品一條槍 白砒一兩

明礬三兩

砒礬二味共研細末入小罐內加炭火煨紅青烟已盡壺起白烟片時約上下紅撒住

火取罐安地上一宿取出約有砒礬淨末一兩加雄黃二錢四分乳香一錢二分共研極細厚糊搗成線條陰乾瘡有孔者插入孔內無孔者先用鍼連孔竅早晚插藥二條插至三日後孔大者每插十餘條插至七日孔內藥條滿足方住患處四

邊自然裂開火縫共至十四日前後具堅硬衣膜及疔核癰癰瘡潰諸管自然落下隨用湯洗搽王紅膏瘡者兼服健脾補劑自然收斂 歌方神奇三品一條槍能醫堅硬衣膜瘡雄乳白砒礬生用研末煨煉搽條良

敗銅散 化銅舊罐子一個研為細末用香油調敷自能去濕祛瘡瘡口易斂 歌敗銅散治潰風傷騷癢破津脂水瘡化銅

舊罐研細末香油調敷參濕良

紺珠膏 萬應膏 生肌散 王紅膏俱見清

瘡門

髮除瘡

髮際瘡圖



髮際瘡生項後髮際內胖人多生此瘡

摺紋其髮反刺瘡內因循日久不瘥又兼受風寒凝結形如卧臥破爛津水時破時斂俗名謂之肉龜經年不愈亦無傷害常用琥珀膏貼之可稍輕也

琥珀膏 定粉兩一 血餘錢八 輕粉錢四 銀朱錢七 花椒粒十四 黃蠟兩四 琥珀五分 麻油兩十二 將血餘花椒麻油煉焦

撈去渣下黃蠟溶化盡用夏布濾淨傾入磁盤內預將定粉銀朱輕粉琥珀四味各研極細共合一處徐徐下入油內用杵枝不時攪之以冷為度綿紙攤貼亦可 琥珀膏能治諸瘡活瘀解毒化腐良定血輕朱椒蠟珀麻油熬膏亦療瘍

紺珠丹 即萬靈丹 見腫瘍門 防風通聖散 見前 黃連膏 見鼻部 鼻瘡

頭風傷目 頭風引目眉稜痛風火寒痰有四因或因楊梅毒攻項或因產後被風侵 此證畏風惡寒其痛走注不定得暖

少減者風痛也寒熱口苦大渴二便秘不眠者火痛也手足厥冷面青唇白氣逆不渴小水白者寒痛也身重肢痠胸煩作嘔

口吐痰沫者痰痛也以上四證舊有古方羌活中和湯倍川芎加菊花隨經形證加引治之倘若因循失治風攻眉稜痠痛眼

皮跳動漸攻睛珠起藍雲遮睛多致損目若只眉稜痠痛以碧雲散常吸之甚效

羌活中和湯 防風 白芷錢一 細辛 甘草錢五分 生地 蒼朮 黃芩錢一 羌活錢五分 川芎錢二 引加蔥頭三

根生薑二片紅棗肉二枚水煎遂食服 痛由頂後起屬膀胱經倍加藁本 痛由耳後起屬胆經加柴胡 痛由太陽牽

引頭額兩目屬胃經倍白芷加葛根煨石膏 頭痛兼有腹痛身重屬脾經倍蒼朮 頭痛兼有足冷氣逆屬腎經倍細辛

甚者加麻黃生附子減黃芩 頭痛兼有嘔涎沫者手足厥冷屬肝經加吳茱萸 頭痛有火熱渴倍酒洗黃芩加生石膏

便秘者加生大黃 頭痛吐涎涎四肢不冷者加半夏 方沖和頭風傷目風火寒痰四因生日久眉稜痠痛跳遮睛損

外科要訣

自此能清防風白芷細辛草生地蒼朮羌活等詳在隨加引經藥葱薑紅棗水煎成

碧雲散 川芎 鵝不食草

各一 細辛 辛夷

各二 青黛

共為細末患者口噤凉水令人以蘆筒吹入左右鼻孔內取

嚏為效每用少許鼻常吸之其效緩

方 碧雲散去頭風證眉睫痠痛更堪惡鵝不食草辛夷等細同研不時吸

貼兩太陽穴法 治頭痛如破

雀腦川芎 白附子

各等

研末葱汁調稠紙攤貼左右太陽穴效 產後風寒侵腦頭痛

不可發汗宜用四物湯倍川芎加荆芥穗服之其效緩

楊梅毒入腦髓以致頭痛者治在本門

四物湯見潰瘍門

面部

額瘍

額瘍額疽漸榴形風熱積熱小腸經瘍起焮紅浮腫痛

疽紫漫硬木麻疼

此二證發於顴骨尖處屬小腸經不論左右初

小漸大如榴發陽分者由風熱而生初起焮紅浮腫疼痛七日即潰

名為額瘍毒輕根淺易愈陰分者由積熱而生色紫漫腫堅硬麻

木疼痛三七方潰名為額疽毒甚根深難愈瘍證初宜仙方活命飲

疽證初宜內疏黃連湯或麥靈丹其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰

瘍門

額瘍痘



額瘍痘腫色赤左右同

額疽痘腫色紫左右同

仙方活命飲

內疏黃連湯

麥靈丹

俱見腫瘍門

額疔



額疔色赤堅硬形小根深左右同

額疔 額疔初起粟米形證由陽明火毒生堅硬頂凹根深固寒熱

交作麻癢疼 此證生在顴骨之間屬陽明胃經不論左右初如粟

米黃色小胞次如赤豆頂凹堅硬按似疔頭麻癢疼痛多因過食炙

博藥酒以致胃經積火成毒而生初宜蟾酥丸或麥靈丹汗之次服

黃連消毒飲消之外治法同疔門凡疔皆屬迅速之證初覺即當急

治遲則毒火攻心令人昏潰謔語惡證悉添多致不救

蟾酥丸

見頭部

黃連消毒飲

見頭部

面發毒



面發毒形如豆粒色紅堅硬

涼膈散

黃芩 薄荷 梔子

連翹

石膏

甘草

芒硝 大黃

水二鍾苦竹葉二十片煎八分加蜂

蜜三匙和服

防涼膈散醫肺胃熱口渴唇焦便燥結舌薄脆起石膏芒硝大黃苦竹葉

清涼消毒散

白芨 乳香 雄黃 天花粉 麝香 烏藥 山慈如 黃蘗 各等分共研細末雞子清和蜜水調敷

敷清涼消毒散去風熱及乳雄黃花粉麝香烏藥慈姑黃蘗研雞清蜜調毒即滅

荆防敗毒散

見頭部腦疽

面遊風



面遊風像面上起白皮形似細魚鱗

面遊風 面遊風燥熱濕成面目浮腫癢無行膚起白屑而癢極破津黃水津血疼此證生於面上初發面目浮腫癢若癢行肌膚乾燥時起白屑次後極癢拆破熱濕盛者津黃水風燥盛者津血痛楚難堪由平素血燥過食辛辣厚味以致陽明胃經濕熱受風而成癢甚者宜服消風散痛甚者宜服黃連消毒飲外抹厚風膏緩取效

厚風膏

麻黃

羌活

白檀香

升麻

白芨

防風

當歸

用香油五兩將藥浸五日文火煉黃

即撈去渣加黃蠟五錢溶化盡用絹濾過攪冷塗抹瘡上

敷厚風膏抹遊風證麻黃羌活白檀升芨防歸身香油泡煉黃

去渣加蠟凝

消風散

見頭部

黃連消毒飲

見頭部

外科要訣

疔腮圖



疔腮

體虛者宜平補之其餘治法按癰疽潰瘍門此證初起若過服涼藥令毒攻喉者險

柴胡葛根湯 柴胡 葛根 石膏 花粉 黃芩 甘草 生甘草 五分 牛蒡子 研 連翹 研 桔梗 研 升麻 研 水二

鍾煎八分不拘時服 治柴胡葛根發表證疔腮腫痛或手形石膏花粉黃芩甘草牛蒡子連翹桔梗升

四順清涼飲 防風 梔子 研 連翹 研 甘草 生 當歸 赤芍 羌活 錢各一 大黃 錢 水二鍾燈心五十寸煎八分食

遠服 治四順清涼攻裡強口乾便秘疔腮瘡防風梔子連翹當歸芍燈心羌大黃

託裡消毒散見腫瘍門

頰瘍圖



頰瘍生頰車骨

頰瘍 頰瘍胃經積熱生初如紅粟漸趨形膿出腫消易斂愈膿稀

難斂漏因成茲此證生于耳下頰車骨間由陽明胃經積熱而生始

發如粟色紅漸大如榴初起宜犀角升麻湯清解之若失治或過敷

寒藥以致肌冷凝結堅硬難消難潰者宜升陽散火湯宣發之將潰

宜託裡消毒散膿熟針之膿出腫退瘡口易斂者則愈或牙關緊急

不開或旁腫不消膿水清稀因而成漏復被寒侵瘡孔致生多骨經

年纏綿難愈者服桂附地黃丸外用豆豉餅墊灸艾壯初用九壯以知熱瘡為止每日灸之以朽骨脫出膿漸少而肌漸平為

度兼用紅升丹研入瘡口內萬應膏蓋貼每日一易患者當慎起居戒腥發等物漸漸收功

犀角升麻湯 犀角_{二錢五分} 升麻_{一錢五分} 黃芩_{八分} 白附子_{八分} 生甘草_{五分} 白芷_{八分} 川芎_{八分} 羌活_{一錢二分} 防風_{八分}

水三鍾煎(鍾食遠熱服) 歌方犀角升麻醫煩瘍色紅初起服之良黃芩白附生甘草白芷川芎羌活防

升陽散火湯 撫芎_{六分} 蔓荊子 白芍_{酒炒} 防風 羌活 獨活 甘草_生 人參_{錢一} 柴胡 香附_{各一錢五分} 葛根

錢一 升麻_{錢一} 僵蠶_{一錢五分} 生薑一片紅棗肉一枚水三鍾煎(鍾食遠溫服) 歌升陽散火過數寒牙又拘急木痛堅無

蔓荊防羌獨草參柴香附葛升蠶

託裡消毒散_{見腫} 豆豉_{餅法內} 紅升丹 萬應膏_{俱見潰瘍門}

骨槽風圖



骨槽風腮頰浮腫牙關緊急

骨槽風 骨槽風火三焦胃耳前頰隱隱疼痛筋骨仍硬痛牙關拘急失邪風_註此證一名牙文發一名穿腮發乃手少陽三焦足陽明胃二經風火也起於耳前連及腮頰筋骨隱痛日久腐潰腮之裡外筋骨仍然漫腫硬痛牙關拘急皆由邪風深襲筋骨故也此證屬在筋骨陰分故初起腫硬難消潰後瘡口難合多致不救初起熱不盛者內宜服清陽散火湯外以清胃散擦牙真君妙貼敷數貼如

初起發表之後人壯火盛者用皂刺大黃甘草節白芷僵蠶下之後減大黃加生石膏以清之然亦不可過用寒涼之藥恐其凝結也有硬腫日久失治不能盡消者膿勢將成宜用中和湯託之已潰按癰疽潰瘍門治法亦有過服寒涼以致肌肉堅凝腐臭非理中湯佐以附子不能回陽非僵蠶不能搜風如法治之諸證俱減惟牙關拘急不開宜用生薑片墊灸頰車穴二七壯其穴在耳垂下五分陷中處每日灸之兼用針刺口內牙盡處出血其牙關即開若寒熱不退形焦體削痰盛不食或口內腐爛甚則穿腮落齒者俱為逆證當腐爛之初治法即同牙疳亦不過稍盡人事耳

清胃散 薑黃 白芷 細辛 川芎 各等分共研細末先以鹽湯漱口擦牙痛處 歌清胃散擦牙腫疼薑黃白芷細辛

中湯 研先以鹽湯漱後擦此藥有奇功 芍同 白芷 桔梗 人參 黃耆_{各一錢} 藿香_五 肉桂_五 甘草 白朮_{土炒} 川芎 當歸 白芍_{各一錢酒炒} 麥門冬

五分 水二鍾薑三片棗二枚煎八分加酒一杯食遠服 方中和湯治骨槽風日久不消欲潰膿並枯參耆藿香草木

去心 芎藭芍藥門冬

理中湯見門 真君妙貼散見腫 升陽散火湯方見

發頤圖



發頤

發頤 發頤腫痛結核般經屬陽明身熱寒傷寒腫毒汗失表腫至咽喉調治難註此證又名汗毒發於頤領之間屬足陽明胃經初起身發寒熱腫如結核微熱微痛漸腫如桃如李疼痛倍增由傷寒發汗未盡或疹形未透壅積而成初起宜荊防敗毒散汗之外以二味拔毒散敷之即消如消之不應者腫痛日增勢必潰膿宜服託裡透膿湯潰後按癰疽潰瘍門治法若此證失於調治或誤投寒涼尅伐

之藥毒必內陷腫至咽喉痰湧氣堵湯水難嚥者逆

荊防敗毒散見頭部 二味拔毒散見腫 託裡透膿湯見頭部

時毒圖



時毒在於項領之間左右同

時毒 時毒初發類傷寒漫腫無頭在項間因感冒四時不正氣治分壯弱疎解症註此證初起狀類傷寒憎寒發熱令人恍惚不寧肢體痠痛或兼咽痛一二日間發於項腮頤頤作腫無頭漸漸微赤疼痛或似結核有根漫腫色赤俱由感冒四時不正邪氣客於經絡釀結而成非發於病後之頭毒也惟在醫者精察瘡色辨別虛實治法須宜疏解不可驟用寒涼致毒不外發而內攻咽喉者險矣初服荊防

敗毒散汗之其腫不消者宜服連翹消毒飲腫仍不消膿勢將成壯者宜服透膿散弱者宜服託裡透膿湯外敷二味拔毒散膿熟針之潰按癰疽潰瘍門治法

荊防敗毒散見頭部 連翹消毒散見背脊 透膿散見腫 託裡透膿湯見頭部 二味拔毒散見腫