

醫學實在易 卷五

增輯 陳倏園醫書七十種

上海廣益書局
印行

十

閻長樂陳念祖修園著

男元犀靈石參訂孫男

表證諸方

傷寒

桂枝湯 治傷風自汗頭痛項強發熱惡寒等證凡傷寒論金匱千金外臺聖濟方俱改為小劑以便時用下服此

桂枝 白芍 生薑 炙甘草

草二錢 大棗四枚 水煎服吸熱粥覆取微汗未汗再服一日夜可三服此方薑桂甘草大棗之辛甘以補陽芍

藥大棗甘草之苦甘以補陰是補劑非汗劑也妙在服後溫覆吸粥取穀氣勝邪以為汗則汗不受傷絕無變症之患

無論四時南北老幼強弱皆可服之

麻黃湯 治傷寒中風發熱惡寒頭痛身疼項強無汗而喘等證

麻黃 桂枝 炙甘草 杏仁

水三杯先煮麻黃至二杯去沫入諸藥同煮至八分溫服覆取微汗不吸粥未汗再服一日夜可三服此

方麻杏從表以發表桂甘從肌以達表不吸粥者恐其逗留麻黃之性發汗太過也

升麻葛根湯 治陽明傷寒中風頭疼身痛發熱惡寒無汗口渴目痛鼻乾不得卧及陽明發斑欲出不得出寒暄

不時人多疫疾 升麻 葛根 白芍 炙甘草 加薑煎 愚以此方葛根可用三四錢升麻只

用一錢許如川芎白芷紫蘇黃芩石膏之類俱可加入 此方非傷寒論陽明證之正方也但就表證而論陽明

以肌肉為表與太陽不同故取葛根以清肌肉之熱為君亦不吸粥者恐胃得補而增熱也 按陽明證內經以身

熱目痛鼻乾不得卧為提綱仲景以胃家實為提綱前聖後聖立說不同或從宋人用升麻葛根湯是宗內經經氣

之傳以為治也但葛根非陽明正藥以其宣肌絡除大熱取陽明主肌肉而蒸蒸發熱之義也傷寒論入手有用桂

枝湯麻黃湯法却無用葛根法而傳為白虎證以及承氣證古今之治法一轍也

小柴胡湯 治少陽病脇痛目眩耳聾口苦寒熱往來嘔吐等症此方傷寒論以太陽病邪氣欲從少陽而出取之

以助樞轉也然正少陽症亦不外此方蓋以少陽主樞柴胡為轉樞之神品切勿以發汗証之 按頭為諸陽之會傷

寒中風陽症必有頭痛經云太陽之脈其直者從顛入絡腦還出列下項循肩膊由夾脊抵腰中故太陽頭痛腦痛

上海文華書局印行

而連項脊也陽明之脈起於鼻絡於目交額中故陽明頭痛額痛而連面目也少陽之脈起於目銳眥上抵頭角下耳後其支者從耳後入耳中出走耳前故少陽頭痛耳前後痛上連頭角也

感冒

加味香蘇飲 治四時感冒風寒

紫蘇葉 三錢

香附 二錢

陳皮 川芎

蔓荊子

防風

秦艽

荊芥 各一錢

甘草 一錢

加生薑五片葱白五根水二杯半煎八分溫服覆取微汗

如傷風自汗去葱白荊芥加大棗二

枚一日夜作兩服此方代桂枝湯麻黃湯時人喜其平穩

瘧疾

二陳湯

平胃散 見傷

小柴胡湯

治脇痛口苦耳聾咽乾頭痛在側嘔逆寒熱往來等症

柴胡 四錢

人參

黃芩

生薑

炙草 各一錢

大棗 二枚

半夏 二錢

水四盞煎一盞去滓再煎至八分溫服日夜作三服

陳皮

炙草 各一錢

生薑 三片 棗 二枚

六君子湯

治脾虛痰盛為溫補之良藥

人參

白朮

茯苓

半夏 各二錢

陳皮

炙草 各一錢

生薑 三片 棗 二枚

水煎溫服

補中益氣湯

黃耆 二錢

人參

白朮

當歸

陳皮

甘草 各一錢

川升麻

柴胡 各三錢

加薑三片 棗二枚 水煎

腎氣丸

見下

瘧疾

加味香蘇飲

見上

人參敗毒散

治瘟疫及四時感冒並治噤口惡痢

人參

柴胡

前胡

羌活

獨活

川芎

茯苓

桔梗

枳殼 各一錢

甘草 八分

加生薑三片水煎服

若體壯者只用加味香蘇飲去蔓荊子加玉竹三五錢

藿香

白芷

大腹皮

紫蘇

茯苓 各一錢

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏 八兩

知母 三錢

甘草 一錢

粳米 四錢

水煎服加人參一錢五分名

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏 八兩

知母 三錢

甘草 一錢

粳米 四錢

水煎服加人參一錢五分名

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏 八兩

知母 三錢

甘草 一錢

粳米 四錢

水煎服加人參一錢五分名

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏 八兩

知母 三錢

甘草 一錢

粳米 四錢

水煎服加人參一錢五分名

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏 八兩

知母 三錢

甘草 一錢

粳米 四錢

水煎服加人參一錢五分名

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏 八兩

知母 三錢

甘草 一錢

粳米 四錢

水煎服加人參一錢五分名

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏 八兩

知母 三錢

甘草 一錢

粳米 四錢

水煎服加人參一錢五分名

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏 八兩

知母 三錢

甘草 一錢

粳米 四錢

水煎服加人參一錢五分名

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏 八兩

知母 三錢

甘草 一錢

粳米 四錢

水煎服加人參一錢五分名

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏 八兩

知母 三錢

甘草 一錢

粳米 四錢

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏 八兩

知母 三錢

甘草 一錢

粳米 四錢

水煎服加人參一錢五分名

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏 八兩

知母 三錢

甘草 一錢

粳米 四錢

水煎服加人參一錢五分名

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏 八兩

知母 三錢

甘草 一錢

粳米 四錢

水煎服加人參一錢五分名

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏 八兩

知母 三錢

甘草 一錢

粳米 四錢

水煎服加人參一錢五分名

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏 八兩

知母 三錢

甘草 一錢

粳米 四錢

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏 八兩

知母 三錢

甘草 一錢

粳米 四錢

水煎服加人參一錢五分名

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏 八兩

知母 三錢

甘草 一錢

粳米 四錢

水煎服加人參一錢五分名

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏 八兩

知母 三錢

甘草 一錢

粳米 四錢

水煎服加人參一錢五分名

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏 八兩

知母 三錢

甘草 一錢

粳米 四錢

水煎服加人參一錢五分名

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏 八兩

知母 三錢

甘草 一錢

粳米 四錢

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏 八兩

知母 三錢

甘草 一錢

粳米 四錢

水煎服加人參一錢五分名

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏 八兩

知母 三錢

甘草 一錢

粳米 四錢

水煎服加人參一錢五分名

白虎湯

治大熱大渴自汗之症

石膏 八兩

人參白虎湯日夜作三服

三一承氣湯 治一切裏實之症

大黃 芒硝 厚朴 枳實 甘草 一錢

水煎後入芒硝不如三承氣擇

用為當

防風通聖散

見中

六味湯

見脈

四物湯

見婦

陰虛盜汗症

當歸六黃湯 治陰虛發熱盜汗

當歸 生地 熟地 黃芩 黃連 黃柏 甘草 各一錢 炙黃耆 三錢 水煎服

煎服

麥附湯 治腎虛不足自汗等症

人參 一兩 附子 五錢 水煎

耆附湯 治衛陽虛而有汗 即前方以炙黃耆一兩易人參

朮附湯 治脾陽虛而挾溼自汗 即前方以白朮一兩易人參

盜汗自汗

自汗者汗自出屬陽虛宜玉屏風散如牡蠣浮小麥之類以實表補陽盜汗者身睡而汗出醒而汗收屬陰虛宜當歸六黃湯以補陰清火然陰陽有互根之理有陽虛而治其陰者陰虛而治其陽者不可不知又汗為心液宜補其心以人參養榮湯主之液主於腎宜補其腎以左右歸飲六八味丸主之總之汗以元氣為樞機苟大汗身冷必以六味回陽飲人參加至兩許方可挽回傷寒誤發其汗上焦津液乾枯必引腎水上泛外溢如水湧出名曰亡陽必以真武湯救之蓋以此湯茯苓為鎮水佐附子以回陽也

汗出不治症

汗出而喘 汗出而脈脫 汗出而身痛 汗出髮潤至巔 汗出如油 汗出如珠 凡見此類皆不得妄約

脈息

宜陰脈若漸緩者吉 忌陽脈兼短澀促結代散革者難治

玉屏風散 白朮 鈔 黃耆 防風 水煎服 愚按宜以黃耆為君可加至五七錢

蓮棗麥豆湯治盜汗方 蓮子 黑棗各七 浮麥 馬料豆各一 用水一大碗煎八分服三劑

黃耆豆湯 黃耆 馬料豆各等 一味全煎服半月愈

六味回陽飲 治陰陽俱脫汗出不止 熟地四五錢 當歸二錢 乾薑一錢 附子二錢 人參二錢 炙

草三一錢 水煎服按汗出亡陽者以茯苓換當歸再加烏梅一枚

外治法 用五倍子研末口水為丸貼臍中男用女用男用男用外以膏藥封之不走氣隔宿即止 又以龍骨牡蠣煅研為末包

稀布內擦汗粉自出以實毛竅

黃汗備方

仲景傷寒論師曰黃汗為病身體腫發熱出汗而渴狀如風水汗沾衣色正黃如柏汁脈自沈也問曰從何得之師曰以

汗出水入汗孔水從外入而得之宜黃耆芍藥桂心酒湯主之 黃耆五兩 芍藥三兩 桂心三兩 右三味切以

苦酒一升水七升和煮取三升去滓溫服一升正當心煩也至六七日稍稍自除其心煩不止者以苦酒阻故也

一方用美清醪代酒忌生蔥

又凡黃汗之病兩脰自冷假令發熱此屬臈節食已則汗出又身常夜卧盜汗出者此勞氣也若汗出即發熱者久久身

必甲錯也發熱不止者必生惡瘡也若身重汗出已輒輕者久久必身瞶瞶則胸中痛又從腰以上必汗出下無汗腰髀

弛痛如蟲在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利者名曰黃汗桂枝湯加者主之 桂枝 芍藥 炙草 生

薑各三 黃耆五兩 大棗十二 水煎

瘰癧瘻身腫發熱汗出而渴狀如風水汗出者衣皆黃黃汗吳藍湯方 吳藍 白芍 麥冬 桑白 防己 鮮皮

梔子各六 水煎

中風症

小續命湯 通治六經中風喘邪不遂語言蹇澀及剛柔二症 防風二錢 桂枝 麻黃 人參 白芍 川芎

黃芩 防己 杏仁 炙草各八 附子四分 加生薑三片棗二枚水煎服

防風通聖散 治中風傷寒瘡瘍及一切表裏俱實之症 酒大黃 芒硝 防風 荊芥 麻黃 梔子 白芍

連翹 川芎 當歸 薄荷 白朮各五 桔梗 石膏 黃芩各一 甘草二錢 滑石三錢 加蔥薑煎日可兩

服夜可一服 吳鶴皋曰防風麻黃解表藥也風熱之在皮膚者得之由汗而泄荊芥薄荷清上藥也風熱之在巔

頂者得之由鼻而泄大黃芒硝通利藥也風熱之在腸胃者得之由後而泄滑石梔子水道藥也風熱之在決瀆者

得之由溺而泄風淫於膈肺胃受邪石膏桔梗清肺胃也而連翹黃芩又所以祛諸經之遊風火之為患肝亦主之

川芎歸芍和肝血藥也而甘草白朮所以和胃氣而健脾劉守真氏長於治大此方之旨詳且悉哉

歌曰防風通聖大黃硝荊芥麻黃梔子翹甘桔歸芍滑石薄荷芥朮力偏饒

驅風至寶丹 治風中經絡臟腑及一切危證 天麻 人參 熟地 羌活 桔梗 石膏 獨活 黃芩各一

薄荷 大黃酒浸 芒硝 黃柏 荊芥 麻黃 梔子 細辛 連翹 黃連 全蝎各五 川芎三兩 白朮

半兩 白芍 當歸 防風各二 甘草二兩 滑石三兩 右二十六味共為末煉蜜丸彈子大每服一丸或二

丸細嚙茶酒任下臨卧服

侯氏黑散 治大風四肢煩重心中惡寒不足者外臺用 菊花四十 白朮 防風各十 桔梗八分 黃芩五分

細辛 乾薑 人參 茯苓 當歸 川芎 牡蠣 礬石 桂枝各三 右十四味并為散酒服方寸匕日一服

初服二十日溫酒調服禁一切魚肉大蒜常宜冷食六十日止即約積腹中不下也熱食即下矣冷食自能助藥力

方用參苓歸芍補其氣血為君菊花白朮牡蠣養其肝脾腎為臣而加防風桂枝以行痹著之氣然風以寒為師先

以細辛乾薑驅其助虐之寒大衆風而發又以黃芩桔梗疏其怫鬱之熱礬石所至除濕解毒收澀心氣酒力運行

周身為使庶傷風盡出新風不受且必為散酒服至六十日止又常冷食使藥積腹中不下蓋邪漸侵心不惡熱而

惡寒其由陰寒可知若胸中之陽不治風必不出故先以藥填塞胸中之空竅壯其中氣而邪不內入勢必外消此

即內經所謂塞其空竅是為良工之理若專治其表裏風邪非不外出而重門洞開出而復入勢將莫禦耳

地黃飲子 治足痺不能行舌瘡不能言此少陰氣厥不至名瘖痺 肉桂 附子 肉蓯蓉 茯苓 熟地 麥冬

五味子 遠志 菖蒲 石斛 山茱肉 巴戟肉各五 薄荷葉二分 水二杯煎八分服 諸藥皆質重性沈

以鎮逆上之大然火由風發則無形而行速故用輕清之薄荷為引導又微煎數沸不令諸藥盡出重濁之味俾輕清

走於陽分以散風重濁走于陰分以鎮逆製方煮法之妙如此

參附湯

汗盜

三因白散

治中風不省人事痰涎如湧真起死回生之神方也氣喘痰多用之甚效

滑石

四錢

半夏

三錢

附子

二錢

共研末生薑四片白蜜五錢水一盃半煎八分溫服寒化證脈微或脈弦四肢逆冷痰盛者用此方或

脈數手足溫為熱化症宜風引湯竹葉石膏湯之類

白虎湯

見傷寒

竹葉石膏湯

見大

黃連阿膠湯

治少陰病得之二三日以上心中煩不得臥者主之

少陰中風借

黃連

四錢

黃芩

一錢

二錢

阿膠

三錢

雞子黃

三錢

右五味以水二杯

先煮三物取一杯去滓內膠烱盡少冷內雞子黃攪

令相得溫服日三服

此為少陰熱化之症方中用黃連黃芩之苦寒以折之芍藥之苦平以降之又以雞子黃補離

中之氣阿膠補坎中之精俾氣血有清之物交媾其水火斯心煩止而得臥矣此回天手段

蘇合香丸

至寶丹

馳名藥肆中藏

溫服

人參

白朮

茯苓

陳皮

青皮

烏藥

白芷

各一

甘草

五錢

右咬咀每服三錢水一杯煎七分

勻氣散

白朮

烏藥

人參

天麻

沉香

青皮

白芷

木瓜

紫蘇

甘草

片水煎服

白朮

烏藥

人參

天麻

沉香

青皮

白芷

木瓜

紫蘇

甘草

片水煎服

滌痰湯

南星製

半夏

泥

枳實

麩炒

茯苓

各二

橘絡

一錢

石菖蒲

各一

人參

各一

竹茹

七分

加生薑

五片水一杯半煎八分食後服

竹瀝湯

治熱風心中煩悶言語蹇澀

竹瀝

荆瀝

各五

生薑汁

三合

右三味相和溫服三合以酒調服良

一方竹瀝荆瀝梨汁各二合陳醬汁半合相合微煎一二沸濾清細細灌入口中治中風不語昏沉不識人一方

竹瀝五合人乳汁二合三年陳醬汁半合三味相合分三服治熱風舌強不得語心神煩悶一方竹瀝二升生薑

汁一升生薑三合三味相合溫分三服日夜各一服劉朱李三子發揮之外後人又增惡中食中寒中暑中四症

孫男心與 按食中者過飽食填太陰上下之氣不通而厥以平胃散加減煎服或探吐之或以備急丸灌之

風引湯

治大人中風牽引小兒驚風癲癇並治顛狂癰

大黃二兩

乾薑三兩

龍骨四兩

桂枝三兩

甘草

三兩 牡蠣四兩

寒水石

赤石脂

白石脂

滑石

紫石英

石膏六兩

右十二味竹籠篩以葶藶散之取

安

心腎為君然厥陰風木與少陽相火同升火發必風生風生必挾木勢侮其脾土故脾氣不行聚液成痰流注四末

因成癰瘰故用大黃以蕩滌風火濕熱之邪為臣隨用乾薑之止而不行者以補之為反佐又取滑石石膏清金以伐

其才亦白石脂厚土以除其濕寒水石以助腎水之陰紫石英以補心神之虛為使故大人小兒風引驚癰皆主之何

後世以為石藥過多而不用反用腦腐以散真氣花蛇以增惡毒耶

白礬散

治急中風口閉涎上欲垂死者

白礬二兩

生薑一兩連皮搗水二合

右二味合研濾分三服旋旋灌之

須臾吐出痰毒眼開風退方可服諸湯散救治若氣衰力弱不宜吐之

急救稀涎散

治中風涎潮口禁氣閉不通

猪牙皂角四兩

普礬一兩

右為細末和勻輕者半錢重者

一錢七溫水調灌下不大嘔吐但微微冷涎出一二升便得醒次緩緩調治大服亦恐過傷人孫兆方

三化湯 河間云中風外有六經之形症先以加減續命湯隨症汗之內有便溺之阻隔復以三化湯下之

厚朴

枳實

大黃

羌活各等

右剉如麻豆大每服三兩水三升煎至一升半終日服之以微利為度

經云脾胃太

過則令人四肢不舉又曰土太過則敦阜阜高也敦厚也既厚而又高則令除去此真膏梁之疾非腎經虛之候也

何以明之經云三陰三陽發病為偏枯痿易王註云三陰不足則發偏枯三陽有餘則為痿易易為變易常用而痿

弱無力也其治宜三化湯瀉令氣弱陽衰土平而愈若脾虛則四肢亦不用也經云土不及則卑監卑者下也監者

陷也坑也四肢皆稟氣於胃而不得至經必因於脾乃得稟也今脾不能為胃行其津液四肢不得稟水穀氣日以

益衰脈道不利筋骨肌肉皆無氣以生故不用焉其治則宜十全散加減四物去邪留正也

肘後紫方

外療中風脊強身瘦如弓

雞屎二兩

大豆一升

防風三兩

水二升先煮防風取三合汁豆雞矢二

味煮令黃赤色用酒二升淋之去滓然後入防風汁和分再服相去人行六七里攪取微汗避風

上海文華書局印行

中風

華佗愈風散 治婦人產後中風口禁手足瘳瘳角弓反張或產後血暈不省人事四肢強直等症 荊芥微炒 每

服三錢豆淋酒調服或童子小便服之口噤則抉齒灌下約下如神王貺指迷方加當歸等分水煎服按男用之

豆淋酒法 黑豆二升熬令聲絕酒二升納鎗中急攪以絹濾取清汁送藥或專用此汁頓服取汗

續命煮散備外復榮衛却風邪 桂枝七分 白芍 甘草 防風 獨活 人參 生地 當歸 川芎 荊芥穗

細辛 遠志 乾薑 半夏各五分 右剉作一貼入薑三片水煎服

應節風

五積散 治感冒寒邪外而皮毛經絡內而臟腑上而頭項下而腰脚無有不治及痢後鶴膝風 當歸 麻黃 蒼

朮 陳皮各一錢 乾薑 白芍 枳殼各八分 半夏 白芷各七分 桔梗 炙草 茯苓 人參一本無 肉桂各五分

分 川芎四分 加生薑三片葱白二根

歌曰局方五積散神奇歸芍參芎四味宜桔芷夏苓薑桂草麻黃枳殼與陳皮

痺症

二陳湯見下

黃耆五物湯 治血痺並治一切痺症之屬虛者 黃耆 桂枝 白芍各三錢 大棗四枚 生薑四兩 水煎服

外治法筋骨之病總在經 敷古人多用外治

靈樞治之以馬矢膏其急者以白酒和桂塗其緩者以桑鈎鈎之即以桑炭置之坎中高下以坐等以膏熨急類且飲美

酒嗽美炙肉不飲酒者自強也為之三拊而已 靈樞用純酒二十升蜀椒一升乾薑一斤桂心一斤凡四種皆以咀漬

酒中用綿絮一斤細白布四丈並納酒中置酒馬矢煨中蓋封塗勿使泄五日五夜出布綿絮曝乾之乾後復漬以盡其

汁每漬必醉其日乃出乾並用滓以綿絮複布為複巾長六七尺為六七巾則用生桑炭炙中以熨寒濕所刺之處令熱

入至於病所寒復炙中以熨之三十遍而止汗出以巾拭身亦三十遍而止

薑活桂歸酒梗酒 治風寒濕痺 薑活 桂枝 秦艽 防風 續斷 附子各一錢 歸身 金毛狗脊 虎骨

錢五 杜仲 晚蠶沙各二錢 川芎八分 桑枝三錢 生薑切 大棗二枚 陳酒二觔浸一日夜煎服

集寶瘡膏

種福

川烏 草烏 南星 半夏 當歸 紅花 獨活 羌活 大黃 桃仁

各一 白芷 五錢 院僧二兩 硫黃半斤 松香一斤 生薑汁一盞 麻油一斤

右收煎好加乳香沒藥血

錫胡椒樟冰細辛牙皂木

各二錢 若加商陸根鳳仙開楊花鮮烟葉鮮蒜鮮布蒼等汁更妙

蒼朮黑豆飲

種福

治瘰癧 茅山蒼朮

水一層

蒸二次再用蜜酒蒸一次用河水在砂鍋內熬濃汁去滓隔湯燉滴水成珠為度每膏斤和煉蜜斤白湯調服

一老人專用此方壽至八十餘身輕體健甚於少年

七製松香膏

種福

治濕氣第一神方 松香三斤 第一次薑汁煮第二次葱汁煮第三次白鳳仙汁煮第四次燒酒煮

第五次開楊花汁煮第六次商陸根汁煮第七次紅醋煮 桐油三斤 川烏 草烏 蒼朮 官桂 乾薑 白芥

子 草麻

以上各四兩 血餘八兩 右八味共入桐油熬至藥枯髮消滴水成珠濾去滓入牛皮膏四兩烱化用煎製過

松香漸收之離火加樟腦一兩好麝香三錢厚紙攤之貼患神效

虎骨木通湯

種福

治一切麻木痹症痛風歷節

虎骨 木通 各等分煎湯頓頓多喫即愈

紅花白芷防風飲

種福

治歷節四肢疼痛 紅花 白芷 防風

各五錢 威靈仙三錢 酒煎服取汗三服全愈

山甲白薇澤蘭飲

種福

山甲白薇澤蘭飲

種福

治箭風俗名鬼箭打或頭項手足筋骨疼痛半身不遂等疾服方一服即愈

白薇二錢 澤蘭三錢 照分量好酒煎服

硫黃敷痛膏

種福

治痛風歷節四肢疼痛 用醋磨硫黃敷之或用葱白杵爛炒熱熨之

鶴膝風

見上

十全大補湯

十全大補湯

種福

治血氣兩虛之證 人參 白朮 茯苓 炙草 熟地 當歸 白芍 黃耆

各五錢 加大棗服 孫男心典

按鶴膝風者脛細而膝腫是也初起發熱頭痛等症宜五積散加松節或大防風

湯三氣飲之類或間送活絡丹一錢或用八味丸六味丸加鹿茸牛膝之類調補之經云膝者筋之府屈伸不能筋

將德矣薛氏云多是風邪乘虛入于三陰之經治法以溫補肝腎為主未效即須煖脾又外治二法不可不知一用

上海文華書局印行

上海文華書局印行

上海文華書局印行

芥菜子數法治初起漫腫不紅屈伸不便者乘未潰時用陳年芥菜子研細以薑汁葱涕調塗一伏時患處起泡泥乾脫皮自愈一用雷火針法治風寒濕留滯筋脈劇痛不寐用蘄艾五錢丁香五分麝香三分合研勻入紙筒中痛處襯布四五層照火焙數十過以筋脈活動為度但此二法膿腥氣不可喻嘉言曰鶴膝風者即風寒濕之痺於膝也如膝骨日大上下肌肉日枯且未可治其膝先養其氣血使肌肉滋榮後治其膝可也此與治偏枯之症大同小異急澀其末枯者使氣血流行而復榮倘不知此但麻黃防風等散風之藥鮮不全枯者故治鶴膝風者而急攻其痺必並其足痿而不用矣

腳氣

雞鳴散 治腳氣第一方不問男女皆可服 檳榔七粒 吳茱萸泥 紫蘇葉各三錢 桔梗五錢 橘紅 木瓜各

兩 生薑五錢

水三大椀煎至一小椀取汁再入水二椀煎取一小椀兩汁相和次日五更分三五次冷服之冬

月略溫亦可天明當下黑糞 寒濕之氣著於下焦而不去故用生薑吳茱萸以驅寒橘紅檳榔以除濕然驅寒除濕之藥頗多而數品皆以氣勝加以紫蘇為血中之氣藥辛香撲鼻更助其氣氣盛則行速取著者行之之義也又佐以木瓜之酸桔梗之苦經云酸苦涌洩為陰俾寒濕之氣得大氣之藥從微汗而解之解之而不能盡者更從大便以洩之戰則必勝之意也其服於雞鳴時奈何一取其腹空則藥力專行一取其陽盛則陽藥得氣也其必冷服奈何以濕為陰邪冷汁亦為陰屬以陰從陰混為一家先誘之而後攻之也

腎氣丸見下

四物湯見婦人症

暑症

天水散 又名六一散 錢五分 益元散 滑石六兩 甘草一兩 共研末以燈心湯下三錢

白虎湯見上

香薷飲 香薷三錢 厚朴二錢 扁豆三錢 水煎服 前方加黃連名黃連香薷飲治中暑熱盛口渴心煩前方

加茯苓甘草名五物香薷飲再加木瓜橘皮人參黃耆白朮各十味香薷飲

大蒜新汲水方 治中暑法 用大蒜同新黃土研爛以新汲水和之澆去渣灌入即活凡中暑傷暑不可便與

此方試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

冷物俾稍勉方可復冷物則中氣運動無患也

田中乾泥圍臍方治中暑骨節煩悶欲絕急救法取田中乾泥做一團堆在病人肚上使少壯人撒尿於泥因

肚臍中片時即得生麤矣後不可飲冷湯須進溫米湯

理中湯 通脈四逆湯 五苓散俱見傷寒論

濕症

二朮二陳湯 治諸濕及痰飲 白朮三錢 蒼朮二錢 茯苓半夏錢二 陳皮 炙草錢一 加生薑三片大棗

二枚煎

腫症

五皮飲 治一切氣腫水腫 茯苓皮 大腹皮 桑白皮 陳皮錢半 生薑皮七分 水煎服 此藥以皮治皮

不動臟腑勿以平易而忽之

四君子湯 人參 白朮 茯苓錢二 炙草一錢 加生薑大棗煎服

小青龍湯 真武湯俱見傷寒

導水茯苓湯 治水腫頭面手足遍身腫如爛水之狀按而塌陷胸腹喘滿不能轉側安睡飲食不下小便秘瀯溺出如

割或如豆汁而絕少服喘嗽氣逆諸藥不效者用此即漸利而愈 澤瀉 赤茯苓 麥冬 白朮錢三 桑白皮

紫蘇 檳榔 木瓜略一 大腹皮 陳皮 砂仁 木香各錢 每服一二兩水二杯燈草三十根煎八分食

遠服病重者可用五兩濃煎五更服

麻黃甘草湯金 麻黃三錢 甘草一錢 水二杯先煮麻黃至一杯半去滓入甘草八分服 此方上宣肺氣中助

土氣外行水氣其功居於濟生腎氣丸之上且腫症與傷寒症不同傷寒症恐過汗亡陽腫症以汗愈多愈妙水從汗

泄時醫謂須開鬼門並無亡陽之說

麻黃附子甘草湯 即前方加附子一錢五分 此與傷寒論之分數略異即以溫經散寒之法變為溫經利水之方

濟生腎氣丸 治水腫小便短少氣喘者 藥地四兩 茯苓三兩 山茱肉 懷山藥 丹皮 澤瀉 牛膝 車

前子

由桂各一兩

附子五錢

右為末煉蜜丸如梧子大燈草湯送下三錢一日兩服

神仙九氣湯

神仙言為之靈驗也九氣喜悲恐怒憂思是也經曰怒則風上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒則氣收暑則氣洩勞則氣耗思則氣結驚則氣亂故云然

薑黃 香附炒 右

各為細末每服五六錢空心淡鹽湯調服惡治膚脹用溫酒下

壹隱子曰不佞用之以治膚脹其效如神

頭痛

道遠散 治一切鬱病寒熱往來及頭痛婦人經水不調

柴胡 當歸 芍藥 白朮 茯苓各一兩 炙草八分

薄荷 水煎服

當歸補血湯

治血虛發熱如神經云勝虛則血虛血虛則發熱症係白虎惟勝不長策

炙者一兩 當歸 三錢 水煎服 尤氏金匱翼有

生地黃五錢甘草一錢

按元氏全匱謂此方各書未載陰病南味時疫名指諸其訂刻此書源亦不肯阿好

熟地四五錢 山藥 山

左歸飲 治腎水大虛能治六味丸所不能治之症妙在甘草大甘從脾以輸精于腎也

熟地四五錢 山藥 山

羊肉

各二錢或三錢

茯苓

二錢

枸杞

二錢

炙草

三錢或

水煎服 去茯苓炙草加兔絲子龜膠鹿膠牛膝蜜丸名

左歸丸

吳茱萸湯

治陽明食穀欲嘔乾嘔吐涎沫

少陰吐利煩躁欲死者

頭痛如破者

吳茱萸錢二

人參一錢

生薑

五錢

加大棗五枚水煎服

清震湯

治頭風頭面疙瘩增寒拘急發熱狀如傷寒祇務宜出此血

升麻 二錢

蒼朮 四錢

荷葉全青

水煎食

後服

透頂散

本

治偏正頭風連年近日皆效并治鼻塞不聞香臭

細辛 三錢

瓜蒂

丁香

糯米各七粒一

龍腦

半分

麝香 一分

研末置小口罐中緊塞罐口令患人口含清水隨左右搖一豆大于鼻中良久涎出即安不愈

三日後再搖孫男心典按此本金匱納藥鼻中取黃涎之法酒客多濕頭重者宜之

入法治偏正頭風以生萊菔搗汁令患者仰臥以汁灌鼻中左痛灌右右痛灌左左右俱痛俱灌之

又頭風有偏正之

殊其病皆在少陽陽明之絡以毫針刺痛處數穴立效 張石頑云外用法不若蒸法最效方用川芎半兩晚蠶沙二

兩鹽蠶如患人年歲之數以水五碗煎至三碗就砂鍋中以厚紙糊滿中間錢大一孔取藥氣熏蒸痛處每日一次雖

年久者三五次永不再發平時置新鮮木瓜於枕邊取香氣透達引散肝風亦良法也

眩暈

二陳湯見疾

一味鹿茸酒 註云緣鹿茸生于頭頭暈而主鹿茸蓋以類相從也用鹿茸兩酒煎去滓入麝香少許服

一味大黃散 丹溪云眩暈不可當者此方主之大黃酒製三次為末茶調下每服一錢至二三錢

玉液湯治 治脊核骨痛 半夏六錢湯泡七次切片 水煎去渣加沉香末少許服

咳嗽

小青龍湯 治寒飲咳嗽 麻黃 桂枝 白芍各一錢半 細辛一錢 乾薑一錢 五味子一錢 半夏三錢 炙草

一錢 水三杯先煮麻黃至二杯去沫入諸藥八分服

木乳散治 治肝咳嗽兩脇下滿 木乳即身炙樹根皮 杏仁去皮 貝母去心各 炙草一兩 共為細末姜橘湯

送下二錢

醫學實在易卷六

裏證諸方

傷寒

白虎湯 調胃承氣湯 小承氣湯俱見傷寒論

心腹諸痛

黃耆湯 治心痛胃脘痛腹痛喜按者此治虛症 黃耆一兩 當歸三錢 肉桂一錢五分 水煎服

枳實湯 治心痛胃脘及脇肋大小腹諸痛非按者此治實症 枳實三錢 半夏四錢 生薑八錢 水煎服

丹參飲 治心痛諸痛諸藥不效者如神婦人尤宜此治半虛半實者 丹參一兩 白檀香 砂仁各一錢五分 水煎服

枯萸半夏白酒湯治 治胸痹不卧背痛徹心喘咳氣短等症實症 薤白五錢 枯萸四錢 半夏三錢 白酒二杯

煎至八分溫服

醫學實在易

卷六 心腹諸痛

上海文華書局印行

理中湯 治心腹諸痛及吐瀉等症

症寒

人參 白朮 乾薑 炙草

錢各三

水煎服

通脈四逆湯 治四肢厥冷脈絕諸危症

症寒

乾薑 附子 炙草

錢各三

水煎服

腹痛加芍藥三錢

黃連湯 治胸中有熱而嘔胃有邪氣而腹痛

症熱

黃連 炙草 乾薑 桂枝

錢各一

人參 一錢

半夏 二錢

大棗 二枚 水煎服

當歸生薑羊肉湯 治腹脇諸痛裡急者並治寒疝腹中疝痛及產後腹痛不止

症寒

羊肉 一錢

生薑 一兩四分

當歸

九錢

水八茶杯煎至三杯每服一杯一日三服

若寒多者加生薑痛多而嘔者加陳皮六錢六分白朮三錢三

分若加生薑再加水三杯

小柴胡湯

方見

治脇痛多嘔寒熱往來若腹中急痛先服小建中湯二時許再服此湯

當歸四逆湯

症寒

治厥陰傷寒手足厥冷脈細欲絕者

當歸 白芍 桂枝

錢各三

炙草 細辛 木通

錢各一

大棗

四枚

水煎服 寒者加生薑豆豉更各二錢酒水各半煎

金鈴子散 治心腹諸痛服熱藥而更甚者

金鈴子 去核

元胡索

錢各等

研末以清酒送下二三錢

七氣湯 治七情氣逆諸痛

茯苓 三錢

半夏 厚朴

錢各二

紫蘇葉 一錢

加生薑三片水煎服

和劑抽刀散

川白薑 一個剉入已豆肉紐

錢各二

糯米 錢各二

良薑 一個同炒至豆黑去豆

石菖蒲 五兩半

右為末

每服二錢空心溫酒調下

仁齋直指云有一田夫醉飽之餘露星取快一枕天明自此脾疼攻刺百藥罔效淹淹數

載後遇至人授以抽刀散數服頓愈則知風露之根入在脾胃良薑菖蒲為能散其邪也蓋借氣為能伐其根觀此可

以通一畢萬矣然而痛不復作養脾之劑獨不可繼是而調理之乎療病如濯衣必去其垢汚而後可以加綴飾醫者

意也請借是以為喻

脇痛已於心腹諸症門載其方治矣然此症時下最多今又補錄於左言之不厭於複也

肝虛脇痛

肝貫膈布脇肋陰虛血燥則肝脈失養而痛其症脇下筋急不得太息目昏不明爪甲枯青遇勞即甚或忍飢即發是

也

滑氏補肝散

酸棗仁 四錢

熟地 白朮

錢各二

當歸 山茱肉 山藥 川芎 木瓜

錢各一

獨活 五味子

各

分 右為末每服五錢水煎服 肝體陰而用陽此以甘酸補肝體以辛味補肝用加獨活者假風藥以依其氣也
一方有人參黃耆石斛柏子仁桃仁無山藥獨活五味 一方阿膠為丸梧子大每服二錢空心白湯下 一方雞子
黃一枚調吞日二服

肝火脇痛

經云肝病者兩脇下痛引少腹善怒又云肝氣實則怒其脈當弦急數實其口當酸其痛必甚或煩渴二便不通

龍膽丸方

龍膽草 當歸並酒洗

梔子 黃連

黃柏

黃芩各一兩

大黃酒洗八錢

青黛

蘆薈各五錢

木香二錢半

麝香五分

蜜丸小豆大薑湯下二三十丸

瓜萸湯

治左脇痛 大瓜萸一隻重一二兩者連皮搗爛粉甘草二錢紅花五分水煎服蓋紫胡龍蒼青黛龍膽之類

苦寒益資其燥而瓜萸柔而滑潤於鬱不逆甘緩潤下故奏效捷也

息積

內經曰病脇下滿氣息二三歲不已病名曰息積夫消息者陰陽之更事也今氣聚於脇下息而不消則積而不散故
滿逆而為病然氣不在胃故不妨於食特害於氣而已治宜導引服藥藥不可獨治蓋導引能行積氣藥力亦藉導引
而行故也

推氣散

治右脇痛脹滿不食

片薑黃

枳殼

桂心各三錢

炙草三錢

為末每服二錢薑棗湯調下食遠服

赤茯苓湯

治息積脇下氣逆滿悶

赤茯苓

桂心

陳皮半兩

高良薑一兩

大腹皮五錢

甘草一分 吳

茱萸三分

每服三錢水煎日二服

白木丸

白木陳土

枳實麩炒

桂心各半兩

人參

陳皮

炙草

桔梗各半兩

右為末蜜丸梧子大空心酒下

三十九日二脇痛左屬肝主血右屬肺主氣多痰積然悲哀惱怒傷肝氣兩脇骨疼痛筋脉拘急腰脚重滯是也

枳殼煮散

枳殼四兩

細辛

桔梗

防風

川芎

葛根各二兩

甘草一兩

為粗末每服四錢水一盞半

薑棗同煎至七分空心食前服 尤在涇云悲哀煩惱肝氣致鬱枳殼能通三焦之氣故以為若肝欲散故用細辛川

芎枯搜之辛以散之肝苦急故用甘草之甘以緩之其用防葛者悲則氣飲借風藥以張之也

痰飲

二陳湯 治痰飲及諸般咳嗽之通劑

茯苓四錢

半夏二錢五分

陳皮一錢五分

炙草一錢

加生薑四片棗三枚水

煎服錢數新定

逐痰丸 治老痰頑痰變注諸種怪病

青礞石打碎入磁瓶加鐵瑣一兩以鹽水封固煎紅取出所服得三兩

大棗酒洗各

黃芩酒洗各

沉香一兩

水泛為丸每服一錢五分仰臥而勿行動二時許方行動飲食服後喉間稠粘塞乃藥與病相拒少頃自

愈

桂苓甘水湯

治痰飲頭暈欲嘔心下悸小便不利等症

茯苓四錢

白朮

桂枝各三錢

炙草一錢

水煎服錢數新定

桂附八味丸

治腎虛諸病但小便不利者宜之

熟地黃四兩

山茱肉

懷山藥各二兩

茯苓

丹皮

瀉兩各半

附子炮

肉桂各五錢

蜜丸如梧子大每服五十九米湯下以美饈壓之 王肯堂云相火寄于命門命

門者男子以藏精女子以繫胞因嗜慾竭之火無所附故厥而上行桂附與火同氣而其味辛能開腠理致津液通氣

道據其密宅而招之同氣相求火必降下矣且大從腎出者是水中之火也大可以水折而水中之火不可以水折故

巴蜀有大井焉得水則熾得火則熄則桂附者固治浮游相火之正劑歟

神仙墜痰丸

黑牽牛取頭末

皂角酥炙

白朮生各一兩

為末水丸梧子大酒下三五十丸

控涎丹

甘遂

大戟

白芥子各等分

糊丸臨臥薑湯服五七丸至十丸痰猛加丸數

十棗湯

礞石見上

礞石見上

礞石見上

礞石見上

礞石見上

礞石見上

礞石見上

礞石見上

青礞石見上

治食積成痰

青礞石見上

青礞石見上

青礞石見上

青礞石見上

青礞石見上

青礞石見上

青礞石見上

月以明發感

右為細末神麴糊入薑汁為丸如桐子大每服三五十九薑湯下

一方有枳實倍礞石

一方有枳實倍礞石

一方有枳實倍礞石

一方有枳實倍礞石

一方有枳實倍礞石

一方有枳實倍礞石

一方有枳實倍礞石

竹瀝丸

半夏

陳皮

白朮

茯苓

大黃

黃芩

人參

炙草

瀝一大碗

薑汁三匙拌勻晒乾如此五六度仍以竹瀝薑汁糊丸小豆大每百丸臨臥薑湯下

按沈香似宜於臨

製時入之久晒恐洩香味

製時入之久晒恐洩香味

製時入之久晒恐洩香味

製時入之久晒恐洩香味

製時入之久晒恐洩香味

製時入之久晒恐洩香味

半夏丸

治脇疾結實滿悶喘逆

半夏薑汁製

半夏薑汁製

半夏薑汁製

半夏薑汁製

半夏薑汁製

半夏薑汁製

半夏薑汁製

半夏丸

治脇疾結實滿悶喘逆

半夏薑汁製

半夏薑汁製

半夏薑汁製

半夏薑汁製

半夏薑汁製

半夏薑汁製

半夏薑汁製