

全国护士执业资格考试用书编写专家委员会 | 编写

2014

全国护士执业资格考试指导 同步练习题集

全国护士执业资格考试用书编写专家委员会 | 编写

2014

全国护士执业资格考试指导 同步练习题集

图书在版编目(CIP)数据

2014 全国护士执业资格考试指导同步练习题集/全国护士
执业资格考试用书编写专家委员会编写. —北京:人民卫生
出版社,2013.9

ISBN 978-7-117-17934-8

I. ①2… II. ①全… III. ①护士-资格考试-习题集
IV. ①R192.6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 195673 号

人卫社官网	www. pmph. com	出版物查询, 在线购书
人卫医学网	www. ipmph. com	医学考试辅导, 医学数 据库服务, 医学教育资 源, 大众健康资讯

版权所有, 侵权必究!

2014 全国护士执业资格考试指导 同步练习题集

编 写: 全国护士执业资格考试用书编写专家委员会

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph @ pmph. com

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 北京市安泰印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 19

字 数: 462 千字

版 次: 2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-17934-8/R · 17935

定 价: 60.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ @ pmph. com

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)

出版说明

根据《护士条例》(2008年,国务院第517号令)、《护士执业注册管理办法》(2008年,卫生部第59号令)和《护士执业资格考试办法》(2010年,卫生部、人力资源社会保障部第74号令)精神,护士岗位实行准入制度,护士必须通过护士执业资格考试才能申请执业注册。护士执业资格考试实行统一考试大纲、统一命题、统一合格标准的全国统一考试制度。考试原则上每年举行一次,以加强对考生实践能力的考核为目标要求。自2011年起,护士执业资格考试由原来的四个科目改变为专业实务和实践能力两个科目,一次考试通过两个科目为考试成绩合格。

为贯彻护士执业资格考试相关文件精神,帮助广大考生更好地了解新护考,做好考前复习工作,特组织国内知名专家成立了全国护士执业资格考试用书编写专家委员会,严格按照最新护士执业资格考试的具体要求,结合最新考试大纲的精神,参考国内外有关著作,编写了《2014全国护士执业资格考试指导》。为了满足不同考生的需求,同时编写了3本配套用书,即《2014全国护士执业资格考试指导 要点精编》、《2014全国护士执业资格考试指导 同步练习题集》和《2014全国护士执业护士资格考试 模拟试卷》,由人民卫生出版社出版和发行。

《2014全国护士执业资格考试指导》打破原有的基、内、外、妇、儿的分类方法,将疾病按系统分类,按照疾病在临床工作中出现的频率,列出了护士在执业过程中可能会遇到的常见疾病。根据在特定的疾病背景下,护士为完成特定的护理任务所需要的特定护理知识,以及完成护理工作应该具备的医学基础知识、护理专业知识和技能以及与护理工作有关的社会医学、人文知识等进行编写。本书充分考虑了现行的护理教学模式,将现行护理教学模式与最新护士执业资格考试大纲的精神要求有机结合,是国内最权威、最具指导性的护士执业资格考试用书。

《2014全国护士执业资格考试指导 要点精编》针对考生不同阶段的复习要求,在《2014全国护士执业资格考试指导》的基础上进行浓缩精编,提取其中的要点、难点、考点,编写而成。

《2014全国护士执业资格考试指导 同步练习题集》以《2014全国护士执业资格考试指导》为蓝本,按照《2014全国护士执业资格考试指导》的章节排序。遵循科学、严谨、客观、规范的题目命制要求,依据新护考的考试大纲和考试方案精神编写。考题模拟临床情景,着重考查考生的护理专业知识和临床操作能力,题型全面,题量丰富。建议与《2014全国护士执业资格考试指导》配合使用,随学随测,及时有效地考查和反馈复习成果,强化记忆。其中部分重点、难点习题附详细解析,分析考点、答题思路和方法,帮助考生尽快理解和掌握相关知识。

《2014全国护士执业资格考试 模拟试卷》依据最新护士执业资格考试方案精神的要求,选取考查全面、难度适宜的题目,参照护士执业资格考试实际考试科目划分、题型匹配、题量设计原则进行组卷。旨在帮助考生熟悉考试题型,了解题量,准备把握和分配作答时间。建议考生在学习《2014全国护士执业资格考试指导》的基础上,作为考前冲刺、自测使用。

本套丛书编写方案经过编写专家委员会反复论证后确立,精心编制而成。

欢迎广大考生与专业人士来信交流学习:zyhs2011@163.com

目 录

第一章 基础护理知识和技能	1	第五章 传染病病人的护理	142
一、A ₁ 型题	1	一、A ₁ 型题	142
二、A ₂ 型题	7	二、A ₂ 型题	144
三、A ₃ 型题	33	三、A ₃ 型题	147
四、A ₄ 型题	37	四、A ₄ 型题	148
五、答案列表	38	五、答案列表	149
六、重点难点习题解析	41	六、重点难点习题解析	149
第二章 循环系统疾病病人的 护理	48	第六章 皮肤及皮下组织疾病病人 的护理	150
一、A ₁ 型题	48	一、A ₁ 型题	150
二、A ₂ 型题	54	二、A ₂ 型题	150
三、A ₃ 型题	62	三、A ₃ 型题	150
四、A ₄ 型题	64	四、A ₄ 型题	151
五、答案列表	65	五、答案列表	151
六、重点难点习题解析	67	六、重点难点习题解析	151
第三章 消化系统疾病病人的 护理	69	第七章 妊娠、分娩和产褥期疾病的 护理	152
一、A ₁ 型题	69	一、A ₁ 型题	152
二、A ₂ 型题	76	二、A ₂ 型题	154
三、A ₃ 型题	87	三、A ₃ 型题	164
四、A ₄ 型题	95	四、A ₄ 型题	166
五、答案列表	102	五、答案列表	167
六、重点难点习题解析	104	六、重点难点习题解析	168
第四章 呼吸系统疾病病人的 护理	115	第八章 新生儿和新生儿疾病的 护理	171
一、A ₁ 型题	115	一、A ₁ 型题	171
二、A ₂ 型题	119	二、A ₂ 型题	171
三、A ₃ 型题	133	三、A ₃ 型题	172
四、A ₄ 型题	135	四、答案列表	173
五、答案列表	138	第九章 泌尿生殖系统疾病病人的	
六、重点难点习题解析	139		

护理	174	疾病病人的护理	244
一、A ₁ 型题	174	一、A ₁ 型题	244
二、A ₂ 型题	176	二、A ₂ 型题	244
三、A ₃ 型题	183	三、A ₃ 型题	246
四、A ₄ 型题	187	四、答案列表	247
五、答案列表	188		
六、重点难点习题解析	189		
第十章 精神障碍病人的护理	191	第十五章 内分泌、营养及代谢疾病	
一、A ₁ 型题	191	病人的护理	248
二、A ₂ 型题	192	一、A ₁ 型题	248
三、A ₃ 型题	195	二、A ₂ 型题	249
四、答案列表	197	三、A ₃ 型题	253
		四、A ₄ 型题	254
第十一章 损伤、中毒病人的		五、答案列表	255
护理	198	六、重点难点习题解析	255
一、A ₁ 型题	198	第十六章 神经系统疾病病人的	
二、A ₂ 型题	200	护理	257
三、A ₃ 型题	207	一、A ₁ 型题	257
四、A ₄ 型题	209	二、A ₂ 型题	258
五、答案列表	211	三、A ₃ 型题	262
六、重点难点习题解析	212	四、A ₄ 型题	263
		五、答案列表	264
第十二章 肌肉骨骼系统和结缔组织		六、重点难点习题解析	265
疾病病人的护理	215	第十七章 生命发展保健	267
一、A ₁ 型题	215	一、A ₁ 型题	267
二、A ₂ 型题	216	二、A ₂ 型题	269
三、A ₃ 型题	219	三、A ₃ 型题	271
四、A ₄ 型题	220	四、答案列表	272
五、答案列表	221		
六、重点难点习题解析	221	第十八章 中医护理基础	273
		一、A ₁ 型题	273
第十三章 肿瘤病人的护理	223	二、A ₃ 型题	274
一、A ₁ 型题	223	三、答案列表	275
二、A ₂ 型题	227		
三、A ₃ 型题	231	第十九章 护理管理	276
四、A ₄ 型题	233	一、A ₁ 型题	276
五、答案列表	236	二、A ₂ 型题	276
六、重点难点习题解析	237	三、A ₃ 型题	279
		四、A ₄ 型题	279
第十四章 血液、造血器官及免疫		五、答案列表	280

六、重点难点习题解析	280	第二十一章 人际沟通	290
第二十章 护理伦理与法规	281	一、A ₁ 型题	290
一、A ₁ 型题	281	二、A ₂ 型题	291
二、A ₂ 型题	287	三、A ₃ 型题	292
三、答案列表	289	四、答案列表	292

第一章 基础护理知识和技能

一、A₁ 型 题

1. 静脉输液引起发热反应的常见原因是输入液体
A. 量过多 B. 速度过快
C. 温度过低 D. 时间过长
E. 制剂不纯
2. 采用热疗法促进炎症局限的机制是
A. 解除肌肉痉挛
B. 促进软组织松弛
C. 降低细胞新陈代谢
D. 溶解坏死组织
E. 降低神经兴奋性
3. 足底忌用冷疗是防止
A. 一过性冠状动脉收缩
B. 末梢循环障碍
C. 局部组织坏死
D. 体温骤降
E. 心律异常
4. 乙醇拭浴时,在头部放置冰袋的目的是
A. 控制炎症的扩散
B. 减少脑细胞需氧量
C. 防止头部充血
D. 减轻局部疼痛
E. 控制毒素吸收
5. 为全麻未清醒患者用热水袋时,水温不应超过
A. 40℃ B. 50℃ C. 60℃
D. 70℃ E. 80℃
6. 服用止咳糖浆的正确方法是
A. 饭前服,服后立即饮少量水
B. 饭后服,服后立即饮大量水
C. 睡前服,服后立即饮少量水
D. 咳嗽时服,服后立即饮大量水
E. 在其他药物后服,服后不立即饮水
7. 关于碘过敏试验,正确的是
A. 静脉注射造影剂前不用做皮内试验
B. 试验方法包括口服法、眼结膜试验法
C. 皮内注射试验时皮丘直径超过 2cm 即可判断为阳性
D. 口服后出现眩晕、心慌等表现即可判断为阳性
E. 过敏试验阴性者,造影时不会发生过敏反应
8. 输液过程中导致静脉痉挛的原因是
A. 输液速度过快
B. 液体注入皮下组织
C. 针头阻塞
D. 患者肢体抬举过高
E. 输入的药液温度过低
9. 血液病患者最适用的血制品是
A. 新鲜血 B. 库存血
C. 纤维蛋白原 D. 新鲜血浆
E. 冰冻血浆
10. 发生溶血反应后,为增加血红蛋白在尿中的溶解度,常用
A. 枸橼酸钠 B. 氯化钠
C. 碳酸氢钠 D. 乳酸钠
E. 葡萄糖酸钙
11. 采集粪便标本检查阿米巴原虫前,将便盆加热的目的是
A. 减少污染 B. 保持原虫活力
C. 降低假阳性率 D. 降低假阴性率
E. 使患者舒适
12. 需用抗凝管采血检查的项目是
A. 甘油三酯的测定 B. 肝功能检查

- C. 血清酶测定 D. 尿素氮测定
E. 血钠测定
13. 采集粪便标本做隐血试验时应**禁食**
A. 牛奶 B. 西红柿
C. 动物肝脏 D. 豆制品
E. 土豆
14. 使用电动吸引器吸痰时,储液瓶内的吸出液应及时倾倒,**不应超过瓶的**
A. 3/4 B. 2/3 C. 1/2
D. 1/4 E. 1/5
15. **禁忌**洗胃的患者是
A. 幽门梗阻者 B. 昏迷者
C. 食管静脉曲张者 D. 胆囊炎患者
E. 胃溃疡患者
16. 判断患者临床死亡期的主要指标是
A. 肌张力减退
B. 瞳孔对光反射消失
C. 桡动脉搏动不可触及
D. 机体新陈代谢障碍
E. 身体温度接近室温
17. 临床上进行尸体料理的依据是
A. 呼吸停止 B. 各种反射消失
C. 心跳停止 D. 意识丧失
E. 医生做出死亡诊断后
18. 出院后医疗护理文件应保管于
A. 出院处 B. 住院处 C. 医务处
D. 护理部 E. 病案室
19. 临时备用医嘱的有效期为
A. 6 小时 B. 12 小时 C. 24 小时
D. 36 小时 E. 48 小时
20. 需要专人负责、加锁保存并列入交班内容的药物是
A. 可待因 B. 柴胡
C. 地西洋 D. 硝酸甘油
E. 胎盘球蛋白
21. 嘱患者服药时,应**避免**接触牙齿的药物是
A. 扑热息痛 B. 抗菌优
C. 硝酸甘油 D. 洋地黄
E. 硫酸亚铁糖浆
22. 患者在住院期间,其医疗护理文件应保管于
A. 病房 B. 住院处 C. 护理部
D. 医务处 E. 病案室
23. 高热、中暑的患者使用冷疗法的目的是
A. 减轻局部充血或出血
B. 减轻疼痛
C. 控制炎症扩散
D. 降低体温
E. 使患者舒适
24. 药物保管中,剧毒药瓶上的标签颜色是
A. 蓝色 B. 红色 C. 黑色
D. 绿色 E. 黄色
25. 应放在 4℃ 冰箱内保存的药物是
A. 青霉素 B. 氨茶碱
C. 强的松 D. 苯巴比妥钠
E. 胎盘球蛋白
26. 发挥药效最快的给药途径是
A. 静脉注射 B. 皮下注射
C. 口服 D. 外敷
E. 吸入
27. 宜饭前服用的药物是
A. 胃蛋白酶合剂 B. 颠茄合剂
C. 维生素 C D. 氨茶碱
E. 溴化铵
28. 超声波雾化器在使用中,水槽内水温超过一定温度应调换冷蒸馏水,此温度是
A. 30℃ B. 40℃ C. 50℃
D. 60℃ E. 70℃
29. 关于 TAT 脱敏注射法,正确的是
A. 分 2 次、量由小到大、每隔 20 分钟注射 1 次
B. 分 3 次、量由小到大、每隔 20 分钟注射 1 次
C. 分 3 次、量平均、每隔 20 分钟注射 1 次

- D. 分4次、量由小到大、每隔20分钟注射1次
E. 分4次、量平均、每隔20分钟注射1次
30. 对纠正体内电解质失调有显著效果的溶液是
A. 浓缩白蛋白 B. 右旋糖酐
C. 晶体溶液 D. 血浆
E. 全血
31. 对维持血浆胶体渗透压、增加血容量、升高血压有显著效果的溶液是
A. 林格液
B. 生理盐水
C. 5%葡萄糖溶液
D. 10%葡萄糖溶液
E. 中分子右旋糖酐
32. 血液病患者最适宜输入
A. 血浆 B. 库存血
C. 新鲜血 D. 白蛋白
E. 水解蛋白
33. 患者大量输入库存血后容易出现
A. 低血钾 B. 高血钾 C. 低血磷
D. 高血铁 E. 高血钠
34. 使用前需放在37℃温水中提温的血液制品是
A. 普通血浆 B. 干燥血浆
C. 冰冻血浆 D. 新鲜血
E. 库存血
35. 成人胸外心脏按压频率是
A. 40~60次/分 B. 60~80次/分
C. 80~100次/分 D. 100~120次/分
E. 120~140次/分
36. 为成年人进行人工呼吸的吹气量约为
A. 100~200ml B. 300~400ml
C. 500~600ml D. 700~1100ml
E. 1200~1300ml
37. 尸斑通常出现在死亡后
A. 2~4小时 B. 4~6小时
C. 6~8小时 D. 8~10小时
E. 10~12小时
38. 患者住院病历排在首页的是
A. 化验结果报告 B. 长期医嘱单
C. 临时医嘱单 D. 入院记录
E. 体温单
39. 护士处理医嘱时,应先执行
A. 新开的长期医嘱 B. 长期备用医嘱
C. 临时备用医嘱 D. 临时医嘱
E. 停止医嘱
40. 利于黏稠痰液吸出的方法是
A. 体位引流
B. 雾化吸入
C. 增加吸痰次数
D. 缩短吸痰间隔时间
E. 延长每次吸痰时间
41. 插导尿管前,再次消毒女性小阴唇的顺序是
A. 自上而下,由内向外
B. 自上而下,由外向内
C. 自下而上,由内向外
D. 自下而上,由外向内
E. 由外向内再由内向外
42. 皮内注射是将药液注入
A. 表皮 B. 真皮
C. 皮下组织 D. 表皮与真皮间
E. 真皮与皮下组织间
43. 皮下注射的进针角度为
A. 0~5° B. 30°~40° C. 45°
D. 60° E. 90°
44. 静脉输液时,茂菲滴管内的液面自行下降,原因是
A. 输液瓶挂得太高
B. 输液速度过快
C. 环境温度太低
D. 患者肢体摆放不当
E. 滴管或滴管以下导管有漏气

45. 口服给药注意事项中正确的是
- 铁剂、阿司匹林宜饭前服
 - 服止咳糖浆后宜多饮水
 - 服磺胺类药物后应多饮水
 - 服强心苷类药物前先测血压
 - 镇静安神药宜清晨空腹服用
46. 组织损伤破裂的患者局部**禁用**冷疗的理由是
- 防止冻伤
 - 防止引起反射性心率减慢
 - 防止引起腹泻
 - 冷疗可减少血液循环,影响愈合
 - 防止引起一过性冠状动脉收缩
47. 门诊结束后,门诊护士应
- 检查候诊、就诊环境
 - 备齐各种检查器械
 - 回收门诊病案
 - 整理检验报告
 - 收集初诊病历
48. 遇有交通事故,急诊预检护士应立即通知
- 家属
 - 总值班
 - 医务科
 - 护士长
 - 医院保卫部门
49. 遇到灾害性事件,急诊预检护士应立即通知
- 家属和陪护者
 - 值班医生
 - 抢救室护士
 - 护士长和有关科室
 - 医院保卫部门或公安部门
50. 急诊护士在抢救过程中,正确的是
- 任何情况下,护士不执行口头医嘱
 - 输液瓶、输血袋用后及时按医用垃圾处理
 - 急救药品的空安瓿经患者检查后方可丢弃
 - 抢救完毕,请医生第2天补写医嘱与处方
 - 口头医嘱向医生复述一遍,经双方确认无误后方可执行
51. 白天病区较理想的声音强度范围是
- 55~60dB
 - 50~55dB
 - 45~50dB
 - 40~45dB
 - 35~40dB
52. 引起医院内感染的主要因素**不包括**
- 严格监控消毒灭菌效果
 - 介入性诊疗手段增加
 - 抗生素的广泛应用
 - 医务人员不重视
 - 易感人群增加
53. 能杀灭所有微生物以及细菌芽胞的方法是
- 清洁
 - 消毒
 - 抑菌
 - 灭菌
 - 抗菌
54. **不适合**用干烤法灭菌的是
- 玻璃制品
 - 橡胶制品
 - 陶瓷类
 - 粉剂
 - 油剂
55. 煮沸消毒金属器械时,为了增强杀菌作用和去污防锈,可加入
- 氯化钠
 - 硫酸镁
 - 稀盐酸
 - 碳酸氢钠
 - 亚硝酸钠
56. **不适合**用煮沸消毒法消毒的是
- 灌肠筒
 - 搪瓷药杯
 - 玻璃量杯
 - 纤维胃镜
 - 橡胶管
57. 关于煮沸消毒法,正确的是
- 煮沸10分钟可杀灭多数细菌芽胞
 - 水中加入亚硝酸钠可提高杀菌效果
 - 橡胶类物品在冷水中或温水中放入
 - 中途加入其他物品,需等再次水沸后再开始计时
 - 物品需全部浸入水中,相同的容器应重叠放在一起

58. 不能用于金属物的消毒的是
A. 燃烧法 B. 干烤法
C. 煮沸消毒法 D. 微波消毒灭菌法
E. 压力蒸汽灭菌法
59. 臭氧灭菌灯适合消毒
A. 橡胶导管 B. 化验单据
C. 医院污水 D. 食品
E. 被服
60. 不适合电离辐射灭菌的是
A. 一次性输血器 B. 宫内节育器
C. 治疗碗 D. 橡胶管
E. 清蛋白
61. 能够杀灭芽胞的化学消毒剂是
A. 过氧乙酸 B. 乙醇
C. 碘酊 D. 碘伏
E. 氯己定
62. 使用 2%戊二醛浸泡手术刀片时,为了防锈,在使用前可加入
A. 5%碳酸氢钠 B. 5%亚硝酸钠
C. 0.5%醋酸钠 D. 0.5%亚硝酸钠
E. 0.5%碳酸氢钠
63. 关于碘酊和碘伏,正确的描述是
A. 碘酊属于低效消毒剂,碘伏属于中效消毒剂
B. 碘酊对黏膜刺激性强,碘伏对黏膜无刺激
C. 碘酊和碘伏都用于皮肤和黏膜等的消毒
D. 碘酊对金属有腐蚀性,而碘伏没有
E. 皮肤对碘过敏者禁用碘酊
64. 浸泡消毒金属器械适宜选用
A. 过氧化氢 B. 漂白粉
C. 戊二醛 D. 碘酊
E. 碘伏
65. 适宜用于黏膜和创面消毒的是
A. 过氧化氢 B. 戊二醛
C. 碘酊 D. 碘伏
E. 乙醇
66. 新洁尔灭与肥皂同用,影响其消毒效果的原因是
A. 降低浓度 B. 拮抗失效
C. 引起分解 D. 引起污染
E. 吸附作用
67. 护士进行晨间护理的内容不包括
A. 协助患者排便,收集标本
B. 协助患者进行口腔护理
C. 发放口服药物
D. 整理床单位
E. 问候患者
68. 晚间护理的目的是
A. 提醒陪护人员离开病室
B. 保持病室美观、整洁
C. 保持患者清洁舒适
D. 做好术前准备
E. 进行卫生宣教
69. 晚间护理的内容包括
A. 经常巡视病房,了解患者睡眠情况
B. 协助患者排便,收集标本
C. 整理病室,开窗通风
D. 协助患者进食
E. 发放口服药物
70. 高热持续期的特点是
A. 产热大于散热
B. 产热持续增加
C. 散热持续减少
D. 散热增加而产热趋于正常
E. 产热和散热在较高水平上趋于平衡
71. 适宜测量口腔温度的是
A. 幼儿 B. 躁狂者
C. 呼吸困难者 D. 极度消瘦者
E. 口鼻手术者
72. 速脉常见于
A. 发热患者
B. 动脉硬化患者
C. 颅内压增高患者
D. 房室传导阻滞患者

- E. 甲状腺功能减退患者
73. 测量呼吸时护士的手不离开诊脉的部位主要是为了
- 易于记录时间
 - 保持患者体位不变
 - 易于观察呼吸的深浅度
 - 不被患者察觉,以免紧张
 - 保持护士姿势不变,以免疲劳
74. 吸气性呼吸困难多见于
- 喉头水肿患者
 - 代谢性酸中毒患者
 - 支气管哮喘患者
 - 呼吸中枢衰竭患者
 - 慢性阻塞性肺疾病患者
75. 代谢性酸中毒患者的呼吸为
- 浅快呼吸
 - 蝉鸣样呼吸
 - 鼾声呼吸
 - 叹息样呼吸
 - 深而规则的大呼吸
76. 测血压时,松开气门使汞柱缓慢下降,听到第一声搏动音时,袖带内压力
- 大于心脏收缩压
 - 等于心脏收缩压
 - 小于心脏收缩压
 - 等于心脏舒张压
 - 小于心脏舒张压
77. 脉压增大常见于
- 主动脉瓣关闭不全
 - 缩窄性心包炎
 - 心包积液
 - 肺心病
 - 心肌炎
78. 测血压时,应该注意
- 测量时血压计“0”点与心脏、肱动脉在同一水平
 - 固定袖带时应紧贴肘窝,松紧能放入一指为宜
 - 听诊器胸件应塞在袖带内便于固定
 - 测量前嘱患者先休息 10~20 分钟
 - 放气速度应慢,约 2mmHg/s
79. 属于医院基本饮食的是
- 低盐饮食
 - 软质饮食
 - 高热量饮食
 - 高蛋白饮食
 - 糖尿病饮食
80. 属于治疗饮食的是
- 要素饮食
 - 软质饮食
 - 流质饮食
 - 胆囊造影饮食
 - 吸碘试验饮食
81. 伤寒患者最适宜的饮食是
- 低盐饮食
 - 少渣饮食
 - 高热量饮食
 - 低胆固醇饮食
 - 高膳食纤维饮食
82. 胆囊造影前一日晚餐应给予
- 高脂肪、高蛋白饮食
 - 高热量、高蛋白饮食
 - 高热量、低蛋白饮食
 - 无脂肪、低蛋白饮食
 - 低蛋白、低糖饮食
83. 潜血试验前 3 天,患者应禁食
- 豆制品
 - 西红柿
 - 肉类
 - 牛奶
 - 土豆
84. 甲状腺吸¹³¹I 测定,检查前 7~60 天,可食用的食物是
- 海蜇
 - 紫菜
 - 海带
 - 淡菜
 - 淡水鱼
85. 长期鼻饲者,定期更换胃管的时间是
- 1 天
 - 3 天
 - 7 天
 - 10 天
 - 14 天
86. 不需要记入排出量的内容是
- 胸腹腔吸出液
 - 胃肠减压液
 - 胆汁引流液
 - 呕吐液
 - 汗液
87. 高热患者应给予
- 流质饮食
 - 普通饮食
 - 软质饮食
 - 低盐饮食
 - 低热量饮食

88. 在治疗性环境中,工作人员应做到“四轻”
- A. 谈话轻、走路轻、动作轻、开门轻
 - B. 说话轻、走路轻、动作轻、开门轻
 - C. 说话轻、走路轻、操作轻、关门轻
 - D. 谈话轻、走路轻、操作轻、开门轻
 - E. 说话轻、走路轻、动作轻、关门轻
89. 湿度过高时,人体会
- A. 神经系统受到抑制
 - B. 口干舌燥、咽痛
 - C. 尿液排出量增加
 - D. 肌肉紧张
 - E. 出汗增多
90. 室温过高时,人体会
- A. 肌肉紧张,产生不安
 - B. 神经系统受到抑制
 - C. 加快机体散热
 - D. 促进体力恢复
 - E. 尿量增加
91. 颅内压过低引起头痛的机制是
- A. 牵张颅内静脉窦
 - B. 脑部充血
 - C. 脑部缺血
 - D. 脑膜炎症
 - E. 脑细胞缺氧
92. 单人搬运法,适合于
- A. 小儿及体重轻者
 - B. 体重较重者
 - C. 腿部骨折者
 - D. 颅脑损伤者
 - E. 老年患者
93. 使用约束用具时,患者肢体应保持
- A. 功能位置
 - B. 患者喜欢的位置
 - C. 常易变换的位置
 - D. 治疗的强迫位置
 - E. 生理运动位置
94. 骨科某护士对本科室油纱条进行灭菌,应该实行的灭菌法是
- A. 燃烧法
 - B. 干烤法
 - C. 光照法
 - D. 熏蒸法
 - E. 压力蒸汽灭菌法
95. 膀胱刺激征的主要症状有
- A. 高热、尿频、尿急
 - B. 高热、尿少、尿急
 - C. 尿频、尿急、尿痛
 - D. 尿频、尿急、腹痛
 - E. 血尿、尿急、尿痛
96. 易氧化和遇光变质须装在有色密盖瓶中保存的药物是
- A. 糖衣片
 - B. 巴比妥
 - C. 地西洋
 - D. 氨茶碱
 - E. 胃复安
97. 对严重烧伤、大出血、休克患者采用静脉输液治疗的目的是
- A. 补充水分及电解质
 - B. 补充营养,供给热量
 - C. 输入药物,治疗疾病
 - D. 增加循环血量,改善微循环
 - E. 改善心脏功能
98. 某患者正在行氧气疗法,其流量表指示流量为 4L/min,该患者的吸入氧浓度是
- A. 21%
 - B. 26%
 - C. 49%
 - D. 37%
 - E. 41%
99. 心肺复苏作为最主要的急救技术之一,主要包括
- A. 胸外心脏按压,开放气道,人工呼吸
 - B. 人工呼吸,胸外心脏按压,电除颤
 - C. 胸外心脏按压,静脉输液,电除颤
 - D. 吸痰,人工呼吸,胸外心脏按压
 - E. 心电图检查,人工呼吸,电除颤

二、A₂ 型 题

100. 患者女性,62岁,风湿性关节炎,每日红外线照射 20 分钟,现照射中患者局部皮肤出现桃红色均匀红斑,说明
- A. 照射剂量过小
 - B. 照射剂量过大
 - C. 照射剂量合适

- D. 应立即停止照射
E. 应延长照射时间
101. 长期留置导尿管的患者,出现尿液混浊、沉淀或结晶时应
A. 经常清洁尿道
B. 膀胱内用药
C. 热敷下腹部
D. 多饮水,并定时进行膀胱冲洗
E. 经常更换体位
102. 患者男性,41岁,浅昏迷2日,为患者行留置导尿最主要的目的是
A. 保持床单位清洁干燥
B. 测量尿量及比重,了解肾血流灌注情况
C. 收集尿标本,作细菌培养
D. 防止尿潴留
E. 持续引流尿液,促进有毒物质排出
103. 患者男性,54岁。3天未排便,遵医嘱给予开塞露灌肠,应嘱患者保留灌肠液的时间是
A. 立即排出
B. 5~10分钟
C. 15分钟
D. 30分钟
E. 60分钟
104. 患者男性,65岁。尿失禁,予留置导尿管,定期进行膀胱冲洗。在冲洗过程中需要停止冲洗并报告医生的情况是
A. 剧烈疼痛
B. 感觉不适
C. 冲洗液混浊
D. 冲洗不畅
E. 冲洗速度过快
105. 患者女性,26岁。出现肠胀气,予肛管排气后缓解不明显,再次进行排气时应间隔
A. 2~3小时
B. 60分钟
C. 40分钟
D. 30分钟
E. 15分钟
106. 患者男性,48岁,因结肠癌入院,遵医嘱做术前肠道准备,灌肠过程中患者出现速脉,面色苍白,出冷汗,心慌气促,护士的正确处理措施是
A. 移动肛管
B. 停止灌肠
C. 挤捏肛管
D. 提高灌肠筒高度
E. 嘱患者张口呼吸
107. 患者男性,60岁。患失眠症,遵医嘱给予10%水合氯醛20ml,9pm行保留灌肠。正确的操作是
A. 灌肠液的温度为28℃
B. 嘱患者右侧卧位
C. 液面与肛门距离35~40cm
D. 将臀部垫高10cm
E. 将肛管插入直肠7~9cm
108. 为患者行大量不保留灌肠,当患者有便意时,处理方法为
A. 转动肛管
B. 抬高灌肠筒
C. 立即停止灌肠
D. 嘱患者快速呼吸
E. 降低灌肠筒
109. 患者女性,43岁。中暑,体温41.5℃,遵医嘱灌肠为患者降温,正确的做法是
A. 选用0.1%~0.2%肥皂水
B. 用4℃的0.9%氯化钠溶液
C. 灌肠液量每次<500ml
D. 灌肠时患者取右侧卧位
E. 灌肠后患者保留1小时排便
110. 患者男性,35岁。在剖腹探查术后3日出现腹部胀痛,体检:腹部膨隆,叩诊呈鼓音。最佳的处理方法是
A. 清洁灌肠
B. 保留灌肠
C. 大量不保留灌肠
D. 肛管排气
E. 服药导泻
111. 患者女性,28岁。近日出现尿急、尿频,排出的新鲜尿液有氨臭味,提示为
A. 尿毒症
B. 膀胱炎
C. 肾结石
D. 肾积水

- E. 糖尿病酮症酸中毒
112. 患者男性,72岁,休克,护士遵医嘱留置导尿管,其目的是
- A. 做尿培养检查
B. 引流潴留的尿液
C. 训练膀胱功能
D. 保持会阴部清洁干燥
E. 记录尿量观察病情变化
113. 患者男性,54岁,因外伤致尿失禁,行留置导尿,尿液引流通畅,但尿色黄,混浊,医嘱抗感染治疗。护士护理患者时应注意
- A. 记录尿量
B. 及时更换尿管
C. 必要时清洗尿道口
D. 指导患者练习排空膀胱
E. 鼓励多饮水并行膀胱冲洗
114. 患者男性,66岁,因直肠癌将于次日手术,手术前做肠道清洁准备,护士正确的做法是
- A. 行大量不保留灌肠一次,排出粪便
B. 行小量不保留灌肠一次,排出粪便
C. 行保留灌肠一次,刺激肠蠕动,促进排便
D. 反复多次行大量不保留灌肠,至排出澄清液
E. 采用开塞露通便法,排出粪便及气体
115. 患者女性,50岁,尿潴留需行导尿术,初次消毒时,首先消毒的部位是
- A. 大阴唇 B. 小阴唇 C. 尿道口
D. 阴阜 E. 肛门
116. 患者男性,45岁,膀胱高度膨胀且极度虚弱,一次放尿过多可导致血尿,其原因是
- A. 腹压急剧下降,致大量血液滞留于腹腔血管内
B. 膀胱内压突然降低,导致膀胱黏膜急剧充血
- C. 操作过程中损伤尿道内口
D. 尿道黏膜发生损伤
E. 操作中损伤输尿管
117. 患者女性,47岁,肝昏迷,为患者灌肠时不宜用肥皂水,其原因是
- A. 防止发生腹胀
B. 防止发生酸中毒
C. 防止对肠黏膜的刺激
D. 减少氨的产生与吸收
E. 避免引起顽固性腹泻
118. 患者男性,46岁,已10余小时未排尿,腹胀,为非尿路阻塞引起的尿潴留,用温水冲洗会阴的目的是
- A. 分散注意力,减轻紧张心理
B. 利用条件反射促进排尿
C. 清洁会阴防止尿路感染
D. 利用温热作用预防感染
E. 使患者感觉舒适
119. 患者男性,34岁,阿米巴痢疾,为患者做保留灌肠时,应让患者采取右侧卧位,其目的是
- A. 利于药液保留
B. 减少对患者刺激
C. 使患者舒适安全
D. 缓解患者痛苦
E. 减轻药物毒副作用
120. 患者男性,34岁,因外伤瘫痪导致尿失禁,留置导尿,尿液出现浑浊、色黄,护理时应注意
- A. 经常清洗尿道口
B. 进行膀胱冲洗
C. 及时更换导尿管
D. 观察尿量并记录
E. 促进膀胱功能恢复
121. 患者女性,30岁,近几天来平均尿量为14ml/h,应视为
- A. 多尿 B. 少尿 C. 无尿

- D. 尿潴留 E. 正常尿量
122. 患者男性,胃、十二指肠溃疡出血,经对症治疗后出血停止,大便隐血阳性,出血期间,患者大便呈
A. 鲜红色 B. 暗红色 C. 柏油色
D. 果酱色 E. 黄褐色
123. 患者女性,56岁,近日来出现咳嗽、打喷嚏时不自主排尿现象,这种现象称为
A. 压力性尿失禁
B. 反射性尿失禁
C. 急迫性尿失禁
D. 功能性尿失禁
E. 部分尿失禁
124. 一糖尿病患者,口服降糖药效果欠佳,遵医嘱皮下注射胰岛素治疗,不属于重点观察的一项是
A. 有无心慌 B. 出冷汗
C. 神志不清 D. 眩晕
E. 体温变化
125. 按照药物保管要求,应放置在2~10℃冰箱内的药品是
A. 白蛋白 B. 氨茶碱
C. 维生素C D. 酵母片
E. 苯巴比妥钠
126. 患者女性,50岁,因患呼吸系统疾病,需同时服用几种药物,最后服用的药物是
A. 维生素
B. 罗红霉素
C. 维生素B₁
D. 复方甘草口服液
E. 乙酰半胱氨酸胶囊
127. 患者女性,60岁,因充血性心力衰竭住院,医嘱地高辛0.25mg,每日一次,护士发药时应特别注意
A. 研碎药片再喂服
B. 服药后不宜多饮水
C. 给药前测量脉率
D. 叮嘱患者按时服药
E. 患者服药后再离开
128. 患者女性,32岁,不慎割破手指,医嘱TAT肌肉注射,立刻执行。患者行TAT过敏试验,结果阳性,正确的做法是
A. 禁用TAT注射
B. 备好抢救物品,直接注射TAT
C. 注射肾上腺素等药物抗过敏
D. 采用脱敏疗法注射TAT
E. 再做过敏试验并用生理盐水做对照试验
129. 患者女性,50岁,上呼吸道感染,医嘱口服磺胺药抗感染,护士嘱其服药后多饮水,目的是
A. 维持血液pH值
B. 增强药物疗效
C. 减轻胃肠道刺激
D. 避免损坏造血系统
E. 加快药物溶解避免结晶析出
130. 患者女性,46岁,因COPD需要做雾化吸入,医嘱使用氨茶碱,其目的是
A. 消除炎症
B. 减轻黏膜水肿
C. 解除支气管痉挛
D. 保持呼吸道湿润
E. 稀释痰液使其易于咳出
131. 患者男性,45岁,护士为其静脉注射25%葡萄糖溶液时,患者自述疼痛,推注时稍有阻力,推注部位局部隆起,抽无回血,此情况应考虑是
A. 静脉痉挛
B. 针头部分阻塞
C. 针头滑出血管外
D. 针头斜面紧贴血管壁
E. 针头斜面部分穿透血管壁
132. 患者女性,24岁,肺炎,医嘱青霉素治疗。患者在青霉素皮试后2分钟突然出现休克,护士首先应