

卷

臨江指南醫案

卷二

一

第 五 冊

月 月

眩暈
頭風
虛勞
欬嗽

臨江指南醫案

文益書
行

吳江徐靈胎先生評本

增補

臨證指南醫案

附種福堂公選良方

凡例

一此案出自數年採輯。隨見隨錄。證候錯雜。若欲考一證難於彙開。余不揣固陋。稍分門類。但兼證甚多。如虛勞。咳嗽。吐血。本同一證。今各分門。是異而同也。即如欬嗽。有虛實標本六氣之別。今合為一門。是同而異也。如暑濕而兼癰痢。脾胃病而兼嘔吐。腫脹。凡若此者。不可勝數。欲求分晰。至當不易。余本不業醫。且年已古稀。自謝不敏。而俟高明之輩。翻刻改正。一證之中。有病源各異。如虛勞有陰虛陽虛。陰陽兩虛之不同。若再分門。恐有繁冗之嘆。今將陰虛先列於前。繼列陽虛。繼陰陽兩虛。使觀者無錯雜之憾。餘門倣此。

一此案分門類時。已剔去十之二三。今一門之中。小異而大同者尚多。本應再為剔選。但細閱之。小異處卻甚有深意。無意處亦多故不敢妄為去取。且如建中湯。麥門冬湯。復脈等湯。稍為加減。治證甚多。若再為刪削。不足以見先生信手招來。頭頭是道。其用方變化無窮之妙矣。

一每閱前人醫案。治貧賤者少。蓋醫以濟人為本。視貧富應同一體。故此案不載稱呼。僅刻一姓與年歲。如原案已失記者。則以一某字代之。至於婦女之病。年高者但將一嫗字。中年以一氏字。年少用一女字別之。然有本係婦女。而案中未經註明者甚多。不敢臆度。強為分別。

一醫道在乎識證立法。用方。此為三大關鍵。一有卓率。不堪為司命。往往有證既識矣。却立不出好法者。或法既立矣。却用不出至當不易好方者。此謂學業不全。然三者之中。識證尤為緊要。若法與方。只在平日看書多記。至於識證。須多參古聖先賢之精義。由博反約。臨證方能卓然定見。若識證不明。開口動手便錯矣。今觀此案。其識證如若洞垣。所用法與方。皆宗前賢。而泰以己意。稍為加減之。故案中有並非杜撰之句。亦有杜撰處余願業醫者。於識證尤當究心。如儒家參悟性理之功。則臨證自有把握。然後取此法與方用之。必有左右逢源之妙矣。倘閱是書者。但據拾其辭句。剽襲其方藥。藉此行道。為覓利之計。則余與刻是書之一片誠心。大相悖矣。幸後之覽者。捫心自問。切勿墮落此坑塹。

一此案須知看法。就一門而論。當察其病情。病狀。脈象各異處。則知病名雖同。而源不同矣。此案用何法。彼案另用何法。此法用何方。彼法另用何方。從其錯綜變化處。細心參玩。更將方中君臣佐使之藥。合病源上細細體貼。其古方加減一二味處。尤宜理會。其辨證立法處。用硃筆圈出。則瞭如指掌矣。切勿草率看過。若但得其皮毛。而不得其神髓。終無益也。然看此案。須文理清通之士。具虛心。活潑靈機。曾將靈素及前賢諸書。參究過一番者。方能領會此中意趣。吾知數人之中。

近日此書
甚多并有
批語其理
而論其理
論者

傷寒之旨義
六經現近
不得入
諸門獨
此一症
於傷寒
無獨開
而之一
也

僅有一二知音。潛深默契。若初學質魯之人。未能躡等而進。恐徒費心神耳。

一此案惟開火證一門。

夫本朝人火證居多。獨此症則不成書矣。蓋火有七情六氣五志之不同。證候不一。難於彙輯。故

竟不分門。至於傷寒。惟太陽初感風寒為甚。寒既化熱之後。種種傳變之證。散見諸門者頗多。此病不能散見。觀者自能會意。

勿謂先生長於治離證。短於治傷寒。觀其用仲景諸方。活潑潑地。即可以知其治傷寒之妙矣。

一案中治法如作文之有平澀奇淡。諸法悉備。其用藥有極輕清治平淡者。取效更捷。或疑此法僅可治南方柔弱之質。不能治北方剛強之體。余謂不然。苟能會悟其理。則藥味分量。或可權衡輕重。至於治法。則不可移易。蓋先生立法之所在。即理之所在。不遵其法。則治不循理矣。南北之人。強弱雖殊。感病之由則一也。其補瀉溫涼。豈可廢繩墨而出範圍之外乎。況姑蘇商旅雲集。案中豈乏北省之人哉。不必因其輕淡而疑之。或又曰。案雖佳。但未知當時惡

乎。理。今案中評證。方中議藥。咸合於理。據理設施。自必有當。至於效與不效。安得

一案中有未經載明。難於稽考。處如藥味分量。泡製九方。煎方相混。與

一人連用幾方者。其間相隔日月遠近。併四季時令。俱未註明。惜皆

一每門之後。附論一篇者。因治法頭緒頗繁。故挈其綱領。稍為敘述之。

志措辭不必高古。觀者幸勿因其俚鄙而忽之。

一案中所用丹丸。有一時不能猝辦者。如紫雪丹。至寶丹。驚風散。至

病人。既可穩穩。亦不至於虧本。

一此案之刻。不過一嚮之味耳。本欲再為購求。廣刻行世。奈無覓處。倘

刻。然此案雖非全璧。實具種種良法。已足啟發愚蒙。嘉惠來茲。學者

奇。孟浪。瞻法諸弊。其於醫學有功不小。

一凡治諸症。俱有初中末三法。如傷寒初起。邪在太陽。則用麻黃桂枝

用胃苓湯加減。目疾初起。則用柴薄荊防以升散之。此皆初治之大略。

治者不過十之二三。其故何歟。蓋緣先生當年名重一時。延請匪易。故

生耳。故初治之案甚少。觀是書者。其中先後淺深。層次不可紊亂。須細

臨證指南醫案總目

卷一

中風

肝風

眩暈

頭風

虛勞

欬嗽

卷二

吐血

失音

肺痿

遺精

陽痿

脫肛

木乘土

淋濁

汗

脾胃

腫脹

積聚

痞

噎膈

吐衄

不食

腸痺

寒

卷三

嘔吐

胸痺

喘呃

疳

風

便閉

肺痺

溫熱

暑

疳

瘧

寒

風溫

濕熱

不寐

瘧痧疹瘰

三消

痰飲

卷四

鬱

燥

疫

錯

瘧

脾痺

溫

肝火

不寐

瘧痧疹瘰

三消

痰飲

瘧

瀉

脫肛

痿

痺

脾厥

卷五

痢

便血

脫肛

痿

痺

脾厥

驚

癰瘤

衄

疳

頭痛

心痛

胃脘痛

脇痛

腹痛

肩臂背痛

腰腿足痛

諸痛

卷六

耳

目

鼻

牙

咽喉

瘰癧

調經

淋帶

崩漏

胎前

產後

瘰癧

熱入血室

幼科要畧

痧疹

癰疽

蟲

集方

卷七

疳

疳

勞

癰疽

咳

吐

中風

補益

瘧

盜汗

便閉

風寒濕痺

針灸

瘰癧

瘧

膈

便閉

風寒濕痺

卷八

黃疸

瘰癧

弱血

目

癰疽

諸丹毒

代針點頭

雀斑

初生

疳積

胎前

河白

瘡

疔氣

鼻

疔

無名腫毒

長肉收口

疣痣

雪口

產後

中暑霍亂

泄瀉

心口胃脘痛

口

瘡瘡結毒

跌打損傷

麻藥

脂風

經帶

消渴

痢

呃逆

舌

下疳

團藥

瘤癭

稀痘方

血崩漏

瘟疫

脫肛

欬逆

牙

中毒

提藥

諸風

痧症

乳疾

痧

痔漏

耳

咽喉

諸瘡

降藥

疥藥

急慢驚風

雜症

臨證指南醫案卷一

古吳葉桂天士先生著

游關李天瞻翰圖
錫山華南田岫雲同較

邵銘新圖

肝腎
虛內
風動

錢

偏枯在左血虛不榮筋骨內風襲絡脈左緩大無補熱之弊
准牛膝二兩 明天麻二兩 三角胡麻二兩打碎水
用三汁膏加蜜丸極細早服四錢滾水送

制全首烏四兩
黃甘菊三兩水煎汁
川石斛四兩水煎汁
小黑豆皮四兩水煎汁

枸杞子去蒂二兩
歸身二兩用獨
枝者去根

歸身二兩用獨
枝者去根

陳

四十歲肝血腎液內枯陽擾風旋乘數大忘風藥寒涼
去心 牡蠣 此方畧用血藥
陳四十歲肝血腎液內枯陽擾風旋乘數大忘風藥寒涼
去心 牡蠣 此方畧用血藥

炒杞子

桂圓肉

炒菊花

炙黑甘草

黃芪

金

失血有年陰氣久傷復遺憂悲悵陽披內風大冒血含自空氣乘於左口喎肢麻舌喑無聲足痿不耐行走
明明肝腎虛陰氣不主上承重培其下冀得風熄議以河間法
黃肉二兩 牛膝二兩 遠志二兩 杞子二兩 菊花二兩 五味二兩 川斛二兩 茯神二兩 淡菴蓉乾二兩

沈

四十歲脈細而數細為臟陰之虧數為營液之耗上年夏秋病傷更因冬暖失藏入春地氣升肝木風動遂令右肢
偏痺舌本絡強言塞都因根蒂有虧之症庸俗泄氣降痰發散攻風再劫真陰漸漸神潰如寐倘加昏厥將何療
治議用仲景復脈法復脈湯去薑桂

又

操持經營神耗精損遂令陰不上朝內風動躍為痺中之象治痰功刻溫補陰愈損傷枯槁日甚幸以育陰熄
風小安今夏熱益加發泄真氣更虛日餌生津益氣勿忘大暑不加變動再商調理固本丸去熟地加北味
天冬 此病用此 人參 無意 麥冬 此等症總 五味

金

六月初起神景遺溺之病也 老人厥中顯然數月來夜不得寐是陽氣不交於陰勿謂痰火專以攻消乃下虛

陽升
熱蒸
液虧

案中者熱
者按出病
症所在與
方之合否
相對方合
者對不合
者對不合
若近日耳
食之難地
必用熟地
此大何嘗
近日常食
之人必用
此方作煎
剖去大陰

非中二
不達

此虛宜心
腎同治而

增臨證指南醫案

卷一

中風

一

上海文益書局石印

治心之藥

為主

人參

龍齒

麥草

難經云肝

者之藥明

指肝金為

剛而不為

柔今云則

出藏未如何

言此乃金

德之文也

此當扶正

北邪虛五

味補病

發不治矣

不納議與滑陽 此方治下亦安但必當有治上之方不可缺也

龜腹甲心 熟地炭 乾菝蓉 天冬 生虎脛骨 淮牛膝 炒杞子 黃柏

虛 喘怒動陽 恰值春木司令厥陰內風乘陽明脈絡之虛上凌咽喉環連耳後清空之地升騰太過脂液無以營

養四末而指節為之麻木是皆非中根明所謂下虛上實多致顛頂之疾夫情志鬱之熱閱方書無不連苦降

羌防辛散之理肝為剛臟非柔潤不能調和也 鮮生地 元參心 桑葉 丹皮 羚羊角 連翹心 方甚清涼

又生地 阿膠 牡蠣 川斛 知母

汪五左肢麻木膝蓋中牽綴忽如針刺中年後精血內虛虛風自動乃陰中之陽損傷確是養血驅風之品 淡菝蓉乾而

拘杞三 歸身二 生虎骨二 沙苑二 巴戟天二 明天麻二 桑寄生四

精羊肉膠阿膠丸早服四錢交冬加減用人參丸服

錢八用力努持精液溺管滲出以經兩耳失聰腎氣失司顯然虛象凡腎液虛耗肝風偏張身肢麻木內風暗襲多

有難中之累滋液煇風溫柔藥涵養肝腎經言肝為剛臟而腎臟急燥若攻風劫痰捨本求末矣 熟地 當用 生地

拘杞 菝蓉 石菖蒲 當歸 沙苑 巴戟 遠志

張九中風以後肢麻言塞足不能行是肝腎精血殘傷虛風動絡下寒二便艱阻凡腎虛忌燥以辛潤溫藥

菝蓉 拘杞 當歸 柏子仁 牛膝 巴戟 川斛 小茴

陳九中格舌音不言痛自足起漸上麻木腹脹已屬痼疾參苓益氣兼養血絡僅堪保久

人參 茯苓 白朮 拘杞 當歸 白芍 天麻 桑葉

周 大寒主旺節候中年勞傷陽氣不藏內風動越令人麻痺肉瞤心悸汗泄煩躁乃裏虛欲暴中之象東南封固

護陽為主無暇論及痰飲他歧補作痰飲奈 人參 黃芪 附子 熟朮

某 陽明脈絡空虛內風暗動右肩臂及指麻木 玉屏風散加當歸天麻童桑

俞氏寡居一十四載獨陰無陽平昔操持有勞無逸當夏四月陽氣大泄主令忽然右肢麻木腿陰如墮不舉汗出

麻冷陰氣心中卒痛而呵欠不已大便不通診脈小弱豈是外感病象似乎難中其因在乎意傷憂愁則肢廢也

表疎 胃虛 衛疎 陽虛

麻疎 胃虛 衛疎 陽虛

麻疎 胃虛 衛疎 陽虛

麻疎 胃虛 衛疎 陽虛

麻疎 胃虛 衛疎 陽虛

麻疎 胃虛 衛疎 陽虛

攻風刮痰之治。非其所宜。大旨以固衛陽為主。而宣通脈絡佐之。

桂枝

方病

附子

生薑

炒遠志

片薑黃

羌活

美活

天麻

煨薑

南棗

氣虛

唐六男子右屬氣虛。麻木一年。入春口眼歪邪。非風乃虛風內動。老年力衰。當時令之發泄。忌投風藥。不得純用。

以固衛益氣

人參

黃芪

白朮

炙甘草

廣皮

歸身

天麻

煨薑

燥熱

胡五陽明脈絡已空。厥陰陽氣易逆。風勝為腫。熱久為燥。面熱喉古乾。渴。心中填塞。無非陽化內風。胃受衝侮。不飢。

不納矣。有年久延。頗慮非中。

羚羊角

此方清和可用連翹

丹皮

黑山梔

青菊葉

元參

花粉

天麻

胃虛

張五難速致紛紛亂藥。馬望向安。議用固陽明一法。

此當兼用陰藥

桂枝木

生黃芪

川熟附

炒遠志

龍骨

牡蠣

薑

東

陽升

劉六神傷思慮則肉脫。意傷憂愁則肢廢。皆瘵象也。緣高年陽明脈虛。加以愁煩。則厥陰風動。木橫土衰。培中可效。

若窮治風痰。便是劫燥。則謬。

此方調中而仍加風藥。不似前之變補矣。

黃芪

於朮

桑寄生

天麻

白蒺藜

白蒺藜

白蒺藜

肝胃

包

老

年

隆

冬

暴

暴

暴

暴

暴

同治

明厥陰主治法以候裁。

此方頗平穩。但重人參。

茯苓

白茯苓

炒半夏

茯苓

廣皮

炒杞子

甘菊

甘菊

胞絡

沈

風

中

康

康

康

康

康

康

康

阻礙

宣

宣

宣

宣

宣

宣

宣

宣

宣

宣

熱邪

宣

宣

宣

宣

宣

宣

宣

宣

宣

宣

增

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

皆以通陰

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

凡治厥陰

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

皆以通陰

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

凡治厥陰

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

皆以通陰

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

凡治厥陰

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

皆以通陰

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

凡治厥陰

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

皆以通陰

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

凡治厥陰

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

皆以通陰

年

年

年

年

年

年

年

年

年

年

風濕中脾

艾炙絡熱

脫

腎陰虛肝風動

至寶丹

程脈濡無熱厥後右肢偏痿口喎舌歪聲音不出此陰風濕晦中於脾絡加以寒滯湯藥散其清陽致清氣無由

展舒法宗古人星附六君子湯益氣仍能攻風祛痰若曰風中康景乃任脈為病與太陰脾絡有間矣

人參 茯苓 新會皮 香附汁 南星薑汁 竹節白附子薑汁

呂陽邪襲經絡而為偏痺血中必熱艾炙反助絡熱病劇廢食清涼固是正治然須柔劑不致傷血且有熄風功

能方論俱佳 犀角 羚羊 生地 元參 連翹 橘紅 膽星 石菖蒲

楊中後不復交至節四日寒戰汗泄遂神昏不醒是陰陽失於交戀真氣欲絕有暴脫之虞擬追回陽攝陰法

人參 乾薑 淡附子 五味 猪膽汁

又人參錢三附子錢三此方用於寒戰汗泄者尚宜若一轉關即當易方也 又人參 附子 龍骨 牡蠣 五味

龔厥症脈虛數病在左軀腎虛液少肝風內動為病偏枯非外來之邪

製首烏 生地 杞子 茯神 明天麻 菊花 川斛 熟地 淡菴蓉 杞子 牛膝

徐四水虧風動古強肢麻中絡之象當通補下焦復以清上最妙

五味 遠志 羚羊角 茯苓 麥冬 菖蒲 蜜丸

丁大寒節真氣少藏陽拔內風旋動以致痺中古邊亦有苔滯忌投攻風刮痰益腎涼肝治本為法

生地 元參 麥冬 川斛 遠志 石菖蒲 蔗漿 此方補而不滯

曾五脈弦動膝重耳聾行步氣促無力肛痔下垂此未老欲衰腎陰弱收納無權肝陽熾虛風蒙竅乃上實下虛之

象腎厚填陰甘味熄風節勞戒飲可免仆中 虎潛去鎖陽知母加大肉從蓉煨蜜丸

張脈細小帶弦交幸藏納少固遂至痺中百餘日來諸患稍和惟語言欲出忽塞多言似少相續此皆腎脈不營

否絡以致機數少宣乃虛象也早用地黃飲子煎法以治下此方尚宜 晚用星附六君子以益虛宮竅

某娘今年風木司天春夏陽升之候乘因平昔怒勞憂思以致五志氣火交併於上肝膽內風鼓動熾旋上盛則下

虛故足膝無力肝木內風壯火乘襲胃土胃主肌肉脈絡應肢遠出環口故唇舌麻木肢節如癱固為中厥之

丸方亦清
測不賦

觀河間內火召風之論都以苦降辛泄少佐微酸最合經旨折其上騰之威使清室諸數母使濁痰壯火蒙蔽乃
暫藥權衡也至於調養工夫寒暄保攝尤當加意於藥餌之先 上午服 金石斛 化橘紅 真北秦皮

錢 草決明 錢 冬桑葉 錢 白茯苓 錢 嫩鉤藤 錢 生白芍 錢

又 煎訖苦辛酸降一法肝風胃陽已折其上引之威是諸症亦覺小愈雖曰治標正合歲氣即候而設思夏至一

陰來復高年本病預宜持護自來中厥最防於暴寒驟加致身中陰陽兩不接續耳議得攝納肝腎真氣補益下

虛本病 九製熟地 先用水煮半日徐加神酒砂仁再煮一日 肉苁蓉 用大黑皮者去甲切片盛竹筴內放

雨 不通 主虎膝 肯另拆碎 准牛膝 三兩 製首烏 四兩 川草解 鹽水炒 川石斛 八兩 赤白茯苓 今

雨 柏子霜 二兩 右藥照方製末另用小黑穠豆皮八兩煎濃汁法丸每早百滾水服三 議晚上用健中運

痰兼制三陽火動風生從外臺伏苓飲意 人參 二兩 熟半夏 二兩 茯苓 四兩 廣皮 肉 二兩 川連 薑汁炒

枳實 二兩 明天麻 二兩 鉤藤 三兩 白茯苓 淨炒去刺三兩 地栗粉 二兩 右末用竹漚一杯薑汁十匙法

丸食遠開水服三 又 近交秋令燥氣加臨先傷於上是為肺燥之咳然下焦久虛厥陰透咽少陰陰循喉往常口燥舌燥是下虛陰火

又 迭越先治時病燥氣化火暫以清潤上焦其本病再議 白扁豆 三錢 玉竹 三錢 白沙參 錢 麥冬 三錢

甜杏仁 研二錢 象貝母 去心勿 冬桑葉 錢 捲心竹葉 錢 洗白糯米七合清湯煮煎

又 暫服聖方 北沙參 錢 生白扁豆 錢 麥冬 錢 乾百合 半 嗽痛忌人 白茯苓 一錢 甜杏仁 去皮尖

又 痰火上實清數為蒙於暑夜兼追清上方法 麥冬 八錢 冬桑葉 錢 亦人所不知 天冬 四兩 以米 八兩 柿霜 四兩 長條

又 白沙參 八兩 生白扁豆 八兩 甜梨汁 二兩 甘蔗漿 二兩 水煎膏真柿霜收每服五錢開水送下

又 夏熱秋燥陽津陰液更傷口齒咽喉受病都屬陰火上乘氣熱失降使然進手太陰清燥甘涼方法甚安其深

又 秋初冬調理大旨以清上實下則風熄液潤不致中厥至冬至一陽初復再議此方甚無法非

燕窩菜 洗淨另熬 不入 甜梨 去皮核細袋 人參 另熬收 九製熟地 水煎 天冬 二兩 去心 蒸 來冬 去心

黃芪皮 生用 炙甘草 二兩 五味 二兩 雲茯神 三兩 天冬 二兩 去心 蒸 來冬 四兩

中風 上海文益書局石印

此方試誤，需要元整

人參、鹿角、白蜜、同煎、不用秋石、而用沉香、琥珀、古方、如此、今復、改其法、甚、為不妥、從、古為妙、今、則大失、製、方之義矣、

扁豆生用
清肺熱用
補脾向有
此說然終
宜炒用

又左關尺脈獨得動數多語則舌音不清麻木偏著右腕心中熱熾難以名狀此陽明脈中空乏而厥陰之陽挾肉風以糾擾真氣不主藏聚則下無力以行動虛假之熱上泛為喉燥多咳即下虛者上必實意冬主後早服方從丹溪虎潛法

九製熟地照前法製八兩 肉從蓉照前製四兩 天冬去心蒸烘四兩 當歸炒焦二兩 生白芍三兩 川斛蒸黃八兩

黄柏二鹽水炒

淮牛膝
三鹽
兩水

右為末另用虎骨膠

一兩溶入蜜中

丸服五錢滾水送

又太諸恙向安今春三月陽氣正升肝木主乎氣候肝為風臟風亦屬陽卦變為巽兩陽相合其勢方張內風

挾陽動旋脂液暗耗而麻痺不已獨甚於四肢者風淫未疾之謂也經云風淫於內治以甘寒夫痰壅無形之火火灼有形之痰甘寒生津痰火風兼治矣

天冬四兩 麥冬八兩 長白沙參八兩 明天麻四兩 白蒺藜照前製四兩

甜梨汁

蘆根汁用流水煮八兩

青蔗漿
鮮竹瀝

稀霜

先將一冬沙參天

白痰加泉水煎汁

過配入四汁同熬成膏後加柿霜收每日下午食遠服五錢百滾水調服

又下虛上實君相火亢水涸液虧多有暴然跌仆之虞此方滋液救焚使補力直行下焦不助上熱誠鐵寶中先

生瓊玉膏方 鮮生地水洗淨搗自然汁二觔綿紙濾清隨和入生白沙蜜一觔另置一鉛罐或圓鉛罐盛煎藥封堅固用鐵鍋滿盛清水中做井字木架放罐在上桑柴火煮三晝夜頻紙水不可住火至三日後連器沒冷水

中一日頃取出後項藥
人參蘇州所產白茯苓蘇州所產直秋石蘇州所產

三味拌入前膏如乾豆沙樣收貯小口磁瓶內扎好勿令洩氣每早自滾水調服五六錢

又交後三日診得左脈小弦重數右手和平略盛貼得春夏平安交秋後有頭暈左目流淚足痠無力不能行

走舌生紅和微咳不瘳此皆今年天氣太熱已久熱則真氣弛越虛則風再旋經言瘧生大熱熱耗津液而舌

咳嗽流涕者風陽升於上也上則下焦無氣矣故補脾以攝氣氣在胃而浮上安一其右甘涼不傷脾胃

[illegible]

角八兩
熱風
助津液
日員
舌刺
亥救
議以甘
藥養其
胃陰
老年
納穀
為貴
生扁豆

四
麥冬四
上沙參三

天花粉重二兩 甘蔗漿十二兩 柿霜二兩 白花百合四兩 熬膏加飴糖兩許每服時滾水調服三四錢晚上服

此等不入
格然亦清
宜可毒

以上諸方
清和乎淡
不失古人
之法何以
爲附藥氏
乃通曉金
說者俱與
相反此大
下當合究
矣

又 液燔下虧陽挾內風上引陰不上承舌絡強則言蹇氣不注脈則肢痿乏力步趨凡此皆肝腎臟陰本虛鎮補
之中微通通陽爲法以臟液虛不受純溫藥耳 水製熟地兩 阿膠兩 女貞實兩 稽豆皮兩 淡肉從

蓉兩 茯神兩 旱蓮草兩 川石斛兩 用精羯羊肉膠爲丸早上滾水服四五錢

又 暫服煎方 生地 沙參 羌蔚子 黑稽豆皮 川斛 牛膝

又 晚服丸方 九蒸桑葉兩 三角胡麻兩 九製首烏兩 白茯苓兩 人參兩 炙甘草兩 酸棗仁兩

又 改仁兩 右爲末桂圓肉三兩煎湯法丸每服三錢百滾水下

又 今年天符歲會 過上半年陽氣大泄見病都屬肝胃以厥陰爲風臟而陽明爲盛陽耳陰陽不肯相依熱必暴

來厥中過大暑可免以暑濕大熱更多開泄致元氣不爲相接耳然此本虛極實氣火升騰所致經旨以苦寒鹹

潤酸池少佐微辛爲治議進補陽明泄厥陰法

人參兩 生牡蠣錢 生白芍錢 烏梅肉兩 川黃連兩 熟半夏兩 上午服

又 人參兩 茯苓兩 鹽水炒黃連兩 半夏兩 鹽水炒廣皮兩 枳實兩 白茯苓兩 雞子黃兩

又 生白芍兩 烏梅肉兩 右爲末竹瀝法丸早上服三錢百滾湯下

又 夏月連酸苦泄熱和胃通降爲陽明厥陰治甚安入秋涼爽天人漸有收肅下降之理緣有年下虧木少水泄

相火內風旋轉量灼胃脘逆冲爲嘔舌絡被薰則絳赤如火消渴便阻猶刺事耳凡此仍屬中厥根萌當加慎靜

養爲宜凡治此等症必兼驅風消痰方有出路一味滋補中病而不能去病不可不知也

又 生雞子黃兩 阿膠兩 生白芍錢 生地錢 天冬一錢 川連一分 上午服

又 心火亢上皆爲營液內耗先以補心湯理心之用

又 人參兩 川連兩 犀角兩 元參兩 鮮生地兩 丹參兩 捲心竹葉錢

又 苦味和陽脈左頰和但心悸少寐已見營氣衰微微金匱酸棗仁湯方仍兼和陽益心氣以通肝絡

又 酸棗仁兩 炒黑勿 茯神兩 知母兩 川芍兩 人參兩 天冬一錢

又 脈左數右弦緩有年形盛氣衰冬春之交具氣不相繼續內風日熾左肢麻木不仁舌歪言蹇此屬中絡調理

百日戒酒肉可望愈

羚羊角 陳膽星

丹皮

橘紅

連翹心

石膏蒲

鉤藤

川斛

又 羚羊角

元參

連翹

花粉

川貝母

橘紅

竹瀝

又 丹溪云麻為氣虛木是濕痰敗血

診左脈濡滑有年偏枯是氣血皆虛

方書每稱左屬血虛

右屬氣虛未必盡

然人參亦宜少

半夏

廣皮

茯苓

歸身

白芍

炙草

桑枝

又 經絡為痰阻大便不爽

咋口跌仆氣亂

痰出甚艱轉方以宣經

降

炒半夏

石膏蒲

廣橘紅

茯苓

膽星

枳實

竹瀝

薑汁

葉 初春肝風內動眩暈跌仆

左肢偏癱

古絡不和呼吸不爽

痰火上蒙根本下衰

先宜清上痰火

羚羊角

茯苓

橘紅

桂枝

半夏

鬱金

竹瀝

薑汁

又 風熱燔筋骨為痛痰火氣阻

呼吸不利

照前方去鬱金

竹瀝薑汁

加白茯苓鉤藤

又 炒半夏

茯苓

鉤藤

橘紅

金石斛

石膏蒲

竹瀝

薑汁

又 人參

輕胆

半夏

枳實

茯苓

橘紅

茯苓

竹瀝

薑汁

風為百病之長故醫書咸以中風列於首門

其論症則有真中類中

中經絡血脈臟腑之分

其論治則有攻風

劫痰養血潤燥補氣培元之治

蓋真中雖風從外來

亦由內虛而邪得以乘虛而入

北方風氣剛勁南方風氣

柔和故真中之病南北多其真中之方前人已大備

不必贅論其類中之症則河間立論云因煩勞則五志

過極動火而卒中皆因熱甚生火

東垣立論因元氣不足

則邪湊之令人僂仆卒倒

如風狀是因乎氣虛而丹

溪則又云東南氣溫多溼由溼生痰

痰生熱熱生風故主乎溼

三者皆辨明類中之由也

類者偽也近代以來

醫者不分真偽每用羌防星半烏附細辛以祛風

豁痰虛症實治不當如柄鑿之珠矣

中陽氣之變動肝為風臟因精血衰耗水不涵木

木少滋榮故肝陽偏亢

內風時起治以滋液熄風

濡養營絡

此是緩治之藥

補陰滑陽如虎潛固本復脈之類是也

若陰陽並損無陰則陽無以化

故以溫柔濡潤之通補

論是而方非

如地黃飲子還少丹之類是也更有風木過動中土受戕

不能禦其所勝如不寐不食衛疎汗泄飲食衰痰

此方不是治類中竟是治虛矣

河間立方之意本為腎虛之至四肢不收有似

中風惡人誤認作真中風故立成此方孰知後人反以治真中風豈不大謬

治以六君玉屏風茯苓飲酸棗仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

仁

即為之腹
無害同一
所宜熟讀
本章自知

肝陰

其

肝風

湯之屬或風陽上僭痰火阻礙神識不清則有至寶丹芳香靈藥或辛涼清上痰火法雖未備實足以補前人
之未及至於審症之法有身體緩縱不收耳聾目瞽口開眼合撒手遺尿失音野睡此本實先撥陰陽樞紐不
交與暴脫無異並非外中之風乃純虛症也故先生急用大劑參附以回陽若有外邪恐純剛難受必佐陰
藥以挽回萬一若肢體拘攣半身不遂口眼喎邪舌強言謇二便不爽此本體先虛風陽夾痰火壅塞以致營
衛脈絡失和治法急則先用開關繼則益氣養血此數語是總語佐以消痰清火宣通經隧之藥氣充血盈脈絡通利
則病可痊愈至於風痺風熱風痺癱瘓乃風門之兼症理亦相同案中種種治法余未能盡宣其理不過畧舉
大綱分類敘述以便後人觀覽餘門倣此華岫雲
凡風淫所勝之病自內經以及唐宋名家皆以辛涼甘寒為本而佐以驅風益血之藥至河間有地黃飲子之
法此乃治腎虛症有類中風並非有此方治中風之急症乃近日諸醫遇中風之症總以人參附桂為開手
第一方輕者不起重者立斃問所從來曰本之葉先生余始亦信其說果救葉氏出私擬以為此翁遺此恩孽
將來必有忌報及聞此書乃知此翁學有淵源心思靈變與前人所論分毫不背其入泰亦於病勢已逆後用
以培元養氣當病甚時必於驅風之藥同用其分兩亦不過幾分至錢無不中復乃今之竊附其門牆
盜取其餘論者事事相反此翁有知能無痛恨而以此此等邪說誣此翁以害人者對此書能無愧死

內風乃身中陽氣之動變甘酸之屬宜之

生地

阿膠

牡蠣

炙草

炙肉炭

陽披內風上竄目昏耳鳴不寐肝經主病

熟地炙

炙龜甲

炙肉

得再用酸飲

五味

磁石

茯苓

旱蓮草

女貞子

曹三辛寒清上頭目已清則知火風由臟陰而起剛為必不見效緩肝之急以熄風滋腎之液以驅熱治法大旨如

此生地

阿膠

天冬

元參

川斛

小黑豆皮

陳五採持煩勞五志陽氣披內風上擾清空頭眩耳鳴目珠痛但身中陽化內風非發散可解非沉寒可清與六氣

大風迎異用辛甘化風方法乃是補肝用意

枸杞子

桂圓肉

歸身

炙草

甘菊炭

女貞子

此方並無化風之品

陸四肝風陽氣乘陽明之虛上冒牙肉腫痛議和陽熄風

生地

阿膠

牡蠣

天冬

茯苓

川斛

旱蓮草

女貞子

凌 交節病變總其虛症目沒舌強脊背不舒洩淋便瀉皆腎液不營肝風乃張當宗河間渴樂輕服名曰飲子

熟地五。宜生 鹹從蓉錢 炒杞子錢 麥冬錢 雲苓錢 川石斛錢 生沙苑錢 石菖蒲錢 遠志肉

胡 緩肝潤血熄風 製首烏 杞子 歸身 冬桑葉 三角胡 柏子仁 茯神 天冬 黑稽豆皮 蜜丸

某 高年水虧肝陽升逆無制兩脇絮絮如熱則火升面赤遇煩勞為甚宜養肝陰和陽為法

九蒸何首烏四 九蒸冬桑葉三 徽州黑芝麻三 小黑稽豆皮三 巨勝子即胡麻 浸天冬去心

真北沙參二 柏子仁兩 雲茯神兩 女貞實兩 右為末青果汁法丸早服三錢開水送杜撰

張氏肝陽盛風上巔頭目不清陽明脘空腰膝痠爽議養血熄風

菊花炭好 熟首烏 牛膝炭 枸杞子炭 黑稽豆 茯神 此等方不能去病

沈 衝氣左升當鎮肝攝腎 地黃 何膠 芡肉 淡菜 茯苓

丁三四 固緊思擾動五志之陽陽化內風變幻不已夫陽動莫制皆臟陰少藏自覺上竇下虛法當介以潛之酸以收

之味厚以填之偏寒偏熱烏能治情志中病 熟地 芡肉 五味 磁石 茯神 青鹽

龜板膠好 龜板膠 即洛膠為丸純陰之方不能運化

朱姬心中熱辣藉煩不肯寐皆春令地氣主升肝陽隨以上擾老年五液交枯最有痼痼之慮

生地 阿膠 生白芍 天冬 茯神 小黑稽豆皮

程氏伏暑深秋而發病從裏出始如虛狀熱氣逼迫營分經事不當期而來古光如鏡面暗青胸而胸痞隱痛正氣

大盛熱氣內閉況乎周身皆痛衝陽失和極矣先擬育陰驅熱肝風不旋不致痼痼五日中不興風波可望向安

生地 何膠 天冬 麥冬 麻仁 生牡蠣當有和衛之藥

金女溫邪深入營絡熱止脰骨痛甚蓋血液傷極內風欲沸所謂劇則癰癰痼痼至矣總是消導苦寒並兼熱止獨

不慮胃汁竭肝風動乎擬柔藥緩絡熱熄風 復脈湯去麥冬麻仁 生龜甲湯煎藥

王氏痛從腿肢筋骨上及腰腹貫於心胸若平日經來帶下其症亦至此素稟陰虧衝任奇脈空曠凡春交地中陽

陽升
熱

心營
熱
風陽
擾神

氣升舉。虛人氣動隨升。絡血失養。諸氣橫逆。面赤如赭。飢不欲食。耳失聰。寤不成寐。陽浮脈絡。交空。顯然。先和陽治絡。細生地純陰之藥。不能和血。生白芍。生龍甲。生龜甲。生虎骨。糯稻根。煎藥送滋腎丸。又前用滋腎丸。痛緩。面浮。跗腫。血氣俱乏。內風泛越。經言風勝則動。淫勝則腫。陰虛多熱之實。議先用虎潛丸。每服四錢。四服。

某五下水。水虧。風木內震。肝腎虛多驚恐。非實熱。痰火可攻。劫者。

生地 清阿膠 天冬 杞子 菊花炭 女貞子 當加治驚恐之藥

胡久病耳聾微噎。喉中不甚清爽。是陰不上承。陽挾內風。得以上侮。清空諸數。大凡肝腎宜潤。宜涼。龍相再則水

源生矣。人參一錢。秋石一分。化水拌烘乾同煎。鮮生地 阿膠 淡菜 白芍 茯神 炙甘草

又陰虛液耗。風動陽升。雖諸恙皆減。二旬外大便不通。斷勿欲速。惟靜藥補潤為宜。照前方去白芍加柏子仁。又大便兩次頗逸。全賴靜藥益陰之力。第納食未旺。議與胃藥。

人參 茯神 炒麥冬 炙甘草 生穀芽 南棗 宜加入氣分藥

又緩肝益胃。人參 茯神 生穀芽 炙甘草 木瓜 南棗

周怒動肝風。筋脹脇板喉痺。阿膠 天冬 柏子仁此非治方 牡蠣 小麥

吳脈弦小數。形體目瘦。口舌糜碎。肩背掣痛。肢節麻木。膚膝搔痒。目眩暈耳鳴。已有數年。此屬操持積勞。陽升內風。旋動。燔筋損液。古謂壯火食氣。皆陽氣之化。先擬清血分中熱。繼當養血。熄其內風。安靜分勞。不致痿厥。

生地 元參 天冬 丹參 犀角 羚羊角 連翹 竹葉心

何首烏 生白芍 黑芝蔴 久嘉葉 天冬 女貞子 茯神 青鹽

某姬脈右虛左數。營液內耗。肝陽內風。震動心悸。眩暈少寐。生地 阿膠 麥冬 白芍 小麥 茯神 炙甘草

吉五心悸。頭中鳴。七八年中。頻發不止。起居飲食如常。此肝膽內風。自動。宜鎮靜之品。佐以辛泄之味。如枕中丹。

曹肝膽陽氣挾內風。上騰不熄。心中熱驚怖多恐。追和陽鎮攝方法。

龜甲 龍骨 牡蠣 茯神 石菖蒲 遠志 當加血分藥

肝風

上海文益書局石印