




国家执业资格考试应试宝典系列丛书

国家护士执业资格考试 应试宝典·模拟试题

2013

总主编：喻友军 赖 青

主编：胡小和 方 敏

本系列辅导用书由具有多年护考辅导经验的**几十位专家**组成的
命题分析小组倾心打造

主编院校连续四年**通过率100%**

选用学校当年**通过率提高30%**



科学出版社

国家执业资格考试应试宝典系列丛书

2013 国家护士执业资格考试 应试宝典·模拟试题

总主编 喻友军 赖 青
主 编 胡小和 方 敏
编 者 (按姓氏汉语拼音排序)

邓湘穗 邓意志 方 敏 胡小和 赖 青
李小英 李正安 刘静馨 柳 卫 屈 忠
谭 丽 伍梅芳



长沙卫生职业学院图书馆



CW0205999

科学出版社
北京

· 版权所有 侵权必究 ·

举报电话:010-64030229;010-64034315;13501151303(打假办)

内 容 简 介

本书是“2013 国家护士执业资格考试应试宝典”丛书之一,是由具有多年护士执业资格考试辅导经验的教师团队编写。该团队对近些年来的考试题目进行了认真的研究,其辅导的中专学生连续四年参加全国护士执业资格考试平均通过率达 95.82%,大专学生达 100%。本书严格按照国家护士执业资格考试大纲要求,根据疾病所属系统进行命题,既考虑知识的全面性,又结合考试实际,突出重点,力求覆盖所有考点。本着方便教师辅导教学和利于学生复习的宗旨,内容与本系列辅导用书《2013 国家护士执业资格考试应试宝典·考点精粹》的内容紧密对接,全书共有六套模拟试题,每套试题分为专业实务与实践能力两部分。各种题型的题量都按照考试大纲的要求进行配置,对于一些学生不容易理解的难题用▲进行了标记,并在参考答案中给予解析。

本书主要供参加国家护士执业资格考试的考生使用,也可作为自学考试、专升本考试、成人高考及在校学生学习期间的参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

2013 国家护士执业资格考试应试宝典·模拟试题 / 胡小和,方敏主编. —北京:科学出版社,2012.12

(国家执业资格考试应试宝典系列丛书)

ISBN 978-7-03-036226-1

I. 2… II. ①胡… ②方… III. 护士-资格考试-习题集 IV. R192.6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 303565 号

责任编辑:许贵强 丁海燕 / 责任校对:张怡君

责任印制:肖 兴 / 封面设计:范璧合

版权所有,违者必究。未经本社许可,数字图书馆不得使用

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

保定市中华美凯印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2012 年 12 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2012 年 12 月第一次印刷 印张:8 1/2

字数:252 000

定价:19.80 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

总 前 言

“2013 国家护士执业资格考试应试宝典”丛书为国家护士执业资格考试的复习参考书。本丛书以最新护考大纲为依据,以近年来护士执业资格考试考点为参照,认真分析研究了历年考试真题所覆盖的知识点,并采纳了众多考生的反馈意见,汲取了国内目前已出版的各种护士执业考试辅导用书的优点,总结了自 2009 年来编者所在院校教学与护考的成功经验精编而成,力求为广大考生提供最全面、最精要的备考知识,让考生用最少的复习时间,掌握最多的知识点,取得最理想的考试成绩。2009~2012 年国家护士执业资格考试中,由编者所辅导的五千多名护理、助产专业考生,中专学生考试平均通过率达 95.82%,大专学生达 100%。

“2013 国家护士执业资格考试应试宝典”丛书分为考点精粹、精练(上、中、下册)和模拟试题五部分,以国家最新考试大纲为蓝本,既考虑知识点的全面性,又结合考试实际,瞄准考点、突出重点、突破难点,在编写形式上力求便于考生理解和记忆,试题均备有参考答案,难题备有解析。考点精粹分册对大纲考点科学重组、系统排序、要点提炼、重点标注并详实阐述;精练分册以系统疾病为单元,瞄准考点,以经典试题再现知识点,既与护考无缝对接,又便于考生边复习边检测;模拟试题分册依照国家统一考试单元编写,共 6 套计 1637 题,每套含专业实务与实践能力两部分,考点覆盖面广,模拟性、针对性、预测性强,利于考生顺利实现从各科目的系统复习向综合性实战模拟的转变,起到事半功倍的作用。

本书主要供参加国家护士执业资格考试的各类考生和参加辅导的教师使用,亦可作为自学考试、成人高考和在校学生学习期间的参考资料。

本书编写参考了国内出版与护考相关的教材教辅用书,在此一并致谢。鉴于各种原因,书中难免有不足之处,敬请各位同仁和广大读者批评指正!

喻友军 赖 青

目 录

模拟试题一	(1)
专业实务	(1)
参考答案及难题解析	(10)
实践能力	(11)
参考答案及难题解析	(21)
模拟试题二	(22)
专业实务	(22)
参考答案及难题解析	(31)
实践能力	(32)
参考答案及难题解析	(42)
模拟试题三	(44)
专业实务	(44)
参考答案及难题解析	(54)
实践能力	(55)
参考答案及难题解析	(65)
模拟试题四	(66)
专业实务	(66)
参考答案及难题解析	(75)
实践能力	(76)
参考答案及难题解析	(87)
模拟试题五	(88)
专业实务	(88)
参考答案及难题解析	(97)
实践能力	(98)
参考答案及难题解析	(109)
模拟试题六	(110)
专业实务	(110)
参考答案及难题解析	(119)
实践能力	(119)
参考答案及难题解析	(130)

模拟试题一

专业实务

一、请从各题 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号对应答案所属的方框涂黑。

1. 肾、输尿管结石的主要症状是
A. 尿频、尿急 B. 排尿困难
C. 尿失禁 D. 无痛性血尿
E. 疼痛和血尿
2. 在我国慢性肾衰竭最常见的病因是
A. 结石 B. 慢性肾小球肾炎
C. 多囊肾 D. 糖尿病肾病
E. 肾盂肾炎
3. 急性阑尾炎易发生坏死、穿孔的主要原因是
A. 阑尾开口小 B. 阑尾淋巴丰富
C. 阑尾蠕动慢而弱 D. 阑尾动脉为终末动脉
E. 阑尾系膜短
4. 某初产妇进行产前检查,咨询胎头衔接的时间,护士告知一般在
A. 预产期前 2~3 周 B. 临产前
C. 临产前 1~2 日 D. 破膜后
E. 第一产程末
5. 下列哪项不属于胎儿附属物
A. 胎脂 B. 脐带
C. 胎膜 D. 羊水
E. 胎盘
6. 消化性溃疡的确诊依靠
A. B 型超声检查
B. 胃液分析
C. 典型的周期性和节律性上腹部疼痛
D. X 线钡餐检查和(或)内镜检查
E. 是否有幽门螺旋杆菌感染
7. 为预防巨大肾结石碎石后引起“石街”,卧位应采取
A. 平卧位 B. 头高足低位
C. 患侧卧位 D. 健侧卧位
E. 头低位
- ▲8. 3 岁患儿,引起化脓性脑膜炎的常见病原菌是
A. 脑膜炎奈瑟菌 B. 肺炎链球菌
C. 白色念珠菌 D. 大肠埃希菌
E. 流感嗜血杆菌
9. 小儿生长发育过程中,最晚成熟的是
A. 消化系统 B. 淋巴系统
C. 生殖系统 D. 神经系统
E. 呼吸系统
10. 小儿 2 岁时,体重约为出生体重的
A. 2 倍 B. 4 倍
C. 1 倍 D. 5 倍
E. 3 倍
11. 引起心脏后负荷过重的常见原因是
A. 二尖瓣关闭不全 B. 主动脉瓣关闭不全
C. 甲状腺功能亢进症 D. 原发性高血压
E. 慢性严重贫血
12. 肺炎链球菌肺炎患者咳铁锈色痰出现在下列哪一期
A. 全程 B. 充血期
C. 红色实变期 D. 灰色实变期
E. 溶解消散期
13. 治疗猩红热的首选药物是
A. 红霉素 B. 青霉素
C. 氯霉素 D. 克林霉素
E. 氨苄西林
14. 新生儿寒冷损伤综合征皮肤硬肿的特点为
A. 以鲜红色硬肿为主
B. 以暗红色硬肿为主
C. 以凹陷性水肿为主
D. 以非凹陷性水肿为主
E. 中间软、四周硬
15. 由于气管、支气管解剖结构特点,支气管扩张易发生于
A. 两下叶支气管 B. 左上叶支气管
C. 右上叶支气管 D. 左前段支气管
E. 右前段支气管
16. 腹部受到冲击伤时,最容易发生破裂的脏器是
A. 肾 B. 肠
C. 胃 D. 肝
E. 脾
17. 阿托品对解除有机磷农药中毒的何种症状无效
A. 肺部湿啰音 B. 多汗、流涎



- C. 平滑肌痉挛 D. 肌纤维颤动
E. 瞳孔缩小
18. Graves 病的主要病因是
A. 遗传因素 B. 病毒感染
C. 自身免疫 D. 细菌感染
E. 精神刺激
19. 营养不良的病因主要是缺乏
A. 热能和/或维生素 B. 热能和/或蛋白质
C. 热能和/或脂肪 D. 热能和/或水
E. 热能和/或糖
20. 营养性缺铁性贫血,服用铁剂停药的时间应是
A. 血红蛋白量恢复正常后 2 个月
B. 血红蛋白量恢复正常时
C. 血红蛋白量恢复正常后 1 周
D. 血红蛋白量恢复正常后 2 周
E. 血红蛋白量恢复正常后 1 个月
21. 双侧瞳孔散大常见于
A. 巴比妥类中毒 B. 吗啡中毒
C. 有机磷农药中毒 D. 颠茄类中毒
E. 脑疝早期
22. 处理灭头虱用物,下列哪种方法不妥
A. 治疗巾:高压蒸汽灭菌
B. 隔离衣:烈日曝晒 6 小时
C. 篦子上的棉花:焚烧
D. 梳子:浸泡在消毒液中
E. 患者衣服:煮沸消毒
23. 胃次全切术后第 2 日的患者应采取
A. 仰卧位 B. 半坐卧位
C. 侧卧位 D. 端坐位
E. 中凹卧位
24. 下列属于气体灭菌剂的是
A. 环氧乙烷 B. 漂白粉澄清液
C. 碘酊 D. 苯扎溴铵
E. 84 消毒剂
25. 按照《护士条例》的要求,申请护士执业注册应当具备的条件中错误的是
A. 在教学、综合医院完成 8 个月以上护理临床实习
B. 完成中等职业学校普通全日制 3 年以上的护理专业课程学习并取得相应学历证书
C. 通过国务院卫生主管部门组织的护士执业资格考试
D. 获得经省级以上卫生行政部门确认免考资格的普通中等卫生(护士)学校护理专业毕业文凭者,可以免于护士执业考试
E. 符合国务院卫生主管部门规定的健康标准
26. 患者,男,34 岁。骑摩托车时遭遇车祸,右下肢骨折,大量出血,急诊入院,急诊科护士在医生到来前应立即
A. 为患者注射止痛药物
B. 给患者止血、测血压,建立静脉通路
C. 向保卫部门报告
D. 详细询问事故的原因
E. 劝慰患者耐心等待医生
27. 在护理工作中,尊重原则主要是指尊重患者的
A. 病情 B. 地位
C. 生活习惯 D. 自主性
E. 个性
28. 患者,女,26 岁。因右腹部转移性疼痛就诊。入院后诊断为急性阑尾炎,经手术治疗后好转。术后护士应采取的护患关系模式为
A. 主动-被动型 B. 指导-合作型
C. 共同参与型 D. 并列互补型
E. 相互独立型
29. 具有生长发育与生殖功能的器官是
A. 心 B. 肝
C. 脾 D. 肺
E. 肾
30. 六淫指的是
A. 风、寒、暑、湿、燥、火六种正常气候变化
B. 痰饮、瘀血、疔气六子致病因素
C. 内风、内火、内寒、内湿、内燥、外火六种致病因素
D. 风、寒、暑、湿、燥、火六种外感病邪的统称
E. 外风、外湿、外燥、外暑、外火、内寒六种致病因素
31. 浮脉多见于
A. 里证 B. 寒证
C. 虚证 D. 热证
E. 表证
32. 关于护理差错和医疗事故的区别,叙述错误的是
A. 因为医务人员责任心不强
B. 都分为四级
C. 都违反了法规
D. 后果不同
E. 都给患者带来了痛苦
33. 关于治疗饮食叙述错误的是
A. 大手术后胃肠功能紊乱的患者选择要素膳食



- B. 肾病综合征的患者应增加富含蛋白质的食物,但每日蛋白质摄入量不超过 120g
- C. 高热量饮食要求每日总热量摄入约 12.5MJ (3000kcal)
- D. 低盐饮食要求禁止食用一切腌制食物
- E. 低脂肪饮食要求成人脂肪的摄入量低于 20g/d
34. 患者,女,32 岁。发热待查收入院,查:T 39.9℃,P 130 次/分,R 28 次/分,BP 110/70mmHg,神志清楚,急性面容,患者急诉头痛剧烈。入病区后,值班护士首先应
- A. 立即通知医生诊治患者,及时执行医嘱
- B. 询问病史
- C. 备好急救药品及物品
- D. 填写住院病历和有关护理表格
- E. 自我介绍
35. 为了改善睡眠质量,老年人睡前宜
- A. 加强活动
- B. 多饮水
- C. 加餐
- D. 阅读兴奋书籍
- E. 用热水泡脚
36. 胆囊摘除术后第 1 日的患者应采取
- A. 俯卧位
- B. 半坐卧位
- C. 平卧位
- D. 端坐位
- E. 头高足低位
37. 原发性肝癌多见于男性,好发年龄最多见的是
- A. 20~30 岁
- B. 40~50 岁
- C. 30~40 岁
- D. 50~60 岁
- E. 10~20 岁
38. 血钾低于哪项数值时称低血钾
- A. 2.5mmol/L
- B. 3.0mmol/L
- C. 3.5mmol/L
- D. 4.0mmol/L
- E. 4.5mmol/L
39. 月经周期为 28 日的妇女,其排卵时间可能在月经周期的
- A. 第 10~11 日
- B. 第 12~13 日
- C. 第 14~15 日
- D. 第 17~18 日
- E. 第 20~21 日
40. 慢性肺源性心脏病最常见的病因是
- A. 支气管扩张
- B. 支气管肺癌
- C. 支气管哮喘
- D. 慢性支气管炎
- E. 肺炎链球菌肺炎
41. 影响伤口愈合的因素不包括
- A. 患者性别
- B. 是否有糖尿病
- C. 营养状况
- D. 患者年龄
- E. 伤口特点
42. 护士注册的有效期至
- A. 1 年
- B. 3 年
- C. 5 年
- D. 10 年
- E. 8 年
43. 患者,女,54 岁。因膀胱肿瘤需做膀胱镜检查,患者检查时应取
- A. 膝胸卧位
- B. 截石位
- C. 去枕仰卧位
- D. 侧卧位
- E. 端坐位
44. 脊柱骨折最常见的部位是
- A. 骶尾段
- B. 腰椎
- C. 胸椎
- D. 胸腰段(T10~L2)
- E. 颈椎
45. 患者,男,45 岁。乙型肝炎 12 年,近来自觉右上腹胀痛,首选的检查是
- A. 腹腔镜
- B. B 超
- C. 肝动脉造影
- D. 核素肝扫描
- E. MRI
46. 患者,男,26 岁。因头痛、呕吐 5 日来我院就诊,查体:患者步态不稳,站立时向后倾倒,医生高度怀疑为颅内肿瘤,根据以上表现,可能为颅内哪个部位的肿瘤
- A. 大脑半球
- B. 鞍区
- C. 松果体区
- D. 小脑蚓部
- E. 脑干
47. 陈某,孕 36 周,臀位,胎膜早破 1 小时入院,无宫缩,护士立刻给予抬高臀部是为了
- A. 纠正胎位
- B. 便于观察产程进展
- C. 阻止羊水流出
- D. 防止脐带脱垂
- E. 减少体力消耗
48. 初孕妇,30 岁,诊断为妊娠合并糖尿病,下述描述正确的是
- A. 前置胎盘的发生率增加
- B. 易出现新生儿低血糖
- C. 羊水过少发生率增加
- D. 分娩过程中,产妇血糖更高
- E. 新生儿仍要按足月儿加强护理
49. 患者,女,30 岁。妊娠 10 周,休息时胸闷、气急。查脉搏 120 次/分,呼吸 22 次/分,肺底有湿啰音,处理应是
- A. 避免激动
- B. 多休息,少活动
- C. 立即终止妊娠



- D. 控制心衰后终止妊娠
E. 控制心衰后继续妊娠
50. 患者,女,30岁。妊娠39周,胎儿体重估计3kg,临产后胎头迟迟不入盆,估计最可能是下述哪条径线异常
A. 髌嵴间径 B. 髌棘间径
C. 骶耻外径 D. 坐骨棘间径
E. 坐骨结节间径
51. 患者,男,36岁。今因打架斗殴致左腰部被刺伤,查体:伤口处未见明显出血,但血压测不到,应考虑
A. 腰部挫伤 B. 肾蒂裂伤
C. 肾部分裂伤 D. 肾全层裂伤
E. 肾挫伤
52. 患者,男,57岁。踝部挤压伤后出现局部红、肿、热、痛,边界不清,伴低热。应首先考虑为
A. 疖 B. 痈
C. 脓肿 D. 丹毒
E. 急性蜂窝织炎
53. 患者,男,35岁。3日前右手中指外伤后,指甲侧皮肤组织红、肿、热痛,不伴搏动性疼痛,体温36.5℃,该患者可能为
A. 甲沟炎 B. 甲下脓肿
C. 急性化脓性腱鞘炎 D. 化脓性滑囊炎
E. 脓性指头炎
54. 患者,女,23岁。已婚,婚后不久出现发热、腰痛、尿频、尿急1周就诊。诊断为急性肾盂肾炎。该疾病最常见的致病菌是
A. 大肠埃希菌 B. 溶血性链球菌
C. 葡萄球菌 D. 阴沟肠杆菌
E. 结核杆菌
55. 患者,男,42岁。患尿毒症。在静脉输入5%碳酸氢钠溶液的过程中,突然发生手足抽搐。首先应给予
A. 静注地西泮 B. 肌注地西泮
C. 静注苯妥英钠 D. 口服碳酸钙
E. 静注葡萄糖酸钙
56. 患者,男,40岁。尿毒症病情加重,出现恶心、呕吐、厌食、少尿2日,血清钾11mmol/L。若不紧急处理则可能导致
A. 窒息 B. 心力衰竭
C. 心跳骤停 D. 心律失常
E. 呼吸衰竭
57. 患者,男,70岁。有长期便秘史,突然腹痛、腹胀1日,未吐,排少量黏液血便1次。查体:可见腹周膨胀,左下腹可扪及囊性包块,有压痛及反跳痛,肠鸣音亢进。该患者的诊断可能是
A. 直肠癌 B. 乙状结肠癌
C. 麻痹性肠梗阻 D. 乙状结肠扭转
E. 小肠扭转
58. 1岁男孩,阵发性哭闹,进乳后呕吐,排果酱样粪便。右中上腹扪及6cm×5cm×4cm腊肠样肿块,首先考虑为
A. 蛔虫性肠梗阻 B. 肠道畸形
C. 肠扭转 D. 肠套叠
E. 盲肠肿瘤
59. 患者,男,34岁。用力排便后出现肛门剧痛,无便血,检查见肛管皮下暗紫色肿块,有触痛,首先考虑的是
A. 肛裂 B. 血栓性外痔
C. 嵌顿性内痔 D. 肛门皮下脓肿
E. 直肠息肉
60. 患儿,男,11个月。呕吐、腹泻4日,近9个小时无尿,查体:呼吸深快,精神萎靡,意识模糊,面色苍白,前囟、眼窝明显凹陷,哭时无泪,皮肤弹性极差,脉细弱,四肢厥冷。首先应给的治疗是
A. 4:3:2液180ml/kg 静脉滴注
B. 1.4%碳酸氢钠40ml/kg 静脉注射
C. 3:2:1液40ml/kg 静脉滴注
D. 2:1等张含钠液20ml/kg 快速静脉滴注
E. 4:2:3液50ml/kg 静脉滴注
61. 家长在换尿布时发现婴儿大便为黄绿色,且粪水是分开的,护士给予的解释是
A. 进食不足 B. 消化不良
C. 进食过量 D. 肠道感染
E. 婴儿腹泻
62. 患者,男,35岁。突然呕血1000ml,伴柏油样大便,首选给予的止血药为
A. 垂体后叶素 B. 安咯血
C. 酚磺乙胺 D. 维生素K
E. 抗血纤溶芳酸
63. 患者,女,31岁。习惯性便秘2年,该患者应采取的饮食护理是
A. 高热量 B. 低热量
C. 低脂、低蛋白 D. 低纤维素
E. 高纤维素
64. 患者,女,48岁。打字员,近段时间来常出现腰痛,且不能长时间行走,休息后能好转,偶发大



- 小便失禁,不伴下肢麻木感。体查:直腿抬高试验(-),该患者最有可能的诊断是
- A. 椎管狭窄症 B. 腰3横突综合征
C. 腰椎间盘突出症 D. 腰肌劳损
E. 腰椎滑脱
65. 患者,男,24岁。乘车时右腿搭在左腿上,膝盖顶住前坐椅背,当突然刹车时,右膝部受撞击后髌关节不能活动,且右大腿后侧、小腿后侧及外侧和足部感觉消失,X线摄片:髌关节脱位合并髌臼骨折、股骨头骨折,该髌关节脱位的类型为
- A. 前脱位 B. 中心脱位
C. 后脱位 D. 侧方脱位
E. 下脱位
66. 患者,男,50岁。有高血压史12年。喝酒后忽感头晕,随即倒地昏迷,被家人急送入院,入院拟诊为急性脑出血,查左侧偏瘫,血压200/110mmHg,下列对该患者的治疗原则错误的是
- A. 控制血压 B. 降低颅压
C. 密切观察生命体征 D. 应用抗凝剂
E. 应用止血药
67. 患者,男,27岁。上感2周后,突然发生急性、对称性、弛缓性瘫痪,伴肢体的麻木不适感,拟诊为急性炎症性脱髓鞘性多发性神经炎,脑脊液检查出现特征性的表现为
- A. 脑脊液细胞数量降低
B. 脑脊液浑浊
C. 脑脊液血性
D. 脑脊液蛋白含量降低
E. 脑脊液蛋白-细胞分离现象
68. 患者,男,24岁。头颈部摔伤后立即昏迷,送医院后逐渐清醒,2小时后再度昏迷,查呼吸12次/分,脉搏60次/分。应考虑为
- A. 轻度脑挫裂伤 B. 脑震荡
C. 急性硬膜下血肿 D. 急性硬膜外血肿
E. 重度脑挫裂伤
69. 男婴,出生3日,前囟出生时约为1.5~2cm,测量方法是
- A. 最长径线 B. 对边中点连线的长度
C. 边长 D. 对角线长度
E. 周长
70. 患者,女,25岁。产后一年,前来咨询放置节育环的禁忌证,下列哪种说法正确
- A. 轻度贫血 B. 患有急性盆腔炎
C. 月经过频 D. 子宫肌瘤患者
E. 宫颈口松弛
71. 患者,男,50岁。患原发性高血压12年,一直应用硝苯地平控制血压,该药的药理作用是
- A. 抑制水钠重吸收
B. 抑制肾素释放
C. 阻滞 α 受体
D. 抑制血管紧张素II生成
E. 阻止钙离子进入心肌细胞
72. 患者,男,56岁。突然心悸,气促,咳粉红色泡沫痰,血压195/90mmHg,心率136次/分,护士应首先备好下列哪组药物
- A. 毛花苷C,硝酸甘油,肾上腺素
B. 胍乙啶,酚妥拉明,毛花苷C
C. 毒毛旋花子素K,硝普钠,普萘洛尔
D. 硝普钠,毛花苷C,呋塞米
E. 硝酸甘油,毛花苷C,多巴胺
73. 患者,女,37岁。患风湿性心脏瓣膜病9年,长期应用地高辛口服,近日出现窦性心动过缓,HR47次/分,患者感心悸,考虑洋地黄药物中毒所致,予立即停用地高辛,同时应用
- A. 补钾 B. 使用苯妥英钠
C. 阿托品 D. 安装心脏起搏器
E. 普萘洛尔
74. 对类风湿性关节炎的描述不正确的是
- A. 基本病变为滑膜炎
B. 发病与自身免疫有关
C. 不引起脏器损害
D. 类风湿因子为阳性
E. 有皮下结节示病情活动
75. 心脏正常窦性心律的起搏点是
- A. 心房 B. 窦房结
C. 房室结 D. 希氏束
E. 左心室
76. 患者,女,60岁。急性心肌梗死,经溶栓治疗后,疼痛缓解,但出现缓慢性心律,常应用的药物是
- A. 美托洛尔 B. 呋塞米
C. 硝酸异山梨酯 D. 硝酸甘油
E. 阿托品
77. 关于幻觉的概念,正确的是
- A. 客观刺激作用于感觉器官的感知体验
B. 缺乏相应客观刺激时的知觉体验
C. 对客观事物的胡思乱想
D. 客观刺激作用于人脑的过程
E. 对客观事物的错误感知



78. 感知觉障碍不包括下列哪项
A. 幻觉 B. 错觉
C. 感知综合障碍 D. 内感性不适
E. 思维破裂
- ▲79. 患者,男,66岁。有慢性支气管炎病史18年,近3日来出现发热、咳嗽、咳痰加重,痰液黏稠呈砖红色胶冻状。该患者最可能的诊断是
A. 肺炎链球菌肺炎 B. 克雷白杆菌肺炎
C. 军团菌肺炎 D. 肺炎支原体肺炎
E. 金黄色葡萄球菌肺炎
- ▲80. 患者,男,30岁。因反复咳嗽、咳大量脓痰5年,加重1周入院,诊断为支气管扩张。该患者在施行体位引流时,错误的是
A. 夜间继续吸氧
B. 引流在餐前进行
C. 引流完毕后协助患者漱口
D. 引流时间每次30分钟以上
E. 引流时指导并鼓励患者有效咳嗽
81. 患者,女,48岁。慢性咳嗽、咳痰12年,查体:胸廓呈桶状,活动度减弱,叩诊呈过清音。该患者的医疗诊断最可能为
A. 慢性阻塞性肺气肿 B. 胸腔积液
C. 一侧气胸 D. 支气管肺癌
E. 肺炎链球菌肺炎
82. 患者,女,19岁。因突发呼气性呼吸困难1小时入院,过去5年每逢春季有类似发作史。查体:双肺满布哮鸣音,诊断为支气管哮喘。该疾病诊断的主要依据是
A. 血液中嗜酸性粒细胞增多
B. PaO_2 和 SaO_2 降低, PaCO_2 升高
C. 胸透示横膈下降、肺透亮度增加
D. 肺功能检测有阻塞性通气障碍
E. 有反复发作史,呼气性呼吸困难和两肺广泛哮鸣音
83. 患者,男,49岁。慢性咳嗽、咳痰10余年,气促、心悸3天入院。X线检查示肺动脉段明显凸出。该患者肺动脉高压的主要机制可能是
A. 肺部感染 B. 红细胞增多
C. 肺小动脉痉挛 D. 血液黏稠度增加
E. 肺毛细血管床减少
84. 地高辛用于治疗心力衰竭的主要药理作用是
A. 扩张冠状动脉 B. 增强心肌收缩力
C. 减轻心脏前负荷 D. 减少心律失常发生
E. 减慢房室传导
85. 7岁儿童,高热、昏迷、抽搐3日后因呼吸衰竭抢救无效死亡。为明确死因,最可靠的检查方法是
A. 抽血分离病毒 B. 取脑组织分离病毒
C. 取脑脊液分离病毒 D. 血凝抑制试验
E. 特异性IgM抗体检查
86. 患儿,男,1岁半。出生时接种过卡介苗,常低热、盗汗,OT-1:2000,硬结15mm,持续7天。提示
A. 有过结核感染 B. 无结核感染
C. 变态反应 D. 活动性结核
E. 接种过卡介苗后反应
87. 患者,男,51岁。因出现右下肢发凉、怕冷就诊,医师让其平卧,患肢抬高 45° ,3分钟后出现麻木、疼痛、足部皮肤苍白,随后让其坐起,下肢自然下垂于床沿,此时,足部皮肤出现潮红色,提示患肢严重供血不足。该试验为
A. 波氏试验 B. 屈氏试验 I
C. 屈氏试验 II D. 肢体抬高试验
E. 勃格运动
88. 患者,男,29岁。因左小腿骨折被送至急诊室,护士为他做的最重要的工作是
A. 给止痛剂 B. 提供一张床铺
C. 送一杯水,做好安慰 D. 做石膏托固定
E. 拿来夹板,临时固定
89. 患者,女,35岁。误服敌敌畏100ml,出现呼吸困难,瞳孔缩小,视力模糊,肌肉颤动,其发病机制是
A. 肾上腺素过多 B. 乙酰胆碱失活
C. 胆碱酯酶失活 D. 谷丙转氨酶过多
E. 去甲肾上腺素过多
90. 患儿,5岁。双下肢烫伤,其烫伤面积为
A. 45% B. 40%
C. 39% D. 30%
E. 25%
91. 患者,女,38岁。患甲亢半年,手术前服用碘剂治疗,此药的作用机制是
A. 使甲状腺分泌降低
B. 抑制抗原抗体反应
C. 抑制甲状腺素释放
D. 降低外周组织对甲状腺素反应
E. 抑制甲状腺素合成
92. 患儿,女,9个月。在睡眠时常烦躁哭闹、入睡难,今晒太阳后突发全身抽搐5次,每次约1分钟,抽搐停止后精神如常。体温 37.5°C ,诊断为



维生素 D 缺乏性手足搐搦症。护士给予补钙正确的方法是

- A. 缓慢静脉注射
- B. 肌内注射
- C. 补维生素 D 后,再补钙
- D. 皮下注射
- E. 口服补钙

93. 患儿,女,8 个月。以“间断腹泻 3 个月,厌食 2 个月”入院,查体:患儿神志清楚,精神反应差,皮肤黏膜苍白。血常规:血红蛋白 75g/L,红细胞 $3.8 \times 10^{12}/L$ 。根据病情护士应考虑患儿为

- A. 珠蛋白生成障碍性贫血
- B. 生理性贫血
- C. 营养性巨幼红细胞性贫血
- D. 再生障碍性贫血
- E. 营养性缺铁性贫血

94. 患者,女,36 岁。诊断为特发性血小板减少性紫癜,入院后告知患者禁用的药物是

- A. 泼尼松
- B. 阿司匹林
- C. 红霉素
- D. 阿莫西林
- E. 地西泮

95. 患者,男,66 岁。在使用呼吸机过程中,出现烦躁不安,皮肤潮红,浅表静脉充盈。护士应

- A. 应用呼吸兴奋剂
- B. 检查呼吸道有无堵塞
- C. 增加呼吸频率
- D. 减少潮气量
- E. 减小氧流量

96. 患者,女,55 岁。“亚急性细菌性心内膜炎”,需抽血做血培养,护士采集血标本时应抽血

- A. 1~2ml
- B. 3~4ml
- C. 5~6ml
- D. 7~8ml
- E. 10~15ml

97. 患者,男,68 岁。患有多种慢性病,同时服用下列几种药物,护士指导患者宜饭前服用的药物是

- A. 健胃消食片
- B. 索米痛片
- C. 止咳糖浆
- D. 氨茶碱
- E. 阿司匹林

98. 患者,男,45 岁。一周来晨起眼睑水肿,排尿不适,尿色发红,血压偏高,疑为急性肾小球肾炎,采集 24 小时尿标本时,其正确的采集时间是

- A. 晨 7:00 至次日晨 7:00
- B. 晨 11:00 至次日晨 11:00
- C. 午 12:00 至次日午 12:00
- D. 晚 7:00 至次日晚 7:00

E. 晚 0:00 至次日晚 0:00

99. 患者,女,56 岁。肝癌晚期,表现为极度消瘦,卧床,生活无法自理,由鼻饲管喂食,静脉营养,患者最可能发生的问题是

- A. 静脉炎
- B. 鼻部感染
- C. 压疮
- D. 口腔感染
- E. 双下肢血栓

100. 患儿,男,9 个月。因间歇发热、咳嗽半个月,拟诊“支气管炎”,给予口服“氨苄西林”治疗。护士给患者做口腔护理时发现其口腔黏膜破溃,创面上附着白色膜状物,用棉签将附着物拭去后创面有出血。护士应该给他选用的口腔护理溶液是

- A. 2%~3% 硼酸溶液
- B. 0.9% NaCl 溶液
- C. 甲硝唑溶液
- D. 2% 碳酸氢钠溶液
- E. 3% 过氧化氢溶液

101. 患者,女,58 岁。腹部手术后卧床,皮肤护理时需要预防压疮发生,因为长时间采取了易产生剪切力的下列哪种体位

- A. 头高足低位
- B. 仰卧屈膝位
- C. 半坐卧位
- D. 仰卧中凹位
- E. 左侧卧位

102. 患者,男,26 岁。因肺炎收入院,持续发热 4 日,体温高达 39°C 以上,日差不超过 1°C ,并伴有脉搏、呼吸明显增快,该患者的热型属于

- A. 间歇热
- B. 弛张热
- C. 波浪热
- D. 稽留热
- E. 不规则热

103. 患者,女,34 岁。为协助胆道疾病诊断,需行十二指肠引流,正确体位是

- A. 俯卧位
- B. 仰卧屈膝位
- C. 侧卧位
- D. 头低足高位
- E. 半坐卧位

104. 某医院手术室,用食醋做空气消毒,其正确使用方法是

- A. 每立方米 5~10ml 食醋,加 1~2 倍热水
- B. 每立方米 10~15ml 食醋,加 3~4 倍热水
- C. 每立方米 10~20ml 食醋,加 1 倍热水
- D. 时间 30~120 分钟
- E. 时间 30~60 分钟

105. 患者,男,42 岁。因剧烈腹泻来诊,高度怀疑为霍乱。正在等待检查结果以确认诊断,此时,



对该患者的正确处置方法是

- A. 收住入本院消化科病房
- B. 在留下联系电话后要求其回家等通知
- C. 有护士陪伴时患者可外出活动
- D. 在指定场所单独隔离
- E. 要求患者尽快自行前往市疾控中心确诊

106. 患者,女,42岁。行子宫肌瘤切除术,医嘱“青霉素皮内试验”,错误的做法是

- A. 如青霉素过敏须做皮试
- B. 青霉素试验液的剂量是 20~50U
- C. 青霉素试验液应现配现用
- D. 询问患者最后一次使用青霉素的时间
- E. 皮试前应准备急救药物

107. 患者,男,36岁。因食用不洁食物引起腹泻、呕吐,对纠正体内电解质失调有显著效果的溶液是

- A. 浓缩白蛋白
- B. 右旋糖酐
- C. 晶体溶液
- D. 5%碳酸氢钠溶液
- E. 5%葡萄糖溶液

▲108. 患者,女,19岁。因患先天性心脏病,室间隔缺损,择期手术。在术中应输入的血液制品是

- A. 红细胞悬液
- B. 冰冻血浆
- C. 自体输血
- D. 血小板浓缩悬液
- E. 白细胞浓缩悬液

109. 患者,男,59岁。鼻饲喂食,正确测量胃管插入长度的方法是

- A. 从耳垂至剑突的距离
- B. 从眉心至剑突的距离
- C. 从前发际至胸骨柄的距离
- D. 从发际至鼻尖再到耳垂的距离
- E. 从前发际至剑突的距离

110. 患者,男,49岁。口腔术后1天,鼻饲进食,两次喂食间隔时间至少为

- A. 4小时
- B. 3小时
- C. 2小时
- D. 1.5小时
- E. 1小时

111. 患者,男,50岁。黏液脓血便伴里急后重2年,诊断为溃疡性结肠炎。近2周腹痛加重伴发热入院治疗。护士遵医嘱为患者保留灌肠治疗,正确的是

- A. 灌肠液的温度为 28℃
- B. 灌肠宜保留 5~10分钟
- C. 肛管插入 7~10cm

D. 液面距肛门 60cm

E. 灌肠时取左侧卧位

112. 患者,男,48岁。因卵巢囊肿摘除术后感到疼痛,医生于 4pm 开出医嘱:阿法罗定 10mg im sos,此医嘱失效的时间是

- A. 7pm
- B. 11pm
- C. 次日 4am
- D. 次日 4pm
- E. 医生注明的停止时间

▲113. 患者,女,68岁。股骨颈骨折,非手术治疗,持续皮牵引,护士为其制订的护理措施不当的是

- A. 严格按照骨科制定的常规实施
- B. 与医疗工作相协调
- C. 能保证患者的安全
- D. 具体、明确
- E. 体现个体化的护理

114. 患者候诊时突然剧烈腹痛,面色苍白,出冷汗,呼吸急促,候诊室护士首先应

- A. 让患者到患者少的科室看病
- B. 安排患者提前就诊
- C. 给患者测量血压
- D. 安慰患者
- E. 请医生加速诊疗速度

115. 患者,女,56岁。艾滋病患者,需要吸痰时,做法错误的是

- A. 吸痰前洗手,戴好口罩、护目镜
- B. 吸痰前应戴手套
- C. 不与其他患者共用中心吸引系统
- D. 用过的吸痰管及纱布装入高危品袋中焚烧
- E. 吸痰后吸痰管误落地上,立即进行地面的清洁处理

116. 患者,女,42岁。因脊髓损伤致尿失禁,给予留置导尿管,下述护理措施正确的是

- A. 随时倾倒尿液,并提高引流管
- B. 每周更换集尿袋
- C. 每月做尿常规检查 1次
- D. 每周用消毒棉球擦拭尿道口
- E. 发现尿液混浊时进行膀胱冲洗

二、下列每个病例下设若干考题,请根据各考题干所提供的信息,从每道题 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号对应答案所属的方框涂黑。

(117~120 题共用题干)

患者,男,30岁。半小时前因汽车撞伤头部入

院,入院时已昏迷。

117. 仰卧时该患者容易发生压疮的部位是

- A. 髌部
- B. 骶尾部
- C. 背部
- D. 头部
- E. 坐骨结节

118. 对于此患者应采取的护患关系模式是

- A. 共同参与型
- B. 主动-被动型
- C. 指导-合作型
- D. 并列互补型
- E. 相互独立型

▲119. 患者若出现皮肤因水肿而变薄,出现水泡,是属于压疮的

- A. 淤血红润期
- B. 溃疡期
- C. 炎性浸润期
- D. 坏死溃疡期
- E. 败血症期

120. 该患者治疗无效不幸死亡,目前医学界主张判断死亡的诊断标准是

- A. 瞳孔缩小
- B. 脑死亡
- C. 呼吸停止
- D. 心跳停止
- E. 各种反射消失

(121~122 题共用题干)

患者,男,65岁,出现尿频2年,近来因酗酒加重,尿潴留反复发作,今晨突然出现排尿困难,腹部疼痛,下腹部膨隆,叩诊浊音,发生急性尿潴留,急诊入院。

121. 患者最可能的诊断是

- A. 泌尿系结核
- B. 膀胱结石
- C. 尿道结石
- D. 前列腺癌
- E. 前列腺增生

122. 应给患者采取的措施是

- A. 抗生素预防感染
- B. 解痉止痛
- C. 药物治疗
- D. 做好手术前的护理
- E. 导尿解除尿潴留

(123~125 题共用题干)

患者,男,57岁。近2个月来咳嗽,痰中带血,经抗感染、对症治疗后症状改善,但胸片示右肺门旁3cm×3cm左右肿块影,边缘模糊,右肺尖有钙化。吸烟,10年前曾患右上肺结核,已治愈,平素体健。

123. 为确诊最恰当的检查方法是

- A. 再次痰液检查找癌细胞
- B. 经胸壁穿刺活检
- C. 支气管纤维镜检查
- D. 胸部CT
- E. 纵隔镜检查

124. 该患者确诊为中央型肺癌,行右全肺叶切除术

加淋巴结切除术,最不可能发生的并发症是

- A. 出血
- B. 感染
- C. 肺不张
- D. 肺水肿
- E. 腹泻

125. 该患者手术后第1日,其护理措施中错误的是

- A. 协助患者深呼吸及咳嗽
- B. 适当给予止痛剂
- C. 24小时补液量控制在2000ml内
- D. 取头低仰卧位引流排痰
- E. 患者生命体征平稳后,协助其床旁站立移步

(126~128 题共用题干)

患者,男,45岁。活动后突然出现剧烈头痛,喷射性呕吐,随后意识模糊,无肢体瘫痪,脑膜刺激征阳性,CT检查呈高密度影,既往体健。

126. 该病最可能的诊断是

- A. 脑梗死
- B. 脑血栓形成
- C. 脑出血
- D. 蛛网膜下隙出血
- E. 短暂性脑缺血发作

127. 本病最常见的病因是

- A. 先天性脑动脉瘤
- B. 脑动脉粥样硬化
- C. 血小板减少
- D. 凝血机制障碍
- E. 高血压

128. 该患者病因诊断的主要依据是

- A. 脑超声检查
- B. MRI检查
- C. CT检查
- D. 脑血管造影
- E. 脑脊液检查

(129~131 题共用题干)

患者,女,68岁。2年前丈夫病故后,经常独自流泪,近1年来常出现记忆障碍。前几日,患者独自外出后未归,后被家人找到。

129. 该患者最可能是

- A. 脑卒中
- B. 妄想症
- C. 抑郁症
- D. 焦虑症
- E. 早期阿尔兹海默症

130. 对于该疾病,目前临床最常用的治疗药物是

- A. 抗焦虑药物
- B. 抗抑郁药物
- C. 抗躁狂药物
- D. 乙酰胆碱酯酶抑制剂
- E. 促进代谢药物

131. 社区护士家庭访视时,注意到其女儿照料患者的过程中采取以下做法,其中不正确的是

- A. 为防止患者走失,不让他外出,把他整天关在家里



- B. 在她衣服上写名字和家中电话
C. 尽量让患者自己的事情自己做
D. 让患者帮忙料理一些家务
E. 为帮助患者记忆,会常和她一起看过去的
生活照片

(132~133 共用题干)

患儿,男,胎龄 34 周,日龄 4 日。出生体重为 2105g。

P135 次/分,呼吸佳,四肢能活动,全身皮肤红嫩。

132. 依据体重分类,此患儿属于

- A. 极低出生体重儿 B. 巨大儿
C. 正常出生体重儿 D. 超低出生体重儿
E. 低出生体重儿

▲133. 与此患儿外观特征不符的是

- A. 足底布满纹路 B. 皮肤薄嫩,胎毛多
C. 耳郭不清楚 D. 乳房无结节
E. 头发细如绒毛

134. 此患儿护理措施中错误的是

- A. 晨间护理时室温调到 27~28℃,相对湿度
55%~65%
B. 与足月儿分开,实施保护性隔离
C. 喂养时首选母乳
D. 给予合适的体位,常采取侧卧位
E. 密切观察患儿病情,及时报告医生

(135~136 题共用题干)

患者,男,33 岁。因溺水后被救送医院急诊 EICU,经抢救后,现患者呼吸心跳已经恢复。

135. 目前该患者应该重点进行的步骤是

- A. 脑复苏 B. 一期复苏
C. 二期复苏 D. 上呼吸机
E. 电除颤

136. 关于低温疗法的护理,哪一项是错误的

- A. 不宜翻身和移动体位
B. 体温不低于 32℃
C. 保持水、电解质平衡
D. 严密观察生命体征
E. 复温时先停冬眠药物,后撤降温

【参考答案及难题解析】

专业实务

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	E	B	D	A	A	D	C	E	C	B
序号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	D	C	B	B	A	E	D	C	B	A

序号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	D	B	B	A	B	B	D	B	E	D
序号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	E	B	E	A	E	B	B	C	C	D
序号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
答案	A	C	B	D	B	D	D	B	D	C
序号	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
答案	B	E	A	A	E	C	D	D	B	D
序号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
答案	B	A	E	A	C	D	E	D	B	A
序号	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
答案	E	D	C	C	B	E	B	E	B	D
序号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
答案	A	E	C	B	B	D	D	E	C	C
序号	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
答案	C	A	E	B	B	E	A	A	D	D
序号	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
答案	C	D	D	D	D	A	C	A	E	C
序号	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
答案	E	C	A	B	E	E	B	B	C	B
序号	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
答案	E	E	C	E	D	D	A	D	E	D
序号	131	132	133	134	135	136				
答案	A	E	A	D	A	E				

8 题解析:①新生儿及 2 个月以下的小婴儿,最常见的是大肠埃希菌;②3 个月~3 岁小儿多由流感嗜血杆菌引起;③年长儿由脑膜炎双球菌、肺炎链球菌引起。

79 题解析:砖红色胶冻状痰液为克雷白杆菌肺炎特征性痰液。

80 题解析:体位引流每次 15~20 分钟,每日 2~3 次。

108 题解析:红细胞悬液指全血经离心提取血浆后的红细胞加入等量红细胞保养液制成。适用于战地急救和中、小手术患者。

113 题解析:制订护理措施应充分利用现有的设备、经济实力和人力资源;应针对护理目标;符合实

际,体现个体化的护理;内容应具体、明确、全面;应保证患者的安全;应有科学的理论依据;应与医疗工作相协调。骨科制定的常规,还要根据不同的患者情况修改后实施。

119 题解析:炎性浸润期损伤延伸到皮下脂肪层。受损皮肤呈紫红色,皮下有硬结,患者感觉疼痛。皮肤因水肿而变薄,并有炎性渗出,形成大小不一的水疱。水疱破溃后,形成潮湿红润的创面,如不采取积极的措施,压疮将继续发展。

133 题解析:早产儿哭声低,皮肤红嫩,四肢肌张力低下,胎毛多,耳壳软,指(趾)甲未达指(趾)端,乳晕不清,足底纹理少,男婴睾丸未降或未完全下降,女婴大阴唇不能或不能完全盖住小阴唇。

实践能力

一、请从各题 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号对应答案所属的方框涂黑。

- 肠梗阻非手术治疗期间梗阻解除的标志是
 - 轻度压痛,无肌紧张
 - 呕吐后腹胀减轻
 - 胃肠减压后腹痛减轻
 - 肛门排气排便
 - 肠鸣音亢进转为消失
- 输卵管妊娠患者前来就诊时,最常见的主诉是
 - 腹痛
 - 胸痛
 - 咳嗽
 - 咯血
 - 呼吸急促
- 子宫颈炎症的主要症状是
 - 外阴皮肤瘙痒
 - 阴道分泌物稀薄
 - 白带增多
 - 泡沫状白带
 - 腹痛
- 为了减轻伤口疼痛,子宫内异位症患者术后卧位应为
 - 半卧位
 - 去枕平卧位
 - 头低足高位
 - 侧卧位
 - 头高足低位
- 在第三产程中,对产妇的评估最重要的是
 - 乳汁分泌的情况
 - 宫缩情况,阴道流血量及颜色
 - 生命体征
 - 疼痛
 - 会阴伤口情况
- 35 岁产妇,因胎儿宫内窘迫行低位产钳助产术

娩出一活婴。产后 3 天诉会阴部疼痛难忍,查体:会阴部肿胀,左侧切口红肿、有触痛,以下处理不正确的是

- 红外线照射
- 50%硫酸镁湿敷切口
- 每日冲洗外阴
- 取健侧卧位
- 1:5000 高锰酸钾溶液坐浴

7. 健康女婴,足月顺产后 5 天,因出现阴道血性分泌物被父母送来医院。该现象最有可能是

- 假月经
- 阴道直肠瘘
- 尿道阴道瘘
- 会阴损伤
- 血友病

8. 患者,女,妊娠 38 周。因先兆子痫入院。目前患者轻微头痛,血压为 140/90mmHg,尿蛋白(++) ,呼吸、脉搏正常。在应用硫酸镁治疗过程中,护士应报告医师停药的情况是

- 呼吸 18 次/分
- 膝反射消失
- 头痛缓解
- 血压 130/90mmHg
- 尿量 800ml/24 小时

9. 一般患者短时间肛门检查最常用的体位是

- 蹲位
- 膝胸卧位
- 左侧卧位
- 截石位
- 仰卧位

10. 患者,男,35 岁。近 3 个月经常排便后滴少量鲜血。肛门指检无异常发现,肛门镜检查截石位见 3、6 点各有一突于肛管内的暗红色圆形软结节,考虑该患者为

- I 期内痔
- II 期内痔
- III 期内痔
- IV 期内痔
- 直肠息肉

11. 患者,男,41 岁。诊断为胆总管结石,拟行胆总管切开取石、T 管引流术,放置 T 管的目的不包括

- 引流胆汁
- 经 T 管造影
- 引流腹腔渗液
- 引流残余结石
- 支撑胆道

12. 患者,男,43 岁。因胆道梗阻出现黄疸,尿中有胆红素,其尿液颜色为

- 淡黄色
- 红色
- 乳白色
- 酱油色
- 黄褐色

13. 患者,男,29 岁。有胃溃疡穿孔修补手术史,2



- 日前出现腹痛、腹胀伴呕吐、肛门停止排便排气,经检查诊断为肠梗阻,现最重要的是应了解
- 梗阻的原因
 - 梗阻的部位
 - 梗阻的程度
 - 梗阻的发生速度
 - 梗阻是否绞窄
14. 某妊娠合并糖尿病产妇,孕期无其他合并症。于妊娠 39 周剖宫产一健康男婴,对于新生儿应重点监测的内容是
- 大小便
 - 体重
 - 黄疸
 - 血糖
 - 体温
15. 新生儿,男,经产钳助产娩出。出生后心率 95 次/分,呼吸浅慢,皮肤青紫,四肢稍屈,喉反射消失。Apgar 评分为
- 4 分
 - 5 分
 - 6 分
 - 7 分
 - 8 分
16. 孕妇,26 岁。妊娠 39 周,上午家务劳动时突感胎动频繁,至傍晚胎动渐减弱、消失,急诊入院,听诊胎心音 90 次/分,下列护理措施不妥的是
- 左侧卧位,间断吸氧
 - 行胎心监护
 - 嘱孕妇增加营养和休息即可,继续观察病情
 - 协助做好剖宫产的准备
 - 做好新生儿的抢救和复苏准备
17. 患儿,男,5 岁。以呕吐、惊厥、烦躁、高热 3 小时入院。评估:体温 39.6℃,心率 120 次/分,右下肢呈半屈曲状,膝上部股骨下段处剧痛,局部红、肿、热伴有压痛,分层穿刺抽出混浊液体,涂片为脓细胞,初步诊断为化脓性骨髓炎,用抗生素抗感染治疗 3 日后,体温仍 39.6℃,此患儿应采取哪项紧急治疗措施
- 手术开窗引流
 - 继续抗感染治疗
 - 患肢制动
 - 止痛
 - 复方氨基比林肌注
18. 患者,男,58 岁。患左侧腹股沟斜疝,半小时前背重物时疝块突然增大、不能回纳,疝块紧张发硬伴疼痛和压痛。考虑其可能是
- 易复性疝
 - 难复性疝
 - 滑动性疝
 - 嵌顿性疝
 - 绞窄性疝
19. 早期诊断子宫内膜癌最常用的方法是
- 超声检查
 - 宫颈活检
 - 分段诊刮
 - 宫颈刮片
 - 妇科检查
20. 处理良性葡萄胎时,下列哪项不对
- 应取水泡送病理检查
 - 均应做预防性化疗
 - 40 岁以上疑癌变者可考虑子宫切除
 - 吸宫术中预防子宫穿孔
 - 一旦确诊即行清宫
21. 溃疡性口腔炎下列哪项护理措施错误
- 患儿宜进温凉的流质饮食
 - 口腔护理用 2% 的碳酸氢钠溶液
 - 进餐前可局部涂 2% 利多卡因溶液
 - 清洗后涂 1% 复方甲紫
 - 患儿的奶具、玩具应煮沸消毒
22. 患儿,女,1 岁。以腹泻 2 日、无尿 7 小时入院。经过补液治疗后已开始排尿,护士按照医嘱给予继续补液 200ml,该液体中可以最多加入 10% 氯化钾
- 14ml
 - 6ml
 - 8ml
 - 10ml
 - 12ml
23. 患者,女,30 岁。妊娠 39 周,临产,规律宫缩 12 小时,胎膜已破 3 小时。肛查宫口开大 5cm,胎先露 S+2,下列诊断正确的是
- 正常潜伏期
 - 正常活跃期
 - 潜伏期延长
 - 活跃期延长
 - 胎膜早破
24. 患者,女,30 岁。宫内妊娠 43 周,未临产,NST 2 次无反应,OCT 10 分钟内出现晚期减速 2 次,1 周前 E/C 比值为 15,现仅为 7,下列处理正确的是
- 吸氧后观察
 - 人工破膜
 - 缩宫素引产
 - 立即剖宫产
 - 口服雌激素
25. 患者,男,70 岁。前列腺摘除术后使用气囊导尿管压迫止血,进行膀胱冲洗时不正确的护理措施是
- 记录冲洗量和排出量
 - 密闭式持续膀胱冲洗
 - 冲洗液用无菌生理盐水
 - 注入止血药后要夹管 30 分钟
 - 每次冲洗量 200~300ml
26. 患者,女,29 岁。妊娠 40 周,有规律宫缩后入院,将此产妇送入产房准备接生的指征正确的是
- 有规律宫缩即可
 - 初产妇、经产妇宫口开大 3~4cm