



消除作为公共卫生问题麻风指南

联合化疗可以治愈麻风，终止传染和预防残疾。
在各县(市)皮肤病或麻风病防治所(站)均可以得到
免费治疗。



2000 年第一版

世界卫生组织

全国性病麻风病控制中心译印

南京

2001.5

消除作为公共卫生问题麻风指南

联合化疗可以治愈麻风，终止传染和预防残疾。

在各县(市)皮肤病或麻风病防治所(站)均可以得到免费治疗。



世界卫生组织

为了消除麻风病，我们必须发现所有麻
风病人并用联合化疗治愈他们。



本小册子与以下机构、组织合作而出版：

全球消除麻风联盟

世界卫生组织成员国

丹麦国际发展机构（DANIDA）

国际抗麻风协会联合会

NIPPON 基金会

诺华可持续发展基金会

世界卫生组织

本小册子不是世界卫生组织的正式出版物，世界卫生组织对此保留所有版权。

然而本小册子可以部分或全部免费阅读，摘要，再版和翻译，但不得出售或进行与商业目的有关的应用。

目录

- 5 消除麻风的最后冲刺
- 8 什么是麻风？
- 10 如何诊断麻风
 - 10 麻风的体征
 - 14 哪些体征不是麻风
 - 15 如何对病人进行麻风检查
 - 16 如何测试感觉丧失
- 18 治疗病人
 - 18 如何对麻风分类
 - 19 开始联合化疗的五个简单的步骤
 - 20 联合化疗方案
 - 22 应告诉病人的麻风知识和注意事项
 - 25 专人负责联合化疗
 - 26 病人登记卡
 - 27 麻风治疗单位提供联合化疗服务的关键工作
 - 28 关于联合化疗的重要事项
 - 30 在治疗完成时
- 32 合并症的处理
 - 32 麻风反应
 - 34 联合化疗的常见副作用
 - 36 预防畸残的简单措施
- 38 在你的社区如何消除麻风

消除作为公共卫生问题麻风指南

联合化疗可以治愈麻风，终止传染和预防残疾。

在各县(市)皮肤病或麻风病防治所(站)均可以得到免费治疗。



世界卫生组织

为了消除麻风病，我们必须发现所有麻
风病人并用联合化疗治愈他们。



目录

- 5 消除麻风的最后冲刺
- 8 什么是麻风？
- 10 如何诊断麻风
 - 10 麻风的体征
 - 14 哪些体征不是麻风
 - 15 如何对病人进行麻风检查
 - 16 如何测试感觉丧失
- 18 治疗病人
 - 18 如何对麻风分类
 - 19 开始联合化疗的五个简单的步骤
 - 20 联合化疗方案
 - 22 应告诉病人的麻风知识和注意事项
 - 25 专人负责联合化疗
 - 26 病人登记卡
 - 27 麻风治疗单位提供联合化疗服务的关键工作
 - 28 关于联合化疗的重要事项
 - 30 在治疗完成时
- 32 合并症的处理
 - 32 麻风反应
 - 34 联合化疗的常见副作用
 - 36 预防畸残的简单措施
- 38 在你的社区如何消除麻风



改善麻风的诊断和治疗服务十分重要

消除麻风的最后冲刺

当所有麻风病人被发现并用联合化疗治愈时，麻风病即将被消除。

消除麻风指的是将该病的患病率降至一个很低水平。这将导致传染源减少，使麻风病象在世界许多地区一样自然消失。世界卫生组织规定“消除麻风”的含义是指麻风患病率在1/万以下。



在县(市)皮肤病或麻风病防治所
(站)均应提供免费的联合化疗



消除麻风的最后冲刺包括以下工作：

所有县(市)，特别是在流行区的县(市)皮肤病或麻风病防治所(站)，应提供免费的麻风诊断和治疗服务；

使每个卫生人员都能诊断和治疗麻风；

消除麻风恐惧，增进人们对麻风早期征象的了解，促进患者就医，保证所有麻风病人得到治愈。

本指南将帮助你：

根据临床征象诊断麻风，用全程联合化疗治愈所有病人；
处理并发症和预防残疾

建立良好的病历以记录病情和了解当地的麻风流行情况；

向社区提供正确的麻风信息。

我们必须消除

对麻风的恐惧



并增进对麻风

早期体征的了解



什么是麻风?

麻风是由麻风杆菌引起的一种传染病;

主要侵犯皮肤和神经;

发病缓慢, 平均潜伏期为 3 年;

男女老少都可得病;

麻风可被治愈, 联合化疗可杀灭细菌和终止该病的传播;

麻风病人能过上完全正常的生活;

发病后如能早期发现并及时给予联合化疗, 麻风病就不会引起残疾。



防止麻风病传播的最好方法是用
联合化疗治疗所有病人



病人能过上完全正常的生活

如何诊断麻风病

麻风的体征

麻风病人是指：

有一块或多块斑疹，并有明确的感觉丧失；
尚未完成联合化疗的全程治疗。

麻风病的斑疹：

可为浅色斑、淡红斑或棕红色斑；
扁平或高起；
不痒；
通常不痛；
温度觉、触觉和痛觉丧失；
可发生在身体的任何部位。

麻风病的其他体征包括：

淡红色或皮色结节或皮肤平滑、光亮、弥漫性肿胀，而无感觉丧失。



麻风病的斑疹 ---

可为浅色斑、淡红斑或棕红色斑，
呈扁平或高起



麻风病的斑疹 ---



--- 通常不痛



温度觉，触觉或痛觉丧失