


中 级 医 务 人 员

# 临床医学多选试题选编



云南省红河州卫生学校

# 前 言

党的十一届三中全会的春风，吹遍了祖国各地，温暖了广大知识分子的心田。我校教师在党的亲切关怀下，一扫十年内乱造成的忧郁沉闷心理状态，为四化建设贡献力量的热血奔流了，积极性迸发了。十三位讲师、主治医师和教师利用教课之余暇所编写的《中级医务人员临床医学多选试题选编》，就是他们重振革命精神的一证。

当前，世界已进入“信息”时代，人类的知识不断丰富，科学技术飞速发展，我国四化建设需要更多的人才。《选编》出版的目，主要在于使中专卫校学生以及中级医务工作者参加统考与自学参考使用，以尽编者为祖国四化建设培养人才增砖添瓦的赤诚之心。

但是，由于时间较紧，对《选编》未能作到精心推敲，加之水平所限，错误与不足在所难免，敬望读者批评指正。

云南省红河州卫校

1984年7月1日

## 编 者 的 话

：多选试题是在美、英、日等国广泛应用于临床医师及医学生考试的一种较为先进的方法。它的优点是考试知识面广；能够衡量考生的分析和综合能力；同时考生取得的成绩也较为客观等。中央卫生部曾在一九八二和八三年对部分医学院校医学专业毕业生以多选题的形式进行了两次业务考试颇受广大师生的欢迎。

为了提高多选题命题质量更好地为教学服务，同时也为初、中级医务人员晋升考核的学习参考，我校在总结八一、八二及八三届学生参加省卫生厅组织的中专卫校毕业生统一考试的基础上，组织了十三位中年教师编写了此《选编》。

《选编》中的试题基本上以卫生部颁布的中专教学大纲及统编试用教材为依据，筛选了我校近两年来使用过的试题并参考了全国几所重点医学院校的多选题，进一步审编成册。

《选编》分内、外、妇产、儿科及基础护理五门课程内容的试题，共2400题计有25万多字，各科后面均附有全部答案。

在编写过程中得到我校党、政有关领导的大力支持，教务处及各教研组的教师为了保证编写质量，给了多方面的支持和帮助，紧密配合，使本书能够按时印出。同时王少鸿同志进行封面设计，在此一并表示致谢。

云南省红河州卫校

《临床医学多选题选编》编写组

# 题型及题解说明

## 型题

本书所采用的多选题题型，是目前全国已统一采用的A、B、C和K型四种类型，各型题的特点如下：

### 1、A型题

为最佳回答题，它是由一个叙述主体和A、B、C、D、E五个备选答案组成。答题时只能选择其中最佳的一个答案，其余四个均为干扰性答案，干扰性答案可以完全不正确，也可以部分正确，但不是最佳选择、答题时应仔细思考比较从中选出最佳答案。并在答卷上将相应的字母涂黑以示正确回答。

例如

1. 急性有机磷中毒的最常见死因为  
A 休克  
B 急性肾功能衰竭  
C 呼吸衰竭  
D 脑水肿  
E 水电解质与酸碱平衡紊乱

本题正确答案为“C”

则答卷如下表示：

1. A B ☒ D E

### 2、B型题

又称配伍题，本型题首先列出五个备选答案随后列出几道考题、答案也是由A、B、C、D、E五个组成，每道考题亦只能选择其中最合适的一个答案，数道考题可共一个答案，每个答案可被重复选择，也可不被选择。

例如 问题 2 ~ 4

- A 滴虫性阴道炎
- B 霉菌性阴道炎
- C 老年性阴道炎
- D 幼女性阴道炎
- E 阿米巴阴道炎
2. 泡沫样白带
3. 豆渣状白带
4. 用碱性溶液冲洗阴道可提高疗效

其正确答案，2为A、3为B、4为B则答卷如下表示。

- 2 ☒ B C D E

- 3 A ☒ C D E

- 4 A ☒ C D E

### 3. C型题

又称比较选择题，本型题与B型题相似，即一组答案可供多道题选用，但备选答案只有四个，随后几道试题。要求应试者从备选答案中为每道题选配一个正确答案。

例如 问题 5 ~ 7

- A 新生儿颅内出血
- B 新生儿脑膜炎
- C 两者均有
- D 两者均无
5. 脑性尖叫、呕吐可考虑
6. 皮肤有感染灶可考虑
7. 早产儿有窒息史可考虑

其正确答案：5为A 6为B 7为A

则答卷如下表示

5. ☒ B C D E
6. A ☒ C D E
7. ☒ B C D E

### 4. K型题

又称复合是非题，这类试题是由一个考题主体和四个叙述式的备选答案所组成，其组合的方法固定不变、应试者选择其中一组作为正确答案。

其答案组合方式为。

- A、只有 ①、②、③是正确的
- B、只有 ① ③是正确的
- C、只有 ② ④是正确的
- D、只有 ④ 是正确的
- E、①②③④都是正确的

例如

8. 急性中毒的治疗原则包括。  
① 终止接触毒物  
② 清除进入体内已被吸收或尚未吸收的毒物  
③ 应用特殊解毒剂  
④ 对症处理

本题正确答案为E，即、①、②、③、④  
则答卷如下表示

8. A B C D ☒

# 目 录

## 前 言

## 编者的话

## 多选试题简介

### 第一章 内科学

|                   |    |
|-------------------|----|
| 第一节 诊断学基础试题       | 1  |
| 第二节 呼吸系统疾病试题      | 13 |
| 第三节 循环系统疾病试题      | 21 |
| 第四节 消化系统疾病试题      | 33 |
| 第五节 泌尿、造血系统试题     | 43 |
| 第六节 内分泌、代谢、中毒疾病试题 | 50 |
| 第七节 神经、精神疾病试题     | 53 |

### 第二章 外科学

|                |    |
|----------------|----|
| A型题 (1~294题)   | 57 |
| B型题 (295~362题) | 83 |
| C型题 (363~415题) | 85 |
| K型题 (416~540题) | 88 |

### 第三章 妇产科学

|        |     |
|--------|-----|
| 生理产科试题 | 98  |
| 病理产科试题 | 106 |
| 妇 科试题  | 119 |

### 第四章 儿科学

|              |     |
|--------------|-----|
| 基础儿科         | 137 |
| 新生儿及新生儿疾病    | 144 |
| 营养缺乏病及消化系统疾病 | 148 |
| 呼吸系统疾病       | 153 |
| 循环系统及血液系统疾病  | 154 |
| 泌尿系统疾病       | 156 |
| 神经系统及内分泌系统疾病 | 158 |

### 第五章 基础护理

|                |     |
|----------------|-----|
| A型题 (1—145题)   | 160 |
| B型题 (146~230题) | 172 |
| C型题 (231~254题) | 176 |
| K型题 (255~300题) | 177 |

# 第一章 内科学

## 第一节 诊断学基础试题

### A型题 (1~66)

1. 体温调节中枢失常引起发热的疾病是
  - A 肺炎球菌肺炎
  - B 甲亢
  - C 药物热
  - D 风湿热
  - E 中暑
2. 以下哪种疾病属感染性发热:
  - A 甲亢
  - B 风湿热
  - C 溶血
  - D 急性心肌梗塞
  - E 血吸虫病
3. 以下哪种疾病属非感染性发热
  - A 风湿热
  - B 大叶性肺炎
  - C 肺脓肿
  - D 慢性支气管炎
  - E 急性胃肠炎
4. 发热最常见和最主要的原因是:
  - A 感染性发热
  - B 变态反应性疾病
  - C 体温调节中枢功能失常
  - D 无菌坏死物质的吸收
  - E 产热过多或散热不良
5. 下列何病引起的头痛属非器质性头痛
  - A 脑膜炎
  - B 脑溢血
  - C 脑脓肿
  - D 脑震荡
  - E 脑神经衰弱
6. 以下哪种疾病属于呼气性呼吸困难:
  - A 急性喉炎
  - B 气管内异物
  - C 支气管哮喘
  - D 肺炎
  - E 肺水肿
7. 引起咯血最常见的病因是:
  - A 支气管扩张
  - B 肺癌
  - C 肺炎
  - D 肺结核
  - E 二尖瓣狭窄
8. 血液中还还原血红蛋白的绝对量增多, 当超过多少时即可出现紫绀?
  - A 1 g%
  - B 3 g%
  - C 5 g%
  - D 7 g%
  - E 9 g%
9. 上消化道出血最常见的病因是:
  - A 门脉性肝硬化食管静脉曲张破裂
  - B 消化性溃疡
  - C 胆道疾病
  - D 急性糜烂出血性胃炎
  - E 全身出血性疾病
10. 下列主诉, 哪项记录是正确的:
  - A 感冒三天
  - B 上腹痛后大量呕血
  - C 患病三年未愈, 要求治疗
  - D 发热、咳嗽5天
  - E 左胸痛伴气促、头晕
11. 肺气肿患者肺部的叩诊音是:
  - A 清音
  - B 鼓音

- C 过清音  
D 浊音  
E 实音
12. 正常成人血压标准为 (WHO)  
A 血压  $\leq 140/90\text{mmHg}$   
B 血压  $< 140/90\text{mmHg}$   
C 收缩压  $< 140\text{mmHg}$   
D 舒张压  $< 90\text{mmHg}$   
E 以上都不是
13. 颜面潮红, 兴奋不安, 呼吸急促、表情痛苦等是何类病面容:  
A 急性病容  
B 慢性病容  
C 重危病容  
D 甲亢面容  
E 伤寒面容
14. 脑溢血患者双侧瞳孔的表现常为:  
A 正常  
B 瞳孔双侧缩小  
C 瞳孔双侧扩大  
D 瞳孔双侧不等大  
E 瞳孔对光反射消失
15. 以下哪种疾病可出现语颤增强:  
A 高度胸膜肥厚  
B 胸腔积液  
C 气胸  
D 肺气肿  
E 大叶性肺炎实变期
16. 正常人肺下界位置一般在腋中线平:  
A 第5肋骨  
B 第6肋骨  
C 第7肋骨  
D 第8肋骨  
E 第9肋骨
17. 肺下界下降见于:  
A 肺气肿  
B 肺不张  
C 大量腹水  
D 气腹  
E 肝脾肿大
18. 水泡音满布肺野的疾病是:  
A 肺瘀血  
B 大叶性肺炎  
C 肺结核  
D 支气管扩张  
E 急性肺水肿
19. 胸膜摩擦音最易听到的部位是  
A 锁骨中线和腋前线第5—7肋间  
B 腋前线和腋中线第5—7肋间  
C 腋中线和腋后线第5—7肋间  
D 腋后线第5—7肋间  
E 锁骨中线第5—7肋间
20. 正常人心尖搏动的位置是:  
A 左侧第4肋间锁骨中线内2.0—2.5 cm处  
B 左侧第5肋间锁骨中线内2.0—2.5 cm处  
C 右侧第4肋间锁骨中线内2.0—2.5 cm处  
D 右侧第5肋间锁骨中线内2.0—2.5 cm处  
E 左侧第5肋间距前正中线的垂直距离7—9 cm处
21. 心尖搏动增强见于:  
A 肺气肿  
B 心包积液  
C 心肌炎  
D 左侧胸腔积液  
E 甲亢
22. 心尖部出现舒张期震颤见于  
A 二尖瓣狭窄  
B 二尖瓣关闭不全  
C 室间隔缺损  
D 主动脉瓣关闭不全  
E 肺动脉瓣关闭不全
23. 右心室扩大时, 心尖搏动向何处移位  
A 向右  
B 向左  
C 向下  
D 向右下

- E 以上都不是
24. 心脏听诊按“主次顺序法”的听诊顺序是
- A 二尖瓣区→主动脉瓣区→主动脉第二听诊区→肺动脉瓣区→三尖瓣区
- B 三尖瓣区→主动脉瓣区→肺动脉瓣区→主动脉瓣第二听诊区→二尖瓣区
- C 二尖瓣区→肺动脉瓣区→主动脉瓣区→主动脉瓣第二听诊区→三尖瓣区
- D 三尖瓣区→肺动脉瓣区→主动脉瓣区→主动脉瓣第二听诊区→二尖瓣区
- E 以上都不是
25. 第一心音产生的原理最主要的是:
- A 心室收缩时二尖瓣、三尖瓣突然关闭的震动产生
- B 心室收缩时主动脉瓣、肺动脉瓣突然开放的震动产生
- C 心室收缩时心室肌肉收缩产生
- D 心室排血初期, 血流冲击大血管的震动产生
- E 以上都不是
26. 下述哪种疾病引起第一心音减弱?
- A 室上性阵发性心动过速
- B 二尖瓣狭窄
- C 甲亢
- D 二尖瓣关闭不全
- E 贫血
27. 心尖区听到收缩期Ⅲ级以上吹风样杂音, 并向左腋下传导, 首先考虑:
- A 功能性杂音
- B 二尖瓣关闭不全
- C 二尖瓣狭窄
- D 三尖瓣关闭不全
- E 三尖瓣狭窄
28. 关于杂音的概念, 哪项是错误的:
- A 生理性杂音一般无临床意义
- B 病理性杂音表示心脏和血管的病变
- C 收缩期杂音均为病理性杂音
- D 舒张期杂音均为病理性杂音
- E 连续期杂音均为病理性杂音
29. 以下哪点不是胸膜摩擦音的特点
- A 吸气和呼气均可听到
- B 屏止呼吸消失
- C 听诊器加压后更为清楚
- D 一般在腹前线及腋中线第5—7肋间最易听到
- E 咳嗽或咳嗽后深吸气可增多或消失
30. 以下哪种情况肺泡呼吸音增强
- A 胸腔积液
- B 肺气肿
- C 气胸
- D 喉头水肿、痉挛
- E 发热
31. 以下哪项不是胸腔大量积液的体征:
- A 患侧膨隆, 呼吸动度减弱
- B 患侧语颤减弱或消失
- C 患侧叩诊呈实音
- D 患侧呼吸音消失
- E 气管移向患侧
32. 关于体温、脉搏、呼吸、血压哪项是错误的
- A 正常人体温(口表)36.2—37.2℃, 体温升高1℃。脉搏增加10次左右。
- B 正常人脉搏60—100次/分, 脉搏>100次/分时为脉搏增快, 脉搏<60次/分时为脉搏减慢。
- C 正常人呼吸为16—20次/分, 呼吸>20次/分为呼吸增快, 呼吸<16次/分为呼吸减慢。
- D 正常人呼吸与脉搏之比为1:4
- E 40岁以下的健康人血压为90—130/60—90毫米汞柱, 脉压为30—40毫米汞柱。
33. 早期慢性支气管炎肺部X线表现是
- A 无特殊征象



- B 两肺纹理增粗、紊乱  
C 肺野透亮度增加  
D 膈肌下降  
E 胸廓扩张肋间隙增宽
34. 以下哪个概念是错误的:  
A 严重贫血病人(血红蛋白 $<4.5\text{g}\%$ )即使全部氧合血红蛋白处于还原状态也不出现紫绀。  
B 当血液中的总胆红素浓度超过 $2.0\text{mg}\%$ 时,可使巩膜、粘膜、皮肤发黄、即为黄疸。  
C 只要有黑便存在,就一定是上消化道出血。  
D 吗啡引起的呕吐为中枢性呕吐。  
E 心源性水肿首先出现的部位是身体最低部。
35. 阻塞性黄疸下列检查哪项是错误的  
A 血清硷性磷酸酶降低  
B 尿胆素原反应阴性  
C 凡登白试验立即直接反应  
D 血清直接胆红素增加  
E 灰白色粪便
36. 消化性溃疡合并大出血的特点,不正确的是:  
A 出血后疼痛加重  
B 呕血常混有食物  
C 呕血呈酸性  
D 呕血为咖啡色  
E 出血后可有发热及氮质血症
37. 一长期卧床不起的心力衰竭病人,其最早的水肿部位是  
A 双上肢  
B 双下肢踝部  
C 眼睑及面部  
D 腰骶部及臀部  
E 腹部
38. 病理性杂音的特点是  
A 二级以下的收缩期吹风样杂音  
B 发生部位局限(肺动脉瓣区,心尖部)  
C 受呼吸的影响,与体位有关,休息可消失  
D 无心脏病史及体征  
E 以上都不是
39. 以下哪项不是主动脉瓣关闭不全体征  
A 颈静脉怒张  
B 颈动脉搏动  
C 毛细血管搏动征  
D 水冲脉  
E 枪击音
40. 脾脏肿大时,下列哪项是错误的  
A 脾脏位置在左肋缘下,随呼吸而上下移动  
B 脾前缘常可触到切迹  
C 胃泡鼓音区缩小  
D 若肠管高度胀气、脾区处叩之呈鼓音  
E 位置较深时,要用双手触诊法
41. 腹部检查以下哪项是错误的  
A 急性胆囊炎时墨非氏征阳性  
B 胃肠穿孔时,肝浊音界缩小或消失  
C 阑尾炎时麦氏点可出现压痛点  
D 腹水超过 $1000\text{ml}$ 时可出现移动性浊音  
E 正常人肠鸣音每分钟3—5次,超过5次为肠鸣音亢进,少于3次为肠鸣音减弱
42. 周围血管征常见于:  
A 二尖瓣关闭不全  
B 二尖瓣狭窄  
C 主动脉瓣关闭不全  
D 主动脉瓣狭窄  
E 三尖瓣关闭不全
43. 在胸骨右缘第二肋间,听到舒张期吹风样杂音见于:  
A 二尖瓣关闭不全  
B 二尖瓣狭窄  
C 主动脉瓣关闭不全  
D 主动脉瓣狭窄

- E 肺动脉瓣狭窄
44. 下列哪项对肝癌的诊断最有价值:
- 肝区疼痛
  - 进行性肝肿大
  - 肝质硬
  - 肝触痛
  - 肝边钝
45. 患者女性, 40岁, 有慢性肝炎史, 半年来进行性腹部隆起, 月经不调。查体: 腹部明显膨隆, 用什么物理检查区别腹部膨隆的原因是腹水或其它原因
- 腹围测量
  - 移动性浊音
  - 波动感
  - 比较叩诊浊音、鼓音的部位
  - 触诊
46. 以下生理反射中, 哪项为浅反射
- 提睾反射
  - 二头肌反射
  - 三头肌反射
  - 膝腱反射
  - 跟腱反射
47. 腱反射亢进的疾病是
- 周围神经炎
  - 脊髓灰质炎
  - 极度衰竭病人
  - 昏迷
  - 甲亢
48. 三头肌的反射中枢在
- 颈髓 2、3
  - 颈髓 4、5
  - 颈髓 6、7
  - 颈髓 7、8
  - 颈髓 8、胸髓 1
49. 巴彬斯基氏征阳性的典型表现是
- 母趾背屈四趾散开
  - 五趾均背屈
  - 五趾均跖屈
  - 下肢各关节均迅速回缩
  - 各趾均不动
50. 以下哪项为脑膜刺激征
- 巴彬斯基氏征
  - 查多克氏征
  - 戈登氏征
  - 霍夫曼氏征
  - 布鲁辛斯基氏征
51. 在测定 A、B、O 血型时, 使用玻片法, 在 A 侧玻片凹面加入 A 型标准血清一滴, B 侧加入 B 型标准血清一滴。如被检血型为 B 型, 当两侧各加入检者血球悬液一滴后, 反应为
- A 侧凝集、B 侧不凝集
  - B 侧凝集、A 侧不凝集
  - 两侧都凝集
  - 两侧都不凝集
  - 以上都不是
52. 以下哪项概念正确
- 红细胞减少的程度与贫血相平行
  - 网织红细胞出现过多表示造血功能低下
  - 再生障碍性贫血中性粒细胞可出现核左移现象
  - 风湿热在治疗过程中血沉逐渐减慢, 说明病情逐渐好转
  - 以上都不对
53. 肝细胞严重坏死时, 肝功能异常主要表现为
- ZnTT 增高
  - 白球蛋白比例倒置
  - TTT 增高
  - GPT 增高
  - GOT 高于 GPT。
54. 有关尿的检查错误的是
- 持续存在的蛋白尿多见于肾实质损害
  - 尿中出现丙酮称为酮尿
  - 凡由尿中排出任何糖类都称为糖尿
  - 急性肾炎患者尿比重多偏高
  - 糖尿病人因尿量增多, 故比重偏低

55. 关于尿管型的概念错误的是
- 轻度肾损害可见腊样管型
  - 慢性肾炎可见颗粒管型
  - 急性肾炎可见红细胞管型
  - 肾盂肾炎可见白细胞管型
  - 肾脂肪性变可见脂肪管型
56. 关于胃液分析, 以下概念哪项不正确
- 正常空腹胃液游离酸度为 0—30 单位
  - 正常空腹胃液总酸度为 10—50 单位
  - 十二指肠溃疡病人游离酸度和总酸度都增高
  - 正常胃液中含有少量乳酸, 故一般定性检查能够检出
  - 胃癌, 胃酸缺乏时可查见乳酸杆菌
57. 化脓性脑膜炎脑脊液外观的特点是
- 无色透明
  - 混浊有凝块
  - 毛玻璃样, 可形成网状薄膜
  - 红色或黄色
  - 正常或微混
58. 脑脊液蛋白细胞分离见于
- 细菌性脑膜炎
  - 多发性神经炎
  - 病毒性脑膜炎
  - 传染性多发性神经根炎
  - 脊髓灰质炎
59. GPT 在下列组织的细胞中哪一种含量最高:
- 脑
  - 心
  - 肝
  - 肾
  - 胰腺
60. 区别血尿与血红蛋白尿的主要方法
- 尿颜色检查
  - 尿胆元测定
  - 尿三杯试验
  - 尿蛋白电泳
  - 尿沉渣镜检或尿 12 小时细胞计数
61. 关于尿糖下列哪项是正确的
- 尿糖阳性肯定血糖升高
  - 尿糖阳性是由于肾小管不能将糖全部吸收
  - 尿糖阳性肯定有糖代谢紊乱
  - 根据尿糖阳性即可诊断糖尿病
  - 斑氏试剂只检查尿中是否有葡萄糖
62. 肺炎球菌肺炎出现铁锈色痰最主要的原因是:
- 痰内有大量红细胞
  - 痰内混有大量肺泡巨噬细胞
  - 是纤维蛋白和红细胞结合的产物
  - 红细胞破坏后释放含铁血黄素
  - 以上都不是
63. 下列检查中哪项与溶血无关
- 网织红细胞增多
  - 血清直接胆红素升高
  - 粪胆元增多
  - 尿胆元增多
  - 黄疸指数升高
64. 关于溴磺酞钠滞留试验哪项正确:
- 滞留量增加表示肝脏灭能功能减退
  - 结果正常表示肝脏排泄功能正常
  - 滞留量增加即可诊断肝硬化
  - 是鉴别肝硬化与肝癌的敏感方法
  - 是鉴别肝细胞性与梗阻性黄疸的有效方法
65. 以下哪项尿比重试验是严重肾功能衰竭的表现
- 夜尿量 > 750ml
  - 日尿量最高的一次比重低于 1.018
  - 日尿量最高与最低的比重差减低至 0.001—0.002
  - 尿比重固定在 1.010
  - 以上都不是
66. 重度代谢性酸中毒时, 二氧化碳结合力的标准为
- 50—60 容积 %
  - 50—40 容积 %
  - 40—30 容积 %

D 小于30容积%

E 小于15容积%

**B 型题 (67~85)**

**问题 (67~70)**

A 大量脓性痰

B 铁锈色痰

C 粉红色泡沫痰

D 白色粘液痰

E 血痰

67. 肺脓肿

68. 肺炎球菌肺炎

69. 急性肺水肿

70. 支气管扩张

**问题 (71~72)**

A 心源性水肿

B 肾源性水肿

C 肝源性水肿

D 营养不良性水肿

E 功能性水肿

71. 以眼睑及面部较显著, 常遍及全身

72. 先有消瘦, 而后出现水肿, 多从下肢开始, 通常为上行性

**问题 (73~74)**

A 浅部触诊法

B 深部滑行触诊法

C 双手触诊法

D 冲击触诊法

E 深插触诊法

73. 有大量腹水时检查肝脏

74. 确定阑尾炎压痛点

**问题 (75~76)**

各种病理性脉搏的意义

A 奇脉

B 短绌脉

C 交替脉

D 重搏脉

E 水冲脉

75. 主动脉关闭不全

76. 心房纤颤

**问题 (77~78)**

A 急性淋巴细胞性白血病

B 慢性淋巴细胞性白血病

C 急性粒细胞性白血病

D 慢性粒细胞性白血病

E 类白血病反应

77. 全身淋巴结明显肿大

78. 脾明显肿大

**问题 (79~81)**

A 舌体肥大

B 地图舌

C 杨梅舌

D 镜面舌

E 牛肉舌

79. 缺铁性贫血

80. 猩红热

81. 核黄素缺乏

**问题 (82~83)**

A 杵状指 (趾)

B 匙状指 (反甲)

C 指端异常粗大

D 指间关节呈梭状畸形

E 膝内翻呈“O”型弯曲

82. 缺铁性贫血

83. 类风湿性关节炎

**问题 (84~85)**

A 酚红排泄试验

B 尿浓缩稀释试验

C 血中尿素氮测定

D 内生肌酐清除率试验

E 血浆二氧化碳结合力测定

84. 反映肾近曲小管功能

85. 反映肾远曲小管功能

**C 型题 (86~108)**

**问题 (86~87)**

A 呕吐呈“喷射性”, 吐前无恶心感

B 呕吐后即感轻松

C 两者都有

D 两者都无

86. 颅内压升高引起的呕吐

87. 反射性呕吐

**问题 (88~89)**

- A 触诊甲状腺有震颤
  - B 听诊甲状腺有血管杂音
  - C 两者均有
  - D 两者均无
88. 甲亢
89. 单纯性甲状腺肿

**问题 (90~91)**

- A 右心室肥厚
  - B 左心房扩大
  - C 两者均有
  - D 两者均无
90. 肺心病
91. 二尖瓣狭窄

**问题 (92~93)**

- A 叩诊浊音或实音
  - B 听诊湿罗音
  - C 两者均有
  - D 两者均无
92. 大叶性肺炎
93. 肺气肿

**问题 (94~95)**

- A 将听诊器胸端向胸壁加压, 摩擦音增强
  - B 屏止呼吸仍可听到
  - C 两者均有
  - D 两者均无
94. 胸膜摩擦音
95. 心包摩擦音

**问题 (96~97)**

- A 过敏性紫癜
  - B 血小板减少性紫癜
  - C 两者均有
  - D 两者均无
96. 出血时间延长
97. 凝血时间延长

**问题 (98~99)**

- A 皮肤粘膜下出血, 直径>2毫米
- B 检查时压之不褪色
- C 两者均有
- D 两者均无

- D 两者均无
98. 出血点
99. 紫癜

**问题 (100~102)**

- A 凝血酶原时间 (一期法) 延长
  - B 凝血酶时间延长
  - C 二者均有
  - D 二者均无
100. 凝血酶形成障碍
101. 纤维蛋白形成障碍
102. 血小板减少

**问题 (103~104)**

- A 血尿
  - B 脓尿
  - C 两者均有
  - D 两者均无
103. 急性肾盂肾炎
104. 急性肾小球肾炎

**问题 (105~106)**

- A 胆红素阳性
  - B 尿胆元阳性
  - C 两者均有
  - D 两者均无
105. 溶血性黄疸
106. 肝细胞性黄疸

**问题 (107~108)**

- A 胃良性溃疡
  - B 胃恶性溃疡
  - C 两者均有
  - D 两者均无
107. 大便潜血持续阳性
108. 大便潜血有时阳性, 有时阴性, 周期性较明显

**K型题 (109~140)**

- 109 呼吸困难最常见的病因是
- ①中毒性呼吸困难
  - ②肺原性呼吸困难
  - ③神经精神性呼吸困难
  - ④心原性呼吸困难
110. 引起中心性发绀的疾病是

- ①严重右心衰竭
  - ②缩窄性心包炎
  - ③休克
  - ④肺气肿
111. 中枢性紫绀的特点是:
- ①周围血流障碍所致
  - ②动脉血氧饱和度不足所致
  - ③发绀部位皮肤冷
  - ④发绀部位皮肤温暖
112. 水肿发生的机制是
- ①钠与水的潴留
  - ②毛细血管滤过压升高
  - ③毛细血管渗透性增加
  - ④淋巴回流受阻
113. 关于黄疸的概念正确的是
- ①黄疸指数的正常值是4—6单位
  - ②黄疸指数在7—15单位之间称为隐性黄疸
  - ③临床上表现有黄疸时, 黄疸指数 $>15$ 单位
  - ④血液中的总胆红素浓度 $>2.0\text{mg}\%$ , 可使巩膜、粘膜、皮肤发黄, 即为黄疸
114. 引起全身淋巴结肿大的疾病是
- ①淋巴瘤
  - ②急性白血病
  - ③传染性单核细胞增多症
  - ④肺结核
115. 颈静脉怒张可见于
- ①右心衰竭
  - ②上腔静脉回流受阻
  - ③心包积液
  - ④左心衰竭
116. 使气管移向健侧的疾病是
- ①一侧大量胸腔积液
  - ②一侧肺不张
  - ③一侧气胸
  - ④一侧胸膜粘连肥厚
117. 周围静脉压升高见于
- ①右心衰竭
  - ②休克
  - ③心包炎
  - ④昏厥
118. 佝偻病人常见异常胸廓是
- ①桶状胸
  - ②鸡胸
  - ③扁平胸
  - ④漏斗胸
119. 湿罗音的特点是
- ①吸气和呼气都可听到, 但呼气时较明显
  - ②发生的部位不定
  - ③易变性大
  - ④具多样性, 可有大、中、小水泡音同时存在
120. 肺部听诊的内容包括
- ①呼吸音
  - ②罗音
  - ③语音传导
  - ④胸膜摩擦音
121. 干性罗音产生的原理是
- ①气流通过狭窄的支气管管腔
  - ②气管或支气管内有较稀薄的液体
  - ③支气管腔内附有粘稠分泌物
  - ④形成的水泡破裂
122. 正常心脏相对浊音界离前正中线的距离正确的是
- ①右侧第四肋间2—3cm
  - ②左侧第三肋间3.5—5cm
  - ③左侧第四肋间4—7cm
  - ④左侧第五肋间7—9cm
123. 心脏听诊的内容是
- ①心音
  - ②心率
  - ③心律
  - ④有无杂音及心包摩擦音
124. 以下说法错误的是
- ①心脏触诊出现震颤提示有器质性心脏病
  - ②蜘蛛痣出现说明患有肝硬化
  - ③舒张早期奔马律的出现, 提示有心肌

严重损害, 心肌高度衰竭

④心房纤颤时, 脉率常常大于心率

125. 二尖瓣狭窄病人, 下列哪些情况适于作二尖瓣分离术

①第一心音正常

②响亮的开瓣音

③响亮的收缩期杂音

④响亮的第二心音

126. 第三心音可见于下列哪些情况

①二尖瓣狭窄

②正常青少年

③Ⅲ度房室传导阻滞

④二尖瓣关闭不全

127. 第一心音的特点是

①音调较低, 时限较长

②心尖部最强

③第一心音到第二心音间隔时间短

④心尖搏动之后出现

128. 主动脉瓣关闭不全患者的周围血管征包括

①水冲脉

②甲床毛细血管搏动

③肱动脉枪击音

④脉搏短绌

129. 门脉性肝硬化, 由于雌激素增多可引起以下体征

①肝掌

②皮肤色素沉着

③蜘蛛痣

④皮肤粗糙

130. 肾脏有病变时腹部的压痛点是

①第十肋前端

②腹直肌外缘平脐处

③两髂前上棘连线与通过耻骨结节的垂直线的交点

④耻骨联合上方

131. 能引起脾肿大的疾病是

①伤寒

②肝硬化

③慢性白血病

④败血症

132. 叩膝反射时应将

①下肢伸直

②下肢弯曲

③肢体用力

④肢体放松

133. 脑膜刺激征的临床表现有

①双侧巴彬斯基氏征阳性

②颈强直, 克匿格氏征阳性

③眩晕、耳鸣、恶心

④头痛、恶心、呕吐

134. 以下哪些组合是正确的

①24小时尿量1500ml—正常

②24小时尿量2000ml—多尿

③每小时尿量15—20ml—少尿

④24小时尿量150ml—无尿

135. 收集尿液标本的正确方法是

①清晨第一次尿液为好

③新鲜送检、无法送检时应放在冰箱中贮存

③取尿量为100—200ml, 应取中段尿

④尿液中加入适量防腐剂亦可, 但防腐剂可能会影响某些化学检查结果

136. 下列情况哪些可产生漏出性胸腔积液

①急性左心衰

②肾病综合症

③营养不良

④低蛋白血症

137. 大量浆液脓性痰, 静置后分三层的疾病是

①慢性支气管炎

②肺脓肿

③支气管哮喘

④支气管扩张

138. 结核性渗出性胸膜炎胸水特点有

①比重 $>1.018$

②蛋白含量 $>2.5g\%$

③李瓦他氏反应阳性

④草黄色抽出液静置后不易凝固

139. 胃液分析结论为胃酸缺乏, 可见于哪

些疾病

- ①慢性浅表性胃炎
- ②慢性萎缩性胃炎
- ③胃溃疡
- ④胃癌

140. 可出现大量蛋白尿的疾病有

- ①糖尿病
- ②系统性红斑狼疮
- ③过敏性紫癜
- ④肺心病伴严重心衰

### 答案

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 1 E   | 2 E   | 3 A   | 4 A   |
| 5 E   | 6 C   | 7 D   | 8 C   |
| 9 B   | 10 D  | 11 C  | 12 A  |
| 13 A  | 14 D  | 15 E  | 16 D  |
| 17 A  | 18 E  | 19 B  | 20 E  |
| 21 E  | 22 A  | 23 B  | 24 A  |
| 25 A  | 26 D  | 27 B  | 28 C  |
| 29 E  | 30 E  | 31 E  | 32 C  |
| 33 A  | 34 C  | 35 A  | 36 A  |
| 37 D  | 38 E  | 39 A  | 40 D  |
| 41 E  | 42 C  | 43 C  | 44 B  |
| 45 D  | 46 A  | 47 E  | 48 D  |
| 49 A  | 50 E  | 51 A  | 52 D  |
| 53 E  | 54 E  | 55 A  | 56 D  |
| 57 B  | 58 D  | 59 C  | 60 E  |
| 61 B  | 62 D  | 63 B  | 64 B  |
| 65 D  | 66 D  | 67 A  | 68 B  |
| 69 C  | 70 A  | 71 B  | 72 D  |
| 73 D  | 74 E  | 75 E  | 76 B  |
| 77 B  | 78 D  | 79 D  | 80 C  |
| 81 B  | 82 B  | 83 D  | 84 A  |
| 85 B  | 86 A  | 87 D  | 88 C  |
| 89 D  | 90 A  | 91 C  | 92 C  |
| 93 D  | 94 A  | 95 C  | 96 B  |
| 97 D  | 98 B  | 99 C  | 100 A |
| 101 B | 102 D | 103 C | 104 A |
| 105 B | 106 C | 107 B | 108 A |
| 109 C | 110 D | 111 C | 112 E |
| 113 E | 114 A | 115 A | 116 B |

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 117 B | 118 C | 119 D | 120 E |
| 121 B | 122 D | 123 E | 124 C |
| 125 C | 126 C | 127 A | 128 A |
| 129 B | 130 A | 131 E | 132 C |
| 133 C | 134 B | 135 E | 136 E |
| 137 C | 138 A | 139 C | 140 E |

## 第二节 呼吸系统试题

### A 型题 (1~73)

1. 单纯型慢性支气管炎的症状是:

- A 突然发作咳嗽咯痰
- B 突然发作咳嗽咯痰伴喘息
- C 反复咳嗽咯痰伴喘息
- D 反复咳嗽咯痰
- E 以上都不是

2. 慢性支气管炎最主要的病因是:

- A 大气污染
- B 吸烟
- C 气候变化
- D 过敏因素
- E 细菌和病毒感染

3. 慢性支气管炎咳嗽的一般性状为:

- A 粘液脓性痰
- B 白色粘液泡沫痰
- C 脓痰
- D 粉红色泡沫痰
- E 痰中带血

4. 慢性支气管炎最主要的并发症是:

- A 支气管扩张
- B 支气管肺癌
- C 阻塞性肺气肿
- D 自发性气胸
- E 支气管哮喘

5. 下述哪项不是慢性支气管炎并发症?

- A 自发性气胸
- B 肺心病
- C 肺部急性感染
- D 支气管肺癌
- E 慢性阻塞性肺气肿



6. 患者男性60岁咳嗽10多年,近3年出现气喘,双肺广泛哮鸣音和肺底湿罗音,最可能的诊断是:
- 支气管哮喘
  - 支气管扩张
  - 支气管肺癌
  - 慢性纤维空洞型肺结核
  - 喘息型慢性支气管炎
7. 支气管哮喘的发病原理中吸入过敏原后,浆细胞的特异性抗体是:
- IgA
  - IgG
  - IgE
  - IgM
  - IgD
8. 支气管哮喘发作时,肺部听诊有:
- 呼吸音减弱
  - 满布双肺湿罗音
  - 满布双肺哮鸣音
  - 支气管呼吸音
  - 局限性湿罗音
9. 支气管哮喘的临床特征是:
- 吸气性呼吸困难
  - 阵发性夜间呼吸困难
  - 反复发作的混合性呼吸困难
  - 反复发作的呼气性呼吸困难
  - 肺底湿罗音
10. 支气管哮喘发作时呼气期两肺满布哮鸣音,其原因主要是
- 支气管内粘稠物增多
  - 支气管粘膜肿胀使支气管狭窄
  - 阻塞性肺气肿
  - 支气管平滑肌痉挛
  - 肺泡间质水肿
11. 在鉴别支气管哮喘与心源性哮喘时下列哪项最重要?
- 病史
  - 发热
  - 双肺满布哮鸣音
  - 两肺底湿罗音
  - X线肺纹理增粗
12. 顽固性支气管哮喘发作时可用:
- 喘定
  - 氢化可的松
  - 5%碳酸氢钠
  - 氯化铵
  - 必嗽平
13. 哮喘持续状态是指哮喘发作持续时间至少在:
- 6小时
  - 12小时
  - 24小时
  - 36小时
  - 48小时
14. 哮喘持续状态时血液气体检查常显示
- 呼吸性酸中毒
  - 呼吸性硷中毒
  - 代谢性酸中毒
  - 代谢性硷中毒
  - 正常
15. 下列哪项不是引起哮喘持续状态原因
- 感染未控制
  - 过敏原未消除
  - 硷中毒
  - 精神紧张情绪激动
  - 痰粘稠难咳出
16. 有一54岁老人常于夜间发作,气急伴咳嗽咯出泡沫痰,有时带粉红色,双肺底闻湿罗音。你认为下述哪种疾病的可能性大?
- 支气管哮喘
  - 心源性哮喘
  - 喘息型慢性支气管炎
  - 支气管肺癌
  - 肺炎
17. 支气管扩张的主要病因是:
- 支气管过敏
  - 支气管平滑肌痉挛
  - 支气管感染和阻塞
  - 肺气肿