

中等卫生学校四年制护理专业教材

急诊护理 达标练习

湖南科学技术出版社

中等卫生学校四年制护理专业教材

急诊护理达标练习

主 编：邹玉莲

主 审：罗学宏

编 者：(以姓氏笔画为序)

易 霞 邹玉莲 颜关明

本测试题集是以卫生部四年制护理专业教材为基础，根据单元学习目标的要求编写，按教材章节顺序编排。试题内容力求全面、突出重点、内容正确、文字精练，能体现目标教学与护理专业的特点，具有评价性、启发性和通用性。

本试题集选用目前最常用的题型：选择题（含单项选择题和多项选择题）、填空题、名词解释、是非题、简答题、案例分析。分单元达标练习、综合达标测试题和参考答案三部分进行编写。第一部分是单元达标练习，便于学生在单元学习后进行练习、自测，以及教师进行单元达标测试和形成性评价；第二部分是综合达标测试题，包括本课程的全部教学内容，有利于学生进行总复习；第三部分是参考答案。

由于此教材涉及课程门类较多，体例安排略有特殊，主要是第六章下的单元练习有其习题与主体教材对应，特此说明。

各题要求：

一、选择题：

1. 单项选择题题干在前，有A、B、C、D四个备选答案，只须将其中一正确答案填入题于题干后。

2. 多项选择题题干在前，有A、B、C、D、E五个备选答案，可供选择的答案有两个或两个以上，应将其正确答案依次填入题于题干后。

二、填空题：按题要求填入答题内容，力求正确、精练。

三、是非题：陈述正确的，在题后用“√”表示，错误的用“×”表示。

四、名词解释题：根据题意进行简明扼要的解答。

五、简答题：根据题意要求，简要回答。

六、案例分析：根据题意，根据题意根据题意根据题意。

《急诊护理》编写组

1999年4月

湖南科学技术出版社

要有眼球震颤、瞳孔反射与对光反射等生命体征。②保持呼吸道通畅，吸净气管内分泌物后，应密切观察呼吸、心跳。③立即施行气管插管，必要时施行气管切开。④备好急救用品及器械，配合医师行脑室穿刺引流术。⑤紧急术前特殊检查和手术准备。

× 0.1 × 0 × 8 √ 5 √ 0 × 2 × 4 × 6 √ 5 √ 1

六、案例分析 强答简，正

大略血
图重和五血... ①... ②... ③... ④... ⑤... ⑥... ⑦... ⑧... ⑨... ⑩... ⑪... ⑫... ⑬... ⑭... ⑮... ⑯... ⑰... ⑱... ⑲... ⑳... ㉑... ㉒... ㉓... ㉔... ㉕... ㉖... ㉗... ㉘... ㉙... ㉚... ㉛... ㉜... ㉝... ㉞... ㉟... ㊱... ㊲... ㊳... ㊴... ㊵... ㊶... ㊷... ㊸... ㊹... ㊺... ㊻... ㊼... ㊽... ㊾... ㊿... 一、选答简

（一）单项选择题

1. C 2. D 3. D 4. A 5. A 6. C 7. C 8. A 9. C 10. C 11. B 12. D

中等卫生学校四年制护理专业教材

急诊护理达标练习

主编单位：岳阳市卫生学校

责任编辑：梅志洁 黄一九

出版发行：湖南科学技术出版社

社址：长沙市展览馆路66号

http://www.hnstp.com

邮购联系：本社服务部 0731-4441720

印刷：湖南省新华印刷二厂

（印装质量问题请直接与原厂联系）

厂址：邵阳市双坡岭

邮编：422001

出版日期：1999年8月第1版第1次

开本：787mm×1092mm 1/16

印张：5.75

字数：133000

印数：1~12100

书号：ISBN 7-5357-2752-2/R·558

定价：8.00元

（版权所有·翻印必究）

88

使用 说 明

本书是《急诊护理》的配套教材,为反馈教学效果与检查学生情况而编写的这本达标练习,供学生在单元(章)教学完成后,能对照单元学习目标进行练习,测评达标的程度;同时教师则根据抽查练习测评反馈结果,及时总结教学经验,并对未能达标的学生施以矫正辅导,使其达到学习目标的要求。

本测试题集是以卫生部四年制护理专业教学大纲为依据,以教材为基础,根据单元学习目标的要求拟写,按教材章节顺序编排。试题内容力求少而精、题意清楚、重点突出、内容正确、文字精炼,能体现目标教学与护理专业的特点,具有评价性、启发性和适用性。

本试题集选用目前最常用的题型:选择题(含单项选择题和多项选择题)、填空题、名词解释、是非题、简答题、病案分析,分单元达标练习、综合达标测试题和参考答案三部分进行编写。第一部分是单元达标练习,便于学生在单元教学后进行练习、自测,以及教师进行单元达标测试和形成性评价;第二部分是综合达标测试题,包括本课程的全部教学内容,有利于学生进行总复习;第三部分是参考答案。

由于此教材涉及课程门类较多,体例安排略有特殊,主要是第六章下的节为单位出有复习题与主体教材对应,特此说明。

答题要求:

一、选择题:

1. 单项选择题题干在前,有A、B、C、D四个备选答案,只须将其中一个正确答案题号填于题干后。

2. 多项选择题题干在前,有A、B、C、D、E五个备选答案,可供选择的答案有两个或两个以上,应将其正确答案依次填于题干后。

二、填空题:按题意填入答题内容,力求正确、精炼。

三、是非题:陈述正确的,在题后用“√”表示,错误的用“×”表示。

四、名词解释题:根据题意进行简明扼要的解释。

五、简答题:根据题意要求,简要回答。

六、病案分析:根据题意要求准确解答。

《急诊护理》编写组

1999年4月

目 录

第一部分 单元达标练习

●上篇 总论

第一章 绪 论

一、选择题..... (1)

(一) 单项选择题..... (1)

(二) 多项选择题..... (1)

二、填空题..... (1)

三、名词解释..... (2)

四、是非题..... (2)

五、简答题..... (2)

第二章 急诊科的设置与管理

一、选择题..... (2)

(一) 单项选择题..... (2)

(二) 多项选择题..... (3)

二、填空题..... (3)

三、名词解释..... (3)

四、是非题..... (3)

五、简答题..... (3)

第三章 常见抢救技术及护理

一、选择题..... (4)

(一) 单项选择题..... (4)

(二) 多项选择题..... (6)

二、填空题..... (8)

三、名词解释..... (8)

四、是非题..... (8)

五、简答题..... (9)

第四章 心跳骤停与心肺脑复苏

一、选择题..... (10)

(一) 单项选择题..... (10)

(二) 多项选择题..... (11)

二、填空题..... (11)

三、名词解释..... (11)

四、是非题..... (12)

五、简答题..... (12)

第五章 重症监护

一、选择题..... (12)

(一) 单项选择题..... (12)

(二) 多项选择题..... (13)

二、填空题..... (13)

三、名词解释..... (13)

四、是非题..... (13)

五、简答题..... (14)

●下篇 各论

第六章 常见急诊的护理

第一节 急性呼吸衰竭患者的护理

一、选择题..... (15)

(一) 单项选择题..... (15)

(二) 多项选择题..... (15)

二、填空题..... (16)

三、名词解释..... (16)

四、是非题..... (16)

五、简答题..... (17)

六、病案分析..... (17)

第二节 急性左心功能不全患者的护理

一、选择题..... (17)

(一) 单项选择题..... (17)

(二) 多项选择题..... (18)

二、填空题..... (19)

三、名词解释..... (19)

四、是非题..... (19)

五、简答题..... (19)

六、病案分析..... (19)

第三节 颅高压综合征患者的护理

一、选择题..... (20)

(一) 单项选择题..... (20)

(二) 多项选择题..... (21)

二、填空题..... (21)

三、名词解释..... (21)

四、是非题.....	(21)	(一) 单项选择题	(33)
五、简答题.....	(22)	(二) 多项选择题	(33)
六、病案分析.....	(22)	二、填空题.....	(34)
第四节 急性肾功能衰竭患者的护理.....		三、名词解释.....	(34)
一、选择题.....	(22)	四、是非题.....	(34)
(一) 单项选择题	(22)	五、简答题.....	(34)
(二) 多项选择题	(23)	六、病案分析.....	(35)
二、填空题.....	(24)	第九节 多发性创伤患者的护理.....	
三、名词解释.....	(24)	一、选择题.....	(35)
四、是非题.....	(24)	(一) 单项选择题	(35)
五、简答题.....	(24)	(二) 多项选择题	(36)
六、病案分析.....	(24)	二、填空题.....	(37)
第五节 大咯血患者的护理.....		三、名词解释.....	(37)
一、选择题.....	(25)	四、是非题.....	(37)
(一) 单项选择题	(25)	五、简答题.....	(37)
(二) 多项选择题	(25)	六、病案分析.....	(37)
二、填空题.....	(26)	第七章 急性中毒患者的护理.....	
三、名词解释.....	(26)	一、选择题.....	(38)
四、是非题.....	(26)	(一) 单项选择题	(38)
五、简答题.....	(26)	(二) 多项选择题	(39)
六、病案分析.....	(27)	二、填空题.....	(39)
第六节 上消化道大出血患者的护理.....		三、名词解释.....	(40)
一、选择题.....	(27)	四、是非题.....	(40)
(一) 单项选择题	(27)	五、简答题.....	(40)
(二) 多项选择题	(28)	六、病案分析.....	(40)
二、填空题.....	(29)	第二部分 综合达标测试题.....	
三、名词解释.....	(29)	达标测试题 (一).....	
四、是非题.....	(29)	一、选择题.....	(41)
五、简答题.....	(29)	(一) 单项选择题	(41)
六、病案分析.....	(29)	(二) 多项选择题	(42)
第七节 休克患者的护理.....		二、填空题.....	(43)
一、选择题.....	(30)	三、名词解释.....	(43)
(一) 单项选择题	(30)	四、是非题.....	(43)
(二) 多项选择题	(31)	五、简答题.....	(44)
二、填空题.....	(31)	六、病案分析.....	(44)
三、名词解释.....	(32)	达标测试题 (二).....	
四、是非题.....	(32)	一、选择题.....	(44)
五、简答题.....	(32)	(一) 单项选择题	(44)
六、病案分析.....	(32)	(二) 多项选择题	(46)
第八节 昏迷患者的护理.....		二、填空题.....	(46)
一、选择题.....	(33)	三、名词解释.....	(47)

四、是非题.....	(47)		(57)
五、简答题.....	(47)	第四章 心跳骤停与心肺复苏.....	(60)
六、病案分析.....	(47)		(62)
达标测试题 (三)		第五章 重症监护.....	(62)
一、选择题.....	(48)	●下篇 各论	
(一) 单项选择题.....	(48)	第六章 常见急诊的护理.....	(63)
(二) 多项选择题.....	(49)	第一节 急性呼吸衰竭患者的护理.....	(63)
二、填空题.....	(50)	第二节 急性左心功能不全患者的护理.....	(64)
三、名词解释.....	(50)	第三节 颅高压综合征患者的护理.....	(65)
四、是非题.....	(50)	第四节 急性肾功能衰竭患者的护理.....	(66)
五、简答题.....	(50)	第五节 大咯血患者的护理.....	(68)
六、病案分析.....	(51)	第六节 上消化道大出血患者的护理.....	(69)
达标测试题 (四)		第七节 休克患者的护理.....	(71)
一、选择题.....	(51)	第八章 昏迷患者的护理.....	(73)
(一) 单项选择题.....	(51)	第九章 多发性创伤患者的护理.....	(74)
(二) 多项选择题.....	(52)	第七章 急性中毒患者的护理.....	(75)
二、填空题.....	(53)		(78)
三、名词解释.....	(53)	综合达标测试题.....	(78)
四、是非题.....	(53)	达标测试题 (一).....	(78)
五、简答题.....	(54)	达标测试题 (二).....	(79)
六、病案分析.....	(54)	达标测试题 (三).....	(81)

第三部分 参考答案

●上篇 总论

第一章 绪论.....	(55)
第二章 急诊科的设置与管理.....	(56)
第三章 常见抢救技术及护理.....	

- 急诊科工作有季节性强特点,如
- A. 春季呼吸道感染病多 B. 夏季肠道传染病多 C. 秋季外伤多 D. 冬季骨折多 E. 节假日气管异物、酒精中毒多
- 急诊患者就诊时间规律一般是
- A. 晚班较少 B. 创伤急诊早晚多 C. 白班较多 D. 夜班多 E. 白天下班后较多

二、填空题

- 急诊科的任务是
- 急诊医学包括
- 分析创伤死亡率下降的原因,运用有效的急救及复苏技术抢救出现的伤病员是必需的。
- 1980年10月我国卫生部颁发了《急诊科建设标准》,各医院先后成立急诊科。
- 1975年5月,前联邦德国召开了现代社会要求委员会,并提出了急诊科建设标准。

第一部分 单元达标练习

上篇 总论

第一章 绪论

一、选择题

(一) 单项选择题

1. 现代急诊护理的起源可追溯到
A. 16 世纪 B. 17 世纪 C. 18 世纪 D. 19 世纪
2. 下列哪项不属急诊科的收治对象
A. 急性外伤 B. 昏迷 C. 急性肾盂肾炎 D. 有机磷农药中毒
3. 下列哪项不属于急诊科的工作特点
A. 时间性强 B. 纪律性强 C. 季节性强 D. 协作性强

(二) 多项选择题

1. 院前急救护理的主要任务是
A. 与医师协同进行现场急救 B. 灾难处理 C. 现场途中监护 D. 危重急症现场处置 E. 有效地进行心理护理
2. 急诊科工作有季节性强的特点, 如
A. 春季呼吸道感染病多 B. 夏季肠道传染病多 C. 秋季外伤多 D. 冬季骨折多 E. 节假日气管异物、酒精中毒多
3. 急诊患者就诊时间规律一般是
A. 晚班较少 B. 创伤急诊早晚多 C. 白班较多 D. 夜班多 E. 白天下班后较多

二、填空题

1. 急诊科的任务是 急救、抢救、转送、会诊、手术、监护、复苏、转运、会诊、手术、监护、复苏、转运。
2. 急诊医学包括 院前急救、院内急救、急诊重症监护、急诊危重症抢救、急诊创伤急救、急诊中毒急救、急诊感染急救、急诊心理急救。
3. 分析战伤死亡率下降的原因, 运用有效的 急救技术 及 急救措施 对抢救成批出现的伤病员是必需的。
4. 1980 年 10 月我国卫生部颁发了 城市急诊科建设方案, 各医院先后成立急诊科。
5. 1975 年 5 月, 前联邦德国召开了现代社会要求委员会, 并提出了 急救医学国际公约。

国际互助、标准化 的方针。

6. 现场抢救原则包括 先救命后治病、先重后轻、先急后缓、先近后远。
7. 遇传染病患者，在救治转送后，工作人员、物品、仪器 及 被褥等 均应进行有效消毒处理。
8. 急诊护理是一门理论联系实际的课程，分 理论护理 和 临床护理 两个阶段，理论和实践并重。
9. 早在 50 年代，我国医院各病房就普遍将 急诊科设在门诊，靠近门诊大楼，便于护士密切观察病情及护理。
10. 70 年代国外有些国家组织了急救医疗体系，训练各行各业的人员作为二线急救组织成员，非常重视 现场急救、重视 急救知识教育。

三、名词解释

1. 急诊护理 2. 急诊 3. 急救

四、是非题

1. 从城市急救医疗体系来看，其组织结构完全适应规范化的演变。 ☒
2. 院前急救时，抢救车作为一个“流动医院”对重症患者实施途中监护，转送至医院。 ☒
3. 来诊的急、重症患者，病情重而复杂，因此就诊程序是患者直接到急诊室，先抢救后检查治疗。 ☒
4. 我国在 80 年代成立了心脏监护病房，随后相继成立了各专科或综合监护病房。 ☒
5. 对心跳、呼吸停止或严重休克、大出血、内脏损伤患者应先救命，后治伤。 ☒

五、简答题

1. 作为一名医护人员如果您在灾难现场应遵循哪些抢救原则？
2. 急诊科护士素质的具体要求是什么？

第二章 急诊科的设置与管理

一、选择题

(一) 单项选择题

1. 下列哪项不符合急诊科的布局要求 ☒
A. 设有专用的入口 B. 大门宜宽敞 C. 儿科不单设 D. 标志醒目
2. 下列哪项不属于中枢兴奋药 ☒
A. 可拉明 B. 阿拉明 (间羟胺) C. 洛贝林 D. 回苏灵
3. 下列哪项属于解毒类药 ☒
A. 硫酸镁 B. 速尿 C. 阿托品 D. 20% 甘露醇注射液
4. 急诊科预检分诊护士发现传染病患者首先应做 ☒

A. 消毒 B. 隔离 C. 治疗 D. 疫情报告

(二) 多项选择题

1. 急诊科救护车上必备物品有 ABC
A. 氧气 B. 常用抢救药品 C. 木板 D. 单架 E. 心电监护装置
2. 对急诊患者主要的护理措施为 ABCE
A. 配合抢救治疗 B. 病情观察 C. 疾病护理 D. 心理护理 E. 保健指导

二、填空题

1. 急诊科是 抢救生命 的主要场所，急诊医疗工作是 急救性、及时性 服务质量的集中反映。
2. 抢救物品和药品应严格做到四定，即 定物、定量、定位、定人；三及时，即 及时检查、及时补充、及时补充，保证性能良好。
3. 分诊台与各诊室之间应设有 警报系统，以便及时通知各科室医师及时抢救。
4. 急诊诊查室内除必备的家具设备外，应按照 急诊科设置 备有急诊需用各种检查器械及必要的抢救物品。
5. 急诊手术室应分为 无菌手术、处置室 和 器械敷料室、清洁室几个部分。
6. 如遇大批外伤或中毒等患者来院时，要立即 报告上级，并 做好记录。
7. 急诊患者抢救护理的原则为 先重后轻、先急后缓、先救命后治病、先处理危及生命的问题。
8. 在抢救患者的过程中通过 观察、问诊、体格检查，评估患者尚未诊断的潜在生命危险的健康问题。
9. 如遇患者大出血导致的失血性休克，治疗护士应在 5 分钟内抽血送血库配血并输入液体，15 分钟内做好血型交叉配血。

三、名词解释

1. 急诊科
2. 急诊科抢救物品和药品保管“四定”和“三及时”

四、是非题

1. 急诊科位置应靠近门诊，远离住院部。 ☒
2. 急诊科应配备 1~2 名技术熟练、知识面广的护士长负责全面工作。 ☒
3. 急诊科隔离室设消化道及呼吸道隔离室各一间，室内备有空气消毒及洗手设置。 ☒

五、简答题

1. 简述急诊科的基本设置。
2. 试述急诊科护理业务技术管理要求。
3. 如何对急诊患者进行护理评估？

第三章 常见抢救技术及护理

一、选择题

(一) 单项选择题

1. 行气管插管术前准备哪项不妥 C
A. 向患者及家属简要说明操作的必要性及注意事项, 征得其同意 B. 检查头颈部活动状况, 张口程度 C. 有假牙者应注意加固假牙, 避免脱落 D. 做好有关器械准备
2. 气管插管操作哪项正确 C
A. 操作者站在患者右侧 B. 用开口器撑开口腔 C. 左手持喉镜从患者左角插入人口内 D. 无需作咽、喉局部表面麻醉
3. 气管插管术下列描述哪项不妥 A
A. 气管插管儿童与成人用的导管均一样大小 B. 操作应轻柔、准确 C. 儿童、成人插管深度要控制好 D. 儿童插管时间可比成人插管时间稍长
4. 气管切开术的术中配合哪项错误 A
A. 因病情紧急, 无须向患者及家属征求同意 B. 摆仰卧位, 垫高肩部, 使颈、喉结和胸骨切迹成一条直线 C. 常规消毒、铺巾、局麻 D. 切口从颈正中自环状软骨下缘到胸骨上窝纵行切开皮肤约 6~10cm
5. 气管切开手术后护理哪项不妥 D
A. 术后患者暂时丧失发声能力, 护理应细致、周到 B. 注意伤口出血情况 C. 保持气管套管及外周清洁 D. 加强气道湿化, 每 4~6 小时, 向气管套管内滴注 250~500mL 的生理盐水
6. 给气管切开患者吸痰时, 注意点哪项不对 D
A. 随时吸出气管内的积痰 B. 一次吸痰时间不宜超过 15 秒钟 C. 吸痰时要注意无菌操作 D. 若痰液粘稠, 应滴入 20~30mL 湿化液后抽吸
7. 一气管切开患者, 突然出现躁动, 面色青紫, 喉中痰鸣, 应立即 C
A. 吸氧 B. 拔出气管插管 C. 吸痰 D. 密切观察病情变化
8. 气管插管中, 患者继发呼吸道感染, 痰量明显增多, 下列哪项处理不妥 C
A. 加强无菌操作 B. 注意及时清除痰液 C. 立即拔除气管插管 D. 加强局部及全身抗生素的使用
9. 气管切开患者拔管, 哪项错误 D
A. 患者病情稳定, 呼吸平稳, 无紫绀者 B. 血气分析正常 C. 气管内分泌物少 D. 可立即拔管
10. 一呼吸衰竭患者, 出现呼吸困难、明显紫绀、呼吸 36 次/分钟、呼吸表浅、纯氧吸入后, 查血气分析 $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 > 55\text{mmHg}$, 应采取下列哪项措施 C
A. 低浓度、低流量持续氧疗 B. 应用呼吸兴奋剂 C. 使用呼吸机 D. 做呼

吸操

11. 一呼吸衰竭患者,呈昏迷状态,呼吸道痰量很多,在应用呼吸机时,应考虑下列哪项联接方式合适 **C**
- A. 面罩 B. 气管插管 C. 气管切开 D. 以上均不是
12. 患者呼吸完全停止,应采用哪种通气方式 **A**
- A. 控制呼吸 B. 辅助呼吸 C. 压力支持呼吸 D. 呼气末正压呼吸
13. 一般呼吸机参数的调整范围,哪项错误 **B**
- A. 潮气量 $8 \sim 15 \text{ mL/kg}$ B. 频率 $20 \sim 30$ 次/分钟 C. 通气量 $3.4 \sim 4.5 \text{ L/分钟}$ D. 吸/呼比因不同疾病患者选择不同比例
14. 一患者,上呼吸机后,出现明显血压下降,谵妄抽搐,昏迷,应考虑 **B**
- A. 通气不足 B. 通气过度 C. 呼吸道阻塞 D. 肺部感染
15. 锁骨下静脉作为穿刺插管选择对象的有利条件,哪项错误 **D**
- A. 静脉表浅 B. 静脉粗大 C. 静脉不易塌陷 D. 穿刺部位安全
16. 锁骨下静脉穿刺点在胸锁乳突肌与锁骨所形成的夹角的平分线上,距顶点处 **B**
- A. 刚好在顶点处 B. $0.5 \sim 1 \text{ cm}$ 处 C. $1.5 \sim 2 \text{ cm}$ 处 D. $2.5 \sim 3 \text{ cm}$ 处
17. 锁骨下静脉穿刺术前进行肺部叩诊和听诊,确定肺下界其目的是 **C**
- A. 确定穿刺部位 B. 检查有哪些穿刺禁忌证 C. 有利于穿刺中发现气胸并发症时作为对照 D. 以上均不是
18. 下列哪支静脉不是 CVP 测定常采用的 **D**
- A. 肘正中静脉 B. 大隐静脉 C. 锁骨下静脉 D. 腓窝静脉
19. 在 CVP 测定过程中,发现静脉压突然出现显著的波动性升高时,应 **A**
- A. 将导管退出小段后再测压观察 B. 立即拔除导管 C. 立即用 0.4% 枸橼酸钠生理盐水冲洗导管 D. 立即将患者改成半坐卧位
20. 桡动脉穿刺术,哪项错误 **B**
- A. 在腕部上方约 $3 \sim 4 \text{ cm}$ 桡动脉搏动处进针 B. 于穿刺点垂直进针 C. 针尖斜面朝向头端 D. 穿刺完毕,拔出针头后立即用无菌纱布压迫 $3 \sim 5$ 分钟
21. 检查三腔二囊管的气囊有否漏气,哪种方法不妥 **D**
- A. 充气的气囊放入水中察看有无气泡逸出 B. 观察注入气量与抽出气量是否相等 C. 将充气气囊放在耳旁听有无漏气声 D. 放在光线下照看有无漏光处
22. 食管-胃底静脉曲张破裂出血患者,应用三腔二囊管压迫止血,向胃气囊充气牵引压迫后,抽胃液检查,仍发现经常有新鲜血液,应 **B**
- A. 放出胃气囊的气体,松解牵引,密切观察 B. 再向食管气囊充气,观察出血的情况 C. 适当调整牵引物的重量 D. 立即拔除三腔二囊管
23. 口服中毒患者采用洗胃术,应争取在口服毒物后什么时间内洗胃 **A**
- A. $4 \sim 6$ 小时内 B. $6 \sim 12$ 小时内 C. $12 \sim 24$ 小时内 D. $24 \sim 48$ 小时内
24. 下列哪种口服中毒不宜采用洗胃术 **A**
- A. 浓硫酸 B. 有机磷农药 C. 巴比妥 D. 雷米封
25. 可停止洗胃的标志为 **C**
- A. 洗胃液达到 10000 mL B. 洗胃后病人苏醒 C. 抽出的洗胃液变澄清,无味 D. 以上均不是

26. 洗胃时每次向胃内灌入的液体量应为 ()
A. 100~200mL B. 200~300mL C. 300~400mL D. 400~500mL

(二) 多项选择题

1. 气管内插管术的适应证有 ABCD
A. 喉梗塞 B. 呼吸复苏 C. 呼吸衰竭治疗 D. 全麻呼吸管理 E. 声门或声门下狭窄

2. 气管内插管术的禁忌证 CD
A. 颈部包块压迫气管 B. 昏迷患者痰液阻塞呼吸道 C. 严重喉头水肿 D. 咽后壁脓肿 E. 气管粘膜下血肿

3. 气管插管拔管指征 ABCD
A. 咳嗽, 吞咽反射恢复 B. 神志转清 C. 心率 <100 次/分钟, 呼吸 <30 次/分钟 D. 血气分析结果正常 E. 上述符合时可立即拔管, 撤除抢救设备

4. 气管切开术的适应证 ABCD
A. 不宜作气管插管的喉梗塞者 B. 下呼吸道分泌物滞留不能排出者 C. 呼吸衰竭需较长时间采用人工辅助呼吸者 D. 咽喉部肿瘤 E. 强酸、强碱所致喉头水肿者

5. 气管切开术下列描述哪些正确 ABC
A. 气管切开后发声困难属正常 B. 切开第2~4气管环 C. 术后头24小时不宜多更换体位 D. 气管内、外套管每天消毒更换1次 E. 套管气囊每天放气1次

6. 气管切开后, 气管湿化应做到 ACDE
A. 湿化液可用生理盐水内加抗生素 B. 每天湿化液总量为100mL左右 C. 每15~30分钟向气管套管内滴入湿化液 D. 每次滴入5~10mL E. 湿化液每天应新鲜配制

7. 气管切开术常见的并发症有 ABCD
A. 伤口出血 B. 套管脱出或阻塞 C. 皮下及纵隔气肿 D. 感染 E. 气胸

8. 呼吸机应用的目的有 ABC
A. 改善通气功能 B. 改善换气功能 C. 减少呼吸功消耗 D. 清理呼吸道 E. 代替肺脏功能

9. 下列哪些情况可考虑应用呼吸机 CD
A. 严重气胸患者 B. 大咯血患者 C. 重症肌无力患者 D. 镇静剂所致呼吸抑制者 E. 急性呼吸窘迫综合征者

10. 常用的呼吸机类型有 ABCD
A. 定压型 B. 定容型 C. 高频通气型 D. 多功能型 E. 自控型

11. 呼吸机参数常调节在 ABCDE
A. 潮气量8~15mg/kg B. 频率12~18次/分钟 C. 呼出气量3.5~4.5L/分钟 D. 通气压力为15~20cmH₂O E. 吸/呼比随不同疾病和病期选择不同比例

12. 呼吸机应用通气量合适的标志有 ABCDE
A. 吸气时胸部起伏 B. 自发呼吸与呼吸机合拍 C. 两肺呼吸音消失 D. 生命体征平稳 E. 神志清楚, 表情安适

13. 下列哪些情况可采用锁骨下静脉穿刺插管术 ABCDE

- A. 长期不能进食者 B. 大出血患者 C. 测定中心静脉压 D. 短期输液
E. 紧急放置心内起搏导管
14. 锁骨下静脉穿刺插管术应注意 **CE**
A. 术前不必向病人解释, 以免引起病人恐慌 B. 常规消毒铺巾后用 1% 甲紫定位穿刺点
C. 注意严格无菌操作 D. 射管时应缓慢推注水枪活塞, 避免硅胶管被全部射出
E. 硅胶管外敷料应隔天更换 1 次
15. CVP 的适应证有 **ABC**
A. 危重患者施行大手术时 B. 冠心病心肌梗死伴心源性休克时 C. 休克经治疗效果不佳时
D. 高血压原因需鉴别时 E. 水肿原因需鉴别时
16. 关于 CVP 正确的是 **AD**
A. 正常为 5~12cmH₂O B. 低于 12cmH₂O 为血容量不足 C. 高于 12cmH₂O 为液体量过多
D. 高于 15~20cmH₂O 时表示有明显的心功能不全 E. 补充血容量后休克未纠正, 而 CVP 大于 10cmH₂O, 应首先考虑为血容量仍未补足
17. CVP 测定操作应注意 **ABCE**
A. 经肘正中静脉或大隐静脉插管, 均插入约 35~45cm B. 上腔静脉压较下腔静脉压更为精确
C. 将测压计的零点调到右心房的水平上 D. 体位变动时测压计零点应及时调整
E. 测压管置留时间一般不超过 5 天
18. 三腔二囊管压迫期应注意 **ABCE**
A. 经常抽吸胃内容物以观察压迫止血效果 B. 嘱患者不要将唾液、痰液咽下, 以免误入气管
C. 每天 2 次向鼻腔滴入少量石蜡油, 以免三腔管粘附于鼻粘膜 D. 气囊压迫 24 小时后应放气松解片刻, 以免粘膜压迫坏死
E. 从三腔二囊管之胃管内注入食物时, 应先确认是胃管才能注入食物, 以免发生意外
19. 三腔二囊管拔管应注意 **CE**
A. 先放胃气囊气体 B. 再放食管气囊气体 C. 拔管前患者先服石蜡油 20~30mL
D. 放气后即可拔除三腔二囊管 E. 拔管后 24 小时内应密切注意出血情况
20. 洗胃可达到的治疗目的有 **BC**
A. 清除胃及肠道内的毒物、药物 B. 减少胃内毒物的吸收 C. 中和毒物, 减少毒性
D. 促进血液内毒物的排泄 E. 利尿作用
21. 下列哪些情况不宜洗胃 **DE**
A. 口服巴比妥盐中毒者 B. 口服雷米封中毒者 C. 口服有机磷中毒者 D. 口服强酸、强碱中毒者
E. 肝硬化伴食管-胃底静脉曲张者
22. 下列描述正确的是 **ABE**
A. 温开水洗胃常用于毒物不明的口服中毒者 B. 活性炭可用于一切化学物质中毒者
C. 苏打水用于一切有机磷农药中毒者 D. 高锰酸钾液可适用于大部分有机磷农药中毒者
E. 碘化钾液可用于生物碱中毒者
23. 洗胃过程中, 出现下列哪些情况应停止洗胃 **CD**
A. 病人昏迷无改变 B. 洗胃液变混浊 C. 洗胃液流出时含有血性物质 D. 患者明显腹痛
E. 洗胃液中有异物

二、填空题

1. 气管内插管术与气管切开术是 开放气道、保持呼吸道通畅 和 进行人工通气 最有效的方法。
2. 气管插管的深度应掌握在：儿童声门下 2.5-3 cm；成人 4-5 cm。插管时间：儿童不应超过 72 小时；成人不超过 48 小时。
3. 呼吸机常见类型有 定压型、定容型、高频通气型 及 容积型。
4. 机械通气常用的通气方式有 控制通气、辅助通气、控制/辅助通气、压力支持通气、呼气末正压通气 及 持续气道正压通气。
5. 机械呼吸治疗常见的并发症有 肺不张、肺水肿、呼气末正压通气及持续气道正压通气。
6. 锁骨下静脉穿刺在穿刺点行局麻后，持针指向 腋窝处 与皮肤呈 30-40 角进针，边进针边 抽回血，一般进针 2.5-4 cm，即达锁骨下静脉。
7. 中心静脉压可反映患者当时的 容量、心功能 及 血管张力 的综合状况，从而指导临床 输液补液，以及是否需用 升压药 和 强心药 治疗等。
8. 中心静脉压 (CVP) 正常值为 5-12 cmH₂O；低于 5 cmH₂O 表示 血容量不足，高于 15-20 cmH₂O，表示有明显的 肺水肿，且有 肺水肿 的危险。在补充血容量而休克未纠正但 CVP 高于 10 cmH₂O，则表示有 容量血管过度收缩，或 心功能不全 的可能。少数重症感染患者虽 CVP 低于 10 cmH₂O，也有出现 肺水肿 的危险，应加以注意。
9. 股动脉穿刺术操作者右手以 执笔 式持注射器，针头斜面朝向 髂窝处，左手中指及示指间 垂直 刺入。如果针尖有搏动感，表示已触及 动脉，再向深处推进 少许，即有鲜红色血流入注射器中。
10. 三腔二囊管经鼻腔插入约 50-65 cm，即可达胃腔。胃气囊一般充气约 200-300 mL，食管气囊充气约 100-150 mL。
11. 各种经口服中毒的非腐蚀性毒物，时间在 4-6 小时内者，均可采取洗胃术，但超过 6 小时，仍应争取洗胃，因很多药物或毒物延长 吸收 或 反吸收，因此，洗胃仍有效。
12. 洗胃时，每次向胃内灌入洗胃液约 300-400 mL，然后吸出，如此反复洗胃至吸出液 澄清无味 为止。

三、名词解释

1. 气管内插管术
2. 气管切开术
3. 高频通气型呼吸机
4. 呼吸末正压呼吸 (PEEP)
5. 持续气道正压呼吸 (CPAP)
6. 中心静脉压 (CVP)
7. 动脉穿刺术
8. 洗胃术
9. 三腔二囊管压迫止血术

四、是非题

1. 气管内插管术，它与气管切开术一样，是开放气道、保持呼吸道通畅和进行人工通气的最有效的方法。✓
2. 严重喉头水肿、声门或声门下狭窄等不宜做气管插管术者，可做气管切开术。✓

3. 气管插管术一般采用经鼻腔插管。✗
4. 气管插管术插管时间儿童不超过 72 小时，成人不超过 48 小时。✓
5. 气管切开术致暂时失去发声能力，护理应细致周到，以免发生意外。✓
6. 一次吸痰时间不应超过 15 秒钟。✓
7. 感染是气管切开术最常见的并发症。✓
8. 气管切开术拔管前应堵塞套管 24 小时，若呼吸正常，则可拔管。✓
9. 严重气胸患者因肺明显被压缩，应立即采用呼吸机，利于撑开压缩的肺和纠正缺氧。✗
10. 呼吸机不可与气管插管相连。✗
11. 锁骨下静脉穿刺术静脉留置导管，主要是为临床需要长期反复应用静脉途径提供方便。✓
12. 锁骨下静脉穿刺插管术的进针点在胸锁乳突肌外侧与锁骨所形成的夹角的顶点处。✗
13. 每次输液完毕，用 0.4% 枸橼酸钠生理盐水 1~2mL 注入静脉留置的导管内，以防血栓塞住导管。✓
14. 采用锁骨下静脉穿刺插管输液时，如滴注不畅，可用力推注液体，保证输液通畅。✗
15. 静脉留置导管皮外的部分应每天用酒精消毒。✗
16. CVP 测定可指导临床输血量及速度，以及是否需用扩血管药物和强心药物治疗等。✓
17. 股动脉穿刺针头应斜面朝向患者足端。✗
18. 为预防动脉穿刺术后出血，应于穿刺结束前向动脉内注射血管收缩剂。✗
19. 桡动脉穿刺，应以 30° 角在腕部上方约 3~4cm 处向桡动脉穿刺进针。✓
20. 三腔二囊管压迫止血术主要适用于食管下段-胃底静脉曲张破裂出血者。✓
21. 插入三腔二囊管后，先向食管气囊充气，再向胃气囊充气。✗
22. 应用三腔二囊管患者，应每天向鼻腔内滴入少量石蜡油 2 次，以防粘连。✓
23. 三腔二囊管拔管时，放出食管、胃气囊内气体即可拔管。✗
24. 口服中毒患者，若中毒时间超过 6 小时，已无洗胃的必要。✗
25. 强酸、强碱口服中毒时，可采用弱碱、弱酸溶液洗胃。✗
26. 1%~5% 苏打水可用于一切有机磷农药中毒患者。✗
27. 重症口服中毒患者，应加快洗胃速度和每次灌入的洗液量。✗

五、简答题

1. 气管内插管及气管切开术的目的何在？
2. 请简答气管插管术的适应证及禁忌证以及气管切开术的适应证。
3. 气管切开患者何时可以拔管？应注意何事项？
4. 呼吸机应用的目的何在？有哪些适应证和禁忌证？
5. 在呼吸机使用的过程中，容易出现哪些问题，如何加以区别和处理？
6. 哪些患者可以考虑做锁骨下静脉穿刺插管术？
7. CVP 测定有何临床意义？
8. 简述股动脉穿刺术要点及注意事项。
9. 如何护理好应用三腔二囊管患者？
10. 洗胃时应注意哪些事项？

第四章 心跳骤停与心肺脑复苏

一、选择题

(一) 单项选择题

1. 早期诊断心跳骤停的主要依据是 **C**
A. 心音听不到, 桡动脉摸不到 B. 心前区无搏动, 血压测不到 C. 突然意识丧失, 大动脉搏动消失 D. 呼吸停止, 全身紫绀
2. 一旦确诊为心跳骤停, 必须争取在几分钟内重建呼吸和循环 **A**
A. 4~6 分钟 B. 6~8 分钟 C. 8~10 分钟 D. 10~12 分钟
3. 复苏的关键措施是 **B**
A. 人工呼吸 B. 保持呼吸道通畅 C. 心脏按压 D. 以上都不是
4. 判断口对口人工呼吸是否有效, 首先应观察 **D**
A. 口唇紫绀是否改善 B. 瞳孔是否缩小 C. 吹气时阻力大小 D. 胸廓是否扩张
5. 胸外心脏按压的部位应在 **D**
A. 胸骨左缘第 4 肋间 B. 胸骨上段 1/3 处 C. 胸骨中段 1/3 处 D. 胸骨下段 1/3 处 (离胸骨下缘二指处)
6. 胸外心脏按压下列哪项措施不正确 **B**
A. 患者仰卧于硬板床 B. 术者左手掌跟部放在患者胸骨上 1/3 段 C. 将胸骨按压下陷 4~5cm D. 成人按压频率为每分钟 80~100 次
7. 衡量胸外心脏按压有效的标志中, 下列哪项是错误的 **C**
A. 摸到颈或股动脉搏动 B. 口唇紫绀逐渐减轻 C. 收缩压达 10kPa (75mmHg) 以上 D. 瞳孔散大开始缩小
8. 脑复苏采用头部降温的目的是 **D**
A. 减轻头痛、头昏 B. 降低颅内压, 防止呕吐 C. 提高呼吸中枢兴奋性 D. 降低脑组织代谢, 提高缺氧耐受性
9. 恢复心跳的首选药物是 **A**
A. 肾上腺素 B. 利多卡因 C. 阿托品 D. 碳酸氢钠
10. 心跳呼吸骤停早期复苏的有效措施是 **C**
A. 心三联注射 B. 开胸心脏按压 C. 口对口人工呼吸加胸外心脏按压 D. 低温疗法
11. 防治脑水肿的措施不包括 **B**
A. 低温疗法 B. 控制感染 C. 应用脱水剂 D. 肾上腺皮质激素的应用
12. 严重损伤导致心跳已停止的患者, 急救时应首先考虑的是 **A**
A. 复苏术 B. 清创缝合 C. 抢救休克 D. 固定骨折
13. 患者突然昏迷, 颈动脉摸不到搏动, 处理时下列哪项是错误的 **A**