

# 新 医 疗 法

(試用教材)

湖 北 醫 學 院

一九七三年十二月

救死扶傷  
革命的人道主義  
白求恩

# 毛主席语录

中国医药是一个伟大的宝库，  
应当努力发掘，加以提高。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

学习我们的历史遗产，用马克思主义的方法给以批判的总结，是我们学习的另一任务。



# 前 言

毛主席教导我们：“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提提”。针灸是祖国医学重要组成部分之一。新医疗法是无产阶级文化大革命中，中国人民解放军和革命医务人员在毛主席无产阶级革命路线的指引下，认真落实毛主席关于“备战、备荒、为人民”的伟大战略方针，破除迷信，解放思想，在继承和发扬祖国传统的针灸基础上发展起来的新生事物，使祖国医学遗产——针灸增添了新的光辉，是战无不胜的毛泽东思想的伟大胜利，是落实毛主席“六·二六”光辉指示的丰硕成果。

我们遵照伟大领袖毛主席关于“教材要彻底改革”的教导，在教育革命实践的基础上，编写了这本讲义，其内容共分三章，第一章包括取穴方法及经穴、新穴、奇穴等。并着重介绍了常用穴位和新穴。第二章包括新针、水针、电针、按摩、肠线等二十一种新疗法。第三章包括各科53种常见病的各种新疗法。

未编入本讲义的有关经络部分，已在中医基础学讲义中详述，这里不再重复。

由于我们对毛主席教育革命思想学习不够，对毛主席无产阶级教育和卫生路线理解不深，加上实践经验不足，因此教材中一定有不少缺点和错误，诚恳地希望同志们提出宝贵意见，以便不断修改充实和提高。

“新医疗法”编写小组

一九七三年七月

# 序 言

使用针灸治疗疾病是我国独特的医疗技术，它和其他自然科学一样，是我国劳动人民长期与疾病斗争的过程中，通过反复实践而取得的劳动成果，是祖国医学伟大宝库的一个重要组成部分。它是以经络学说和神经学说为根据，以穴位为基础，以刺灸为手段的一门防治疾病的学科。具有适应症多、收效迅速、设备简单、使用方便、而且按法操作比较安全等优点。广泛应用于临床各科，符合多、快、好、省的要求，因此对于贯彻落实毛主席“六·二六”指示和“备战、备荒、为人民”的伟大战略方针，巩固农村合作医疗制度都具有十分重要的意义。

新医疗法是在无产阶级文化大革命中，在毛主席无产阶级革命路线指引下，广大的革命医务人员认真学习毛主席的光辉哲学思想，狠批刘少奇一类骗子所推行的反动的唯心的先验论，洋奴哲学、爬行主义和民族虚无主义。根据“古为今用”“洋为中用”和“推陈出新”的原则，在为广大工农兵服务的医疗实践过程中，破除对“专家”“权威”的迷信，以全心全意为人民服务和发扬一不怕苦二不怕死的无产阶级彻底革命精神；敢于革命、敢于实践。经过反复的自身实验和大量的临床实践，在祖国医学的基础上，大搞中西医结合，在激烈的两个阶级、两条道路、两条路线的斗争中产生和发展起来的新生事物。这些新医疗法具有独特的医疗效果，它打开了聋哑禁区，使聋哑人听到了毛主席的声音，喊出了时代最强音——毛主席万岁！使盲人喜见红太阳；使瘫痪人重新站了起来；迈开了革命的步伐……治愈了许多被判为“不治之症”的疾病，创造了世界医学史上的奇迹。这些新医疗法的涌现，不仅为我国的人民卫生保健事业作出了重大贡献，而且为中西医结合、创造我国的新医药学开辟了广阔的道路。

遵照毛主席关于“为什么人的问题，是一个根本的问题，原则的问题”的教导，学习本课程必须树立为工农兵而学习，为工农兵所利用的思想，以解放军为榜样，发扬“一不怕苦、二不怕死”的革命精神，在学习过程中，运用毛主席的哲学思想来理解本课程的内容。还必须贯彻理论联系实际的原则，边学边用，并在临床实践中，不断总结，不断提高，为捍卫毛主席的无产阶级革命路线，树雄心，立壮志，胸怀祖国，放眼世界，为完成历史赋予我们工农兵学员的光荣任务，为创造我国新医药学作出最大的努力，为更好地支援世界革命作出应有的贡献。

# 目 录

|             |      |
|-------------|------|
| 第一章 穴位      |      |
| 第一节 穴位的取法   | (1)  |
| 一、骨度法(折量法)  | (1)  |
| 二、指量法       | (1)  |
| 三、体表标志法     | (2)  |
| 第二节 十四经常用穴位 | (2)  |
| 一、手太阴肺经     | (3)  |
| 二、手阳明大肠经    | (3)  |
| 三、足阳明胃经     | (5)  |
| 四、足太阴脾经     | (8)  |
| 五、手少阴心经     | (9)  |
| 六、手太阳小肠经    | (10) |
| 七、足太阳膀胱经    | (11) |
| 八、足少阴肾经     | (15) |
| 九、手厥阴心包经    | (16) |
| 十、手少阳三焦经    | (17) |
| 十一、足少阳胆经    | (19) |
| 十二、足厥阴肝经    | (21) |
| 十三、督脉       | (22) |
| 十四、任脉       | (24) |
| 第三节 经外奇穴及新穴 | (26) |
| 一、头面部穴位     | (26) |
| 二、腹、背、腰部穴位  | (27) |
| 三、上肢穴位      | (27) |
| 四、下肢穴位      | (29) |
| 第二章 常用新医疗法  |      |
| 第一节 针刺疗法    | (31) |
| 一、取穴原则      | (31) |



|                   |      |
|-------------------|------|
| 二、配穴方法            | (31) |
| 附：针刺疗法要穴治疗歌诀（供参考） | (32) |
| 三、针刺治疗有关知识和操作方法   | (32) |
| (一) 常用针具介绍        | (32) |
| (二) 针刺前的准备        | (33) |
| (三) 进针方法          | (33) |
| (四) 进针后的手法        | (34) |
| (五) 针刺的角度与深度      | (34) |
| (六) 针感和刺激强度       | (34) |
| (七) 留针            | (35) |
| (八) 出针法           | (35) |
| (九) 注意事项          | (35) |
| (十) 异常情况的处理       | (35) |
| (十一) 疗程           | (35) |
| 四、其他针法            | (36) |
| (一) 三棱针刺法         | (36) |
| (二) 梅花针（皮肤针）刺法    | (36) |
| (三) 皮内针刺法         | (36) |
| 五、关于针刺治病作用的理论原理   | (37) |
| 附一：艾灸法            | (37) |
| 附二：火罐疗法           | (38) |
| 附三：水罐疗法           | (39) |
| 附四：火针疗法           | (39) |
| <b>第二节 耳针疗法</b>   | (39) |
| 一、耳壳表面解剖名称        | (39) |
| 二、耳针穴位的分布         | (40) |
| (一) 耳穴分布规律        | (40) |
| (二) 耳穴具体解剖位置      | (40) |
| 三、重要穴位及其作用        | (43) |
| 四、取穴配穴原则          | (42) |
| 五、操作方法            | (43) |
| 六、注意事项            | (43) |
| 七、各系统疾病及症状常用穴位    | (43) |
| 八、耳针治疗作用原理简介      | (43) |
| <b>第三节 水针疗法</b>   | (44) |
| 一、简介              | (44) |
| 二、痛点与穴位的选择        | (44) |
| 三、常用药物介绍          | (45) |
| 四、操作方法            | (46) |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 五、注意事项              | (49) |
| 附一：经络综合疗法（供参考）      | (46) |
| 附二：骶管裂孔注射疗法（供参考）    | (50) |
| <b>第四节 电针疗法</b>     | (51) |
| 一、电针电生理概念及临床应用      | (51) |
| 二、电针治疗机的种类及波形的生理作用  | (51) |
| 三、各种波形的特点与适应症       | (52) |
| 四、临床常见疾病的几种波形配合     | (54) |
| 五、操作顺序              | (54) |
| 六、注意事项              | (55) |
| 附一：电兴奋疗法（供参考）       | (55) |
| 附二：常用神经干刺激点的进针方法    | (56) |
| <b>第五节 穴位刺激结扎疗法</b> | (58) |
| 一、治疗原则              | (58) |
| 二、穴位的选择与组合          | (59) |
| 三、操作步骤及方法           | (59) |
| 四、治疗后反应             | (60) |
| 五、注意事项              | (61) |
| 六、疗程                | (61) |
| 附一：埋线疗法             | (61) |
| 附二：割治疗法             | (62) |
| <b>第六节 头针疗法</b>     | (63) |
| 一、头针的刺激区和作用         | (63) |
| 二、头针的操作方法及注意事项      | (64) |
| 三、头针的针感             | (65) |
| 四、提高疗效的几个环节         | (65) |
| 五、适应症               | (65) |
| 六、头针对人体生物电的影响       | (66) |
| 七、头针治疗的原理           | (66) |
| <b>第七节 推拿疗法</b>     | (70) |
| 一、推拿疗法的作用           | (70) |
| 二、常用的推拿手法           | (71) |
| 三、怎样应用推拿疗法          | (81) |
| （一）、具体操作            | (81) |
| （二）、推拿注意事项          | (82) |
| （三）、推拿用的介质          | (82) |
| （四）推拿的适应症、禁忌症。      | (82) |
| 四、推拿临床应用            | (83) |
| （一）腰背部软组织损伤         | (83) |



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| (04) (二) 踝关节扭伤           | (83)  |
| (04) (三) 落枕              | (84)  |
| (05) (四) 肩关节周围炎          | (84)  |
| (13) (五) 面神经麻痹           | (85)  |
| (13) (六) 小儿麻痹后遗症         | (85)  |
| (15) (七) 腰椎间盘突出症         | (86)  |
| (25) 附: 小儿推拿 (供参考)       | (87)  |
| (16) 1、小儿消化不良            | (92)  |
| (16) 2、感冒                | (92)  |
| (26) 3、小儿营养不良            | (93)  |
| (26) 4、小儿腹泻              | (93)  |
| (82) 第八节 其他疗法 (供参考)      |       |
| (82) 一、手针疗法              | (93)  |
| (82) 二、挑治法               | (95)  |
| (82) 三、新明穴介绍             | (95)  |
| (82)                     |       |
| (00) 第三章 常见病症新医疗法治疗      |       |
| (10) 第一节 内儿科病症 (包括神经精神科) | (97)  |
| (10) 一、感冒                | (97)  |
| (22) 二、气管炎               | (97)  |
| (22) 三、支气管哮喘             | (97)  |
| (23) 四、胃痛                | (97)  |
| (24) 五、胃下垂               | (98)  |
| (25) 六、便秘                | (98)  |
| (25) 七、急、慢性肠炎、痢疾         | (98)  |
| (26) 八、传染性肝炎             | (98)  |
| (26) 九、小儿单纯性消化不良         | (98)  |
| (26) 十、肠蛔虫病              | (98)  |
| (27) 十一、膈肌痉挛             | (98)  |
| (27) 十二、风湿性心脏病           | (98)  |
| (27) 十三、高血压              | (99)  |
| (27) 十四、头痛               | (99)  |
| (27) 十五、关节炎              | (99)  |
| (27) 十六、偏瘫               | (100) |
| (27) 十七、面瘫 (面神经麻痹)       | (100) |
| (27) 十八、外伤性截瘫            | (100) |
| (27) 十九、三叉神经痛            | (101) |
| (27) 二十、神经衰弱             | (101) |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 二十一、癫痫                              | (102) |
| 二十二、精神分裂症                           | (102) |
| 二十三、小儿麻痹后遗症                         | (102) |
| 二十四、坐骨神经痛                           | (102) |
| 二十五、休克                              | (103) |
| 二十六、中暑                              | (103) |
| 二十七、小儿高烧、惊厥                         | (103) |
| 二十八、腮腺炎                             | (103) |
| 二十九、夜尿症                             | (103) |
| 三十、尿潴留                              | (103) |
| 三十一、瘰疬                              | (103) |
| <b>第二节 外科、皮肤科病症</b>                 | (104) |
| 一、急、慢性阑尾炎                           | (104) |
| 二、胆道蛔虫症                             | (104) |
| 三、脱肛                                | (104) |
| 四、腰椎间盘突出后遗症                         | (104) |
| 五、腰扭伤                               | (104) |
| 六、慢性腰肌劳损                            | (104) |
| 七、四肢关节扭伤                            | (105) |
| 八、周围神经损伤                            | (105) |
| 九、落枕                                | (105) |
| 十、神经性皮炎                             | (105) |
| 十一、牛皮癣                              | (105) |
| 十二、荨麻疹                              | (105) |
| 十三、腕部腱鞘病                            | (105) |
| <b>第三节 妇产科病症</b>                    | (106) |
| 一、月经病(包括月经不调、闭经、痛经、功能性子宫出血)         | (106) |
| 二、附件炎                               | (106) |
| 二、子宫脱垂                              | (106) |
| 三、胎位不正                              | (106) |
| <b>第四节 五官科病症</b>                    | (106) |
| 一、聋哑                                | (106) |
| 二、鼻炎                                | (107) |
| 三、近视                                | (107) |
| 四、内眼病(包括视神经萎缩、中心性视网膜炎、视网膜色素变性、青光眼等) | (107) |
| 五、牙痛                                | (107) |

# 第一章 穴位

穴位、俞穴、经穴，是针刺或有关疗法施于人体以防治疾病的刺激点。

人体穴位，据现有文献记载已达一千多个。其中属于十四经的有361个，后来在长期的临床实践中又发现一些不在十四经循行路线上的穴位，但对某些疾病有治疗作用，这些穴位称为“经外奇穴”。当人体患病时，反应于体表的一些敏感处或压痛点，称为“阿是穴”或“天应穴”。近几年来发现的一些穴位称为“新穴”。

经络是新医疗法重要基础理论，它与穴位有极密切的关系。有关内容在中医学讲义内阐述。

## 第一节 穴位的取法

确定穴位的位置通常有三种方法。

一、骨度法（折量法）：根据人体不同部位定出一定的尺寸作为取穴标准的。如取中腕穴，将剑突至脐规定为8寸，脐上4寸处即是。

常用尺寸如下：

前发际至后发际12寸。

后发际至第七颈椎棘突3寸。

前发际至印堂穴3寸

两乳头之间8寸。

胸骨剑突至脐8寸。

脐至耻骨联合上缘5寸。

腋前横纹至肘横纹9寸。

肘横纹至腕横纹12寸。

股骨大转子至外膝眼19寸。

耻骨联合上缘至股骨内上髁18寸。


寸。

膝中至外踝尖16寸。

外膝眼至外踝尖13寸。

肩胛骨内缘至背中线3寸。

二、指量法：是以病人手指宽度作为取穴标准的。若医生与病人手指大致相当就可以直接量取病人穴位，



图①：骨度法（折量法）



若不相当则应按比例增减。

- (一)、中指同身寸：以中指中节两横纹之间的距离为1寸。
- (二)、一夫法：食、中、无名、少指并拢时，四个指头第二节总的宽度为一夫（三寸）；食、中指的宽度为半夫（1寸半）。
- (三)、拇指法：以拇指平指甲根的宽度为1寸。




图2 指量法

**三、体表标志法：**以人体体表的各種自然标志作取穴标准，有定型标志与活动标志两类。定型标志包括五官、毛发、爪甲、乳头、脐孔、骨性标志、关节、肌沟、皮纹等。如两眉正中处为印堂穴。活动标志指病人在作某种动作或特殊姿势时出现的肌沟、皮纹、突起、凹陷等。如屈肘时出现的肘横纹头处为曲池穴，咬牙时下颌角突起为颊车穴等。

## 第二节 十四经常用穴位

**一、手太阴肺经：**起于上腹，下络大肠，回绕胃穿过膈到肺属肺，从中府穴经上肢桡侧内侧直达拇指内侧少商穴。

**主治：**本经所属肺脏与相表里的大肠腑，及其循行部位疾患。如胸胀满、咳嗽、气喘、咳血、咽喉痛、肩臂痛、大肠疾患等。

**穴位：**共11穴，介绍常用7穴。

| 穴名 | 部位            | 主治                    | 针法           |
|----|---------------|-----------------------|--------------|
| 中府 | 锁骨外端下方凹陷处下1寸。 | 咳嗽、哮喘、胸闷、胸痛。          | 向胸廓外上直刺0.5寸。 |
| 尺泽 | 肘横纹上、肱二头肌腱外侧。 | 咳嗽、气喘、咳血、咽喉痛、臂肘肿痛。    | 直刺0.5—1寸。    |
| 孔最 | 仰掌、尺泽穴下5寸。    | 咳嗽、气喘、咳血、咽喉病、失音、前臂酸痛。 | 直刺1—1.5寸。    |

|     |                                |                        |                |
|-----|--------------------------------|------------------------|----------------|
| 列 缺 | 桡骨茎突上方，两虎口交叉食指指尖到达的凹陷点中。       | 咳嗽、气喘、头痛、腕关节痛。         | 向肘部斜刺0.3—0.5寸。 |
| 太 渊 | 仰掌，腕横纹之桡侧凹陷处，拇长展肌腱与桡动脉搏动处之间取穴。 | 咳嗽，气喘、咽喉痛、腕关节及周围软组织疾患。 | 直刺0.3—0.5寸     |
| 鱼 际 | 仰掌，第一掌骨中点赤白肉际处。                | 扁桃腺炎、咽喉肿痛、咳嗽发烧、失音。     | 直刺0.5—0.8寸。    |
| 少 商 | 拇指桡侧距指甲角1分许。                   | 昏迷、发热、咳嗽、咽喉肿痛、扁桃体炎。    | 直刺0.1寸；点刺出血。   |






图3：手太阴肺经经脉循行穴位图

**二、手阳明大肠经：**起于食指背面桡侧商阳穴，沿上肢桡侧背侧肩部到对侧鼻旁的迎香穴。一支从肩部向下络肺，下膈属大肠。

**主治：**本经所属大肠腑与其相表里的肺脏、及其循行部位疾患，如腹痛、肠鸣、腹泻、痢

穴位：共20穴，介绍常用7穴

| 穴 名 | 部 位                     | 主 治                                        | 针 方                  |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 商 阳 | 食指桡侧距指甲角1分许。            | 咽喉肿痛、手指发麻、昏迷。                              | 直刺0.1寸、点刺出血。         |
| 合 谷 | 手背1、2掌骨间，拇食指并拢肌肉突着最高点。  | 感冒、多汗、头痛、咽肿痛、耳聋耳鸣、眼病、鼻病、面瘫、手指麻木痉挛、上肢疼痛、催产。 | 直刺1—1.5寸，孕妇忌针。       |
| 阳 溪 | 腕关节桡侧背面凹陷处（大拇指上翘两肌腱之间）。 | 头痛、牙痛、喉痛、耳鸣、耳聋、腕痛。                         | 直刺0.3—0.5寸。          |
| 手三里 | 曲池穴下2寸。                 | 手臂疼痛麻木、上肢瘫痪。                               | 直刺1—1.5寸。            |
| 曲 池 | 屈肘、肘横纹头尽端处。             | 肩臂痛、上肢麻木瘫痪、发热、高血压、荨麻疹等。                    | 直刺1—2寸。可透刺少海。        |
| 肩 髃 | 平举上臂、肩前凹窝内。             | 肩臂痛、上肢麻木瘫痪、肩关节周围炎。                         | 手臂平举，直刺1—1.5寸。       |
| 迎 香 | 鼻翼外缘中点平齐的鼻唇沟中。          | 鼻塞、鼻炎、鼻衄、面瘫、胆道蛔虫病。                         | 向上内斜刺0.5寸。胆道蛔虫病透刺四白。 |








图6：手阳明大肠经脉循行穴位图



图7：合谷穴




图8：曲池、肩髃穴

**三、足阳明经：**起于承泣穴、下绕口唇经耳前达头维穴；另一支由下颌沿喉下缺盆，又分两支，里支下膈属胃，络脾；其表支直行向下挟脐下行至腹股沟与里支会合，再缘下肢外侧前缘到次趾末端厉兑穴。

**主治：**本经所属胃腑与其相表里的脾脏，及其循行部位疾患，如腹胀、腹痛、腹泻、肠鸣、水肿、呕吐、面瘫、咽喉肿痛、齿痛、鼻衄及经循循行部位疼痛等。

**穴位：**共45穴，介绍常用19穴

| 穴名 | 部位                 | 主治                     | 针法                     |
|----|--------------------|------------------------|------------------------|
| 承泣 | 眼正视瞳孔下7分，眼球与眶下缘之间。 | 眶下神经痛、近视、视经神萎缩、流泪、面瘫等。 | 沿眶缘直刺0.5—2寸，不捻转。       |
| 四白 | 眼正视，瞳孔直下1寸眶下孔凹陷处。  | 面瘫、结膜炎、目翳、三叉神经痛，胆道蛔虫病。 | 直刺0.2—0.8寸，胆道蛔虫病透刺迎香穴。 |
| 地仓 | 口角旁开4分处。           | 面瘫、牙痛、流涎，牙关紧闭。         | 直刺0.3—0.5寸，可斜刺透颊车穴。    |

|              |                        |                                              |                    |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 颊 车          | 下颌角前上方一横指，作咬牙动作，咬肌突起处。 | 牙痛、面瘫、腮腺炎、牙关紧闭。                              | 直刺或斜刺0.5—1寸。       |
| 下 关          | 耳屏前8分，颧骨弓下凹陷处。         | 牙痛、面瘫、下颌关节炎、三叉神经痛、耳鸣耳聋、鼓膜内陷。                 | 略内下直刺0.5—1.5寸。     |
| 梁 门          | 中脘穴旁开2寸。               | 胃痛、呕吐、食欲不振。                                  | 直刺0.8—1寸。          |
| 天 枢          | 脐旁2寸。                  | 腹痛、腹胀、痢疾、腹泻、便秘、阑尾炎、痛经。                       | 直刺1—1.5寸。          |
| 脾 关          | 髌前上棘直下与会阴平齐处。          | 下肢瘫痪、髌关节及大腿痛。                                | 直刺1—2寸。            |
| 优 兔          | 腓骨上缘上6寸与外膝眼对直取穴。       | 下肢瘫痪、腿痛、膝痛。                                  | 直刺2—3寸。            |
| 梁 丘          | 腓骨上缘上2寸、与外膝眼对直取穴。      | 胃痛，下肢瘫痪、膝关节炎及周围软组织疾患。                        | 直刺1—2寸。            |
| 犊 鼻<br>(外膝眼) | 屈膝90度，腓骨外侧凹陷处。         | 膝关节痛、膝关节屈伸不利。                                | 向内斜刺1—1.5寸。        |
| 足三里          | 外膝眼直下3寸，距胫骨前缘约一横指处。    | 为全身强壮穴。胃痛、腹痛腹泻等消化系统疾患、下肢瘫痪、神经衰弱、贫血、高血压、阑尾炎等。 | 直刺1—2寸。            |
| 上巨虚          | 足三里直下3寸。               | 腹痛、腹泻、便秘、胀气、阑尾炎等。                            | 直刺1—2寸。            |
| 条 口          | 上巨虚下2寸，胫骨腓骨间。          | 腹痛、肩关节痛、腓肠肌痉挛。                               | 直刺1.5—2.5寸，可透刺承山穴。 |

|     |                       |                              |                |
|-----|-----------------------|------------------------------|----------------|
| 下巨虚 | 条口下1寸。                | 腹痛、腹泻、痢疾。                    | 直刺1—2寸。        |
| 丰隆  | 外膝眼与外踝连线中点，距胫骨外侧2横指处。 | 为祛痰要穴、咳嗽、头痛、眩晕、癫痫、下肢疼痛、下肢瘫痪。 | 直刺1—2寸。        |
| 解溪  | 足背内、外踝之间横纹中点两肌腱之间。    | 踝关节疾患、扭伤、足下垂。                | 直刺0.5—1寸。      |
| 内庭  | 足第二、三趾蹼缘上5分许（趾缝间）。    | 胃痛、腹痛、腹泻、牙痛、面瘫、扁桃体炎、鼻病。      | 直刺或向上斜刺0.5—1寸。 |
| 厉兑  | 足第二趾外侧距趾甲角1分许。        | 牙痛、癫痫、精神分裂症。                 | 斜刺0.1寸。点刺出血。   |




图9： 足阳明胃经脉循行穴位图




图10： 胃经小腿穴位分寸图




图11 丰隆穴