




棕颈犀鸟  
• RUFOUS-NECKED HORNBILL



远东山雀  
• JAPANESE TIT



寿带  
• ASIAN PARADISE FLYCATCHER

海峡出版发行集团 | 海峡书局

# 中国鸟类图鉴 中卷

## FIELD GUIDE TO THE BIRDS OF CHINA

主编: 曲利明

VOLUME II



戴胜  
COMMON HOPOE



仓鸮  
• BARN OWL



红角鸮  
• ORIENTAL SCOPS OWL

沙鸡目	>	沙鸡科	
鸽形目	>	鸠鸽科	
alconiformes	>	鵟鵙科	
alconiformes	>	鴟鵰科	杜鹃科
alconiformes	>	草鹀科	鹀科
夜鹰目	>	夜鹰科	
雨燕目	>	树燕科	雨燕科
咬鹃目	>	咬鹃科	
佛法僧目	>	佛法僧科	翠鸟科
		鱼狗科	蜂虎科
戴胜目	>	戴胜科	
犀鸟目	>	犀鸟科	
䴕形目	>	拟啄木鸟科	洞蜜䴕科
		啄木鸟科	
雀形目	>	阔嘴鸟科	八色鸫科
		林鶲科	燕鶲科
		雀鹀科	鹛鹀科
		伯劳科	莺雀科
		黄鹂科	卷尾科
		扇尾鹟科	王鹟科
		鹀科	太平鸟科
		仙鹟科	山雀科
		攀雀科	文须雀科
		百灵科	鶲科
		燕科	树莺科
		长尾山雀科	柳莺科
		苇莺科	煌莺科
		扇尾莺科	



台湾似啄木鸟  
• TAIWAN BARBET

# 中国 鸟类 图鉴

FIELD GUIDE  
TO THE BIRDS  
OF CHINA

主编:曲利明



海峡出版发行集团  
海 峡 书 局  
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

图书在版编目 (C I P) 数据

中国鸟类图鉴 : 全3册 / 曲利明主编. — 福州 :  
海峡书局, 2013. 1

ISBN 978-7-80691-804-3

I. ①中… II. ①曲… III. ①鸟类—中国—图集  
IV. ①Q959.708-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第299692号

主 编：曲利明

副主编/撰稿：刘阳、闻丞、危骞、雷进宇

责 任 编 辑：廖飞琴、欧阳丽敏、陈婧、李舒洁、薛瑜婷

设 计：黄舒婧

封 面 设 计：黄硕燊

## 中国鸟类图鉴（全3册）

出版发行：海峡出版发行集团 海峡书局

地 址：福州市东水路76号出版中心12层

网 址：[www.hcsy.net.cn](http://www.hcsy.net.cn)

邮 编：350001

印 刷：深圳市国际彩印有限公司

开 本：889毫米×1194毫米 1/16

印 张：120

图 文：1916码

版 次：2013年1月第1版

印 次：2013年1月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-80691-804-3

定 价：2800.00元（全套）

## 西藏毛腿沙鸡

Tibetan Sandgrouse

体长: 40厘米

居留类型: 留鸟

特征描述: 中央尾羽延长的大型沙鸡。翼黑色, 中央尾羽延长, 羽端白色, 胸部无黑色块斑, 深色小点构成细横纹, 将白色的腹部与橙黄色的脸及喉隔开, 整体浅色的胸腹部将其与中国另外两种沙鸡区别开。


虹膜褐色; 喙角质蓝色; 脚偏蓝色, 腿被羽。

生态习性: 结群生活于荒芜草地及多岩石的碎石滩上。


分布: 中国见于西藏、新疆西南部、四川西北部、青海南部及东部。国外分布于拉达克地区和帕米尔高原。



雌鸟/西藏/杨华



西藏/杨华



空旷荒凉、平缓起伏的景观是沙鸡栖息地的典型特征/西藏/杨华

# 毛腿沙鸡

Pallas's Sandgrouse

体长: 36厘米

居留类型: 夏候鸟、旅鸟、冬候鸟

特征描述: 大型沙色沙鸡。中央尾羽延长, 脸侧有橙黄色斑纹, 眼周浅蓝色, 无黑色喉斑, 上体具浓密黑色杂点, 腹部具特征性的黑色斑块。雄鸟胸部浅灰色, 无纵纹, 黑色的细小横斑形成胸带。雌鸟喉具狭窄黑色横纹, 颈侧具细点斑。飞行时翼形尖, 翼下白色, 次级飞羽具狭窄黑色缘。


虹膜褐色; 喙偏绿色; 脚偏蓝色, 腿被羽。

生态习性: 栖于开阔的贫瘠原野、无树草场及半荒漠地带, 也光顾收割后的耕地。

分布: 中国见于北方地区, 迁徙季节南下至河北、陕西、辽宁及山东越冬, 偶在华北有繁殖记录。国外分布于中亚。



雌鸟/新疆阿勒泰/张国强




雄鸟/内蒙古/张明




雌鸟/新疆阿勒泰/张国强



雄鸟/新疆阿勒泰/张国强



·小家庭/雄鸟（前）雌鸟（后）/内蒙古/张明



·带雏鸟/内蒙古/张明

# 黑腹沙鸡

Black-bellied Sandgrouse



雄鸟/新疆阿勒泰/张国强

保护级别：国家Ⅱ级

体长：34厘米

居留类型：夏候鸟、旅鸟

特征描述：沙褐色多彩沙鸡。中央尾羽不甚延长，雄鸟头、颈及喉部灰色，颈侧及下脸具栗色块斑，翼上多具黑色及黄褐色粗横纹。雌鸟色浅，黑色点斑较多。两性下胸及腹部均黑色，胸具皮黄色胸带，其上为纯黑色的项纹。

虹膜褐色；喙绿灰色；脚绿灰色。

生态习性：栖息于干燥而少植被的地区以及耕作区的边缘。

分布：中国繁殖于新疆北部及西北部(天山)，迁徙时途经新疆西南部(喀什)。国外分布于西班牙、北非、中东、印度北部及西北部、阿富汗、俄罗斯南部。



新疆阿勒泰/张国强

# 原鸽

Rock Pigeon

体长: 32厘米

居留类型: 留鸟

特征描述: 极似家鸽的中型蓝灰色鸽类。头小而体壮, 翼上及尾端横斑黑色, 头及胸部具紫绿色闪光, 为人们所熟悉的城市及家养品种鸽的野生型, 与家鸽的区别在于羽色规则, 翼上覆羽无雨点斑, 鼻瘤微小。

虹膜褐色; 喙角质色; 脚深红色。

生态习性: 岩栖性鸟类, 喜开阔地带, 在地面觅食。很容易适应城市及庙宇周围的生活, 常结群活动, 盘旋飞行。

分布: 亚种 *neglecta* 在中国西北地区及喜马拉雅山脉为地方性常见鸟, *nigricans* 分布于青海南部至内蒙古东部及河北。国外见于印度次大陆的部分地区和古北界南部, 引种至世界各地。



新疆阿勒泰/张国强



雄鸟(右一、右二)昂首挺胸, 膨大颈部鸣叫, 尾随雌鸟进行求偶炫耀/西藏吉隆/肖克坚



新疆阿勒泰/张国强

# 岩鸽

Hill Pigeon

体长: 31厘米 居留类型: 留鸟、候鸟

特征描述: 极似家鸽而尾羽完全不同的灰色鸽类。中等体型, 翼上具两道黑色横斑, 似原鸽, 但腹部及背色较浅, 尾上有宽阔的偏白色次端带, 灰色的尾基、浅色的背部及尾上白色端带成明显对比。

虹膜浅褐色; 喙黑色, 蜡膜肉色; 脚红色。

生态习性: 成对或集群栖息于多峭壁崖洞的悬崖地带, 在地面觅食。

分布: 中国亚种*turkestanica*为新疆西部及西藏的留鸟, 指名亚种繁殖遍及华北、东北及华中地区, 部分鸟秋冬南迁越冬, 分布可至海拔6000米。国外见于喜马拉雅山脉南麓、中亚。



西藏纳木错/董磊



北京/张永



青海共和/高川

# 雪鸽

Snow Pigeon

体长: 35厘米 居留类型: 留鸟

特征描述: 大型白色鸽类。头深灰色; 领、下背及下体白色, 上背褐灰色, 腰、尾黑色, 中间部位具白色宽带, 翼灰色, 具两道黑色横纹。

虹膜黄色; 喙深灰色, 蜡膜洋红色; 脚浅红色。

生态习性: 成对或结小群活动, 滑翔于高山草甸、悬崖峭壁及雪原的上空, 在地面觅食, 常见于海拔3000—5200米的适合环境, 尤其较潮湿的地区。

分布: 中国分布于西藏南部、东部及东南部和云南西北部、四川西部及青海。国外见于喜马拉雅山脉南麓。



西藏/张永



崖栖是雪鸽、岩鸽和原鸽共同的特征/西藏/张明



西藏错那/肖克坚

# 欧鸽

Stock Dove

体长: 31厘米

居留类型: 留鸟

特征描述: 中型灰色鸽类。体形较原鸽纤细, 胸偏粉色, 颈侧具金属绿色块斑, 翼具两道黑色纵纹, 与原鸽区别在于腰灰色, 翼上纵纹不完整, 初级飞羽具黑色缘, 颈部亮紫色少。

虹膜褐色; 喙黄色; 脚红色。

生态习性: 不结大群, 常活动于干燥开阔地带。

分布: 中国为新疆喀什及天山地区的罕见留鸟。国外见于欧洲、北非、亚洲西南部、伊朗、土耳其。



新疆/王尧天



新疆阿勒泰/肖克坚



新疆阿勒泰/肖克坚



新疆奇台/邢睿

# 斑尾林鸽

Common Wood Pigeon

保护级别：国家Ⅱ级

体长：42厘米

居留类型：留鸟

特征描述：身体壮实的大型灰色鸽类。胸粉红色，颈侧具绿色闪光斑块，下连豆状的乳白色块斑，飞行时黑色的飞羽及灰色的覆羽间具白色宽横带。幼鸟颈侧无乳白色块斑，胸棕色。


虹膜黄色；喙偏红色；脚红色。

生态习性：结群活动，栖息于开阔林地但常觅食于农耕地。起飞时扑翼响动声大，炫耀飞行时两翼至最高点后俯冲而下，或两翼半合滑翔，动作略似珠颈斑鸠。


分布：在中国罕见，亚种*casiotis*为新疆喀什及天山地区的留鸟。国外见于欧洲至俄罗斯、伊朗及印度北部。



新疆阿勒泰/张国强



新疆阿勒泰/张国强



斑尾林鸽比原鸽更常栖于树枝上，不结大群且在树上筑巢/新疆阿勒泰/张国强