

初生門下

目爛 兒初生目痛難睜胞邊赤爛胎熱攻內用地黃湯清熱外點真金目即明註目爛者胞邊赤爛痛難睜因胎中熱

生後毒熱上攻於目故有是證內服地黃湯以清熱外用真金散以點目其證自愈

生地黃湯方見目不開

真金散 黃連生 黃蘗生 當歸 赤芍藥各一 杏仁五分炒 右剉散乳汁浸一宿曬乾為極細末用 生地黃汁調

一匙頻頻點眼即愈

懸癰 睛上腫起號懸癰皆因胎毒熱上冲法當刺破睛邊拭如聖一字搽之靈註凡喉裏上脰腫起如虛癰風水狀者名曰

懸癰虛癰者虛也此胎毒上攻須以綿纏長針留鋒刺之瀉去青黃赤汁未消者來日再刺刺後以鹽湯拭口用如聖散或

一字散搽之

如聖散 鉛霜錢 真牛黃錢 太陰元精石 硃砂各二錢五 龍腦分五 右為極細末每用一字搽患處

一字散 硃砂飛 硼砂各五 龍腦 朴硝各一 右為極細末用蜜調少許搽創藥搽口內

重齕 重齕胎熱胃中蓄牙根腫如痛難禁刺破一字散敷上繼進清胃散如神註重齕者因小兒在胎有熱蓄於胃中故牙

根腫如水泡名曰重齕治法用針刺破以鹽湯拭淨外敷一字散內服清胃散其腫自消 一字散方見懸癰

清胃散 生地 丹皮 黃連 當歸 升麻 石膏煨 引用燈心水煎服 方清胃散治胃熱熏生地黃連當歸身丹

皮升麻石膏煨臨煎須要入燈心

鵝口 鵝口白屑滿舌口心脾熱本胎原清熱瀉脾搭保命少遲磨爛治難痊註鵝口者白屑生滿口舌如鵝之口也由在

胎中受母飲食熱毒之氣蘊於心脾二經故生後遂發口舌之間治法以清熱瀉皮散主之外用髮蘊并水拭口搽以保命散

日敷二三次白退自安倘治之稍遲必口舌糜爛吮乳不得則難痊矣

清熱瀉脾散 山梔炒 石膏煨 黃連薑炒 生地 黃芩 赤苓 引用燈心水煎服 方清熱瀉脾治鵝口石膏生

地赤蒼黃連梔子合戔劑加入燈心病即安

保命散 白礬燒灰 硃砂二錢各五 馬牙硝錢 右研末以白鵝糞水攪取汁塗舌與口角上

吐舌 吐長收緩名吐舌皆是心經有熱成面紅煩渴溺赤服瀉心導赤服即愈 註吐舌者伸長而收緩也因心經有熱所致

故面紅煩燥口渴尿赤宜瀉心導赤湯主之

瀉心導赤湯 木通 生地 黃連 甘草生 引用燈心水即服 方瀉心導赤湯最良心熱吐舌即堪嘗木通生地黃

連草燈心加入服自強

弄舌 弄舌時時口內搖心脾熱發口唇焦燥熱舌乾大便穢濁黃導赤並能療 兒熱口中搖動者因心脾有熱以致唇焦

舌乾煩燥便穢先通瀉黃散次用瀉心導赤湯

瀉黃散 藿香葉 山梔子炒 石膏煨 防風 甘草生 引用燈心水煎服 方弄舌瀉黃散最靈藿香葉配山梔仁甘

草防風石膏煨臨時煎服入燈心 瀉心導赤湯 方見吐舌

重舌 舌下腫突似舌形心脾積熱上攻衝內服宜以清熱飲外敷涼心功最靈 註重舌者因舌下近古根處其腫形如舌故

名重舌此心脾之熱宜服清熱飲外吹涼心散

清熱飲 黃連生 生地 木通 甘草生 連翹去心 蓮子 引用淡竹葉水煎服時灌入口中 方清熱飲內用

黃連生地蓮子木通甘連翹更加淡竹葉一同煎服自然安

涼心散 青黛 硼砂 黃蘗 黃連人乳拌 人中白各二錢 風化硝錢 冰片二分 右為極細末吹之甚效

木舌 木舌心脾積熱成腫脹木硬證多凶外用川硝數古上內服瀉心導赤靈 註木舌一證皆因心脾積熱而成蓋脾之脉

絡在舌下又舌為心苗遇火上衝令兒舌腫滿木硬不能轉動故名木外用川硝散數古上內服瀉心導赤湯若不急治致難救

川硝散 朴硝分 真紫雪分 鹽分 右為細末以竹漚調敷古上 瀉心導赤散 方見吐舌

覓乳 覓乳之候非一朝傷乳停積胃熱寒熱宜和中清熱飲寒用溫中止吐煎傷乳平胃散最妙停痰二陳湯可痰者是滿

而自溢者當須節乳自能安。小兒嘔乳證非一端有宿乳停胃寒熱之分不可一例而治如面色多赤二便微秘手足指熱此為熱嘔也宜和中清熱飲主之面色青白薑黃多沫手足指冷此因寒而嘔也宜溫中止吐湯主之口熱唇乾夜卧不寧手足心熱此為傷寒而嘔也宜平胃主之胸膈膨脹嘔吐痰涎此因停痰而嘔也宜枳桔二陳湯主之若喫乳過多滿而自溢者不須服藥惟節乳則自止矣

和中清熱散

黃連炒

半夏製

陳皮

茯苓

藿香

砂仁

引用薑水煎服

和中清熱飲

黃連炒

半夏製

陳皮

茯苓

蒼香砂仁

合成劑水煎徐服可安全

溫中止吐湯

白豆蔻研

茯苓

半夏製

生薑

水煎沖磨沈香汁服

溫中止吐

白豆蔻研

茯苓

半夏製

生薑

卧服沈

香汁加入專治嘔乳自寒傷

平胃散

蒼朮炒

陳皮

厚朴炒

甘草炙

麥芽炒

砂仁研

引用薑水煎服

小兒傷乳多吐嘔平胃調和功可

見蒼陳厚朴甘草偕加入麥芽薑一片

枳桔二陳湯

枳殼炒

桔梗

陳皮

半夏製

茯苓

甘草炙

引用薑水煎服

枳桔二陳湯最

先枳桔陳半苓甘草生薑加入即時痊

夜啼

夜啼寒熱表裏證古法蟬花散最精

寒屬脾經面青白手腹俱冷曲腰疼面赤溺閉屬心熱熱用導赤寒鉤藤若無熱

表裏證古法蟬花散最精

小兒初生夜啼其因有二曰脾寒一曰心熱皆受自胎中觀其形色便知病情矣如面色青

白手腹俱冷不欲吮乳曲腰不伸者脾寒也鉤藤飲主之面赤唇紅身腹俱冷小便不利煩躁多啼者心熱也導赤散主之若

非以上形證但夜啼者用蟬花散主當

鉤藤飲

川芎

白當歸

茯苓

白芍炒

茯苓

甘草

木香煨

鉤藤鉤

引用紅棗水煎服

夜啼之證因脾寒

須服鉤藤飲可痊

歸神芍苓甘草木香鉤藤紅棗煎

導赤散

方見小便不通

蟬花散

蟬蛻不拘多少用下半截

右研細末每服少許薄何葉煎湯調下

胎黃

兒生偏體色如金濕熱重蒸胎受深法當滲濕清熱地黃犀角二方神

胎黃者偏體面目皆黃其色如金乃孕婦

初生門

胎黃

兒生偏體色如金濕熱重蒸胎受深法當滲濕清熱地黃犀角二方神

胎黃者偏體面目皆黃其色如金乃孕婦

初生門

胎黃

兒生偏體色如金濕熱重蒸胎受深法當滲濕清熱地黃犀角二方神

胎黃者偏體面目皆黃其色如金乃孕婦

初生門

胎黃

兒生偏體色如金濕熱重蒸胎受深法當滲濕清熱地黃犀角二方神

胎黃者偏體面目皆黃其色如金乃孕婦

初生門

胎黃

兒生偏體色如金濕熱重蒸胎受深法當滲濕清熱地黃犀角二方神

胎黃者偏體面目皆黃其色如金乃孕婦

初生門

胎黃

兒生偏體色如金濕熱重蒸胎受深法當滲濕清熱地黃犀角二方神

胎黃者偏體面目皆黃其色如金乃孕婦

初生門

濕熱太盛小兒在胎受父母熱毒故生則有是證也法當溼清熱須分輕重治之色微黃者生地黃湯深黃者犀角散
生地黃湯 生地黃 赤芍藥 川芎 當歸 天花粉 赤茯苓 澤瀉 豬苓 甘草生 茵陳蒿 引用燈心水煎服

方胎黃須用地黃湯四物花粉赤苓昆澤瀉豬苓甘草等茵陳加入水煎嘗

犀角散 犀角 茵陳蒿 枯蘘根 升麻 甘草生 龍胆草 生地 寒水石煨 水煎不拘時服

方胎黃又有犀角散甘草犀角與茵陳升麻胆草生地共寒水石同枯蘘根

胎赤 胎赤胎中受熱毒生後偏體若丹塗清熱解毒湯極妙蔣氏化毒功效殊 胎赤者因孕婦過食辛熱之物以致毒熱

凝結蘊於胎中遂令小兒生下頭面肢體赤若丹塗故名曰胎赤當以清熱解毒湯主之熱盛便秘者蔣氏化毒丹主之

清熱解毒湯 生地 黃連 金銀花 薄荷葉 連翹 赤芍 木通 甘草生 引用燈心水煎服 方清熱解毒

湯堪誇生地黃連金銀花薄荷連翹赤芍藥木通甘草燈心加

蔣氏化毒方 犀角 黃連 桔梗 元參 薄荷葉 甘草生 大黃 兩生 青黛 錢 右為細末煉白蜜為重丸六分每

服一丸燈心湯化服

赤游風 赤游風中熱毒成皮膚赤腫偏身行頭面四肢猶可治若歸心腹命難主內服犀角藍葉散外用砭法數神功百日

之內忌殺血貼塗二法可安靈 註小兒赤游風證多由胎中毒熱而感或生後過於溫暖熱毒發於外以致皮膚赤熱而腫

色若塗丹游走不定行於偏身故名曰赤游風多發於頭面四肢之間若內歸心腹則死治法當服犀角解毒飲如不愈繼以

藍葉散外用砭法刺出毒血毒甚者數以神功散毒輕者不用敷藥在百日内者小兒忌殺血以其肌肉難任也須用猪肉貼

法或以赤小豆末雞子清調塗之甚效

犀角解毒飲 牛蒡子 炒 犀角 荆芥穗 防風 連翹 金銀花 赤芍藥 生甘草 川黃連 生地黃 引用燈

心水煎服 方犀角解毒藥最良牛蒡犀角合荆防連翹銀花赤芍藥甘草川連生地黃

藍葉散 藍葉 五錢 黃芩 犀角屑 川大黃 炒 微 柴胡 梔子 各二錢 川生麻 錢 石膏 錢 生甘草 一錢 右為粗末每服
一錢水一小杯煎五分去渣兌竹瀝一酒盞煎三兩沸放溫量兒大小用之氣怯弱者可去大黃

砒血法 口吮毒血各聚一處用細磁器擊碎取鋒芒者將著頭劈開更住用線縛之兩指輕擦筋稍入磁鋒對聚血處再用
筋一根頻擊刺出毒血砒後毒甚者以神功散敷之毒輕者砒後不可用惡皮膚既破草烏能作痛也如患在頭者不用砒
法祇宜卧鐵倒挑患處出毒血則愈

神功散 黃蘗炒 草烏生 右各為末等分用漱口水潤之

豬肉貼法 用生豬肉切片貼於赤腫處數數更換

塗法 生赤小豆不拘多少研為細末用雞子清調塗患處乾則再塗

初生無皮 兒生無皮有二端父母梅毒遺染傳或因未足月生早無皮赤爛痛難堪梅毒換肌消毒散胎怯當歸飲能痊外

敷清涼鵝黃粉毒解形丸膚自堅註嬰兒生下無皮其證有二或因父母素有楊梅結毒傳染胎中故生下或上半身赤爛或

下半身赤爛甚至色帶紫黑又有因月分未足生育太早偏體浸漬紅嫩而光二證俱屬惡症遺毒者內服換肌消毒散外用

清涼膏或鵝黃散敷之胎元不足者內服當歸飲外用稻米粉撲之毒解形完者謂解去毒氣其皮自漸漸生完而堅實矣

換肌消毒散 當歸 生地黃 赤芍藥 川芎 皂刺 土茯苓 金銀花 連翹心 甘草生 白芷 苦參 白蘚皮

防風 引用燈心水煎服 方無皮換肌消毒治四物皂刺土茯苓銀花連翹草白芷苦參白蘚皮共防風

當歸飲 何首烏製 白蘚皮 白茯苓 甘草 當歸 生地黃 白芍藥 人參 黃耆 川芎 水煎服 方當歸飲

治兒無皮面白肢冷服最宜首烏蘚皮白茯苓甘草四物共參者

清涼膏 石灰四兩末經水 用水泡之沒指半許露一宿面上有浮起如雲片者輕輕取之微帶清水視其多少對小磨香

油亦如之以順攪成膏為度用雞翎搽之自愈

鵝黃散 黃蘗生 石膏各等 共研為細末撲之濕則乾撲乾則用猪油胆調搽

撲粉法 早稻白米作粉時時撲之其皮漸生神效

變蒸 萬物春生夏熟長兒生同此變形神三十二天為一變六十四日為一蒸變長百骸生藏府蒸增智慧發聰明十八五

百七十六變蒸既畢形神成變蒸之狀身微熱耳尻骨冷無病情註天地初生萬物必以春溫夏熱兒之化生變生神形亦同

此理自生之日至三十二日曰一變至六十四日曰二變則長其百骸生其藏府蒸則增其智慧發其聰明也曰八十五百七十六者謂十變五蒸之外又有三大蒸合計五百七十六日也變蒸既畢形神遂足此後不復變蒸矣然每變蒸之時其狀惟身微熱耳冷尻冷而無他病情狀蓋以陰陽和變生化神形故無他病情狀也身微熱者以陰陽氣之氣變蒸而然也且令尻冷者且尻屬陰以陽不勝陰而與陰和之象故不熱也按變蒸既曰生五臟六腑次序又曰包絡三焦二經俱無形狀故不變不蒸夫包絡乃周身脂膜聯絡百骸藏府者三焦乃軀殼內氣充滿百骸藏府者蒸時豈獨不及之耶其說不經細開靈素自知附辨以俟識者

驚風門

驚風總括 心主驚分肝主風心熱肝風作急驚素虛驚因成慢吐瀉後起慢脾風急驚陽症有是象慢脾陰證有虛形慢驚半陰半陽證虛實寒證要詳明註心藏神心病故主驚也肝屬木肝病故主風也凡小兒心熱肝盛一觸驚受風則風火相搏必作急驚之證也若素稟不足或因急驚用藥過峻暴傷元氣每致釀成慢驚風證更有因吐瀉既久中氣太虛脾土衰弱肝木乘虛而內生驚風者名曰慢經風也三者致病之由既不同故所視之證亦各異急驚屬陽必有陽熱有餘等象象也慢屬陰必有陰冷不足等虛象也至於慢經初生之時陰陽尚未過損或因急驚傳變而成其中常有火痰火熱等症故屬半陰半陽不比慢脾純陰之病也治者須詳分虛實寒熱以治之庶不致悞矣

驚風八候 驚風八候搖掇掇顫及引竄視之名肘臂伸縮名為搖十指開合掇狀成熱若相撲謂之掇顫則頭筋動搖鈴反張身仰頭向後引狀兩手若開弓竄則目直而似怒視則視物不轉睛內外左右分順逆須識急慢證皆同註八候謂搖掇掇顫反竄視是也搖謂肘臂伸縮掇謂十指開合掇謂肩頭相撲顫謂手足動搖反者身仰向後引者手若開弓竄則目直而似似怒視則睛露而不活其搖以男左手女右手男大指在外女大指在內為順反是為逆此候急驚慢驚同皆見之虛實無所異焉治者宜切記之

通關救急法 驚風搖掇神昏憤痰壅氣塞在心胸急用通關吹入鼻無嚏則死有嚏生註驚風搖掇必神氣昏憤皆由痰壅氣塞壅結胸中而致急用通關散入鼻內無嚏者不治有嚏者審其表裏虛實隨證治之

通關散 半夏生 皂刺 細辛 薄荷各等 共為細末用筆管吹入鼻內少許

急驚風 急驚觸其心驚熱或因風鬱火生風暴發症或熱極壯熱煩急面唇紅痰壅氣促牙關緊二便秘瀉脈洪數以

鎮驚風至寶牛黃攻痰涼膈清平治羌活瀉青等化痰導赤共涼驚 急驚風一證有因目觸異物耳聞異聲神散氣亂而生

者有因心肝火盛外為風寒鬱閉不得宣通而生者有因痰盛熱極而內動風者然證多暴發壯熱煩急面唇紅唇赤痰壅氣促

牙關緊急二便秘瀉導赤者齒緊急不能開也二便秘瀉者大便秘結而小便澀難也脈洪數者主陽熱也觸異致驚者有熱

鎮驚湯安神鎮驚丸主之火鬱生風者至寶丹主之痰盛生驚者牛黃丸攻下之熱極生風者涼膈散清解之病不甚者則用

平治之法風熱者羌活散主肝熱者瀉青丸主之痰熱者清熱化痰湯主之經熱者通導赤散治驚丸主之惟在臨證者審

清熱鎮驚湯 柴胡 薄荷 麥冬法 梔子 川黃連 龍胆草 茯神 鉤藤 鈎 甘草生 木通 引加燈心竹葉

硃砂末服 散 清熱鎮驚湯治外驚柴胡薄荷麥冬梔子黃連龍胆草茯神鉤藤草木通

安神鎮驚丸 天竺黃 茯神 鉤藤 胆星 東仁 炒 麥冬法 赤芍 當歸 錢 薄荷葉 黃連 辰砂 牛黃 梔

子 木通 龍骨 鉤藤 青黛 一錢 右為細末煉蜜丸如菜豆大赤金箔為衣量白大小與之淡薑湯化下

至寶丹 麻黃 防風 荊芥 薄荷 當歸 赤芍 大黃 芒硝 川芎 黃芩 桔梗 連翹法 白朮炒 梔子

石膏 煨 甘草 生滑石 金蠅去毒 細辛 天麻 白附子 羌活 僵蠶炒 川連 獨活 黃芩各等 右共為細末

煉蜜為丸每丸重五分量白大小與之薑湯化下

牛黃丸 黑牽牛 白牽牛各七錢半 胆星 枳實炒 半夏各五錢 牙皂二錢去皮 大黃一兩半 右研極細末煉蜜為丸每

丸重五分量白大小與之姜湯化下

涼膈散 黃芩 大黃 連翹法 芒硝 甘草生 梔子 薄荷 引用竹葉生蜜煎服 無汗者加防風羌活 散涼膈

散治膈熱感極翹舌薄荷確黃便秘確黃加倍用無汗更加羌活防

羌活散 羌活 防風 川芎 薄荷 天麻 僵蠶炒 甘草生 川黃連 柴胡 前胡 枳殼炒 桔梗 引用生薑

水煎服 散 羌活散風兼清熱羌活川芎薄荷葉天麻僵蠶草黃連柴胡前胡枳殼桔

散 羌活散風兼清熱羌活川芎薄荷葉天麻僵蠶草黃連柴胡前胡枳殼桔

瀉青丸 龍胆草焙 梔子 大黃煨 羌活 防風各一錢 川芎錢 右研末煉蜜為丸如梧桐子大竹葉薄荷湯調下

清熱化痰湯 紅 麥冬法 半夏鹽 赤苓 黃芩 竹茹 甘草生 川連 枳殼炒 桔梗 胆星 引用生薑燈

心水煎服 助清勢化痰有橘紅麥冬半夏赤茯苓竹茹薑苓生甘草川連枳桔胆南星 瀉心導赤湯方見木舌

涼驚丸 龍胆草 防風 青黛各三錢 鈎藤鈎二錢 黃連五錢 牛黃一錢 右研細末麵糊為丸如粟米大量兒大小與之金

器煎湯化下

急驚後調理法 急驚之後尚未清痰熱琥珀抱龍靈神虛氣弱痰熱清心滌痰大有功註急驚多用寒涼之藥亦急則治

標之法但得痰火稍遲即當調補氣血若過用寒涼必致轉成慢驚等證故驚邪一退餘熱尚在者當用琥珀抱龍丸主之若

脾虛多痰者宜清心滌痰湯主之

琥珀抱龍丸 人參 琥珀 茯神各五錢 山藥一兩 甘草四兩 檀香三錢 天竺黃 枳殼炒 枳實各五錢 辰砂三錢

三星錢 赤金箔二十片 右為細末煉蜜為丸每丸重五分大兒一丸小兒半丸淡薑湯化下

清心滌痰湯 竹茹 橘紅 半夏鹽 茯苓 枳實炒 甘草生 麥冬法 棗仁炒 人參 菖蒲 南星 川黃連

引用生薑水煎服 助清心滌痰湯效靈補正除邪兩收功參苓橘半連茹草枳實菖蒲棗冬

慢驚風 慢驚多緣稟賦弱或因藥峻損而成緩緩搖擗時作止面白青黃身則溫昏睡眼合睛或露脈遲神慘大便青氣虛

夾痰醒脾效脾虛肝旺緩肝靈註慢驚一證或緣稟賦虛弱土虛木賊者有之或由急驚過用峻利之藥以致變成此症者有

之發時緩緩搖擗時作止面色淡黃或青白相兼身必溫和昏睡眼合或睡卧露睛脈來遲緩神氣慘慘大便青色此乃脾

胃虛弱治宜培補元氣為主虛而夾痰者醒脾湯主之脾虛肝旺者緩肝理脾湯主之

醒脾湯 人參 白朮炒 茯苓 天麻 半夏鹽 橘紅 全蠍去毒 僵蠶炒 甘草炙 木香 倉朮 膽南星 引用

生薑水煎服 助氣虛夾痰醒脾治參朮天麻白茯苓橘半全蠍僵蠶草木香倉朮膽南星

緩肝理脾湯 廣桂枝 人參 白茯苓 白芍藥炒 白朮炒 陳皮 山藥炒 扁豆炒 甘草炙 引用煨薑大棗水煎服方助肝旺脾虛緩肝湯桂枝參朮白朮陳皮山藥扁豆草煎服之時入棗薑

夾熱夾痰慢驚 慢驚夾熱或夾痰身熱心煩口溢涎宜以清心滌痰治白九柴芍六君煎註慢驚之證本無熱可言但脾虛虛熱內生故痰涎上泛咽喉氣粗身熱心煩所謂虛夾痰熱是也痰熱相兼者清心滌痰湯主之脾虛肝旺痰盛者青州白九子柴胡六君湯主之 清心滌痰湯主之方見急驚後調理法

青州白九子 生川烏五錢去 生半夏七兩 南星三兩 白附子二兩 右為末盛生絹袋內用井花水攪出粉末盡再

攪以粉盡為度置磁盆內日晒夜露每早撒去舊水別用新水攪春五日夏三日秋七日冬十日去水晒乾研為細末用糯米粉煎粥清九菜豆大每服三五丸薄荷湯送下

柴芍六君子湯 人參 白朮炒 茯苓 陳皮 半夏炒 甘草炙 胡柴 白芍炒 鈎藤鈎 引用薑水煎服 効是

脾虛木旺風痰盛四君人參末草苓痰盛陳半因加入肝風更用柴芍藤

慢脾風 肝盛脾衰金匱鉤金失承制不生風每因吐瀉傷皮胃閉目搖頭面唇青額汗昏睡身肢冷舌短聲啞嘔瀉清溫中補脾為主劑固真理中隨證從註慢驚風一證多緣吐瀉既久脾氣大傷以致土虛不能生金金弱不能制木肝木強盛惟脾是尅故曰脾風閉目搖頭面唇青額汗昏睡四肢厥冷舌短聲啞嘔瀉清水此乃純陰無陽之證遂風則無風可遂治驚則無驚可治惟宜大補脾土生胃回陽為主吐瀉亡陽者溫中補脾湯主之大病後成者固真湯主之四肢厥冷者理中湯加附

附子主之

溫中補脾湯 人參 黃耆蜜炙 白朮炒 乾薑 附子製 半夏蜜炙 陳皮 茯苓 砂仁 肉桂去粗 白芍炒 甘草

炙 丁香 引用薑水煎服 効慢脾溫中補脾湯參耆白朮乾薑陳半附苓縮砂仁白芍甘草共丁香

固真丸 人參 白朮炒 肉桂去粗 白茯苓 山藥炒 黃耆蜜炙 甘草蜜炙 附子去粗 湯泡浸 引用薑水煎服

鞏固真湯治慢脾風人參白朮桂苓山藥黃耆煨甘草附子浸泡最宜精 理中湯方見

痢證門 小兒痢證類症發時昏倒搐涎聲食頃即甦如無病陰陽驚熱痰食風註 痢證類乎驚風痙風者謂時昏倒抽

搐痰涎壅氣促作聲驚驚二證相似也但四體柔軟一食之頃即醒似然如無病之人非若痙風一身強硬終日不醒也

陰者陰癰也見藏證陰陽者陽癰也見府陽證驚癰因驚熱痰癰因痰食癰因食風癰因風其證不一治亦不同臨證宜詳辨之

陰癰 陰癰屬藏肢厥冷偃卧拘急面白青吐沫聲微脉沉細醒脾固真定癰靈註陰癰屬陰藏寒之病也多因慢驚之後痰入心包而得發時手足厥冷偃卧拘急面色青白口吐涎沫聲音微小脉來沉細輕者醒脾湯甚者固真湯病退調理用定癰丹主之 醒脾湯方見慢驚門 固真湯方見慢驚風

定癰丹 人參錢三 當歸錢三 白芍錢三 茯神 棗仁錢五 遠志錢三 琥珀錢三 天竺黃錢四 白朮錢五 橘紅 半

夏製錢三 天麻錢三 鈎藤鈎四 甘草錢二 右共為細末煉蜜丸如榛子大每服一丸淡薑湯化下

陽癰 陽癰屬府身熱汗仰卧面赤脉數洪聲急啼叫吐涎沫龍胆瀉清與抱龍註陽癰屬陽府熱之病也多因急驚去風下

痰不淨久而致成此證發時身熱自汗仰卧面赤脉象洪數牙關緊急或啼叫不已口吐涎沫如風兼熱者用龍胆湯經熱者

者用瀉青丸痰涎壅者用四製抱龍丸主之 龍胆湯方見 瀉青丸方見急驚風

四製抱龍丸 天竺黃錢五 辰砂錢一 胆星錢一 雄黃錢一 麝香一分 右為極細末另用麻黃欸炙甘草各五錢煎湯去

滓漫火熬成膏合藥末為丸如芡實大每服一丸薄荷湯送下

驚癰 驚癰觸異驚神氣吐舌急叫面色紅發作如人將捕狀安神大清鎮驚靈註小兒心肝熱感偶被驚邪所觸因而神氣

潰散遂成癰證發時吐舌急叫面色紅乍白悚惕不安如人將捕之狀先服大青膏次服鎮驚丸則癰自定矣

大青膏 天麻錢三 白附子錢二 青黛錢一 蠟尾錢一 硃砂錢一 天竺黃錢二 麝香分三 烏梢蛇肉錢一 浸酒 右同研

細末蜜為丸每服大兒五分小兒三分薄荷湯送下

鎮驚丸 茯神 麥冬錢五 辰砂 遠志錢三 石菖蒲 棗仁錢三 牛黃錢一 川黃連錢三 鈎藤鈎五 珍珠錢二

胆星 天竺黃錢五 犀角錢三 甘草錢二 右共研細末煉蜜為丸每九重五分量兒與之用薑湯送下

痰癰 痰癰平素自多痰發時痰壅在喉間氣促昏倒口吐痰沫宜先服一捻金以急下其痰次服硃衣滾痰丸則氣順痰清而癰自止矣

一稔金方見不乳

硃衣滾痰丸 礞石一兩 沉香錢五 黃芩錢 大黃兩 右為細末水泛為丸硃砂為衣多寡量兒大小白滾水化服

食癰 食癰食過積中腕一時痰熱使之然面黃腹滿吐利臭妙聖滾痰和胃安註食癰者其病在脾因小兒乳食過度俸結中腕乘一時痰熱壅塞遂致成癰其初面黃腹滿吐退酸臭後發時時發搐宜用妙聖丹主之痰感者硃衣滾痰丸主之後用清熱和胃丸調理則積滯清而驚癇定矣

妙聖丹 雄黃 蠟稍 硃砂 代赭石各錢一 巴豆三 杏仁一錢 右共為細末蒸棗肉丸如桐子大每服三五

丸木香煎湯化服 硃衣滾痰丸方見痰癰 麥冬五錢 連翹四錢 山查兩 神麴炒 麥芽炒 陳皮四錢

清熱和胃丸 川連五錢 梔子五錢 竹茹四錢 麥冬五錢 連翹四錢 山查兩 神麴炒 麥芽炒 陳皮四錢

枳實五錢 大黃五錢 甘草三錢 右共為細末煉蜜為丸每丸重一錢量兒與之用白滾水化下

風癰 風癰汗出風襲經二目青黯面淡紅十指屈伸如數物化風羌活牛黃靈註風癰因汗出脫衣膝理開張風邪乘間而入發時目青面紅手如數物治法宜先疎風解表輕則化風主之重則羌活桂枝湯主之風兼痰者牛黃丸治之

化風丹 胆星錢 羌活 獨活 天麻 防風 甘草錢 荆芥穗 人參 川芎各一錢 右共為細末煉蜜丸每服三五

服一丸薄荷湯化開服

羌活桂枝湯 羌活 防風 麻黃 桂枝 天麻 大黃 甘草生 引用生薑水煎服 羌活桂枝治風癰疎風瀉熱

妙難言羌防麻桂天麻草大黃煎服自然安

牛黃丸 胆星 全蠍去 蟬退各錢半 防風 牛黃 白附子生 僵蠶炒 天麻各五錢 麝香五 右為細末煮薑

去核皮取肉和丸如菉豆大每服三五丸生薑湯化服

卷五十二

編輯幼科雜症心法要訣

疳證門

疳證總括 大人為勞小兒疳乳食傷脾是病原甘肥失節生積熱氣血津液被熬初患尿泔午潮熱日久青筋肚大堅面
色青黃肌肉瘦皮毛憔悴眼睛眊眊大人者十五歲以上也病則為勞若十五歲以下者皆名為疳緣所稟之氣血虛弱藏府
嬌嫩易於受傷或因乳食過飽或因肥甘無節停滯中脘傳積滯腸胃漸傷則生熱熱盛成疳則消耗氣血煎灼津液凡疳
病初起尿如米泔午後潮熱日久失致令青筋暴露肚大堅硬面色青黃肌肉消瘦皮毛憔悴眼睛發涎而疳證成矣然當分
所屬而治之庶不致有悞也

脾疳 脾疳面黃肌消瘦身熱困倦喜睡眠心下痞硬滿腹脹卧冷食泥腹堅痛頭大頸細食懶進吐瀉煩渴便腥黏攻積消
疳肥兒治補脾參苓白朮先註脾屬土色黃主肌肉故脾疳則見面黃肌肉消瘦身體發熱困倦喜睡下心痞硬乳食懶進睡
卧喜冷好食泥土肚腹堅硬疼痛頭大頸細有時吐瀉口乾煩渴大便腥黏之證也宜先攻其積用消肝理脾湯肥兒丸主之
積食然後調理其脾以參苓白朮散主之

消肝理脾湯 蕪荑 三稜 莪朮 青皮炒 陳皮 蘆薈 檳榔 史君子肉 甘草生 川黃連 胡黃連 麥芽炒

神麴炒 引用燈心水煎服 方消疳理脾用無莪三稜莪朮青陳皮蘆薈檳榔史君子肉川連胡連麥芽麴

肥兒丸 人參二錢 白朮五錢 荅荻錢 黃連二錢 胡黃連五錢 史君子肉四錢 神麴炒 麥芽炒 山查肉 銘三 甘

草錢半 蘆薈仁 右為末黃米糊丸如黍米大每服二三十九丸米湯送下

參苓白朮散 人參錢 茯苓 白朮炒 扁豆炒 蒼朮炒 山藥各五錢 陳皮錢 縮砂 桔梗錢二 甘草一錢 建

蓮子五錢 右共為細末每服一錢老米湯調服

疳瀉 疳疾傷脾因作瀉先清後補為妙訣初宜清熱和中湯久瀉參苓白朮提註用瀉之證多緣積熱傷脾以致水穀不分
頻頻作瀉法當清熱滲濕以清熱和中主之若瀉久不愈當漸為調理參苓白朮散主之

清熱和中湯 白朮炒 陳皮 厚朴鹽 赤苓 黃連 神麴炒 穀芽炒 史君子 生甘草 澤瀉 引用燈心水煎

服 疳疳久泄瀉名疳瀉清熱和中功甚捷白朮陳厚赤苓連神穀史君子草澤瀉

參苓白朮散 方見脾疳

疳腫脹 疳疾腫脹面浮光傳化失宜脾肺傷氣逆喘咳胸膈滿飽施勻氣服最良疳病腫脹之證多因傳化失宜以致脾肺兩傷現證氣逆喘咳胸膈痞悶肚腹腫脹面色浮光宜用御苑勻氣散治之其腫脹自消矣

御苑勻氣散 桑皮煨 桔梗 赤苓 甘草生 藿香 陳皮 木通 引用薑皮燈心水煎服 疳疔久脾虛腫脹生御苑勻氣有奇功桑皮桔梗赤苓散藿香陳皮合木通

疳疔 疳疔日久頻作痢多緣腸胃熱凝滯或赤或白腹寬急香連導滯為妙劑註疳疔之由皆因熱結腸胃所致故痢時或赤或白腹中寬痛急用香連導滯湯治之其痢自愈

香連導滯湯 青皮炒 陳皮 厚朴製 川黃連炒 生甘草 山查 神麴炒 木香煨 枳榔 大黃 引用燈心水

煎服 疳疔久下痢名疳疔香連導滯功最多青陳厚朴川連草查麴木香枳榔大黃

肝疳 肝疳面目爪甲青眼生多淚澀難睜搖頭揉目合面卧耳流膿水濕瘡生腹大青筋身羸弱燥渴煩急黃帶青黃熱紫

胡同蘆薈調養逍遙抑肝靈註肝屬木青主筋故肝疳則見面目爪甲皆青生眼眵淚澀難睜搖頭宜先揉目合面睡卧耳瘡流膿腹大青筋身體羸弱燥渴煩急黃帶如苔之證也治清其熱用柴胡清肝散蘆薈肥兒丸主之若病勢稍退當以逍

遙散抑肝扶脾湯調理

柴胡清肝散 銀柴胡 梔子炒 連翹法 生地黃 胡黃連 赤芍 龍胆草 青皮炒 甘草生 引用燈心竹葉水

煎服 疳柴胡清肝治肝疳銀柴胡梔子翹胡蓮生地赤芍龍胆草青皮甘草一同煎

蘆薈肥兒丸 五穀蟲炒二兩 蘆薈生 胡黃連炒 川黃連各一兩 銀柴胡一兩二 扁豆炒 山藥各二 南山查二

半 蝦蟆個 肉豆蔻錢 枳榔錢 使君子二錢 神麴炒二兩 麥芽一兩六 鶴虱炒錢 蘇美炒一兩 硃砂二

飛 麝香錢 共研細末醋糊為丸如黍米大每服一錢米飲下

加味道遙散 茯苓 白朮炒 當歸 白芍炒 柴胡 薄荷 炙甘草 丹皮 梔子炒 引用薑棗水煎服 疳加味

逍遙散如神茯苓白朮當歸身白芍柴胡薄荷草再加丹皮梔子仁

抑肝扶脾湯 人參 白朮炒 黃連炒 柴胡 薄荷 陳皮 白芥子 龍胆草 山查 神麴 炙甘草 引用薑棗

和黃連導滯湯 金監 卷五十二 疳證門

以滾水煎服 歌調理抑肝扶脾湯參朮黃連柴苓良青陳白芥龍胆草山查神麴甘草膏

心疳 心疳面赤脈絡赤壯熱有汗時煩驚咬牙弄舌口渴渴燥口舌生瘡小便紅胸膈滿悶喜伏卧想食乾瘦吐痢煩渴心導

赤珍珠治後神調理可收功 註心屬火色赤主血脈故心疳則見面紅目胞赤壯熱有汗時時煩渴咬牙弄舌口渴煩渴飲

生瘡小便紅赤胸膈飽悶睡喜伏卧想食乾瘦或吐或利也熱盛者瀉心導赤湯主之熱感兼驚者珍珠散主之病久心

虛者後神湯調理之 瀉心導赤湯方見木舌

珍珠散 珍珠錢 麥冬五錢 天竺黃錢 金箔五片 牛黃錢 胡黃連錢 生甘草二錢 羚羊角 大黃 當歸錢

硃砂錢 雄黃錢 後神錢 犀角錢 右為細末每服五錢茵陳湯調服

後神湯 後神 當歸 炙甘草 人參 引用龍眼肉水煎服 煩熱者加麥冬 歌後神湯內用後神當歸甘草共人參

若是煩渴麥冬入清補兼施功最純

疳渴 肥甘積熱傷津液大渴引飲心煩熱速用清熱甘露宜熱減津生渴自飲 註疳渴者多因肥甘積熱煎耗脾胃以致津

液虧損故不時大渴引飲心神煩熱速用清熱甘露飲其渴自愈

清熱甘露飲 生地黃 麥冬錢 石斛 知母生 枇杷葉錢 石膏服 甘草生 茵陳蒿 黃芩 引用燈心水煎服

歌耗液傷津成疳渴清熱甘露飲如神生地麥冬久解知母枇杷石膏茵陳

肺疳 面白氣喘時咳嗽毛髮枯焦皮粟乾發熱憎寒流涕鼻煩生瘡號肺疳疎散生地清肺效清熱甘露飲為先肺虛補

肺散最妙隨證加減草連延 註肺屬金色白主皮毛故肺疳則見面白氣逆咳嗽毛髮枯焦皮上生粟肌膚乾燥憎寒發熱常

流涕涕鼻煩生瘡也先用生地清肺飲以疎解之繼用甘露飲清之日久肺虛者當以補肺散主之

生地清肺散 桑皮炒 生地黃 天冬 前胡 桔梗 蘇葉 防風 黃芩 生甘草 當歸 連翹錢 赤茯苓 引

用生薑紅棗水煎服 歌生地清肺用桑皮生地天冬前胡桔梗蘇葉防風黃芩當歸連翹赤茯苓

甘露飲 生地黃 熟地黃 天冬 麥冬錢 枳殼燉 桔梗 黃芩 枇杷葉錢 茵陳蒿 石斛 引用紅棗水煎服

歌甘露飲治肺火壅生熟地黃二門冬枳殼黃芩枇杷葉茵陳石斛共煎成

補肺散 白茯苓 阿膠炒粉 糯米 馬兜鈴 炙甘草 杏仁炒去 水煎服 肺虛補肺散通神苓茯苓阿膠糯米

馬兜鈴配炙甘草杏仁微炒去皮尖

腎疳 解麝龍膠齒行遍骨瘦如柴面黑齒齦出血口臭氣足冷腹痛瀉哭啼腎疳先用金蟾治九味地黃繼進宜若重賦氣虛弱調元散進宜遲宜註腎屬水色黑主骨患此疳者初必有解麝龍膠齒齒通行遍腎氣不足等證更因肥甘失節久則漸成腎疳故見面色黎黑齒齦出血口中氣臭足冷如冰腹痛泄瀉啼哭不已之證先用金蟾丸治其疳繼以九味地黃丸補之若稟賦不足者調元散主之

金蟾丸 乾蝦蟆五個 胡黃連各三錢 鶴龜各二錢 肉豆蔻煨 苦楝根白皮 雷丸 蘆薈生 無名各三錢 右為末麝

麵糊為丸菜豆大雄黃為衣每服十五丸米湯送下

九味地黃 熟地 茱萸肉各五錢 赤茯苓 澤瀉 牡丹皮 山藥炒 當歸 川楝子 史君子各三錢 右為細末煉白

蜜為丸如茱萸大用白滾水研化食前服

調元散 人參 茯苓 白朮 山藥炒 川芎 當歸 熟地黃 茯神 黃耆炙 甘草炙 白芍 引用薑棗水煎服

方調元散治稟賦弱參苓白朮乾山藥歸熟地共扶神黃耆甘草同白芍

疳熱 小兒疳疾身發熱輕重虛實當分別初用青蒿飲為宜日久驚甲散最捷註疳疾之證身發熱治者宜分別輕重虛

實治之初起時疾多實者驚甲青蒿飲主之日久多虛者驚甲散主之

驚甲青蒿散 銀柴胡 驚甲炙 青蒿 生甘草 生地黃 赤芍 胡黃連 知母炒 地骨皮 引用燈心水煎服

疳疾血虛身發熱驚甲青蒿藥有功銀柴胡驚甲地芍胡連知母地骨皮

驚甲散 人參 黃耆炙 驚甲炙 生地 熟地 當歸 白芍炒 地骨皮 水煎服 疳疳疾日久骨熱驚甲散治

效從容參者驚甲生熟地當歸白芍地骨皮

腦疳 腦疳多緣受風熱又兼乳哺失調節頭皮光急生餅瘡頭熱髮焦如穗結鼻乾心煩腮顫腫困倦暗身汗熱龍胆龍

腦丸甚良吹鼻龍腦效甚捷 腦疳者因兒素受風熱又兼乳失調以致變成此證頭皮光急腦生瘡餅頭熱毛髮枯如

穗鼻痔心煩腮頰腫硬困倦暗暗自汗身熱也腦熱生瘡者龍胆丸主之煩熱羸弱者龍腦丸主之外用吹鼻龍腦散吹之其證自愈

龍胆丸 龍胆草 升麻 苦楝根皮 培 赤茯苓 防風 蘆薈 油髮灰各二 青黛 黃連各三 右為細末豬胆汁

浸糕糊丸如麻子大薄荷湯下量兒大小與之

龍腦丸 龍腦 麝香各五 雄黃錢 胡黃連錢 牛黃錢 硃砂五錢 蘆薈三錢 乾蝦蟆四錢 右為細末熊胆合

丸如麻子大每服三九薄荷湯下

吹鼻龍腦散 龍腦 麝香研細格 蝸牛殼炒 蝦蟆灰 瓜蒂 黃連 桔梗 細辛各等 右為細末入磁口內貼之

每取少許吹入鼻內日吹二次

眼疳 疳熱上攻眼疳成癢澀赤爛胞腫疼白睛生翳漸遮滿流淚羞明目不睜疎解瀉肝散最妙雲翳清熱退翳靈日久不

瘥當補養道遠瀉肝二方從註 眼疳者疳熱上攻於眼故發時癢澀赤爛眼胞腫疼白睛生翳漸漸遮滿不時流淚羞明閉目

也先用瀉肝散疎解之再用清熱退翳湯消其翳若日久不瘥法當調補道遠散或羊肝散主之

瀉肝散 生地黃 當歸 赤芍 川芎 連翹心法 梔子生 龍胆草 大黃 羌活 甘草生 防風 引用燈心水煎

服 防瀉肝散治肝熱壅當歸赤芍連翹心法 生地 梔子 龍胆草 大黃 羌活 甘草生 防風

清熱退翳湯 梔子炒 胡黃連 木賊草 生地 羚羊角 龍胆草 銀柴胡 蟬蛻 赤芍 甘草生 菊花 茯苓

引用燈心水煎服 防清熱退翳消雲翳梔子連木賊生 地 羚羊角 龍胆草 銀柴胡 蟬蛻 甘草 菊花 茯苓

羊肝散 青羊肝一具去筋膜切韭葉厚片 人參 羌活 白朮炒 蛤粉各等 右為細末合勻聽用將鹽薑荷葉上如錢厚一層鋪

肝一層包固外以新足青布包裏蒸熟任兒食之如不食者及夏月恐腐壞則曬乾為末早晚白湯調下服完再合以好為

度若熟者減人參

鼻疳 疳熱攻肺成鼻疳鼻塞赤癢痛難堪浸淫爛連唇際咳嗽氣促髮毛乾熱盛清金化毒效瘡蝕鼻化鼻丸調敷須

用鼻疳散吹鼻蟬殼致通神 鼻疳者因肝熱攻肺而成蓋鼻為肺竅故發時鼻塞赤癢疼痛浸淫潰爛下連腎隱成瘡