

校正外科正宗

卷二

發背

鬚疽

肺癰

疔瘡

咽喉

脫疽

時毒

瘰癧

癰瘤

外科正宗卷四

明崇川陳實功著

吳江徐大椿靈胎評

海軍

許楣辛本訂
蔣光燾寅助校

發背論第二十三

發背有五。一曰陽毒。先因風熱。或患熱毒消渴。或先患傷寒。餘毒蓄積於背脊膂之間。不拘椎數。但從兩夾脊起。滿背掀熱赤紫。或紅色如錢。膿毒難成。成後痛不除。數日之間。忽然平塌。昧者誤謂腫消。殊不知此是內攻內陷。不可復藥矣。此二句徐因杜曰。此乃始時高腫。以後忽平。二曰陰毒。乃氣冷而作。初如黍米。隱隱而痛。直應前心。頭目昏重。寒熱如瘧。五七日後。始覺攻腫。膿毒深沈。遲緩未透。急宜以補氣湯藥內托。此句徐因杜曰。外以抽膿藥貼之。三曰服金石燒煉藥毒。初起如丹痧之狀。熱熱漸開。如湯火所傷。面色如珠。心膈煩燥。多渴嗜冷。此句徐因杜曰。其瘡難起。起則驚人。尤甚於陰陽二毒。但根柢分明。須以解金石毒湯散。急治其內。方保無虞。四曰酒食毒。乃平時或飢或困。飽食即睡。或多食酒食。冷熱黏滑。肥鮮油膩之類。積於臟腑。兼之不慎。悻悻恣意。當風脾臟氣虛。不能承受。乃毒發於背。徐曰。此所謂膏粱之變。足生大疔者也。不問椎數。初起頭如小彈子。後如太拳。其堅如石。痛連四肢。加之拘急。口苦舌乾。腹急便澀。十數日後。頭面手足浮腫。臟腑滑泄。急痛如刺。是其候也。初痛時。急用收腫發穴潰膿湯藥。內膏臟腑。外泄膿水。治之遲緩。潰腐愈甚。傷骨爛筋。復感外邪。而致內敗。危矣。五曰冒山嵐瘴氣。毒其入素歷瘴鄉。觸冒嵐瘴。蓄諸臟腑。久而不發。至氣血衰弱。及斷長虧損之時。而後發露。初起腫色青黑。形如靴皮。附筋徹骨。頑如木石。引手加深。方覺痛處。至五七日。毒氣浮淺。腫高色變青白。有如拳打之狀。寒戰似瘧。頭痛口歪。有若有風。手足厥逆。眼黑睛少。白多。此因內有邪氣相搏。急宜破清血三五升。方有黃白膿出。然其皮猶腫痛不止。直至青白之色退盡方愈。此宜急急追趕膿毒出。外方為無害。否則亦有不瀕於危者也。楣按發背乃大症。而原本無總論。但有治驗各條。列於卷二。腸瘍治法之後。而統名之癰疽治驗。殊為闕畧。失次。今取徐批瘍科選粹中發背論。補於治驗之前。并載徐批。而移在腦疽之後。庶幾以類相從。其方藥原本不別出。散見於腫潰瘍諸方。及癰疽門。並非專治背疽之方。故仍其舊。

發背治驗

一男子年五十餘。背心生疽十三日。矣湯水不入。煩悶不語。背堅硬如負石。皮色赤紫。瘡勢雖重。喜其根腳交會分明。毒尚結局於此。未經入內。須行拔法。使毒氣外發。不致內攻。隨煮藥筒提拔二次。去惡血。脫許。餘曰。最又脈實便秘。用內疎黃連湯。及猪膽導法。何曰。大便通利二次。使內外毒氣皆得通泄。夜卧即安。背重失其大半。次用托裏排膿之藥。外以桑木灸法。腰硬漸腐。膿毒漸出。換服十全大補湯。加參冬五味數服。腐肉自脫。飲食漸進。瘡口漸合。調理兩月餘而愈。

一老婦年近七十。背瘡已過半月。形勢可畏。其家已置不治。整箇後事。適余往看童稚。瘡症見而問之。咸言待斃。且知余強請觀。半背皆腫。瘡勢不高。亦不內陷。以手按之。外實而內腐。老年內虛。膿毒中隔。不得外發故也。雖飲食不進。且喜根脚兩無混雜。臟腑各無敗也。治之可生。其家堅執不信。且言籤龜命卜。俱斷必死。余嘆曰。再三四日不治。內膜穿潰。此命死於無辜矣。次日余自往謂曰。余非相強。實見其可生。不忍聽其死耳。藥金分毫。不取。愈後任從酬謝。何如其家首肯。乃先用艾湯淋洗外面。俱是不腐頑肉。隨用拔針利剪。取去正中二寸頑肉。放通膿管。以手輕重之間。捺淨肉蓄膿血。約有三碗。旁觀無不失色。膿血稍盡。仍換煎湯洗淨。用膏封貼。內用回元大成二服。此口膿已出。可用。以接補真氣。後用人參。養榮湯倍參。亦加香附。早以八味丸。八味丸。徐朝久。八仙糕相兼調理。使其脾健進食。腐脫肌生。此婦亦謹慎調理。並未更變。不出百日。瘡愈身健。始信余言不謬也。

一監生年過五十。素有渴症。體又極肥。生背疽約有尺許。至十二朝後。請余治。視其形勢。微腫色淡。微紅。根脚坐收半散。此陰陽相爭之症也。肥人內虛。瘡勢又大。非補托瘡必難起。毒必易陷。誠恐緩不及事。便以托裏散固其內。候至十五日。外用披針。小小從頂放通三孔。緣勢大不可過放。走泄元氣。致膿難成。但今有路可通而已。內用參耆內托散。倍加人參黃芪各三錢。服至二十日。大膿將發。日至升許。早以參朮膏。午用十全湯。加參耆各四錢。麥冬五味子各一錢。條曰。用五味子不通。所以毒氣收住而難愈也。服至月餘。肉腐通清。膿似湧泉。開用聖愈湯。兼之八仙糕調理。保助脾胃。增進飲食。尚恐前藥不能勝病。加熟附一錢。脾健腰稠。色黃而正。四十日。外瘡勢方得微退。時值中夏。酷熱病者生煩。誤食冷水二椀。瘡遂下陷。不痛無膿。身涼脈細。腹痛足冷。變為陰症。非辛熱不能。獨陽

急用十二味異功散。倍人參熟附各三錢。不應。條曰用人參則換用生附人參各五錢。人參五錢。早晚二服。方得身溫。脈起。瘡高復痛。又二服。膿注前流。條曰此藥力出至一月。約有百餘粒。竟不減少。外皮紅退。亦不爛。此乃補毒之故。大凡非反對之藥。原不此肥人外實內虛。故皮不腐而肉潰矣。又用玉紅膏。搽於棉花片上。推入瘡內。膏蓋之內。腐漸脫。漸出。又十日後。出大腐一塊。約有六兩。自後腫消。身便。膿少。肌生。百日外。方得平復。人參服過五斤。外參五斤。徐曰。原不可不用。辛熱峻補。豈有生理。附子亦用十餘兩。此句方得安全。此症設用解毒傷脾。宣利等藥。用何苦說得。

一鄉宦年踰七旬。背瘡已經八日。形雖微腫。色淡不紅。執若龜形。根漫不聳。乃年老氣血衰弱之故。診其脈。帶微數。而有力。本根猶未檢。雖老可治。隨用排膿內託散。加皂刺以潰腐。托裏服至十二日。後瘡漸高。腫色亦漸赤。但不能潰膿。此食少脾弱。未能培養之故也。又用十全大補湯數服。條曰總不膿始漸出。不能快利。乃內膜中隔不通故也。不可畏其老。而致誤其事。隨用披針。條曰當頭取開寸許。捺通膿管。膿果隨出。以指蹄湯洗淨。膏蓋。用照藥每日一次。外肉亦腐。為膿病者。形色枯槁。更用人參養榮湯。倍加參者。條曰托裏腐肉將脫者。取之新肉欲生者。培之。但老年氣血衰弱。不能速效。又加服參朮膏。早晚二次。新肉方生。飲食頓倍。調理七十餘日而安。

一羣生年六十餘。患背疽。已外十日。其形堅硬。色亦深紫。頭發甚多。含若螺子。堅長尺餘。根橫半背。喜其高腫。光亮發熱。掀痛。脈洪數有力。此膏梁醇酒濕熱交蒸之故。雖重不妨。遂用照藥三條相繼照畢。其內含螺子。盡欲吐出。即用抵脚刮去。流出惡血。鍾許。條曰總不惹湯洗淨。捺上腐藥。用紙蓋貼周圍根脚。以吸毒散敷之。收其毒氣。使不開大。次日仍照仍敷。三日後。外肉漸腐。內服托藥。培助脾胃。解毒為膿。早服八味丸。條曰以滋腎水。餘曰換洗猪蹄湯。仍將膏貼。候至腐盡。其深寸餘。隨用玉紅膏。日漸生長。但此公好飲。雖病不戒。兩月後。新肉雖平。復移珍珠散數次。方結皮。蓋僅十八日而安。

一老年人患疽半月。其瘡骨脊。偏背脊腫。上至肩膊。下至腰脅。腫若瓜形。頭計數百。其家以為不治。余診其脈。微洪而不鼓。瘡形腫掀。外發飲食知味。年雖老而根本尚有餘也。先用托裏消毒散二服。其勢稍定。外用桑木炭

法助其腐潰根以鐵桶膏搗之更服排膿內托散正膿漸出但老年氣血不充外肉不易就腐視其肉色變而不腐者用針鈎利剪徐徐剪去約四十餘長見紅肉使用膏塗新肉已生將半值時隆冬其家自行開看房中不着炭火兼蓋護未煖致被寒侵瘡色淡白膿亦清稀飲食減少氣體不舒幸其瘡本屬陽症遂用濃葱湯乘煖淋洗將紅膏烘化搽上外用膏貼以熟綿軟絹覆蓋數層細蓋其密內用神功托裏散早晚連進二服次早復看其瘡自回陽矣徐曰不發用參不故易愈以後遵法調理百日而安

一老人年過六旬患背疽十二日矣其形半紅半腫微疼微熱發於背心之下背俞之上高低平等廣潤八寸根脚泛腫色若水噴徐曰色若水噴最爲壞症頂軟無神似腐非腐脈浮而大重按則虛余曰此瘡易於膿潰而難於收斂不可治也其家笑而不信復請單中老醫視之見病者起居平和言語清利舉動如常飲食有味以爲五善俱具安若泰山其家亦喜遂用其藥日漸有功膿潰腫退徐曰此腐盡肌生余謂其親族曰此病必死於收口至錢大時也衆皆不信果至口如錢大時變症一出不出四朝而死始以余言爲神

一男子六旬有二發右搭手余用艾炙形勢漸高腫堅硬不痛半月後尚未潰膿日生煩悶恐其毒陷先用針通隨行拔法拔出惡血鍾許此六字稍得輕便口搭化腐之藥膏蓋三日之後瘡漸腐潰至二十日出正膿壞肉漸脫新肉漸生外治之法盡矣其家與一內科醫甚密請其開方不遵外科補托之法徐曰補托二字補失於峻補此四字勒又曰峻補必兼托毒亦每日人參不過二錢余曰不及當用五錢兼熟附二錢不然必變其家與內科醫俱不悅用參二錢謂之大損此語終有獎補安得不死又外科乃破漏之病最能走泄真氣如損補兩不相敵無以抵當多不信後果然不數日肉色淡白瘡口散漫濃水清稀飲食減少敗症具矣雖強投溫中健脾大補之藥終至形體稍削膿水臭穢延至六十日滲盡氣血而亡悔已無及凡大瘡每日膿出一碗用參必至三錢以此爲則此

人日出膿三兩徐曰此說亦是其家不信補而自取敗亡惜哉然補法亦儘多其家不信補而自取敗亡惜哉徐曰參固可用若貧人日

一男子年近六旬其孫患瘡邀余往視彼坐於堂時值仲夏余見其背生熱癰凡二十餘內有一瘡甚小余謂曰此非癰比其毒甚大一發即不可治彼笑而答曰固無恙也及送至門余又謂曰可急請他醫視之彼仍不信至十日形勢稍發命里中一醫視之曰癰也又十日形勢內陷敗症俱出始信前言矣親友邀余往視彼臥於

堂帛覆瘡上余登堂未數步即退親友問故余曰敗氣滿前死期速矣何必再視急備後事更七日死果如期不爽

疔瘡論二十四

夫疔瘡者乃外科迅速之病也有朝發夕死隨發隨死有三日五日而不死一月半月而終死此在於毒中之淺深各隨臟腑而見症有曰火發疔其患多生唇口手掌握指即間初生一點紅黃小泡抓動痛癢非常左右肢體麻木重則寒熱交作頭暈眼花心煩發躁言語昏瞶此出於心經之病也有曰紫莖釘其患多生手足腰背筋骨之間初生便作紫泡次日破流血水三日後串筋爛骨疼痛苦楚重則眼紅目眩指甲純青舌強神昏睡語驚惕此出於肝經之病也有曰黃鼓疔初生黃泡光亮明潤四邊紅色纏繞多生口角腮頰眼胞上下及太陽正面之處發之便作麻癢網急硬強重則惡心嘔吐肢體木痛寒熱交作煩渴乾噦此出於脾經之病也有曰白及疔初生白泡頂硬根突破流血水驟然痛癢易腐易陷重則腮損咽焦毛聾肌熱咳吐膿痰鼻掀氣息此出於肺經之病也有曰黑腐疔其患多生耳竅胸腹腰腎偏僻軟肉之內初生黑斑紫泡驚悸沈困軟陷孔深目睛透露此出於腎經之病也以上五疔內應五臟又紅絲疔起於手掌節間初起形似小瘡漸發紅絲上手膊令人多作寒熱甚者惡心嘔吐遲治則絲至心常能壞人用針於紅絲盡處挑斷出水此十一尋至初起瘡上挑破俱用蟾酥條插入膏蓋點按毒約為妙內服汗藥散之自愈凡治此症貴在早此句初起即治者十全十活稍遲者十全五六失治者十全一二初起項以上者三陽受毒必用拔針刺入瘡四五分此句初起即治者不必挑斷疔根令出惡血隨用回針散或蟾酥似插入孔內以膏蓋之如項以下者三陰受毒即當灸灸此句灸之不痛者亦須針刺插藥方效隨後俱用蟾酥丸冬月萬靈丹發其大汗二字徐勣批曰發毒方得解不致積留毒氣致生變症令人治法不論陰陽表裏部位上下凡見是瘡便加艾灸殊不知頭乃諸陽之首元陽熱極所致其形雖小其惡甚大再加艾灸火益其勢逼毒內攻反為倒陷走黃之症作矣既作之後頭面耳項俱能發腫形如尸胖七惡頓起治雖有法百中難保一二又有疔名數種形狀紛紛有舊說未及重錄徐曰此篇皆是古人舊說不可不知但疔不可灸以其全屬火也

楊按徐言疔不可灸。全生集言疔藥不可用酒。皆古人未發之論。凡藥不忌酒煎。而疔獨忌之者。疔善走黃也。

疔瘡看法

初起初疥形如粉刺。或小泡。或疔瘡。結腫不散者順。瘡腫不作寒熱。亦不惡心。飲食有味。手足溫煖者順。瘡腫肉不腫。四圍白色。多痛少癢。作膿者順。已潰出膿。瘡仍高腫。肉色鮮明。根內紅活。新牛者順。初起似疔非疔。軟慢灰色。四邊瘡根平塌。漫腫者凶。未發前。先作寒熱。如瘡惡心不食。後出瘡如蚊迹。或青紫黑泡。軟陷無根。腐爛深孔。氣粗足冷者逆。瘡形如魚臍。頂凹灰白。軟慢相兼。脈細身冷者多逆。內腫瘡不腫。根脚走散。瘡頂空腐。血水氣穢者死。凡疔項以上針刺不疼。項以下灸之。不痛俱死。已經走散。頭面耳項俱腫。煩躁脈細。痰動喘急者死。日久原瘡無迹。走散之處。仍復作膿。脈數唇焦。終死。病雖危險。惡歲運順者可活。瘡雖微險。歲運逆者當危。徐曰。大段與諸症相同。

楊按徐批。有附錄繡波公一條云。疔瘡全看部位。如部位不佳者。甚為難治。余觀其毒將走之症。用針破其四圍。搯入拔毒之藥。其浮腫處。用針鏤之。出其惡血。此法甚妙。又按他書載疔形活如韭菜。長可寸餘。肉色紫黑者。忌行針刺。

疔瘡治法

初生在項以上者。必先針刺。徐曰。亦以去惡血。庶毒不內攻。在項以下者。必先灸。此四字以殺其勢。庶不侵良肉。發熱作寒。身體拘急。六脈緊數。邪在表也。宜汗散之。身體發熱。口燥咽乾。脈實有力。二便秘澀者。宜下之。針刺之後。瘡不作腐。邊腫不消。仍如插藥。徐二字內用補托。初起誤灸。致毒走黃。不住者。急當隨走處。灸去惡血。徐四發熱乾嘔。心煩作渴。悶亂神昏。當解毒清心。托裏護膜。徐二句潰後氣血受傷。神怯食少。睡臥不寧。宜助脾胃。斂神氣。將愈後。氣血漸復。飲食當進。仍作渴者。急滋養腎水。徐曰。宜更清心胃之火。

疔瘡法驗

一監生右額下生疔。三日形如魚目。麻癢不常。此肺經受毒也。用針刺入四五分。此句徐勸其硬如骨有聲。隨用蟬酥條插至三日。猶不腐化。徐曰。內已變。此聖頑結聚之病也。非此藥所能勝。徐曰。為換用三品一條槍。插至頑邪得化。

七日。以上九字徐又批曰外用紙封蓋至十一日脫出行根一塊約有指許。徐曰皆好肉以養肉玉紅膏搽之。
先服托裏消毒散加金銀花二錢白芷五分脫後用八珍湯加天花粉麥門冬黃耆陳皮各一錢調理月餘肉已平用珍珠散粉上結皮而愈。徐曰此等治法真所謂將好肉做瘡弄成大症以見己功恐醫者亦未必知其害人也其傳援如此耳。

一監生中年縱欲自服補腎助陽之藥以至腎水受傷。以上四字徐不能上制心火左顧生一泡先紫後黑麻木不知痛癢重屬腎經其毒不淺幸四邊尚未走散即用針刺。徐曰此二字以水獅散厚塗作條插入患孔。以上八字顏上皮膚如乃用紙封勿令泄氣早服加減八味丸以滋腎水。此乃增腎火也。徐曰午服益氣養血湯接補真氣晚用琥珀蠟礬丸護心解毒至十一日外疔根與藥結成一塊。好肉遇惡藥毒氣死凡依期脫落乃用生肌飲口補助調理脾胃之藥二十日而愈後因不慎保養幾及三年復成勞瘵而歿。徐曰病根死。

一婦年近四十與夫不相得懷抱鬱鬱垂真應發一疔六日後方延余治毒已走散頭目唇項俱腫形色赤紫余曰肉腫瘡不腫業已走黃不治之症。徐曰亦非必死之症婦流涕數日一家皆絕也余問其故婦曰吾夫不肯有一女二子尚未婚嫁我死而托命於夫必致流涕故我死則家絕矣余聞其言不忍棄而不治但瘡勢既大非藥力可回先催一貧人與飯吃飽再飲火酒數盃隨用針刺腫上十餘處。以上七字徐勸令其吸出惡血數梳。以上四字徐勸批曰自有散毒之方何必出血溫湯洗淨用蟾酥錠磨濃塗之四圍敷金黃散早晚二次內以護心散蠟礬丸清心護裏兼服降火化痰開鬱安神之藥餘腫稍退又六日其夫言何以不死婦聞累怒腫甚於前復用針刺約十餘處出血三四梳。以上十三字徐勸針孔上蓋小膏餘腫仍用敷藥出血既多其內必虛服人參養榮湯。徐曰出血多加香附貝母數日後其針口漸膿餘腫漸消其瘡頭乃得高腫仍用蟾酥條插化腐清。徐曰外周生肌飲口之藥內服開鬱和中養血健脾之劑百日外方愈此瘡勉強治之得生其後二子一女俱婚嫁夫先故婦今六十五歲矣。

一婦二十二歲右耳垂向前一寸生疔二日請余視之約有豆大頂陷色灰此肺經白刃疔也又根脚棉軟毒不結聚為陷伏陰症未及針刺。徐曰若針其男曰何恙也余直告曰疔瘡彼冷笑不信余因辭不用藥復請他醫。
疔瘡

一少婦顙下生疔，疔瘡作瘻，爭欲針之。此四字徐執其家不信，自用灸法。次日四邊漸腫，瘡漸陷。此灸之毒如此。

疔瘡主治方

蟾酥丸
銅錄
蟾酥丸
酥寒水石
乳沒砂礬
牛原麝共
蜈蚣

治疔瘡發背。腦疽乳癰。附骨臂腿等疽。一切惡症。牙瘡不痛。或

麻木或嘔吐病重者必多昏愊此藥服之不起發者即發不痛者即痛痛甚者即止昏愊者即發嘔吐者即止未成者即消已成者即潰真有回生之功乃惡症中至寶丹也

蟾酥二錢 輕粉五錢 枯礬 寒水石 銅

綠乳香沒藥膽礬麝香各一錢雄黃二錢蛭牛一箇硃砂三錢以上各研末稱準於端午日午時

在淨室中先將蠅牛研爛再同蟾酥和黏稠研入各藥共搗極勻丸如菉豆大每服三丸用葱白五十蔥
自噴爛吐於男左女右手心包藥在內用無灰熱酒一茶鍾送下被蓋約人行五六里許出汗為效甚者再進
一服修合時婦人雞犬等忌見

徐曰此護心定痛之方。有狗寶。凡此等方可不合。楮按蟾酥胆礬蝸牛三味。徐園方中無蜈蚣而歌訣有之。

黃連解毒湯
黃連 甘草 牛黃 黃連

黃柏黃芩山梔兼
口乾內熱即時捐

治毒入心內熱口乾煩悶恍惚脈實者黃連黃芩

川黃柏 山梔 連翹 甘草 牛蒡子 分

水二茶鍾燈心二十根煎八分不拘時服徐曰一味寒

源亦宜酌用。撮按全生集有年命湯丸。疔毒主方。余初疑其家傳祖方。後得鈔本。仙傳治疔方。有之。知其方也。方用羌活獨活防風青皮黃連赤芍藥細辛甘草蟬蛻僵蚕草河車澤蘭金銀花各等分。鈔本防風青皮

分兩稍重。云初起急服此方。能內消也。余曾見將走黃者服之亦效。

立馬回疔丹
雄立
乳馬
硃回
砂疔
金丹
頂輕
寧新

治疔瘡初起已用針刺復又或誤灸失治以致疔毒走散

不治乃走黃險惡症也急用此極

糖酥化
 硃砂
 輕粉
 白丁香
 蜈蚣
 雄黃
 硃砂

乳香乳香分 金頂五合製法 共為細末糊成麥子大凡遇疔瘡針破用此一粒插入孔內膏蓋之

追出膿血疔痕為效 徐曰疔有骨肉必用此拔出降藥亦能拔疔 又曰總屬剛燥之藥不宜輕用 又曰

蟾酥乃曰是點頭必用之藥 又曰代針丹有血竭礪砂水片

疔毒復生湯疔毒復生湯壯陽 乳沒山桅與木通 治疔瘡走黃頭面發腫毒氣內攻煩悶欲死者壯礪

山桅 金銀花 木通 連翹 牛蒡子 乳香 沒藥 角刺 花粉 大黃 地骨皮各八 水酒各一

茶鍾煎一半食遠服不能飲者水煎臨服入酒一盃和服亦效脈實便秘者加朴硝 徐曰此表裏兩解之方

寶火宜用

七星劍疔瘡最怕七星劍 野菊河車與華丁 治十三種疔瘡初起憎寒作熱惡心嘔吐肢體麻木痛癢非常

心煩作躁甚者皆消急宜服之 野菊頭 蒼耳頭 獐獐草 半枝蓮 蒂丁香 麻黃錢 草河車錢二

用好酒一斤煎至一椀濾澄熱服被蓋出汗為度冬月無鮮草宜預採陰乾臨時煎服之亦效 徐曰此俗所

謂草頭方也

鉛粉散鉛粉散治冷疔瘡 黃丹松脂及麝香 治冷疔生於腳上初起紫白泡疼痛徹骨新至腐爛深孔紫黑

血水氣穢經久不瘥用此大效 黑鉛此百兩燒化開入水中取起再化如 松脂錢 黃丹五分 麝香

分 輕粉分五 共研先用葱湯將瘡洗淨麻油調度瘡口油紙蓋外 徐曰此治濕毒之症下體腫瘡最宜

化疔內消散化疔內消散消山甲 黃丹松脂及麝香 治疔瘡初起或已針已灸之後服之能令內消 皂角刺

金銀花 知母 貝母 天花粉 穿山甲 白芨 乳香 赤芍 半夏 甘草 草河草錢一 水酒各

一茶鍾煎一半量病上下食前後服之 徐曰此亦通治之方重出 梔按天花粉徐勒

東毒金龜散東毒金龜散白芨 白芨白芷生大黃 治疔瘡針刺之後餘毒是散作腫宜此藥搗之 鬱金錢

者 白芨 白薇 白芷 大黃兩四 黃柏兩二 輕粉錢五 萊豆粉兩一 共為細末酸米漿調搗四邊夏月

熱甚者蜜水調 徐曰即圍藥意義

解毒大青湯解毒大青湯知母 元參冬冬生石膏 治疔瘡候災逼毒入內致生煩燥譫語不定者 元參 桔

小 斗 三 宗 卷 四 疔 瘡 五

梗 知母 大青葉 升麻 石膏 山梔 人中黃 麥門冬 木通 大黃 燒人糞 水二
茶鍾 淡竹葉 燈心各二十件 食遠服 搗按人中黃 燒人糞 徐俱抗不入藥 陸君以脂謂人糞入藥 具載他書
功效甚著 王君士雄謂不入藥者 不入煎藥也 以其穢惡耳 如遇火盛毒重之症 改用陳年糞 澄清無穢氣
頗有殊功 醫者不可不知也

消疔簡便方

消疔簡便方 每服三錢 溫酒下

葱白七莖 和白糖 如湯發雪 勝聖丹

治疔瘡及諸惡毒 初起但未成膿者

白礬末三錢

葱白

從容去其覆物 其痛若失 此雖味澀難服 其效更妙 凡居鄉村之處 倘有緊病 不及請醫 以傳此方服之 活人
甚眾 誠為良便方也

大乙紫金丹

太乙紫金丹 廣香 破砂大戟 千金子

發諸毒 治共雄黃 解毒諸毒 瘡諸瘡 利關竅 通治百病 此藥真能起死回生 製之

濟人奇效 不可盡述 凡居家出入 興大工 動大兵 及閩廣雲貴任宦者 不可無之

山茱萸 洗去毛皮 川文

蛤 破砂 大戟 千金子

廣香 破砂 大戟 千金子

破砂 大戟 千金子

紅芽大戟 杭州紫大戟 色白者性烈 破利損傷元

氣 破砂 大戟 千金子

上品者 去蘆根 洗淨 焙乾 為末 一兩 五錢 整

破砂 大戟 千金子

破砂 大戟 千金子

雄黃 研細末 三錢

以上之藥 各擇精品

於淨室中 製畢 候端午七夕重陽 或天月德天醫黃道上吉之辰 凡人室合藥之人 三日 前俱宜齋戒 更換新
潔衣帽 臨日方入室中 淨手薰香 預立藥王牌位 主人率眾焚香 拜禱 事畢 各將前藥七味 復戩稱準 入於大
乳鉢內 再研數百轉 方入細石臼中 漸加糯米 腰飲調和 軟硬得中 方用杵搗千餘合 至極光潤為度 每錠一
錢 每服一錠 病勢重者 連服二錠 以取通利 然後用溫粥補之 修合時 除令藥潔淨之人 餘皆忌見 此藥惟在精
誠潔淨為效 治一切飲食藥毒 毒瘡 氣惡 菌 河豚中毒 及自犯牛馬猪羊六畜等類 之內人 誤食之 必昏亂卒
倒 或生異形之症 並用水磨灌服 或吐或瀉 其人必甦 南方山嶺瘴氣 烟霧騰疫 最為傷人 感之錢覺意思不快
惡寒惡熱 欲嘔不嘔 即磨一錠服之 得吐利便愈 癰疽發背 對口疔瘡 天蛇無名腫毒 蛙癩紅綠等症 及楊梅
瘡 諸風癰癤 新久痔瘡 並用無灰淡酒磨服 外用水磨擦瘡上 日夜數次 覺瘡而消 陰陽二毒 傷寒心悶 狂言
亂語 胸膈塞滯 邪毒未出 瘟疫煩亂 發狂 喉閉喉風 俱用薄荷湯待冷磨服 赤白痢疾 肚腹泄瀉 急痛霍亂 絞

此方為試 需要完整PDF請到 www.ebay.com 購買

腸痧及諸痰喘並用生薑湯磨服。男子婦人急中顛狂渴吐奔走鬼交鬼胎鬼氣鬼魔失心狂亂羊兒癩癩等症俱用石菖蒲煎湯磨服。中風中氣口眼歪斜牙關緊急言語蹇澀筋脈攣縮骨節風腫偏身疼痛行走艱辛諸風諸癰並用酒磨熱服下自縊溺死鬼魅迷死但心頭微溫未冷者俱用生薑續斷酒煎磨服一切惡蛇風犬毒蝎蜈蚣諸惡等虫傷人隨即發腫攻注偏身甚者毒氣入裏皆悶響叫命在須臾俱用酒磨灌下再吃葱湯一椀被蓋出汗立甦新久癰疾臨發時東流水煎桃柳湯磨服小兒急慢驚風五疳五痢脾病黃腫癰瘡瘡癤牙關緊閉並用薄荷浸水磨濃加蜜服之仍搽腫上年歲幼者每錠分作數服牙痛酒磨塗痛上仍含少許良久嚥下小兒父母遺毒生下百日內皮塌爛斑駁道眼瞋瞋爛者俱用清水磨塗打撲損傷松節無灰酒研服年深月近頭脹頭疼太陽痛極偏頭風及時瘡愈後毒氣攻注腦門作脹者俱用葱酒研服一錠仍磨塗太陽穴上婦女經水不調紅花湯下凡遇天行疫症延街及巷相傳傳染者用桃根湯磨濃搽入鼻孔次服少許任入病家再不染傳又治傳尸勞瘵諸藥不能禁忌一方士指教服此每早磨服一錠至三四次後遂下惡物尸虫異形怪類後得脫然以此相傳活人不計其數一女子久患勞瘵為尸虫所噬磨服一錠片時吐下小虫十餘條後服蘇合香丸其病頓失調理月餘而愈真濟世衛生之寶藥也徐曰此諸毒邪氣內外要方無病不治又曰此秘藥中之第一方也用藥之奇不可思議

人參清神湯

人參清神湯天香藥陳遠志黃連等

歸苓甘草麥冬宜功効還同地骨皮

治疔瘡潰膿後餘毒未盡五心煩燥精神恍惚不安言語

睡臥不清服之降火清心保扶元氣

人參黃耆當歸白木

麥冬陳皮茯苓地骨皮遠志

錢一甘草紫胡黃連各五

水二茶鍾糯米一撮煎八分食遠服

徐曰此愈後調養方毒未盡者不可服

內托安神散

內托安神散天香藥陳遠志黃連等

治疔瘡針後已出膿時元氣虛弱臨睡驚悸心志不安或

毒未盡流入心竅致多健忘亦宜服

人參茯苓黃耆白木

麥冬元參陳皮各一酸棗仁

遠志甘草石菖蒲五味子各五

水二茶鍾煎八分臨服入硃砂末三分和勻食遠服徐曰與前方

相同可刪

疔瘡應用方

蟾酥條

琥珀蠟礬丸

玉紅膏

如意金黃散

托裏消毒散 護心散

見腫

八珍湯 益氣養榮湯 加減八味丸

人參養榮湯

珍珠散

見下 水蠅散

見下

脫疽論第二十五

夫脫疽者。外腐而內壞也。此因平昔厚味膏粱。薰蒸臟腑。丹石補藥。消燦腎水。房勞過度。氣竭精傷。兼用房術之藥。或哈舌下化水。直至丹田。或納臍中。使熱徑投內腎。為九掌握。作香鼻嗅。或抹陰鼎。或搽陽器。圖使堅硬。希求常濟。多致陽精燼。或淫火猖狂。往有之其蘊蓄於臟腑者。終成躁熱火症。其毒積於骨髓者。終為疽毒。陰瘡。巧人行拙。誰防禍起蕭牆。智者多愚。自謂喜從天降。直至骨枯髓涸。臟敗腑亡。方悔解脫無方。罹殃有故。凡患此者。多生於手足。手足乃五臟枝幹。瘡之初生。形如粟米。頭便一點黃泡。其皮如煮熱紅棗。黑氣浸傳。偏五指上至脚前。其痛如湯潑火熱。其形則骨枯筋縮。其穢異香難解。其命仙方難活。故謂血死心敗。筋死肝敗。肉死脾敗。皮死脾敗。骨死腎敗。此五敗者。雖有靈丹。喪命而已。生此疾者。死生附於肚外。孫真人曰。在肉則割。在指則切。即此病也。治之於早。乘其未及延散時。用頭髮十餘根。纏患指本節處。盡達扎十餘轉。漸漸緊之。毋使毒氣攻延良肉。隨用蟾酥餅放原起粟米頭上。加艾炙至肉枯瘡死為度。徐曰。炎而後割。不至痛極。血湧亦良法也。次日本指盡黑。方用利刀。尋至本節縫中。將患指徐順取下。血流不住。用如聖金刀散止之。餘腫以妙貼散敷之。次日倘有黑氣未盡。單用蟾酥錠研末。糝之膏。蓋黑氣自退。患上生膿。照常法用玉紅膏等藥。生肉。雖骨完口。此為吉兆。內服滋腎水。養氣血。健脾安神之劑。若內外無變症。十中可保其三。四矣。若割取之後。黑色仍侵。痛腫尤甚。敗惡無膿。口乾舌硬。精神不爽。食不知味者。終死。凡治此。不可一己專任。必與高明眾議。聽患者願。割與否。因此症首尾凶吉難定。故不可輕易醫治。又有似是而實非者。詳註在後。宜參觀之。徐曰。此症十死八九。即治之得法。亦難許其活。此論却是一篇勸戒文。不獨生脫疽者然也。

脫疽看法

起瘡不渴。口渴舌和。性志尋常。無妄暴急。循禮為吉。初出形如麻子。較熱作痛。一指昏腫。根脚收束者吉。已成頭便作腐。肉不紫黑。疼痛有時。膿出膿消者吉。已潰先膿後腐。肉色紅活。毒不走散。氣不腥穢者吉。未瘡先渴。喜冷無度。昏睡舌乾。小便頻數。陽痿者逆。初起形如粟米。肉便紫色。不腫刺疼。黑氣延散者逆。已成瘡形枯腐。肉

黑皮焦痛如刀刺毒傳好指者逆已潰內枯筋腐血水臭汗疼苦應心零丁徹骨者逆

脫疽治法

脫疽多生足指少生手指。初起水窠黃泡者即灸之。初生如粟裏可容穀皮色紫赤不作掀腫髮孔仍灸已灸之後瘡受火氣發泡作膿外藥搗之內兼補托毒勢已成瘡形稍陷但紫色未攻脚面者評議割取既割之後血水淋漓疼痛不減和氣血補脾胃已成飲食減少身體倦怠便數口乾滋津液壯腎水破後血氣受傷脾胃虛弱自汗盜汗惡心乾嘔睡卧不安日哺發熱疼痛苦楚煩悶譫妄俱宜大補氣血富貴及膏梁素餐色慾每於房術縱恣日久禁行割法。徐曰看法與諸症同治法前已說明重出不必。

脫疽治驗

一男子年近五旬右足小指初生如粟米形漸成白泡三日始痛請治頭已腐爛一指紫腫此脫疽也用艾火明灸十三壯始大痛乃止又用針刺灸頂貼蟾酥餅膏蓋其餘紫腫用披針擊刺七八處發泄毒血用蟾酥餅磨濃塗之腫外以真君妙貼散敷連內疎湯通其大便而惡心煩熱亦止又用托裏消毒散加金銀花牛膝數服早用八味丸解其表症次用黃連內疎湯通其大便而惡心煩熱亦止又用托裏消毒散加金銀花牛膝數服早用八味丸晚用蠟礬丸相兼服之隨又針刺徐曰針刺本不必泄其毒氣解毒為膿腫方稍消後用十全大補湯加山茱五味此四字徐曰麥冬等藥調理月餘而愈此疽若不針灸發泄毒氣專假藥力敷圍再加峻藥攻利必傷元氣豈能保乎。徐曰此症並非脫疽乃濕毒也疹解毒清火藥即愈因慢治遂成大症。

一客商右足次指生一紫泡痛痒異常次日指甲俱紫欲黑余曰此乃肝腎二經之毒甲乃肝之餘氣甲紫則肝受毒也骨乃腎之餘質傷則骨黑彼問何以至此余曰人凡勞疲精力傷於肝誤服熱藥傷於腎此句徐謂旁人曰情實有此彼久客狎妓常服興陽等丸忘情作樂已二年矣余欲辭不治彼哀告求生冀得還鄉余令先取妓者頂髮十餘根撚線纏扎患指盡處隨將艾炷在紫色處排勻三炷每灸七壯各貼蟾酥餅膏蓋過夜一指皆黑量其筋骨皮肉俱死用利刀順節取脫患指徐曰此乃冰冷惡物預煎甘草湯浸洗良久俟疾血稍盡以止血散粉之次日災處紫色不退恐其上延又以神燈法照之候血散皮網合蟾酥丸料多加海羊研爛服

之早晚二次腫不復作。紫色變紅。紅色清膿。外用生肌止痛活血收斂之藥。又熬參朮地黃膏。朝服接補真元。午服健脾藥。以固胃氣。晚用金液丹以解藥毒。如此調理三月而愈。或問用妓髮何也。余曰。以彼心愛之髮。貼肉雖疼而不疼。徐曰。神以妓人妓。又如在此目前。此妙用也。

一婦中年肥胖。患渴三載。右手食指麻癢。月餘。節間生一泡。隨後本指漸腫。疼痛不堪。原泡處生黑斑。半指已變紫黑。此亢陽之極。乃成脫疽。脈洪大數。而有力。與肥人相反。如再黑色上延。壞人迅速。詢知此婦本富室。無嗣。口縱膏梁。冬燼爐灰。多服種子熱藥。中年喪夫。家業為嗣子蕩盡。久懷憂鬱。與寡母同棲。身耽寂寞。此先富後貧。所願不得。又為失榮症。辭不可治。再三哀懇。余乃遵孫真人治法。在肉則割。在指則切。先服人參養榮湯。隨後用軟絹條。尺許。纏裹黑色盡處。好肉節上。以漸收緊。次用利刀放準。依節切下。將手浸甘草溫湯中。片時血出不多。疼亦不甚。余曰。切而不痛。此為氣血筋骨俱死。此指雖脫。未可得愈。因以八味丸料。徐曰。八味丸。加人參。養榮大劑煎服。先救腎水。次扶脾胃。開胃金液戊土丹。以解藥毒。後三日。將纏裹處漸漸放鬆。以通血脈。搽貼紅黑二膏。生肉止痛。既而手背手掌。日漸發腫。勢惡之甚。惟不黑色。此內毒已出之故。仍用神燈照法。兼以豬蹄湯洗淋其腫處。又出數頭。流血無數。兩月外。方得腫稍退。膿稍減。又以參朮膏。人參養榮湯兼服。半年外始愈。而指失矣。徐曰。此脫疽之類也。

一男僕冬月嚴寒。主使亦足履地。不敢移血凍麻。木次日十指俱紫。又數日全變黑色。麻木不痛。請余觀之。強用辛熱散寒。活血熏洗等藥。不應。又延黑脚面骨節一段。其疼余曰。後必十指齊脫。其主疑為脫疽。余曰。似是而非。尚可不妨。今當用秦木火災之敗。其溫暖活血。又能解散熱毒。患處漸腐漸脫。自不立散。內服健皮養血之藥。外用紅黑二膏生肌。百日外愈。徐曰。此凍極血凝之症。

一侍女十二歲。貌頗美。主嫌脚大。用布任意纏緊。以線密縫。脹痛不堪。訴主不聽。半月後流出臭水。方解視之。雙足前半段盡皆腐爛。骨肉已死。余曰。已壞者不可復救。只救未壞者可也。先煮麥粥食之。次煎葱湯。令主家僕婦將兩足浸入湯內淋洗。再換湯浸。但腐肉不痛者。逐一剪割。連續知痛者。以花蕊石散搽之。俾將壞者復生。已壞者得脫。內服補中益氣湯。外搽生肌玉紅膏。此與男僕前案雖俱得愈。終成廢疾。一生矣。

一男子右足小指縫中初生一點黃粟泡皮肉隨變紫色陰痛不堪有如刀刺視其形色真脫疽也診其脈入細數無力此腎經敗症詢知生平大飲內有妻妾三人精力已竭縱治無功遂起辭之後延至脚面足底皆穿疼痛不徹飲食日少氣血日衰形體日削一月後百苦而終徐曰此陰毒之症多不治

脫疽主治方

解毒清生湯

解毒清生湯草芍知柏二花藥連志

花粉桑葉歸茯苓犀角升麻牛膝同

治昂治脫疽初起惡寒體倦發熱作渴或腫或紫或麻或

痛四肢倦怠心志恍惚不要者

川芎

當歸

黃柏

知母

天花粉

金銀花

麥冬

遠志

柴胡

黃芩

犀角

茯神

甘草

紅花

升麻

牛膝

各五分

水二茶鐘煎八分臨服入童便一盃

隨病上下服

徐曰此方藥味甚難不足法

陰陽二氣丹

陰陽二氣參天冬澤瀉辰砂五味

治脫疽久服丹石補藥致虧腎水多成口燥咽乾至飲冰

雪不知其冷

此孤陽獨旺宜服此解之

天冬

麥冬

五味子

黃柏

人中黃

小兒用研者

元參

去粗皮搗

青苔

甘草

枯礬

辰砂

蜜少許再搗千餘下軟硬得中丸如桐子大每服六十九童便乳汁各一鐘空心送下其效如神徐曰此方

無法不可學

清神散

清神散內牛蒡砂

豆粉

梅花

水片

治脫疽疔瘡發背毒積甚者膝理發越不盡煩躁悶亂睡則驚

言嘔吐不食

甘草

節

菜豆粉

長砂

錢

梅花片

牛黃

右為細末每服一錢淡竹葉燈心湯

調服

徐曰此治熱毒犯心經之方

雄雄霹靂火

雄雄霹靂火純陽

新文

雙黃

丁

麝香

治脫疽及一切發背初起不疼痛者艾茸

丁香

雄黃

雄黃

麝香

右研四味共研極細

搗入艾中作黃豆大丸放於患上灸之母論痛痒以肉焦為

度如毒已經走散就紅暈盡處排炷灸之痛則至瘡瘡則至痛為妙灸復仍用提疔麥子貼上膏蓋次服蟾酥

九及解毒湯轉回活色有膿為妙徐曰陰症灸法

金液戊土丹

全液戊土丹五味

斗黃

神志

永壽香

治脫疽及疔瘡發背先因縱食膏粱厚味大酒又或丹石

砂雄硝石烏梅肉

石菖蒲

神志

永壽香

人中黃

治脫疽及疔瘡發背

先因縱食膏粱厚味大酒又或丹石

砂雄硝石烏梅肉

石菖蒲

神志

永壽香

人中黃

治脫疽及疔瘡發背

先因縱食膏粱厚味大酒又或丹石

砂雄硝石烏梅肉

石菖蒲

神志

永壽香

人中黃

治脫疽及疔瘡發背

補藥勉力入房多致積毒臟腑久則胃汁中乾腎水枯竭不能上制心火以致消渴消中消腎饒飲多乾能食多瘦九竅不通驚悸健忘見此諸症後必發疽多難治療宜預服此可轉重就輕移深居淺久解五金八石之毒藥也 人中黃製法在末卷烏梅肉 茯神 胡黃連 五味子各一 石菖蒲 辰砂 雄黃 遠志 硝石

錢三 牛黃 水片錢一 金消二十張 各為淨末配準前數共入乳鉢內再研千轉於端午七夕或二至

二分吉辰在淨室中先將烏梅地黃二膏搗極爛和藥漸加煉蜜少許徐徐搗軟硬得中每藥一兩分作十丸金消為衣每服一丸用人乳童便共一大盃化藥隨病上下食前後服之此藥最解膏梁金石藥毒殺三尸除勞熱極有功效又治煩顛安神志辟瘴辟瘟及諸邪魅謔語失心喪志者俱效修合之時服藥之際俱忌婦人僧尼孝服難大等見之此藥封固收藏不泄藥味愈久愈效 徐曰此亦通治之方此等前已有 補按全生集載脫疽治法大人以陽和湯小孩以小金丹最狠者以犀黃丸皆可消之如色紅者即非脫疽當作癰治又按歌有麝香而方無之方有胡黃連而歌無之製法有地黃膏而歌與方皆遺之

脫疽應用方 針刺法 蟾酥丸 蟾酥餅見前 蠟鑿丸 神燈照法 太乙膏 真君妙貼散 內疏黃連

湯 托裏消毒散 豬蹄湯 玉紅膏見前 十全大補湯 參朮地黃膏 人參養榮湯 補中益氣湯

加減八味丸見前 桑木灸法見前 人參敗毒散見前 如聖金刀散 花蕊石散見前

外科正宗卷五

瘰癧類第二十六

夫瘰癧者有風毒熱毒氣毒之異又有瘰癧筋瘰癧痰瘰癧之殊風毒者外受風寒伏於經絡其患先寒後熱結核浮腫熱毒者天時亢熱暑中三陽或內食高粱厚味醲結成患色紅微熱結核堅腫氣毒者四時殺厲之氣感冒而成其患耳項胸腋臙成腫塊令人寒熱頭眩項強作痛瘰癧者累累如貫珠連結三五枚此不作寒熱其患得於誤食虫蟻鼠咬不潔之物及宿食陳水或內有汁液其患先小後大初不覺癢久方知癢筋瘰癧者憂愁思慮暴怒肝傷蓋肝主筋故令筋縮結毒成核生於項側筋間形如棋子堅硬大小不一或陷或凹久則虛癰多生寒熱旁然則其瘰癧者飲食冷熱不調飢飽喜怒不常多致脾氣不能傳運遂成痰結初起如梅如李生及偏身