

醫宗必讀

王成五

卷五

古吳童氏重校醫宗必讀卷之五

雲間李中梓材父著

門人黃寅錫清伯父參
姪孫李廷芳衡伯父訂

傷寒

黃帝曰熱病者皆傷寒之類也其死皆以六七日之間其愈皆十日以上者何也冬寒之氣感而即病名曰傷寒不即至夏變岐伯對曰巨陽者諸陽之屬也巨大也太陽為六經之長統爲暑病故巨陽者六經之長統也太陽為六經之長統者病也太陽分故諸陽皆其所屬背之表故主人之傷於寒也則為病熱熱雖甚不死寒邪束於肌腠則立府閉陽氣不得布其兩感於寒而病者必不死越慾而爲熱寒散則熱退故雖甚不死其脈復鼻絡於頭故身熱目痛與少陰同病而口痛與少陰同病則耳聾與震縮而厥三陰三陽俱受病水漿不入昏不知人六日當死也傷寒一日巨陽受之故頭項痛腰脊強太陽為三陽之素而脈連風府故傷寒者多從太陽始二日陽明受之陽明主肉其脈復鼻絡於目故身熱目疼而鼻聾不得卧也胃不和則卧三日少陽受之少陽主膽其脈循脣絡於耳故胸脅痛自悶繫於太陰與滿而吐食不下自利益甚腹自痛也而耳聾少陽傳少陽者三陽已盡將入太陽故爲半表半裏之經仲景曰脈弦細頭痛發熱者屬少陽口苦三陽俱見也傷寒一日少陰受之故燥渴仲景曰少陰為病脈微細但欲寐也六日厥陰受之厥陰脈循陰器而絡於肝故煩滿而裏縮甚於陰而六經傳猶加熱於半表半裏故寒熱俱見也三陽經絡皆吸陰為病氣上逆于心中痛劇不能食食則吐吐下之利不上太陽經病若渴者自入於本也名曰傳本太陽傳陽明者名越經傳太陽傳少陽者名表裏傳太陽傳少陰者名裏急傳太陽傳太陰者名謂下傳太陽傳厥陰者名經得度傳厥節者或自太陽始日傳一經六日至厥陰而極者或不罷再傳者或開經傳者或傳一二經而止者或始終只在一經者或越經而傳者或初入太陽不發熱便入少陰而成立證者或直中陰經者不傳者為合病有三經先病未盡又遇一經之傳者為併病有太陽陽明合病者或太陽少陽合病有少陽陽明合病有三陽合病有三陽與三陰合病是而感三陰三陽五藏六府皆受病營衛不行五藏不通則死矣傳經已偏邪當漸解若遇經而不解則深入於府內則五臟不通所謂其死皆以六七日者如此劉華翁謂傷寒傳足不傳手其說蓋出此篇而誕妄實甚夫人之氣運行周身豈邪遇乎經而有不入者哉寒之傷人必先皮毛皮毛者肺之合故外則寒侵鼻塞內則喘嗽短氣非傳肺乎古胎育崩卦傳之與胞終始沖溝脉結非傳太陽乎將問非傳小腸乎瘡滿上下不通非傳三焦乎且本支云五藏六府皆病豈乎經不在內乎經言傳變不及乎經者何也足之六經可盡用身上下之脉絡而乎經已在其內不必復矣其不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰

腹減如故則思飲食。十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而噫十二日厥陰病衰裏緩少腹微下大氣皆去病日已矣

所謂其愈皆十日以上者如此又有言傷寒以不服药為中醫者其說本於此不知經文為真實者言也若正虛邪實則死營如大渴洪濤不為援手而聽其自瀕全活者幾希矣帝曰治之

日數雖多有表証者必汗日數雖少有裏証者必下第當以表裏為辨不可以日數拘也

愚按冬氣嚴寒運轉潛藏君子固密則不傷於寒固密者毋勞爾形毋勞爾神形神並守僵行於閉蟄封藏之本者也

一有不謹而犯寒威則殺厲之毒乘於肌體冬月即發名正傷寒伏而不發至春變溫至夏變熱變態不測殊可憂虞

治之或差反掌生殺自仲景以來名賢代起立言不患不詳患其多而惑也陶節菴曰得其要領易於拾芥脈證於理

而已求之多歧則支離繆疎如涉海問津矣脈證者表裏陰陽虛實寒熱也理者知其常通其變也多歧者蔓衍之方

書也余有風於斯言約六法以盡之曰汗吐下溫清補汗者治在表也而汗法有三一曰溫散寒勝之時陰勝之藏陽

氣不充則表不解雖身有大熱公用辛溫一曰涼解炎熱熾盛表裏枯涸陰氣不營亦不能汗宜用辛涼一曰平解病

在陰陽之間既不可溫又不可涼但宜平用期於解表而已吐者治其上也吐中有發散之意可去胸中之實經曰在

上者因而越之是也下者攻其裏也而下法有五痞滿在裏燥實在血四證具者攻之宜峻也但見滿燥實者攻之稍

緩但見痞實者攻之更緩或行血氣或逐水停滯輕重緩急瀦証靈通也溫者溫其中也藏有寒邪不溫則死夫氣為陽

氣虛則寒故溫即是補又名救裏者以陽虛可危亟當救援也清者清其熱也有熱無結本非下證若不清之熱何由

散下後餘邪亦宜清也補者救其虛也古人言之已詳令人畏而不用使傷寒犯虛者坐而待斃大可憐凸如屢散而

汗不解陰氣不能達也人知汗屬於陽升陽可以解表不知汗生於陰補陰可以發汗也又如內熱不解屢清而火不

迺陰氣不足也人知寒涼可以去熱不知壯水可以制火也又如正虛邪熾久而不痊補正則邪自除溫中則寒自散

此必見衰微之陰脈者也傷寒論曰陰證得陽脈者生陽證得陰脈者死人皆奉其言未知繹其義夫正裏實者多見

陽脈正氣虛者多見陰脈證之陽者假實也脈之陰者真虛也陳氏曰凡察陰證不論熱與不熱惟憑脈用約至為穩

當不論浮沈大小但指下無力重按全無便是伏陰然則沈小者人知為陰脈不知浮大者亦有陰脈也是知傷寒雖

具萬變虛實二字可以提綱正勝則愈邪勝則死正裏實者雖感大邪其病亦輕正氣虛者雖感微邪其病亦重萬實

而病者攻之即愈雖不服药經盡即安何足慮也所可慮者惟彼虛耳奈何淺庸之輩不察虛實但見發熱動手便攻虛而攻之無不死者且曰傷寒無補法謬之甚矣獨不觀仲景立三百九十七法而治虛寒者一百有奇垂一百一十三方而用入參桂附者八十有奇東垣丹溪節庵亦有補中益氣回陽返本溫經益元等湯未嘗不補也謂傷寒典補法可采大實者不灼可愈虛者非治弗痊能察其虛而補救者撫傷寒之要矣何必求之多歧哉

傷寒十六證傷寒者寒傷營血脈浮而緊頭痛發熱無汗惡寒。傷風者風傷衛氣脈浮而緩頭痛發熱有汗惡風。傷寒見風者既傷於寒復感風邪惡寒不躁其脈浮緩。傷風見寒者既傷於風復感寒邪惡風其脈浮緊以上四証皆冬月即病發於春皆有溫之名也。溫病者冬受寒邪來春乃發々熱頭疼不惡寒而渴脈浮數。溫瘡者冬受寒邪復感春寒。風溫者冬受寒邪復感春風頭痛身熱自汗身重哩喞欲眠語言難出四肢不收尺寸俱浮溫疫者冬受寒邪復感春溫時行之氣。溫毒者冬受寒邪春令早熱復感其邪以上五証皆冬傷於寒而熱病者冬傷於寒至夏乃發頭痛身熱惡寒其脈洪盛。傷者羣熱為邪自汗煩渴身熱脈虛。傷溼者感受溼邪身重而痛自汗身不甚熱兩脰逆冷四肢沉重胸腹滿悶。風濕者既受溼氣復感風邪肢體重痛額汗脈浮。瘧者身熱足寒頭項強急面赤目赤口噤頭搖角弓反張若先受風邪復感於寒無汗惡寒為剛瘧先受風邪復感於溼寒風有汗為柔瘧。

類傷寒五症一曰瘧中脫停瘧寒發熱自汗胸滿但頭不痛項不強與傷寒異耳一曰食積胃中停食發熱頭痛但身不痛氣口緊盛與傷寒異耳一曰虛煩氣血俱虛煩躁發熱但身不痛頭不痛不惡寒不浮緊與傷寒異耳一曰脚氣足受寒溼頭痛身熱肢節痛使閉塞逆但脚痛或腫滿或枯細與傷寒異耳一曰內癰脈浮數當發熱而惡寒若有痛處飲食如常畜積有膿也胸中痛而咳脈數咽乾不渴濁唾腥臭肺癰也小腹重按之痛便數如淋汗出惡寒身皮甲錯腹皮腫急脈滑而數腸癰也胃脘痛手不可近胃脈細人迎盛者胃脘癰也以人迎盛而誤認傷寒禁其飲食必死。

表證發熱惡寒惡風頭痛身痛腰脊強直痛鼻乾不眠胸脹耳聾寒熱鳴脈浮而大或緊或緩有汗脈浮緩無力表虛裏證不惡寒反惡熱掌心腋下汗出腹中難滿大便不通腹痛腸鳴自利小便如常諺語潮熱咽乾口渴舌乾煩滿裏縮而厥脣青舌卷脈沈細或沈實曉鳴自利不渴唇青舌卷無熱惡寒下利清穀身痛脈沈微裏熱也腹中轉大便閉或沈實曉語潮熱腹痛不惡寒反惡熱諺語掌心脣下有汗而燥腹滿裏實也表裏俱見

可汗下小柴胡湯隨証加減

陰證身靜氣短少息口不了了。鼻中呼不出吸不入。水漿不入。二便不禁。面如刀割。色青黑。或喜向壁卧。閉目不欲見人。鼻氣自冷。唇口不紅或白或青或紫。手足冷。指甲青紫。小便白或淡黃。大便不實。手按重。與大熱若陰重者。冷透手也。陰毒者。醫本虛寒。或傷冷物。或感寒邪。或汗吐下後。變成陰毒。血痛。腹中絞痛。眼睛痛。身體倦怠而不甚熱。四肢逆冷。頭上手背有冷汗。恍惚身痛。如被杖。虛汗不止。鄭聲嘔逆。六脈沈細。或尺衰寸盛。五日可治。六七日不可治。陰證似陽者。煩躁而赤。身熱咽痛。煩渴。脈浮微。手足冷。大便洩。小便清。昏沉多眠。又有身熱反欲得衣。口不渴。指甲黑。此陰盛於內。真陽失守也。

陽證身動氣高而喘。目睛了了。呼吸能往來。口鼻俱熱而赤。唇紅。口乾舌燥。譯語能飲涼水。身輕如常。小便亦大便閉。手足溫。指甲紅。陽毒者。邪熱深重。失汗失下。或誤服熱藥。熟毒散漫。舌卷焦黑。鼻中如煙煤。咽喉痛甚。身面錦斑。狂言直走。踰垣上屋。登高而歌。棄衣而走。脈洪大滑促。五日可治。六七日不可治。城昏暎眼血藥入即吐。又見鬼神。陽證似陰者。手足冷。大便閉。小便赤。煩悶昏迷。不眠。身寒。卻不欲食。口渴。指甲紅。脈沈滑或四肢厥冷。陰厥脈沉弱。指甲青而冷。此陽陽厥脉沉滑指甲紅而溫。此陽極於內。真陰失守也。

六經證治足太陽膀胱此經從頭項貫腰脊。故頭痛惡寒。發熱者強烈。風與寒常相因。寒則傷營。惡寒頭痛。脈浮緊而無汗。用麻黃湯開發腠理。以散寒得汗而愈。風則傷衛。惡風頭痛。脈浮緩而有汗。用桂枝湯充塞腠理。以散風止汗而愈。若夫風寒兼受。營衛俱傷。用大青龍湯。此三湯者。冬月天寒。腠密。非辛溫不能發散。故宜用也。若春溫夏熱之證。皆用羌活冲和湯。半涼解之。傳至陽明。則目痛。鼻乾不眠。以葛根湯升麻湯治之。此証有在經在府之別。如目痛鼻乾微熱。身熱脈浮。汗出。病在經也。渴熱目汗。發渴大便閉。揭去衣被。手揚足瘙。大柴胡湯。此不已。則傳陽明之府。表証悉罷。名為入裏。惡軟。譯語口燥咽乾。不大便。脈沉實。如痞滿燥實四証皆具。三焦俱傷。宜大承氣湯。但見痞滿實三証。邪在中焦。宜謂胃承氣湯。不用枳橘恐傷上焦之氣也。但見痞實二証。邪在上焦。宜小承氣湯。不用芒硝恐傷下焦之血也。小腹急。大便黑。小便不利。如狂喜忘畜血証也。宜桃仁承氣湯。傳至三陰。四肢厥冷。腸痛吐瀉。口哩冷涎畏寒戰慄而如刀割。引衣膝臥。脈見遲數。宜溫之。輕者理中湯。

重者四逆湯或初病起不發熱便見寒證者名為直中陰經亦以二湯主之以上各經治法一見表證即與汗之一見

裏證即與下之一見虛寒即與溫補但當以脈證為據不可以日數拘也

可汗頭痛項強皮脊腰背俱強身瘦拘急寒發熱無汗脈浮數或浮緊皆可汗若汗後不解仍發熱脈浮須再汗之不可汗無表證者不可汗脈沈不可汗尺脈遲不可汗脈微弱者雖並寒不可汗咽中閉塞者不可汗諸動氣者不可汗淋家不可汗亡血虛家不可汗厥者不可汗汗家不可重汗太陽與少陽併病頭項強痛或眩胃心下痞不可汗脈弦細頭痛面赤屬少陽不可汗昔范雲患傷寒時武帝有九錫之命謂徐文伯曰甚易但元氣不足翌二年後不復起耳雲曰朝開道夕死可矣况二年半遂以蒸法取汗而愈後二年果卒虛者其可輕汗哉

可吐病在膈上者可吐汗下後虛煩懊惱者可吐

不可吐脈虛不可吐厥逆者不可吐膈上寒乾鳴宜溫不宜吐

可下汗後不解邪傳胃府可下潮熱腹痛脈實可下陽明多汗譜語有燥薑可下。潮熱手足腋下汗出譜語者可下。吐後腹滿可下。凡臍腹硬或痛不可按者可下。下後不解臍腹硬痛可再下。結胸脈不浮可下。少陰病下利清水其色青者心下必痛口乾者可下。太陽証熱結膀胱小便不利小腹急結其人如狂者血畜也可下。陽明證其人喜忘大便黑必有闊血可下。陽明無汗小便不利心中懊惱必發黃可下。

不可下表未解者不可下。腹脹可按而減者不可下。諸虛者不可下。陽微者不可下。咽中閉塞者不可下。

諸動氣者不可下。脈弱者不可下。脈浮大者不可下。小便清白者不可下。陽明病面赤心下雖鞭滿不可下。用火法以大燒地布桃葉柏葉亦可設席置病人於上即汗出。或醋炒香附熱熨胸背即汗。或置火於床下或艾灸。用水法傷寒寒飲水為欲愈若不與便不愈若恣飲則水停宜以新汲水少與之待再寒再與。热甚者以青布浸新水中置病人胸前熱則易之甚者置病人於水中或浸手足或漱口若表未解及陰證似陽者忌之。

三陰發熱則有腹痛肢冷脈沈下利為異四逆湯潮熱屬陽明一日一發日晡而作陽明內實也大便軟者綠氣表未罷

者小柴胡湯煩熱兼渴竹葉石膏湯心煩不眠酸棗仁湯煩而心悸小建中湯煩而悶者桔子湯熱者白虎湯寒者附子湯

惡寒不見風亦惡風自發雖熱不散去衣被發熱惡寒者陽也喘活沖湯無熱惡寒者陰也湯中下證悉具微惡寒者表未解也先解表而後攻裏下後不解發熱而渴惡寒白虎加桂枝湯口渴心煩背惡寒而嘔心下痞者五苓汗後惡寒虛也桂枝附子湯後惡寒虛也芍藥附子湯背惡寒表未解也葛根背惡寒而潮熱桂枝湯加桂枝湯少陰病口中和背惡寒附子湯汗後不解反背惡寒者虛也附子湯

惡風密室無風不惡風太陽惡風無汗而喘黃有汗桂枝湯吐下後不解表裏俱熱特時惡風燥渴而煩白虎加桂枝湯少陰病口中和背惡寒附子湯汗後不解反背惡寒者虛也附子湯

自汗惡風寒者桂枝湯惡寒自汗表虛也小建中湯或黃耆建中湯自汗不惡風寒表證龍裏證實也湯氣汗多小便不利必津液竭大便雖鞭不可攻宜蜜導蜜於銅器中微火煎稍凝攪之勿令焦皂角不少許桂枝附子湯外用白水煎本川芎白芷各二兩桂枝各二兩細末糾糞通身模之盜汗在半表半裏膽有熱也小柴胡湯頭汗者熱不得越陽氣上騰譖語盜汗心下滿頭汗出水結胸也小半夏湯頭汗出齊頸而還發黃也茵陳五苓散頭汗出小便難者死手足汗大便燥譖語大承氣湯氣上冲頭痛不甚寒不能食小便不利水穀不分手足汗者理中湯

頭痛太陰少陰有身熱無頭痛厥陰有頭痛無身熱若身熱又頭痛屬陽經也頭痛發熱無汗惡寒麻黃湯大便六七日不通頭痛有熱小便清者不在裏仍痛無身熱若身熱又頭痛屬陽經也頭痛發熱有汗身痛桂枝湯陽明脈浮身痛葛根湯汗在表羌活湯頭痛甚者必取葛根芩白虎湯少陽頭痛小柴胡湯頭痛寒熱寸脈大瘧厥也附子湯厥陰頭痛嘔而吐沫吳茱萸湯陰頭痛脈微遲為欲愈如不愈小建陽明頭痛不甚寒微惡熱不大便調胃承氣湯

身痛太陽脈浮身痛無汗麻黃湯陽明下證已見但身痛者表未解也麻黃湯發熱有汗身痛桂枝湯陽明脈浮身痛葛根湯汗後脈沈遲身痛血虛也黃耆建中湯陰毒嘔逆下利身痛如被杖唇青面黑甘草四逆湯一身盡痛發熱惡寒而寒桂枝湯一身盡痛發熱面黃二便反利甘草附子湯一身盡痛發熱發審頭汗出背強小便不利溼也茵陳五苓散一身盡痛發熱面黃戴結瘀血也抵當湯

筋惕玉瞤汗多亡陽筋肉失潤動兼肢冷者頭武輕者拔荳桂枝甘湯輕者草白术湯汗吐下後見此者先服防風白术桂枝湯汗出邪在胸汗下之而煩熱附子湯胸中痞悶氣上冲喉寒也附子湯陽明少陽合病下利身熱脇痛大柴胡湯汗後頭痛心痞脇

結胸病發於陽而反下之。按之則痛小結胸也。脚陽不按亦痛大結胸也。太陽俱

懷躁渴實裁結胸也。三黃湯 血結胸者小腹滿小便不利。當飲水不散水結胸也。桃芩湯 用陷胸等藥不效者。理中

大煩亂欲死宜水漬法。歸宿雷湯青布瀝脚中熱除煩度。

痞滿而不痛病石曰痞。病發輕者通用桂枝胸滿脈濶半夏湯。手足溫按之濡關上浮者。黃連湯 乾溼有水氣。生薑湯

下利腹鳴。甘草湯 胃寒欬逆。理中 關脈沉緊。大柴胡湯

大腹滿六七日不大便。腹滿常痛者。承氣 腹滿時痛者。桂枝芍藥湯 腹滿吐食。枳橘理中湯 汗後脹滿。草人參湯。腹滿澁澁有

聲。水銀氣化湯 加桂枝。

小腹滿膈下滿也。腹滿為小腹滿。小便利蓄血也。壅者桃仁承氣湯 小腹滿。手足

厥冷。真武不咎 腹滿按之痛冷結也。元穴

腹痛陽邪痛者其痛不常。按而痛甚為實。右關脈實腹痛便閉。不氣湯 下之早。因而腹痛。小建陰脈湯 滯陰脈弦腹痛洩

咽痛。少陰不可汗不可下。甘桔湯為陰服。陰陽俱緊主無汗。有汗曰亡陽屬少陰當咽痛。湯 嘴膚陰脈濶陰脈弦腹痛洩

利。建中湯或桂枝芍藥湯 少陰厥逆或利而厥子。乾薑湯 厥陰小腹痛。通陽四逆加五味湯 咽痛。當歸四逆湯

浸黃連汁噙非時暴寒附於少陰之經。脈弱咽痛必下利。光用半夏桂甘湯 次服四逆湯。

腸痛杜仲丸 痊愈。身涼表證罷。乾嘔腹痛有水也。湯

呃逆仲景作欬逆即此。吸脈微細呃逆。胃寒也。橘皮乾薑半夏生薑湯 丁香柿蒂湯。脈洪大而呃心火上奔肺不得納。甘草湯 服灼無效用

覬法。黃連散 未酒前覬之失下呃逆。大便實者。小承氣湯

嘔吐嘔嘔者聲物俱出。吐者無聲出物。嘔者有聲無物。太陽陽明合病當自利若不利但嘔。葛根加半夏湯 少陽有嘔證。朱

陽合病自利而嘔。黃芩半夏湯 寒熱嘔而不渴。葛根湯 嘔而發熱心下急。微煩。大柴胡湯 胸中有熱。胃中有邪。陰陽不交。腹痛欲

吐。黃連散 三陽發熱而吐。柴胡湯 俱用小柴胡發熱六七日不解煩渴欲飲水入即吐。五苓散 虛熱少氣。氣逆欲吐。竹葉石膏湯 寒多而吐。

柴胡湯。

理中湯不飲而吐。理中湯去生薑。汗下後胃虛而冷。吐。乾薑黃連黃芩人參湯。少陰吐者。子加生薑。吐逆。二便秘厥逆無脈。大承氣湯。心下有水氣。乾嘔身熱。微喘或自利。小青湯不發熱。不惡寒。肺痛乾嘔。十乘自汗頭痛乾嘔。桂枝乾嘔自利。生薑湯。夏裏寒外熱。

脈微欲絕乾嘔。

通脉四逆湯

咳嗽有聲血沫曰咳。太陽證罷表未解。心下有水氣。乾嘔發熱而咳。飴湯太陽發熱咳嗽。方々太陽發熱嘔噦而咳。

小柴胡湯加五味子乾姜。真武湯。少陽寒熱往來。咳嗽胸脇滿或泄利。小柴胡去參。裏寒。少陰咳嗽。真武湯。少陰腹痛。小便不利。四肢沈重咳嗽者。水氣也。

王細辛乾姜。喘太陽無汗而喘。

太陽陽明合病。胸滿而喘。俱麻邪風壅蒸而喘。雖汗而喘不已。宜再發之。麻黃杏子誤下太陽利。

不止。喘而有汗。脈促。

葛根黃芩黃連湯。太陽汗後飲多。永停而喘。小青龍湯去麻黃。加太陽下之微喘。表未解也。

停心下腎氣乘心。為悸。為喘。

桂枝甘草湯。桂枝湯去芍藥。加附子。大柴胡湯。少陰喘脈伏而逆。

煩躁太陽中風。脈浮緊發熱。亞寒身痛無汗。煩躁。

大青龍湯。桂枝湯去芍藥。加附子。桂枝湯去芍藥。桂枝湯加水。太陽汗後飲多。永停而喘。小青龍湯去麻黃。加太陽下之微喘。表未解也。

湯自汗煩躁。小便多。

桂枝甘草湯。桂枝湯去芍藥。加附子。桂枝湯去芍藥。桂枝湯加水。六七日煩不臥。

桂枝甘草湯。桂枝湯去芍藥。加附子。桂枝湯去芍藥。桂枝湯加水。少陰吐利手足厥冷。冷煩躁不飮水。

吳茱萸湯。桂枝湯去芍藥。加附子。桂枝湯去芍藥。桂枝湯加水。太陽下後復發汗。則煩躁夜則。

安靜不渴。與熱。

桂枝甘草湯。桂枝湯去芍藥。加附子。桂枝湯去芍藥。桂枝湯加水。六七日與大熱。陰盛陽陽。陽身冷脈細。煩躁不飮水。

吳茱萸湯。桂枝湯去芍藥。加附子。桂枝湯去芍藥。桂枝湯加水。陰躁欲坐中。

懊惱。

桂枝湯去芍藥。加附子。桂枝湯去芍藥。桂枝湯加水。比之煩躁。始有甚焉。汗吐下後。虛煩不眠。甚則懊惱。

桂枝湯去芍藥。加附子。桂枝湯去芍藥。桂枝湯加水。少陰病厥逆。心下悸。

桂枝湯去芍藥。加附子。桂枝湯去芍藥。桂枝湯加水。飲水多而悸。雖有多邪。亦先治水。

桂枝湯去芍藥。加附子。桂枝湯去芍藥。桂枝湯加水。少陰下利。利少。少陰下利。利少。

桂枝湯去芍藥。桂枝湯去芍藥。桂枝湯加水。少陰下利。利少。少陰下利。利少。

譜語悸動。

桂枝湯去芍藥。桂枝湯去芍藥。桂枝湯加水。太陽脈弦而渴。小柴胡加太陽表不解。有水氣而渴。小青龍去半脹下痛。手足溫而渴。

桂枝湯去芍藥。桂枝湯去芍藥。桂枝湯加水。渴或因汗下過多。太陽脈弦而渴。

桂枝湯去芍藥。桂枝湯去芍藥。桂枝湯加水。太陽脈弦而渴。

桂枝湯去芍藥。桂枝湯去芍藥。桂枝湯加水。太陽脈弦而渴。

惡風大渴白虎加湯後脈大而渴白虎加夏至左右虛煩而渴發熱不惡寒甘草乾心煩但欲寐或自利而渴少陰也陽明脈長而實有汗而渴脈沉

滑熱實煩躁而渴

大渴

口燥咽乾引飲曰渴不欲飲曰燥乾少陽邪在中焦口苦舌乾不甚渴脈弦

胡蒜口乾脈浮緊微數人參湯加陽明無大熱背忌寒口

漱水不欲嚥此證屬陽熱轉陽明身熱頭痛脈微

漱水不欲嚥必發衄

犀角地黃湯外證無寒熱漱水不欲嚥必發狂

不不止茅花湯

此畜血也桃仁承氣湯抵當湯

發狂熱毒在胃并于心神志不定而狂少風不

六七日未得汗脈洪數面赤目張大熱煩燥狂言欲走

酒湯慈苦陽毒發

狂班爛譴語

麻大刦汗多亡陽煩燥驚狂

金匱風引湯柴胡三陽熱極脈大身熱渴而狂

汗吐下後虛者人參白虎

湯加龍骨牡蠣

長砂陽毒發狂眼赤脈洪口渴

黃石血上逆則喜忘血下畜則如狂

癆重者抵當湯脈弦長而狂

調胃承陽勝陰絕

發狂譴妄面赤咽痛發班脈洪實或滑促宜酸苦之藥收陰抑陽大汗而解

生艾湯善悲苦酒

譴語

謂熱乘心神色昏妄言不休實則譴語虛則鄭聲譴語者數數便已發汗身和譴語

桂枝湯桂婦人經水過來熱

入血室譴語

胡湯譴語不惡寒反惡熱

白虎煩燥不眠梔子湯加三陽合病腹滿身重口中不和面垢譴語遺尿脈滑實

不可下渴

虎腹滿微喘口乾咽爛或不大便譴語是因火刦渴虎身熱汗出胃實譴語或下利譴語

必有燥屎承氣譴語小便利大便實小腹滿手不可近為瘀血

抵當鄭聲脈微自利厥逆渴氣虛獨言脈細弱者中理

湯

自利太陽與陽明合病自利

葛根湯加半夏太陽與少陽合病自利

黃芩湯自利而渴屬少陰

白虎湯自利下血皮少陰腎虛

客熱下利咽痛胸滿心煩

桔梗湯協熱自利脣下必熱

白頭翁湯溫毒下利膿血

桃花湯下後脈數不解自利不止心協熱當便

膿血

犀角地黃湯自利不渴屬太陰

理中自利清穀脈微白通湯

自利腹寒痛手足冷吳茱萸湯理中湯或自利不止裏寒下脫

桃花湯

鬱冒

鬱結而氣不散太陽誤下利不止復發汗表裏俱虛鬱冒清形吐下後復發汗又與水噦而冒

理中湯熟而鬱冒有

除慢湯

石脂禹

燥屎不得卧。氣湯承。

瘻瘍熱極生風。風主動故。瘻瘍則筋急而不定。汗出時蓋覆不周。腰背手足搐搦。根湯。脉浮數有風熱。防風通血不養筋。
大秦皮湯。

動氣。滅氣不調。肌膚間藥集跳動隨藏所主。而見于臍之左右上下。皆不宜汗下。中州散輕動乎。此證須手探之。切勿忽也。四旁有動氣。
保命四散。

剛痙柔痙。太陽中風重感寒痙而致也。大汗溼家汗則成痙。新產血虛汗出。傷風亦成痙。傷寒頭痛。汗出而嘔。若汗之必發。經曰。身軟足寒。頭項強急。惡寒頭熱面赤背反張。口噤脈沉細如癰。觸狀是也。若先受風復感寒無汗。惡寒為剛痙。先受風復感寒。風有汗為柔痙。仰面閉目為陽合。面閉目為陰合。浮聚數為陽。沉細齧為陰。陽痙易治。陰痙難治。通用附子。小續命湯。剛痙去麻黃。陰痙去桂心。白芍。閉目合眼。附子。防風。胸滿口噤。臥不着席。咬牙掣急。氣湯。頭項強。小腹滿。小便不利。五苓散。風盛。防風。血燥。當歸。

散。

手足厥逆。四肢冷謂之四厥。逆脈沉細。踴臥惡寒。引衣自覆。不飲水。下利清穀。逆脈不至者。通脈四逆湯。理中手足指微冷。謂之清湯。中寒。熟而厥面色不澤。用綿衣包手足温。大汗而解。急脈。五味子湯。少陰病。吐利厥逆。煩躁欲死。吳茱萸湯。厥而自熱。健中湯。人參。厥而渴者。湯白虎。厥而悸。先治其水。草湯。甘厥而惡熱。不眠。語語。白虎諸陽受氣於胸。邪客則陽氣不施。手足厥逆。脈乍緊心滿而煩。病在胸中。先吐之。瓜蒂先發熱而後厥者。手揚足擲。煩躁飲水畏熱。大便秘小便赤。憊鬱。大抵熱深厥亦深。脈沉滑。頭面有汗。指甲溫。皆伏熱也。大小承氣湯。

頭眩。上虛則眩。半表半裏表中陽虛。頭眩。渴。風家多頭眩。方同。口苦咽乾。頭眩。小柴胡湯。陽明頭眩。不惡寒能食。而歟。葛根湯。太陽病發汗。汗不止。眩冒。身瞤動。振振欲僻地。痹式。

衄血。鼻血出也。太陽病衄血及服桂枝後衄者。為欲解。犀角地脈浮大發熱下利。鼻衄乾嘔。黃芩芍藥湯。衄渴欲飲水。水入即吐。先服五苓散。次自利而愈。麻黃升。少陰病。但厥無汗。而強發之。必衄。名下厥上竭。為難治。當歸四逆湯。汗後執退真服竹葉石膏湯。桂枝後吐血。歸柏枝湯。血紫黑成塊。脈遲細。口不渴。小便血不止。新汲井水。草紙數層。貼頂上。及項脊溫則易。心止。

吐血。當汗不汗。熱毒深入。故吐血內有瘀積。桃仁承氣湯。服桂枝後吐血。歸柏枝湯。血紫黑成塊。脈遲細。口不渴。小便

蓄血太陽病不解。熱結膀胱，發狂。血自下。桂枝熱在下焦。小腹結滿，小便自利。其人如狂。桂枝仁承氣湯

地榆散

下血太陽病不解。其人如狂。熱結膀胱，血自下者愈。若不愈。桂枝 小腹急滿湯。當富湯

桃花腹滿身熱下脾血。當

小便不利已汗復下。小便不利。心煩。躁擾。太陽汗後，脈浮。小便不利。微熱而渴。桂枝 身黃。小便不利。腹微滿者。茵陳 小

便不利。大便乍難乍易。微熱有燥屎也。承氣 潮熱大便泄。小便不利。桂枝 風溼自汗。身重。小便不利。甘草附子湯 热鬱不通。

田螺殼朴梢

少加寒鬱不通。炒藍附子

腐肉如泥貼肺上。

少加寒鬱不通。炒藍附子

小便自利太陽病。小便自利。以飲水多心下悸。桂枝茯苓湯 身黃。小便當不利。今反自利。其人如狂。下焦畜血。桂枝 當熱而

小腹滿。應小便不利。今反自利畜血也。桂枝 當二便俱利。脈沉遲。渴逆。

小便數頻來而太陽汗吐後。小便數譏語。氣湯 調胃承太陽自汗四肢拘急。心煩微惡寒。小便數。

甘草乾薑湯。汗出。太陽自汗四肢拘急。心煩微惡寒。小便數。

發黃。發熱。身盡痛。面目俱黃。太陽中溼。連翹豆湯 热不去。瘀血在裏而黃。小便微利。

麻黃連翹豆湯加小便快。發黃。

五苓散 加

小便不利。四肢沉重似瘡。不欲飲。茵陳五苓湯 傷冷脈虛。小便如

常變為陰黃。理中加 下之太過。脾虛津竭。飲水自傷。此陰溼變黃。

茵陳茯苓湯 甘草四逆湯。

發斑。

熱甚傷血，裏實表虛。發為斑也。斑見紫黑者，十死一生。或陽證誤溫，或當汗當下，或汗下未解，或下早熟，邪入胃，或下還熱，留胃中，皆發斑。

汗陽毒結，熱舌卷焦黑。鼻如煙煤，狂言。

見鬼面赤。錦斑。

麻湯升麻參升麻，表證多者。

防風通聖散去硝黃 已上消散。

斑出咽痛。

雪細細

咽之。

角地黃湯。

冬暖發斑溫毒也。黑膏化毒丹 溫毒煩渴。便實腹痛。亦斑。渴氣汗下虛極發斑。

人參白朮。

連四物湯。

失汗所致。食少胃空，或髓五藏故唇口生瘡。虫食其藏，則上唇生瘡為惑虫。食其肝，則上

升麻

升麻。

升麻。

狐惑。

失汗所生，瘡為狐惑。其便齒齦聲啞惡食，面目乍赤乍白，乍黑舌上白胎，唇黑四肢沉重，喜眠。

清熱角湯。黃連犀角湯 聲啞。

湯。

多眠。

太陽脈細病多眠。外已解也。胡荽湯 尺寸沉細，但欲寐者。少陰證也。

四逆陽脈浮滑，陰脈濡弱。多汗。或發汗後身猶

灼熱。

喘息多眠。風溫也。姜桂湯

不得眠。

安眠。

破。

湯。

吐下後不眠。

解。

少陰病二三日已上。

心煩不眠。黃連解毒湯

少陰病二三日已上。

心煩。

不眠。

五苓湯。

下後復發汗不眠無表。

湯。

太陽大汗。胃乾不眠。欲飲水者。少與之。

下後渴而不眠。猪苓湯 脈浮。小便不利。不眠。

五苓下後。

復發汗。

不眠無表。

短氣呼吸短促不能接續似喘而無痛汗出不徹故短氣葛根湯加腹滿短氣邪在表為虛甘草附

利惡風不欲去衣甘草附水停心下短氣五苓散乾嘔短氣汗出不惡寒此表解裏未和湯

甘草附

太陽下之早心下硬結胸短氣大陷胸湯

短氣

胸湯

號厥藏寒飲食胃中虛冷理中丸或四逆湯九吐號而渴理中湯加大黃入蜜和之

百合病

似寒無寒似熱不熱欲食不食欲臥不助欲行不行哩哩不知所苦如見鬼狀小便赤病後失調攻下非法故成百合病通用知母粳米生薑血熱黃湯地一月不解而

漏碗清一宿煮熟浴

陰陽易

男病新瘥女與之交曰陽易女病新瘥男與之交曰陰易細考之即女勞復也有謂男病愈後因交而女病女病愈後因交而男病於理未然古今未嘗見此證也證狀體重少氣少腹裏急或引陰中拘攣就上衝胸頭重不欲舉眼中生花膝輕拘急通用燒銀散取女人裙褶近邊處剪燒灰水調方寸七日三服女病用男解新瘥後大虛因交復作並死用參至一二斤而愈者古用假鼠膽參湯調燒銀散多有古用羹湯

寒者當歸

水湯

勞復

非但強力持重若梳沐微勞反七情皆復也

脈虛者

補中益氣湯

挾外證者則謂之復非為勞也

小柴胡湯

食復

新瘥胃虛食稍多則腹滿脈虛煩熱便秘大柴胡湯輕者二陳湯

大柴胡湯

大柴胡湯

復羊肉及酒尤忌

腹滿脈虛煩熱便秘大柴胡湯輕者二陳湯

大柴胡湯

大柴胡湯

通經不解

十二日當愈不愈則再傳是為通經潮熱者實也先與小柴胡外加芒硝

大柴胡湯

大柴胡湯

汗後不解

裏或邪氣乘虛內客汗後大如瘡狀再汗之湯麻黃

大汗

大汗

汗後心下痞鞕嘔吐不和胡湯

大柴胡湯

大柴胡湯

參汗後惡熱脈實

調胃承氣湯後不可更行桂枝汗出而喘無大熱者甘草黃芩仁太陽大汗出胃乾不眠欲飲水者少

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

與之若脈浮小便不利

微熱消渴散汗後脈洪數煩渴散汗後脈滿人參湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

寒表虛也

脈細神倦芍藥甘草附子湯太陽汗出不解發熱心悸肉瞤

真武湯

真武湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加芍藥湯

寒表虛也

脈細神倦芍藥甘草附子湯太陽汗出不解發熱心悸肉瞤

真武湯

真武湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加芍藥湯

汗後不解

下後熱不去心中結痛桂枝湯下後心煩腹滿臥起不安桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

利惡寒

四逆湯後脅下悸欲作奔豚桂枝甘草湯

桂枝甘草湯

桂枝甘草湯

桂枝甘草湯

桂枝甘草湯

桂枝甘草湯

解易根湯

葛根湯黃芩根湯下心下懊憹桂枝甘草湯太陽下後脈促胸滿桂枝芍藥散汗後脈沉遲厥逆下利咽喉不利吐

桂枝甘草湯

桂枝甘草湯

桂枝甘草湯

桂枝甘草湯

桂枝甘草湯

膿血

麻黃升麻湯

升麻湯

升麻湯

升麻湯

升麻湯

升麻湯

合病

內經三經皆病不得者為合病

三經合病腹滿身重口不利譙譙遺尿不可汗下

太陽陽明合病脈浮長大便鞕小便利

脾納丸惡寒者不惡寒反惡熱大便通者白虎湯大便鞕喘而胸滿不可下

麻黃湯不下利

葛根加夏葛根加半夏湯太陽少陽合病脈浮

弦脇下鞭往来寒熱

小柴胡自下利者葛芩加半夏生薑湯

少陽陽明合病脈弦長因發汗因利小便

胃中燥實調胃承氣湯

脈長自利者為順滑而數者為負有宿食者如財也

大承氣湯

併病

經先病未盡又過經之傳為併病或始則一經後歸併於二經

一陽病衰一陽邪或歸併於二者皆併病也

太陽陽明併病太陽病發汗不徹轉屬陽明續自微汗

當利肺俞桂枝麻黃

太陽陽明復歸併太陽當再汗

湯桂枝麻黃

太陽證未罷各半湯

桂枝麻黃

太陽證罷但見陽明證者

太陽不勝陽明不負不相逆為順

少陽脈勝

當利肝膽大柴胡湯

陽明脈負鬼蜮相逆為逆

當利肝膽大柴胡湯

陽明脉裏不可東垣以氣實而感之淺者猶或可治

大柴胡湯

兩感

日傳二經陰陽俱病也表裏不可同法故曰必死

東垣以氣實而感之淺者猶或可治

大柴胡湯

並收陰陽雖同一法故曰必死

葛根加半夏湯

古胎

胎在表者舌上無胎半表半裏白胎而陽明病脇下鞭滿而端發熱汗出不大便而嘔舌上白胎者

胡湯脈陰陽

俱聚舌上滑胎

小柴胡去半夏加人參

俱聚於胃則舌黃

承氣湯

舌純也有二種皆死證也

火極似水者為熱極

大承氣湯

有水來越火者為寒極

脈證必寒

中陽子理

七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風舌燥欲飲水數升

白虎加人參湯

瘥後冷沉

因發汗不透餘毒在心胞絡也

發汗出時蓋覆不周則汗出不均腰背手足搐搦或冷或熱

牛膝散瘡後腰以下有水氣者

桂枝附子湯

寒證

脈微弱者生薑附子湯

或吐瀉脫而無脈

人服附子生薑附子湯更復手取之而無脈則絕矣

寒證

脈微弱者生薑附子湯

腹中痛甚將涼水一碗與病人飲之

其痛稍減

冷之不愈渴而大便實者下之

若小腹痛大便黑小便利身目黃者

面赤煩燥欲坐臥涼水中陰極似陽當溫之

須察脈來有力無力此為良法

寒證

脈微弱者生薑附子湯

或吐瀉脫而無脈

人服附子生薑附子湯更復手取之而無脈則絕矣

舌上有胎不拘何也用井水浸新青布拭淨後用生薑浸水括之

或以薄荷為末入蜜少許刷牙擦之

若徐黃者生

薑渣周身擦之即退

鼻衄不止山梔炒黑為末吹鼻中外用濕草紙搭於鼻準血止

熱邪傳裏服藥後將薑炒熟皮一升絹包於病人腹上熨之藥氣得熱則行易通

吐血不止韭汁磨墨呷之如無韭汁雞子清亦可赤虧人里虧水有相制之理也

陰毒昏不知人四肢如冰唇青甲黑藥不得入將葱一握束縛切去根鬚留白三寸如餅先將麝香半分填於膍內後加葱餅於上以火熨之爛即易納三餅後稍醒先灌薑汁後服薑附湯如不醒再灸關元穴三十壯不醒者必化熱邪

亢極

黃連一兩煎水一盞放井水中待冷浸新青布搭胸上稍熱即易熱勢稍減即止

夏月方用此法

服藥即吐者將生薑汁半盞熱飲吐即大抵服寒藥熱飲熱藥寒飲中和之則溫飲

傷寒死候陽證

見陰陽者死

陰陽毒過六七日者死

脈浮而滑身汗如油水漿不入喘息不休身體不仁者死

咳逆上氣散

陽反獨留體如煙薰直視搖頭心絕

汗出髮潤而喘絕

口乾黑虛寒發

脾經

元者

陽反獨留體如煙薰直視搖頭心絕

汗出髮潤而喘絕

身熱喘急

肺陽而死

大發溼家汗則瘳

熱而痙者死

發少陽汗則譫謬發少

陰汗則動血謂之下厥上竭者死

發風溫汗者死

發動氣汗者死

發厥至七八日

膚冷而躁無時暫安

口渴少陽

元者

不得汗者死

發熱脈躁疾狂言

不能食謂之三死

咳逆不止者死

藏結者死

有白胎也

舌卷囊縮者死

脈代者死

少陰吐利煩躁四逆者死

結胸證悉其煩躁者死

發厥至七八日

膚冷而躁無時暫安

元者

不得汗者死

發熱脈躁疾狂言

不能食謂之三死

咳逆不止者死

藏結者死

有白胎也

舌卷囊縮者死

脈候浮濶而緊者表實可汗

浮而緩弱表虛宜救

沈數或疾滑或沈實裏實可下

沈細微遲軟裏

脾經

與陽明合病脈長大而弦者死

陰陽易病頭重眼花四肢拘急小腹絞痛手足掌痛

難忍腹食者陰中死

少陰病厥逆無脈

與白通篇脉陽

脈陰陽俱虛熱不止者死

發厥至七八日

膚冷而躁無時暫安

脈候浮濶而緊者表實可汗

浮而緩弱表虛宜救

沈數或疾滑或沈實裏實可下

沈細微遲軟裏

脾經

虛可溫中候而數

為胃

寸口沈細無力

為陽中

尺部沈數有力

為陰中

寸脈微細陽

為脫

尺脈無力

為脫

寸脈弱者吐

為脫

尺脈弱者下

為脫

純弦之脈名曰負死脈

為重

也陰病見陽脈者生

浮數動

陽病見陰脈者死

沈滿弱緩微弱緩微

醫案

吐血不止韭汁磨墨呷之如無韭汁雞子清亦可赤虧人里虧水有相制之理也

亢極

硫連一兩煎水一盞放井水中待冷浸新青布搭胸上稍熱即易熱勢稍減即止

夏月方用此法

杜友韓氏傷寒。九日以來口不能言目不能視體不能動四肢俱冷衆皆曰陰證比余診之六脈皆無以手按腹兩手護之眉皺作楚按其趺陽大而有力乃知腹有燥屎也欲與大承氣湯病家惶懼不敢進余曰吾郡能辨是證者惟施笠澤耳延至診之與余言若合符節遂下之得燥屎六七枚口能言體能動矣故按手不及足者何以救此垂絕之證耶

休寧吳大傷寒煩躁面赤昏亂悶絕時索冷水其弟相余決死期手揚足擗難以候脈五六人制之方得就診洪大無倫按之如絲余曰浮大沉小陰證似陽也與附子理中湯當有生理日休駭曰醫者十輩至不曰柴胡承氣則曰竹葉石膏今反用熱劑烏乎敢余曰溫劑猶生涼劑立斃矣日休卜之吉遂用理中湯加人參四錢附子二錢煎成入井水冷與飲甫及一時狂躁定矣再剷而神爽服參至五斤而安文哉遺以書曰弟為俗子所誤即登鬼錄矣而兄肩接黃服之轉如閑絕舉室良號惟是治終具候目瞑而已不意兄弟毅然以為可治參附一投陰霧見光前妻相合淚微呼一日即經年乃復嗚呼父母生子兄弟再生之是天罔極莫可云喻敢誌顧木乞附案快俾天下萬世知藥不非張提命不可輕棄童何莫

同社王月懷傷寒至五日下利不止懊憹目脹諸藥不效有以山藥茯苓與之慮其脫瀉余診之六脈沈數按其脣則痛此協熱自利中有結糞小承氣倍大黃服之得結糞數枚諸症悉安

婁水張爾傷寒第二日頭痛發熱正在太陽余曰方今正月天令猶寒必服麻黃兩日愈矣若服冲和湯不惟不得汗即使得汗必致傳經遂以麻黃湯熱飲之更以滾水入浴桶置床下薰之得汗如雨密覆半日易被神已變矣至晚索粥家人不與余曰邪已解矣必不傳裏食粥何妨至明日果愈不以麻黃汗之傳變深重非半月不愈也

光祿卿其立太陽歸頭痛腹脹身重不能轉側口內不和語言譖妄有云表裏俱有邪宜以大柴胡下之余曰此三陽合病誤下之決不可救乃以白虎湯連進兩服諸證漸減更加天花粉麥門冬二劑而安

縣學師楊龍君友傷寒六日譴語狂笑頭痛有活大便不通小便自利眾議承氣湯下之余診其脈浮而大因思仲景云傷寒

四劑霍然矣

不大便六七日。頭痛有熱。小便清。知不在裏。仍在表也。方今仲冬。宜與桂枝湯。衆皆咋舌掩口。謗之甚力。以譖狂為陽盛。桂枝入口必斃矣。余曰。汗多神昏。故發譖語。雖不大便。腹無所苦。和其營衛。必自愈耳。遂違衆用之。及夜而笑語皆止。明日大便自通。故夫變病多端。不可膠執向使狐疑而用一藥。其可活乎。

內戚顧遠勞神之後。煩躁大熱。頭痛時作時止。醫者禁其飲食。與之解表。見四日熱不退。欲與攻裏。余診之曰。脈不浮緊。安得表耶。又不沈實。安得裏耶。惟心部大而濶。此勞心而虛煩。乃類傷寒。非真傷寒。禁食餓絕矣。與之粥。兼進歸脾湯。五日而安。

傷寒諸劑

麻黃湯 治太陽經脈浮濶。頭痛身疼。發熱惡寒。無汗而喘。

麻黃二錢去節桂枝錢去皮尖炒甘草錢去皮尖炒杏仁八枚去皮尖炒水盞半加生薑三片棗一枚煎八分熱服

桂枝湯 治太陽中風。發熱汗出。鼻鳴乾嘔。

桂枝 赤芍藥錢二甘草錢水盞半。生薑五片。大棗三枚。煎八分溫服。

大青龍湯 治傷寒中風。頭痛發熱。無汗煩躁。

麻黃三錢去節桂枝錢去皮尖炒甘草錢去皮尖炒石膏錢三錢水鍾半。生薑錢一錢。大棗一枚。煎八分溫服。

小青龍湯 治表不解。有水氣。發嘔欬或渴或利。或小便不利。小腹滿而喘。

麻黃 桂枝 茯苓藥錢一錢。甘草錢。乾薑細辛各五分。五味子十二粒。半夏一錢。水二鍾。煎八分服。

桂枝麻黃各半湯 治太陽脈浮緩。無汗身疼。

桂枝錢芍藥 甘草 麻黃各三錢。杏仁三錢。去皮尖炒。水四鍾。生薑錢。大棗一枚。煎二鍾。分三服。

麻黃升麻湯 治大下後。脈沈遲。脈不至。咽喉不利。厥逆。洩利不止。

麻黃八錢 升麻 當歸四錢。知母去皮。黃芩炒。葳蕤錢二錢。白朮炒。芍藥。天門冬去根。桂枝。茯苓去皮。甘草乾薑錢一錢。水四鍾。煎二鍾。分三服。

麻黃連翹赤小豆湯治熱中症身痛 治熱中症身痛