



幽癰圖



幽癰在臍上七寸

腹部

幽癰 幽癰臍上七寸生初小漸大腫硬疼癢思厚味大毒發咬牙

寒戰毒陷攻註此證生臍上七寸初起如粟漸增漫腫疼痛形如鵝

卵甚則堅硬痛牽胸肋由過食膏粱厚味憂思氣結腸胃不通大鬱

成毒自內而外發也初起腫痛皮色未紅痛若心煩嘔噦脈沉實者

當疎火毒以絕其源宜內疎黃連湯服之癰腫痛甚邪氣實也宜服

託裏散外用艾壯隔蒜片灸之脈見沉遲其膿未成用補中益氣湯託之脈見洪數其膿已成用託裏透膿湯服之

係氣血虛也急用十全大補湯溫補之外兼用臥鍼開臥鍼者斜入斜出防傷內膜也或誤行汗下或誤敷寒涼以致腫而不

潰潰而不斂者急用十全大補湯加乾薑附子以救之已潰朝寒暮熱者氣血虛也食少作瀉脾胃虛也胸痞痰湧脾肺虛也

俱服六君子湯服後諸證悉退換十全大補湯調理即愈外治之法按癰疽腫瘍清瘍門無論已潰未潰忽咬牙寒戰係氣虛

不能勝毒毒陷攻裏之兆或潰後膿水忽多忽少瘡口如蟹吐沫者係內膿已透但為逆證

託裏散 皂刺 金銀花 黃芩 牡蠣 當歸 赤芍 朴硝 大黃 花粉 連翹 各等分 共研粗末每用五錢

酒水各一鍾煎八分去渣服 方託裏散醫諸瘡毒腫甚癰疽前服消定刺銀花芍牡蠣歸芍硝黃花粉麴

內疎黃連湯 見癰 隔蒜灸法 見前部 託裏透膿湯 見頭部 補中益氣湯 十全大補湯 六君子湯 見前部

見清 癰門

中脫疽 中脫疽由胃火生臍上四寸隱隱疼癢硬漫腫無紅熱不食嘔噦毒內攻註此證一名胃疽發於心胸之下臍上四

寸任脈經中脫穴隱痛日久向外生疽堅硬漫腫皮色無紅無熱由過食炙博以致胃腑火毒而成人迎脈盛是毒氣攻裏作

嘔不食咳噦膿痰者逆初宜服仙方活命飲色紫堅硬宜服山甲內消散膿毒將成內外治法俱按癰疽腫瘍清瘍門若起長

# 中脘疽圖



中脘疽在臍中

# 癰疽圖



癰疽在臍三寸

# 衝疽圖



衝疽在臍上三寸

膿遲或瘡不嫩痛者急用艾壯隔獨頭蒜片置患上灸之回陽

山甲內消散 穿山甲<sup>三片</sup> 當歸尾 大黃 甘草節<sup>各三錢</sup> 土

木鱉<sup>仁</sup> 黑牽牛 殭蠶<sup>各一錢</sup> 酒水各一鍾煎八分空心服渣

再煎服大便秘三四次方食稀粥淡味調理

色紫堅硬中脘疽歸尾大黃殭蠶節木鱉牽牛加酒宜服仙方活命飲

見腫

癰疽 癰疽七情鬱火成臍上三寸粟微紅暴腫焮痛二七潰頂陷

色黃潰遲凶<sup>註</sup>此證由七情鬱火凝結而成生臍上三寸屬任脈經

建里穴初如粟未瘡痛相兼其腫迅速寒熱往來甚則嘔噦牽引臍

痛初腫微紅頂尖根求漸透赤色時痛時止十四日潰膿者順若頂

陷紫黑根脚漫腫面赤大渴脈見浮數而散大者逆內治與幽微參

攷外治法按癰疽腫瘍潰瘍附

衝疽 衝疽臍上三寸生心火毒熾入腎紅高腫焮痛速清吉者見

七惡定然凶<sup>註</sup>此證生於任脈臍上二寸下脘穴一名中脘疽又名

瘰癧瘡由心火熾盛流入腎經而成色赤高腫應在二十一日潰破

膿稠受補者順初宜瘡科流氣飲或仙方活命飲消之膿將成時內

外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍附其證若平塌紫黑膿水清稀七惡證

見者逆 瘡科流氣飲<sup>見背部</sup> 仙方活命飲<sup>見腫</sup>

臍癰<sup>附臍中出水</sup> 臍癰毒發在臍中腫大如瓜突若鈴無紅無熱宜蒜炙調膿為吉污水凶<sup>註</sup>此證由心經火毒流入大腸小腸所致生於臍中屬任脈經神關穴此穴禁鍼腫大如瓜高突若鈴無紅無熱宜隔蒜炙之初宜服仙方活命飲加升麻消之

# 臍癰圖

臍癰生在臍



逆

便結實者內疎黃連湯通利之將欲成膿內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門潰後得稠膿者順時出污水臭穢者逆亦有臍中不痛不腫甚瘡時津黃水此屬腸胃滯熱積久宜服黃連平胃散外用三妙散乾撒溲濕即愈當忌酒麪生冷果菜不致再發若水出不止者亦屬

黃連平胃散

黃連錢五

陳皮

厚朴各三錢

甘草二錢

蒼朮一兩

共研細末每服三錢白滾水調服

歌黃連平

胃散陳甘厚朴蒼朮共細研專除濕熱消積能令臍水立時乾

三妙散

檳榔

蒼朮生

黃蘗各等分

共研細末乾撒肚臍出水津淫成片止瘡溲濕又治濕癰以蘇合油調塗甚效

三妙散用檳榔蒼朮黃蘗同研

治濕癰蘇合油調治濕癰收乾止瘡甚稱強

隔蒜灸法

見首卷

仙方活命飲

內疎黃連湯

俱見腫

癰門

# 少腹疽圖

少腹疽



少腹疽

少腹疽生臍下邊證由七情火鬱經高腫紅疼痛背易漫

硬爛腐水膿艱

此證由七情火鬱而生每發於氣海丹田關元三

穴氣海在臍下一寸五分丹田在臍下二寸關元在臍下三寸皆屬

任脈經此三穴或一穴發腫即為少腹疽高腫紅活疼痛牽背易潰

稠膿者易治若漫腫堅硬綿綿潰腐爛膿稀如水者難治凡遇此證初

起急用艾灸腫頂七壯以痛癢通徹為度宜服仙方活命飲氣實之

人大渴便秘者宜服內疎黃連湯通利之老弱之人宜服內補十宣散令其速清若清遲恐透內膜外治宜同癰疽腫瘍潰瘍

門

仙方活命飲

內疎黃連湯

俱見腫

癰門

內補十宣散

見胸節

逆癰

腹皮癰

腹皮癰生腹皮內皮裏膜外腫隱疼腹痛不止膿成候證由膏粱鬱火生

此證生於腹皮裏膜外無論左右隱疼

此證生於腹皮裏膜外無論左右隱疼

此證生於腹皮裏膜外無論左右隱疼

此證生於腹皮裏膜外無論左右隱疼

此證生於腹皮裏膜外無論左右隱疼

此證生於腹皮裏膜外無論左右隱疼

此證生於腹皮裏膜外無論左右隱疼

此證生於腹皮裏膜外無論左右隱疼

此證生於腹皮裏膜外無論左右隱疼

此證生於腹皮裏膜外無論左右隱疼

此證生於腹皮裏膜外無論左右隱疼

此證生於腹皮裏膜外無論左右隱疼

腹皮癰圖



腹皮癰左右皆同

雙解膏金丸

見腫痛門

託裏透膿湯見頭部侵腦疽

日久後發癰腫於皮外右關脈見沉數而腹痛甚者是其候也由膏火鬱而成初起壯實者用雙解膏金丸下之虛弱者減半用之不應再服半劑凡下之後腹痛不止膿將成也急用託裏透膿湯清後與癰疽潰瘍門治法相同不可過用剋伐之劑若希圖消散過傷胃氣則腫不能潰潰不能斂立見危亡矣

緩疽圖



緩疽在少腹之旁

蒜搗爛鋪於患上又壯灸之以知熱為止次日再灸以或消或潰為效若潰後即按癰疽潰瘍門治法  
山甲內消散脫疽中十全大補湯

緩疽 緩疽脾經氣積凝少腹旁生堅又疼數月不潰生寒熱食少削瘦致難成註此證由太陰脾經氣滯寒積而成生於少腹之旁堅如石不紅不熱痛引腰腿數月不潰若兼食少削瘦者屬敗證但不可棄而不治初宜服山甲內消散不應不可強消徒損胃氣以十全大補湯加烏藥附子胡蘆巴溫補之外用木香餅熨之兼用獨頭

腋癰圖



腋癰生在肱腋窩居中左右皆同

腋部

腋癰 腋癰暴腫生腋間腫硬焮赤痛熱寒肝脾血熱兼忿怒初宜清解潰補痊註此證一名夾肢癰發於腋際即俗名脫肢窩也屬肝脾血熱兼忿怒而成初起暴腫焮硬色赤疼痛身發寒熱難消必欲作膿初宜服柴胡清肝湯外敷冲和膏疼痛日增宜服透膿散如金

銀花甘草節桔梗脹痛者鍼之已潰內外治法俱按癰疽潰瘍門此證首尾忌用寒涼中年易愈老弱之人難痊

柴胡清肝湯見頭部冲和膏透膿散俱見腫痛門

# 腋疽圖



腋疽生在腋腋窩處堅硬清道宜開

腋疽 腋疽初起若核形肝脾憂氣血凝漫腫堅硬宜發大日久紅熱潰先疼此證一名米疽又名痰疽發於腋窩正中初起之時其形如核由肝脾二經憂思患氣結血滯而成漫腫堅硬皮色如常日久將潰色紅微熱疼痛也初宜艾壯隔蒜片灸法內服柴胡清肝湯如烏藥消之虛弱之人宜服香貝養榮湯外用烏龍膏敷之

早治或有全消者遲則膿成宜服託裏透膿湯膿脹痛者鍼之膿出痛減隨患者虛實補之其餘內外治法俱按癰疽清癰

此證初終內外治法禁寒涼中年易愈老難痊

隔蒜灸法見首卷

柴胡清肝湯見頭部

香貝養榮湯見頭部

烏龍膏見腫

託裏透膿湯見頭部

# 黯疔圖



黯疔生在肘腋堅硬色紫按之如針頭

# 肋疽圖



肋疽在肋條骨間堅硬色紫腫大如盤

黯疔 黯疔藏於腋下生肝脾火毒癰結腫形紫痛極甚如盤急宜鍼破免內攻此證生於腋下由肝脾二經火毒而成堅硬者釘頭瘡而且痛寒熱往來四肢拘急其色紫黑煩燥作嘔痛引半身宜麥靈丹其次內外急按疔門治之即愈

麥靈丹見腫瘍門

# 肋部

肋疽 肋疽始發屬肝經火毒鬱結結腫形紫痛極甚如盤急宜鍼破免內攻此證因名夾熱疽生於肋條骨間由肝經火毒鬱結結聚而成初如梅子漸大如盤色紫微痛連及肩肘患在左痛掌右肋患在右痛掌左肋二十一日之內膿潰稠黏者順屆期不清既潰出清水者逆初腫急宜磁鐵吸出紫血庶免毒氣攻裏後赤腫痛甚煩燥脈實作嘔為有餘之證

宜服雙解貴金丸下之腫硬不清宜服透膿散脈弱作嘔此胃虛也宜服香砂六君子湯補之亦有痛傷胃氣而作嘔者即同胃虛治之若感受寒邪及傷觸穢氣而作嘔者雖腫時尤宜壯胃助氣為主蓋腫時作嘔因毒氣內侵者十有一二停飲內傷者十有八九惟醫人臨證詳辨之膿熟用臥鍼開之餘按癰疽清瘍門治法雙解貴金丸 透膿散 俱見腫瘍門 香砂六君子湯

淵疽圖



淵疽在腹下三寸堅硬不紅

凡肋胸脇腰腹空軟之處發癰疽者當在將潰未潰之際多服護膜散可免透膜之患  
護膜散 白蠟 白芨 等 共研細末輕劑一錢中劑二錢大劑三錢黃酒調服米湯亦可

方護膜散內二味藥白蠟白

艾為細末或酒或以米湯調將膜預服不透膜

內發丹毒圖



內發丹毒生於肋脅及腰脇色赤如霞游走如雲

內發丹毒 丹毒肝脾熱極生肋上腰脇赤霞形急宜破出紫黑血嘔穢昏脹毒內攻 註此證由肝脾二經熱極生風所致生於肋脅並瘦腰脇色赤如霞游走如雲痛如火燎急向赤腫周圍破出紫血以次牛肉片貼之羊肉片亦可其毒即可減半初服雙解貴金丸汗之紫次服化斑解毒湯投方應病者順若嘔穢昏憤胸腹腫脹偏身青

者則為毒氣內攻屬逆

化斑解毒湯 升麻 石膏 連翹 法 牛蒡子 炒研

人中黃 黃連 知母 黑參 各一 竹葉二十片水二鍾煎八分

服 歌方化斑解毒熱生風致發丹毒雲片紅升膏翹麥中黃等黃連知母黑參同

# 脇癰圖



清肝湯解鬱滯火如已成者服託裏透膿湯見頭部侵腦症  
補不應者難治

柴胡清肝湯見頭部侵腦症  
託裏透膿湯見頭部侵腦症

# 五臟六腑



# 諸募穴圖



## 內癰部

肺癰 肺癰肺熱復傷風肺臟生癰隱痛胸狀若傷寒燥欬甚稠濁痰涎腥臭膿未潰射干麻黃汁壅不得臥亭慈攻潰後稠膿能食吉膿清兼血不食凶此證係肺臟蓄熱復傷風邪鬱久成癰以致胸內中府穴隱隱疼痛振寒脈數狀類傷寒咽燥不渴欬而喘滿唾稠黏黃痰兼臭穢膿血也治之者於未潰時乘膿未成風鬱於表者法宜疎散用射干麻黃湯以汗之如氣

脇癰 脇癰微紅高腫疼痛堅塌漫冷不紅皆屬肝膽怒火結滯潰敗漿冷虛凶此證生於軟肋有硬骨者為肋肋下軟肉處為李脇癰疽二證皆由肝膽怒火凝結而成多生於體虛之人初如梅子漸長如盤如盆色紅微痛高腫二七潰破膿稠為癰若堅硬平塌漫腫木痛不紅不熱月餘潰破稀膿為疽若失治屆期不清攻擊成膿腫如鼓脹破出敗膿腥臭膿者逆癰疽二證初腫時俱宜急服柴胡

壅喘滿身不得臥者急服葶藶大棗湯以瀉之如效有微熱煩滿胸中甲錯膿欲成者宜千金葶藶湯以吐之若吐膿腥臭形如米粥者宜桔梗湯以排餘毒若吐膿腥臭效而胸滿者宜外臺桔梗白散以開寒塞若咯吐膿血兼午後身熱煩燥宜金鯉湯主之兼飲童便若清後胸脇肋膈痛不止口燥咽乾煩悶多渴自汗盜汗眠臥不得效吐稠痰腥臭此係癰膿不盡而裏虛宜葶藶根湯主之若癰膿已清喘滿腥臭濁痰俱退惟效嗽咽乾咯吐痰血脇肋微痛不能久臥者此屬肺癰潰腐未斂宜紫苑葶藶湯清補之渴甚去生夏加石膏服之若癰膿潰後咳嗽無休膿痰不盡形氣虛羸者宜清金葶藶丸主之凡治此證惟以身溫脈細膿血交粘痰色鮮明飲食甘美膿血漸止便潤者為吉若手掌皮粗滑後六脈遲數氣急顙紅汚膿白血懶食及大便秘結燥者為凶中府穴又名肺募在乳上第三根肋骨間

射干麻黃湯

射干十三枚

麻黃

生薑各四兩

細辛

紫苑

款冬花各三兩

大棗七枚

五味子

半夏各半

水煎溫

服

射干麻黃散上氣肺癰喉中水雞聲射干生薑辛芫夏五味大棗並款冬

葶藶大棗湯

苦葶藶輕者五錢重者一兩

大棗輕者五枚重者十枚

以水三鍾煎至一鍾服之

葶藶大棗治肺癰效不得臥有膿膿

葶藶苦寒瀉實熱佐東之甘和胃經

千金葶藶湯

葶藶二升

薏苡仁炒

瓜瓣各半升即冬小仁

桃仁五十粒去皮尖炒研

水煎服

千金葶藶肺癰效微熱煩滿吐敗濁

皮膚甲錯宜葶藶薏苡桃仁瓜瓣合

桔梗湯

苦桔梗

甘草二兩

水煎服

桔梗湯用排餘膿肺癰吐膿未斂形清熱解毒須甘草開提肺氣桔梗功

外臺桔梗白散

苦桔梗

貝母各三分

巴豆一分去皮

右三味為散強人飲服半錢七羸者減之病在膈上者吐膿在膈

下者瀉出若下多不止飲冷水一盃則定外臺桔梗白散方肺癰便閉服之良桔梗貝母與巴豆藥微力大功速強

金鯉湯

金色活鯉魚一尾約四兩重

貝母二錢

先將鯉魚連鱗剖去肚腸勿經水氣用貝母細末糝在魚肚內線紫之用上白

童子便半大盃將魚浸童便內重湯炖煮魚眼突出為度少頃取出去鱗骨取淨肉浸入童便內炖熟肉與童便作三次

一日食盡一枚其功效甚捷

金鯉湯中效平稀法同貝母活鯉魚童便浸魚重湯炖肺癰煩熱兼能醫

寧肺桔梗湯

苦桔梗

貝母法

當歸

枯葶仁研

生黃耆

枳殼煨

甘草節

桑白皮炒

防己

百合法

薏苡

葶藶

大棗

水煎溫

各八 五味子 地骨皮 知母生 杏仁研 苦薏各五 水二鍾薑三片煎八分不拘時服 效甚倍加百合身

熱加柴胡黃芩 大便不利加蜜炙大黃一錢 小水滯滯加燈心木通 煩燥痰血加白茅根 胸痛加人參白芷歌

寧肺桔根肺癰瘡歸身黃甘桑皮防己百合等五味杏仁地骨宜

紫苑耳湯 紫苑耳 犀角末 甘草炙 人參各五 桑葉用經 款冬花 百合法 杏仁研 阿膠便潤妙用 貝母

法 半夏炙 蒲黃各五 引薑三片水二鍾煎八分將犀角末調入食後服 歌紫苑耳湯參犀角款冬桑葉杏 合阿

膠甘夏貝蒲黃並醫肺癰不久臥

清金盃肺丸 陳皮 白茯苓 苦桔梗 貝母法 人參 黃芩各五 麥冬法 地骨皮 銀柴胡 川芎 白芍炒

胡黃連各六 五味子 天冬法 生地酒浸 熟地搗 歸身 白朮各一 甘草三錢 右為細末煉蜜為丸如梧桐

子大每服七十九食遠白滾湯送下 歌清金盃肺丸肺癰陳皮桔貝參二冬柴桑歸芍黃連草木味生熟地骨芍

大小腸癰 大小腸癰因濕熱氣滯瘀血注腸中初服大黃行瘀滯膿成意以牡丹平註此二證俱由濕熱氣滯凝結而成或

努力瘀血或產後敗瘀蓄積流注於大腸小腸之中初起發熱惡風自汗身皮甲錯關元天樞二穴隱痛微腫按之腹內急痛

大腸癰多大便墜腫小腸癰多小水澀滯脈俱遲緊此時癰膿未成宜大黃湯下之瘀血利盡若小水閉澀仍宜大黃湯加琥

珀末木通利之自效若癰成日久不潰身皮甲錯內無積聚腹急腹痛身無熱而脈數者脘腸內陰冷不能為膿宜意以附子

散主之若脈見洪數壯膈高突腹痛脹滿不食動轉側身則有水聲使淋刺痛者癰膿已成宜意以湯主之腹瀉而痛少腹急

脹時時下膿者毒未解也宜丹皮湯治之如膿成膈出腹脹不除飲食減少面白神勞此屬氣血俱虛宜八珍湯加牡丹皮肉

桂黃耆五味子斂而補之患者轉身動作宜徐緩而勿驚慎之如就延日久因循久治以致毒攻內藏腹痛牽陰腸胃受傷或

致陰器腐爛色敗無膿每流活水衾幃多臭煩燥不止身熱盜汗俱屬逆證關元穴又名小腹募在臍下三寸天樞穴又

名大腸募在臍旁開二寸

大黃湯 大黃炒 牡丹皮 硝石研 芥子 桃仁炒先以湯浸去 右各等分共剉碎每用五錢水二鍾煎至一鍾去渣

空心溫服以利下膿血為度末利再服 歌大黃湯善治腸癰少腹堅痛膿未成牡丹皮與大黃炒芥子桃仁硝石靈

外科要訣

薏苡附子散 附子二錢

敗醬五錢 薏苡仁一錢

右為末每服方寸匕以水二合煎頓服小水當下三因薏苡附子同

前敗醬用一兩一分每服四錢水煎至七分去渣空心服方意薏苡附子散申錯腸癰腹脹痛脈數附子敗醬薏苡仁

為末水煎空心服

薏苡湯 薏苡仁

括蕒仁各三錢

牡丹皮

桃仁各二錢

水二鍾煎至一鍾不拘時服方意薏苡湯治腹水聲腸癰便淋刺

痛疼牡丹皮共括蕒子還有桃仁薏苡仁

丹皮湯 丹皮

括蕒仁各一錢 桃仁二錢 朴硝二錢

大黃五錢

水二鍾煎一鍾去渣入硝再煎數滾不拘時服方意丹皮

湯瘡腸癰證腹濡而痛時下膿硝黃丹蕒桃仁共水煎服之有奇功

八珍湯見潰瘍門

胃癰 胃癰中脘穴腫疼不飲不噉吐血膿飲食之毒七情火候治腸癰大法同註此證初起中脘穴必隱痛微腫寒熱如瘡

身皮甲錯並無痰嗽咯吐膿血由飲食之毒七情之火熱聚胃口成癰脈來沉數者初服清胃射干湯下之若脈滑滯者瘀血

也宜服丹皮湯下之脈洪數者膿成也赤豆薏苡仁湯排之體倦氣喘作渴小水頻數肺氣虛也補中益氣湯加參冬五味子

補之其候證生死治法與大小腸癰同中脘穴又名胃募在臍上四寸

清胃射干湯 射干

升麻 犀角 麥冬各一錢 元參 大黃 黃芩各一錢

芒硝

梔子 竹葉各五錢

水煎服

方意清胃

射干湯射干升麻犀角麥冬參冬大黃芒硝等竹葉山梔胃癰痊

赤豆薏苡仁湯 赤小豆 薏苡仁

防己 甘草各等分

水二鍾煎八分食遠服方意赤豆薏苡湯最神甘己赤豆薏苡仁

胃癰膿成脈洪數二鍾水煎服八分

丹皮湯視大小

補中益氣湯視大小

脾癰 脾癰濕熱瘀血凝章門穴腫兼隱腹脹嘔乾小水短利下濕瘀補收功註此證始發章門穴必隱疼微腫由過食生

冷兼濕熱或瘀血鬱結脾經而成令人腹脹嘔乾燥小水短忍初宜大黃湯赤豆薏苡仁湯二方合而用之以攻滯鬱二便利

通腹脹全消宜六君子湯扶脾調理順逆看法與胃癰同章門穴又名脾募在臍旁開六寸高上二寸

大黃湯見大小

赤豆薏苡仁湯見胃

六君子湯即香砂六君子湯去藿香砂仁

見清濁門

肝癰 肝癰憤鬱氣逆成期門穴腫更兼疼臥驚怯滿溺不利清肝滋腎即成功註此證始發期門穴必隱痛微腫令人兩脇

脹滿脇痛側臥則驚為便溺艱難由憤鬱氣逆而成初服復元通氣散次服柴胡清肝湯脇脹已止宜服六味地黃湯脾虛食少

則佐以八珍湯滋腎補脾治之取效禁用溫補鍼灸期門穴又名肝募在乳旁一寸半再直上一寸半

復元通氣散見腫滿門 柴胡清肝湯見頭部髮頂 六味地黃丸見面部雀斑 八珍湯見清濁門

心癰 心癰巨關腫隱疼酷飲嗜熱火毒成面赤口渴身作痛治法陽熱總宜清註此證始發巨關穴必隱痛微腫令人寒熱

身痛面色赤口渴渴隨飲隨乾由心火熾盛更兼酷飲嗜熱而成宜服涼血飲酒毒為病者宜服升麻葛根湯治之此證甚屬罕

有但治法不可不備巨關穴又名心募在膺上六寸五分

涼血飲 木通 狸麥 荊芥 薄荷 白芷 花粉 甘草 赤芍 麥冬註此證始發巨關穴必隱痛微腫令人寒熱

引用燈心若潮熱加淡竹葉水煎溫服方涼血飲善治心癰瞿刺荷並草翹通赤芍山桅乾生地車前花粉麥門冬

升麻葛根湯 山桅 升麻 葛根 白芷 柴胡 黃芩各一錢 黃連 木通 甘草各五 水二鍾煎八分不拘時服

方升麻葛根湯山桅酒毒心癰黃連宜柴胡通赤升葛草水煎溫服不拘時

腎癰 腎癰胃經不足生京門微腫隱疼少腹脇下腫脹滿房勞形寒邪外乘註此證始發京門穴必隱痛微腫令人寒熱

往來面赤不渴少腹及脇下腹脹塞滿由腎虛不足之人房勞太過身形受寒邪氣自外乘之初服五積散加細辛寒盡痛

止寒用桂附地黃丸調理京門穴又名腎募在身側腰中監骨肋下間

五積散 蒼朮二錢 陳皮 桔梗 川芎 當歸 白芍各一錢 麻黃 枳殼各一錢 桂心 乾薑 厚朴各一錢 白芷 半

夏各一錢 甘草 茯苓各四 引薑一片水二鍾煎八分不拘時服 頭痛惡寒者加蓮鬚葱頭三個蓋臥汗出甚效

方五積散蒼朮陳皮麻黃半桔歸芍芎芷朴桂心乾薑枳殼附子服成功

桂附地黃湯見清濁門

三焦癰 三焦癰由濕熱凝石門穴上腫隱痛寒結治同腸癰法內癰俱係膜內生註此證始發石門穴必隱疼微腫令人寒

即集醫書示金鑑

外科要訣

熱往來二便秘澀由濕熱遇寒凝結而成治法與大小腸癰同凡內癰俱係膜內成患外皮不腐石門穴又名三焦募在臍

下二寸

內癰總論 凡人胸腹有十一募募者各臟腑陰會之所也靈樞云發內癰內疽者其本經募上內必浮腫募中必時時隱痛浮腫為癰隱痛為疽此即內癰內疽之驗也茲內癰有治法內疽無治法何也蓋內癰內疽其病原無殊惟在根淺根深之別耳根淺為癰根深為疽若臨證用藥攻補得宜無不收效至募有十一而內癰僅九證者何也蓋臍府形如膜皮無出無納汁清氣聚不生內癰內疽若夫膀胱亦如膜皮中惟濁水故古今書籍並無講及內癰內疽者是以未敢詳載雖然中極穴即膀胱穴也今人間有中極穴或浮腫或隱痛者所見證候皆同小腸癰治法亦當按小腸癰治之可也俟後之學者留意焉

卷八

編輯外科心法要訣

肩中疽圖

肩中疽生肩平處左右皆同



過肩疽圖

過肩疽生在肩後廉左右皆同



乾疽圖

乾疽生在肩前廉左右同



肩部

肩中疽 乾疽 過肩疽 肩疽癰發正肩中疽硬

黑陷癰腫紅乾疽肩前過疽後風濕積熱血瘀凝註此疽生於肩中廉屬三焦膽二經紅活高腫一名疔癰堅硬平塌為肩中疽肩之前廉屬大腸經名乾疽一名疔疽肩之後廉屬

小腸經名過肩疽瘡無無論大小惟在發源之處命名總由濕熱風邪鬱成亦有負重瘀血凝結而成高腫紅活極熱速消者順若干塌堅硬無紅無熱清遲者險甚則腫痛連及臂肘口噤寒戰大痛不食或兼綿潰便瀉者逆治法初起有表證者俱宜荆防敗毒散汗之有裏證者內疎黃連湯下之汗下後腫痛不退膿勢將成宜用託裏透膿湯膿熟開之至於引經之藥惟在臨證時因經加之清後內外治法俱按癰疽潰瘍門

荆防敗毒散

見項部

內疎黃連湯

見腫

託裏透膿湯

見頭部

侵腫疽

# 膠疽圖



膠疽在肩之后下腋之後外層岐骨縫間左右皆同

# 肩風毒圖



肩風毒生在肩稍骨縫中左右皆同

膠疽 肩風毒 膠疽肩後腋外生小腸肩貞風火凝肩風毒生臈端上大腸肩鵠風濕成註 膠疽生於肩之後下腋之後外微上歧骨縫之間經屬小腸肩貞穴由風火凝結而成初起如粟堅硬腫痛肩鵠拘急不能舉揚初服荆防敗毒散便煙膏者服雙解貴金丸雙解之肩風毒生於肩稍鵠上骨尖處經屬大腸肩鵠穴由邪風濕熱骨縫與濕積留化熱而成初起宣腫色赤大者如桃小者如杏痛連肩腫更兼拘急初服蠲痛無憂散汗之即消若腫痛日深不能盡消者膿勢將成也宜服託裏透膿湯二證清後內外治法俱按癰疽潰瘍門

蠲痛無憂散

番木鱉香油煤浮

當歸酒

甘草

各二兩

穿山甲

陳土炒

川烏

黑豆酒煮去皮尖

草烏

薑汁煮

靈

半夏各二兩

威靈仙

一兩

以上諸藥

各製為末

共和平

每服五七分

至一錢

無灰酒調服

再飲酒以醉為度

益

臥出汗避風此方如關羊花四兩亦治頭風痛

方

蠲痛無憂散

肩風毒

風濕骨縫與濕凝

番黃歸草

麻黃甲

川草烏

蒼土威

荆防敗毒散

見項部

雙解貴金丸

見腫瘍門

託裏透膿湯

見頭部

侵腫疽

外科要訣

# 樂疽圖



樂疽生在肩前下腋前外之上  
骨絡開合空凹陷中左右皆同

神授衛生湯見腫

託裏透膿湯見頭部  
侵腦疽

十全大補湯見潰  
瘍門

# 臈癰圖



臈癰在肩之下肘之上週匝漫腫  
色赤裡外廉俱生左右臈同

臈部自肩至肘曰臈

臈癰附篇包毒

臈癰肩肘周匝腫色赤焮痛癰疽癰癰包毒狀鴨鵝卵臈內三陰外三陽註此證由風溫或風火凝結而

成生於肩下肘上周圍漫腫色赤焮癰初起狀如粟米一積亦有起一粒癰瘡者漸次焮腫紅熱癰腫痛甚紅腫之外無軍  
者順有二暈者陰三四暈者逆臈發臈內或臈外結腫一枚如桃如鴨鵝卵者名臈包毒毒者癰之輕證也臈癰臈包內外治  
法俱按癰疽腫瘍門此癰毒禁由之處若在臈者屬手三陰經在臈外者屬手三陽經隨證用引經之藥必然獲效  
魚肚發魚肚發如魚肚形青靈穴生心火凝暴腫紅活焮熱痛癰疽治法即成功註此證生於臈之後垂肉處屬心經青靈  
穴由大毒凝結而成暴腫色赤焮熱疼痛形如魚肚腫潰治法俱按癰疽腫瘍清瘍門其引經之藥惟在臨證加之

# 藉包毒圖



藉包毒生在臈部不拘裡外廉俱可以生

樂疽 樂疽肩前腋上生骨縫開合凹陷中堅如鵝卵痛入骨包絡  
血熱氣鬱成註此證生於肩前腋之上骨縫開合空凹陷中初起如  
椒子漸腫堅硬大如鵝卵按之疼痛入骨屬包絡經血熱氣鬱而成  
其證屆期潰破出稠膿腫消者順月餘不潰既潰出清水腫硬不退  
者逆初宜服神授衛生湯若惡風太過倍加葱白汗之次服託裏透  
膿湯潰遲者十全大補湯潰後內外治法俱按癰疽潰瘍門

魚肚發圖



魚肚發在臍部之後垂肉處嫩腫赤色

石榴疽圖



石榴疽生在肘尖之上寸餘  
臂色紫左右肘同

石榴疽 石榴疽起肘尖上粟胞根開堅腫疼破翻如榴寒熱甚三焦相火與濕凝註此證生於肘尖上寸餘屬三焦經天并  
穴初起黃粟小胞根脚伸覺開太色紅嫩腫硬硬疼痛腫如覆盆破翻如榴寒熱如瘡由三焦相火與外濕相搏而成初起宜  
蟾酥九汗之外以艾炷九壯貼蟾酥餅用萬應膏蓋之破腫處敷冲和膏服菊花清燥湯煩燥甚者服護心散九日後作稠  
膿痛減喜食者量證俱退者順反此者逆破後用菊花煎湯洗之次以菊花燒灰存性加輕粉少許兌勻敷之神效至透膿  
脫腐生肌時內外治法俱按癰疽潰瘍門

菊花清燥湯 甘草花錢 當歸 生地 白芍 酒 川芎 知母 貝母 研心 地骨皮 麥冬 各一錢 柴胡 黃芩

升麻 犀角 錢 甘草 各五分 竹葉二十片 燈心二十寸 水二鍾煎八分 食遠溫服 方菊花清燥石榴疽腫硬嫩紅痛

可醫四物柴芩知貝草升麻地骨麥冬摩

蟾酥丸 蟾酥餅 即蟾酥丸料 煎成餅見行癰門 冲和膏 護心散 俱見腫瘍門

肘癰圖



肘癰生在肘之圓透赤腫左右皆同

肘癰 肘癰發於肘圓繞高腫嫩熱赤紅疼心肺積留風邪火勢小  
為癰大為癰此證生於肘之圓繞暴發高腫嫩熱色紅疼痛由心  
肺風火之邪積留凝滯而成形勢小者為癰毒形勢大者為癰初服  
荆防敗毒散汗之次服白芷升麻湯清託之外敷二味拔毒散將潰  
治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

白芷升麻湯 白苓 二錢 半生 連翹 二錢 去心 黃耆 三錢 白芷 八分 升麻 桔梗 各五分 紅花 酒 甘草 各三分 酒水 各一

鍾煎八分食遠熱服  
方白立升麻醫腫疼解熱除煩託肘癰  
 荊防敗毒散見項部腦疽  
 七味拔毒散見腫瘍門

臂癰圖



臂癰亦腫臂疽堅硬不拘臂之裡外廉皆可以生  
左右皆同

臂部自肘至腕曰臂

臂癰附風 臂癰臂疽繞臂生平紫硬疽紅腫癰榮衛風邪逆肉由甚則拳縮徹骨疼此證生臂外側屬三陽經臂裏側屬三陰經高腫紅活焮痛潰速者為癰平陷紫暗堅硬木痛潰遲者為疽但由榮衛不週感受風邪逆於肉裏而成初起形如粟粒憎寒壯熱宜服荊防敗毒散汗之焮痛煩熱宜服白立升麻湯消之膿勢將成宜服託

裏透膿散膿熱鐵之若疽證木痛無紅無熱此屬氣血兩虛無論已清未清宜服十全大補湯託之潰後內外治法俱按癰腫

癰潰瘍門若拳縮筋不能舒發痛徹骨者係清深傷脈也屬逆  
 荊防敗毒散見項部腦疽  
 白立升麻湯見臍部肘癰

託裏透膿湯見頭部侵腦疽  
 十全大補湯見潰瘍門

腕癰圖



腕癰生在手腕背面高腫色紅左右皆同

腕疽圖



腕疽生在手腕裡面橫紋則稍動脈之間左右同

腕癰 腕癰三陽風火凝手腕背面結癰形高腫速潰順易治腐爛露骨逆難功此證生於手腕背面屬手三陽經由風火凝結而成高腫紅活在十四日潰破膿出痛減者順而易治手腕乃皮肉淺薄之處若遷延日久不潰或潰腫平塌所潰腐爛露骨者逆難於收功初服荊防敗毒散汗之外用太乙紫金錠敷之膿成將潰即按癰疽腫瘍潰瘍門治法  
 荊防敗毒散見項部腦疽  
 太乙紫金錠見胸部脾發疽