



編輯雜病心法要訣

中風總括 風從外中傷肢體發火內發病心官體傷不仁與不用心病神昏不語言當分中絡經府藏更審虛實寒熱四肢證撤手為脾絕閉口眼合是心肝遺厥督絕軒聾肺閉證握固緊牙關閉以通關先取嚏痰壅不下吐為先証風謂虛邪賦風從外而中傷人四肢軀體故名曰中風發火謂痰火從內而發病人心主之官故名曰痰火體中風邪輕則頭麻不仁重則瘓瘻不用心病瘻火輕則舌強難語重則瘻難神昏此證或內或外單病輕兼病重當細辨其中絡中經中府中藏及中經絡中府藏併細審其兼虛兼實兼寒兼熱兼瘻與夫脫證閉證之淺深緩急而治之凡初中宜先用通關散取嚏有嚏可治無嚏多死口噤者用開闢散擦牙軟之痰涎壅盛用諸吐法涌之若口噤不開湯藥不能下咽者則將應服之藥隨引調如麪茶含在不病人口內用葷管或筆管插入病人鼻孔使氣運藥吹之其藥自能入咽不可用金器撞之恐傷齒也按中風一證分中血脈中府中藏始自李東垣中血脈者大秦艽湯中府者小續命湯中藏者三化湯然後未見有三化湯中藏之證惟金匱書中分為四證曰絡曰經曰府曰藏其說最為的當可為後世法蓋口眼喎斜肌膚不仁邪在絡也左右不遂筋骨不用邪在經也昏不識人便溺阻隔邪在府也神昏不語脣緩涎出邪在藏也學者細閱諸家之論自知不謬云爾

中風死證 寸口脈平卒中死生氣獨絕暴脫之五藏幾息呼吸汨譬<sub>註</sub>如墮溺豈能期脈來一息七八至不大不小尚能醫大小浮晝沉夜死脈絕不至死何疑脫證嘗見皆死候搖頭上竄氣長噓喘汗如油燙搜鋸肉脫筋痛髮枯直<sub>註</sub>寸口脈平謂寸關尺脈俱平之人忽然卒中而死者皆因中邪太甚閉塞九竅天真之氣不能與人之生氣相通則獨絕於內也譬<sub>註</sub>如墮溺水豈能預期其死耶脈來一息七八至者不大不小雖困可治若大而無倫小而如纖浮主晝死沉主夜死不可治也五藏脫證若三藏四藏並見及搖頭上竄等証皆死候也

通關散 開闢散 黑鼻法 解語法 通關星皂細荷牛開闢烏梅冰片南巴油紙皂烟熏鼻通尿舌下點難言<sub>註</sub>通關散 南星皂角細辛薑荷生半夏為末吹鼻有寒可治開闢散烏梅肉冰片生南星為末擦牙其噤可開巴豆油紙捲皂角末燒烟熏入鼻內人事自省取通尿點在舌下言語自易

三聖散 瓜蒂散 全蠍散 五元散 巴礬丸 無汗吐宜防藜蒂有汗瓜蒂入蠍全重劑藜豆礬蜜臘度壅吐以巴礬丸  
註發延壅盛無汗表實用三聖散即防風藜蘆瓜蒂吐之有汗裏實用水蒂散即瓜蒂亦小豆或用全蠍散即瓜蒂散加全  
 蠍吐之此皆吐之輕劑也甚則用五元散乃藜蘆亦小豆白礬皂角礬巴礬丸即巴豆枯白礬吐之  
 烏藥順氣散 乌藥順氣實中絡喝斜頑麻風注皮麻黃枳橘烏楂翼白芷乾薑陳草芎註實中絡謂風邪中絡之人形氣實  
 者也喝斜口眼歪斜也頑麻肌膚麻木也風注疼風氣攻注骨節疾也是方麻黃枳橘桔梗烏楂翼白芷陳皮乾薑甘草  
 川芎也

大秦光湯 大秦光湯虛中絡喝斜偏廢減參珍秦先生地石膏共羌獨防芷細辛芩註虛中絡謂風邪中經之人形氣虛者  
 也偏廢謂半身不遂也減參珍謂八珍湯減去人參加入秦先生地石膏羌活獨活白芷防風細辛黃芩也偏廢是中經之  
 證而亦可治之者以此方能養血榮筋為久病風人調理之劑

換骨丹 中經氣實宜換骨喝斜癱瘓芷芩防冰麝硃杏槐苦味仙人麻菖草桑葉註中經氣實謂風邪中經之人形氣虛者  
 癱瘓左不用也癱右不用也換骨丹白芷川芎防風冰片麝硃杏槐角苦參五味子威靈仙人參麻黃石膏何首烏葛根子  
 蒼朮桑皮也麻黃膏者以麻黃熬成膏和煎藥為丸研砂滾衣也

小續命湯 小續命湯虛經絡八風五痺總能全麻杏桂芍通榮衛參草歸芎氣血宣風淫防風濕淫已黃芩熱淫附子寒春  
 夏石膏知母入秋冬桂附倍加添註虛經絡謂風邪中經中絡之人形氣虛也八風謂八方之邪風中人為痰也五痺詳見  
 痘門要訣中

黃耆五物湯 黃耆五物虛經絡偏廢虛風無力癱瘓清語蹇因古軟古強神濁是火痰補衛黃耆起不用益榮芍桂棗薑蜜  
 左加當歸下牛膝筋爪骨虎附經添註黃耆五物湯治因虛召風中人經絡而病半身不遂者然當其人若古強雖言補氣  
 不清則是痰火為病不宜此方若心清語蹇舌軟無力難言者乃是榮衛不足之病宜用此方經曰衛虛則不用榮虛則不  
 仁此方君黃耆而補衛以起不用臣桂枝白芍而益榮以治不仁佐生薑大棗以和榮衛也不仁不用在右者屬氣宜倍加  
 黃耆在左者屬血則加當歸在下兩腿兩膝軟者則加牛膝骨軟不能久立者則加虎骨筋軟難於屈伸者則加木瓜周身

或左或右經絡不宣通者則加炮附子有寒者亦加之此方屬証候數者其功力專於補外所以不用人參補之也

三化湯 搜風順氣丸 三化氣實風中府冒冒開滿小承羌形氣俱虛及風燥搜風順氣自然康詳氣實風中府謂風邪中府之人形氣實也冒冒謂神昏不知人也閉滿謂二便阻隔腹滿脹也小承羌謂小承氣湯厚朴枳實大黃加羌活即三化湯也若其人形氣俱虛則當以搜風順氣丸緩緩治之自然康也久病風之人大便多結燥謂之風燥或用續命湯汗過三化湯下過津液枯乾以致結燥凡病不能中經絡藏府但有二便阻隔形氣不足難堪攻下者均宜此法以搜六府之風通腸胃中之氣二便自利矣

牛黃清心丸 牛黃清心實中藏痰壅神昏不語言口眼喎斜形氣盛兩手握固緊牙關註牛黃清心丸治風邪中藏之人形氣俱實其證痰壅壅塞神昏不能言語口眼喎斜形氣滿盛而手握固牙關緊急之閉證皆可服之

參附湯 參附湯治虛中藏脣緩涎出不語言昏不知人身偏廢五脫證見倍參煎註參附湯即人參附子也治風邪中藏之

人形氣俱虛其證脣緩不收痰涎流出神昏不語身肢偏廢或與五藏脫證並見宜大倍人參先固虛脫次治風邪可也

十全還魂湯 經絡閉證卒中惡氣促神昏不識人無汗拘急身偏痛肉桂麻草杏還魂詳經絡閉證謂風邪中經絡之閉證也氣促謂氣粗盛也無汗四肢拘急身體偏痛乃表邪固閉宜用肉桂麻黃甘草杏仁即還魂湯以開之

奪命散 藏府閉證腹滿閉塞痰結在喉間危急湯藥不能下奄命巴芷半夏南星註藏府閉證謂風邪中藏府之閉證也腹滿閉謂腹滿二便閉也兼之神昏口噤不開結痰喉間不下宜用是方吐下之巴豆白芷半夏菖蒲生南星也

三生飲 三生飲治中風寒厥逆沉伏涌氣痰星香烏附俱生用氣虛加參脫倍添註中風寒謂不論經絡藏府風邪中之人也厥逆謂四肢冷也沉伏謂六脈沉伏也是方生南星半夏烏附子木香也惟寒盛氣實者宜之若氣虛者加入參虛極將脫者大倍人參始可用之而無倒戈之害也

祛風至寶湯 祛風至寶中風熱浮數面赤熱而煩通聖加蠍天麻細白附羌獨連蘇蠍蟲註中風熱謂不論經絡藏府風邪中府熱之人也浮數謂六脈浮數也熱而煩謂身熱心煩也通聖謂防風通聖散方中加全蠍天麻細辛白附羌活獨連蘇蠍蟲黃連僵蠍也防風通聖散詳在傷寒門

青州白丸子 青州白丸中風痰喘斜癱瘓滯小兒驚瘓為妙藥白附烏星半夏九註中風痰謂不論經絡藏府風邪中表有痰飲之人也湧痰涎謂痰涎湧盛也是方生白附子生川烏生南星生半夏法製為丸也

羌活愈風湯 羌活愈風治外中手足無力語出難肌肉微掣不仁用大秦艽湯參再添官桂黃耆杜防己知和柴荷蔓荆前蒼麻半朴杞地骨調理諸風症可安註治外中謂風從外中之病也此病之來必有先兆如手足無力語言蹇澀時有肌肉微動牽掣大指次指麻木不用皆風邪外中之先兆也宜用此湯太秦艽湯方中再添人參官桂黃耆杜仲防己知母枳殼柴胡薄荷蔓荆子菊花前胡荳朮麻黃半夏厚朴枸杞地骨皮也調理諸風更可堪謂凡中風內邪將除外邪漸盡更服此藥調理以行道諸經久則大風寒去清濁自分榮衛自和矣

清熱化痰湯 清熱化痰治內發神短忽忘語失常頭眩腳軟六君參芩連菖枳竹星香註治內發謂痰火內發之病也此病之來必有先兆如神短忽忘言語失常上盛下虛頭眩腳軟是痰火內發之先兆也宜用此湯即人參白朮茯苓甘草橘紅半夏麥冬黃芩石菖蒲枳實竹茹南星木香也

地黃飲子 四肢不收無痛非偏枯身偏不用痰甚言不變志不亂邪在分腠五物能甚不能言為瘡疳入藏病多凶地黃桂附容已遠萸斛冬味薄莫冬註風痱偏枯瘡疳三病皆屬外中而有微甚淺深之別也風痱謂四肢不收身無痛處偏枯謂半身不遂身有痛處甚言不變志不亂乃邪微淺痼在分腠繫衝之間以黃耆五物湯能補榮衛而散風邪也甚者不能言志亂神昏則為瘡疳乃腎虛內奪少陰不至而厥其邪已入於藏故曰病多凶也地黃飲子是治腎虛內奪之方桑芍熟地肉桂附子肉蓯蓉巴戟遠志山萸石斛麥冬五味子蒲荷石菖蒲伏苓也

滌痰湯 滌痰內發迷心數舌強難言參蒲星溫膽熱盛火速入神昏便開滾痰攻註內發謂痰火內發迷人心數令人精神恍惚舌強難言也滌痰湯即人參菖蒲南星合溫膽湯也溫膽湯橘紅半夏茯苓甘草竹茹枳實也熟盛加黃連大小二便開用礞石滾痰丸攻之可也

類中風總括 類中類半中風證尸厥中虛氣食寒火濕暑惡止食厥辨在喝斜偏廢間註類中風證皆名尸厥謂形厥而氣不厥也故口鼻無氣狀類死尸而脈自動也中虛中氣中食中寒中火中濕中暑中惡等證雖勿然似倒人事木省類乎真

風病但一見口眼喎斜偏廢不仁不用等證自可辨也

獨參湯 參附湯 星香湯 三物備急丹 奔命散 尸厥無氣而脈動或脈微細有無間緣於病後氣血竭人參參附星  
香痰氣閉腹滿二便閉或腹急痛備急再服後轉鳴吐下驗咳間痰結奔命先註尸厥之證有虛有實虛者以獨參湯盛  
寒者以參附湯虛實兼者以星香飲加人參湯實者氣閉似死脈動有力腹滿脹二便閉或腹急痛氣閉前後不通者以備  
急丹實兼症者以奔命散

補中益氣湯 生脈補精湯 補中益氣療虛中煩勞過度氣不升虛冒有痰加苓牛膝冒生麥地歸草註補中益氣湯治虛  
中之證即李杲所云內傷氣虛之人煩勞過度清氣不升勿然冒也然冒謂因房勞過度成冒也生脈飲即人參參冬五  
味子合熱地當歸鹿茸名曰生脈補精也

木杏調氣飲 木杏調氣實氣中暴怒氣逆嘯聲痰風浮肢溫氣沉冷木薑砂慈草丁檀註實氣中謂形氣俱實之人中氣也  
因暴怒氣逆勿然皆倒嘯急也風浮肢溫氣沉冷謂中風之人脈浮手足溫中氣之人脈沉手足冷可別也是方木杏壹  
砂仁白蔻甘草丁檀杏也

八味順氣散 八味順氣虛氣中標本兼施邪正安參芩木草桔梗桑白皮陳利氣痰註虛寒中謂形氣俱虛之人中氣也  
宜用此標本兼施邪正相安之劑也

瓜蒂散 薑附湯食中過飽感寒風或因怒懶塞胸中忽然昏厥肢不舉水希薑鹽探吐平註瓜蒂散挾痰者用之薑湯挾  
寒者用之鹽湯過食者用之探吐謂作此湯數鍾令病者飲一鍾隨用指探吐不吐再飲再探以吐通快為度可立愈也  
附子理中湯 附子理中療寒中腹痛拘急嘯牙關有汗身寒或吐瀉附子參芩草薑乾無汗身寒加麻細陰毒川烏用生煎  
嘔吐丁香姜黃入脈微欲絕倍姜添桂半寒中之證即腹痛諸證者是也宜用附子理中湯若無汗加麻黃細辛陰毒加生川  
烏嘔吐加丁香吳茱萸服微欲絕倍加人參陰毒甚極也詳在傷寒心法

涼膈散 涼膈火中神昏冒施翹芩薄草硝黃芩治一切胸膈熱便燥譙妄與狂註火中之證即劉完素所云情過極五  
志之火內發則令人昏倒無知筋骨不用也

香薷飲 蕺香正氣散 辰砂益元散 煎臍法 蒼朮白虎湯 人參白虎湯 暑中須分陰與陽陰邪無汗似寒傷壯熱心煩或嘔瀉香薷扁朴二香湯更兼苔憤蒸蒸汗而垢喘渴證為陽不省煎臍灌誅水益元蒼朮白虎湯註陰邪無汗似寒傷謂暑中陰邪似傷寒頭痛身病惡寒無汗而更壯熱心煩或嘔或瀉也得之於受暑納涼寒外暑內宜香薷飲二香湯謂香薷飲合藿香正氣飲詳在藿亂門。有如上之證更兼精神昏憤蒸蒸自汗而垢喘渴則為暑中陽邪得之於赤日長途中外皆熱初中昏憤不省者急以熱物熨臍蒜汁合水灌之即省繼以辰砂益元散與實者蒼朮白虎湯與虛者人參白虎湯選而用之可也

滲濕湯 滲濕濕中內冒胃寒亨濕熱熱生痰厚味醇酒生冷水冒苓香附撫砂連詳濕中內謂濕從內生之病即朱震亨所云濕熱生痰冒胃之證得之於傷寒味醇酒生冷水物過節也滲濕湯即胃苓湯加香附撫砂仁黃連也

除濕湯 除濕陰雨濕蒸霧卧濕涉水瘴山嵐頭身重痛便溏腹脹升柴防水煎註除濕湯即羌活藁本升麻柴胡防風蒼术治濕因外中得之於天陰淫雨晴後濕蒸早辰霧露及入卧濕地遠行涉水瘴氣山嵐其證頭身重痛甚而冒大便溏瀉皮膚浮腫也

調氣平胃散 調氣平胃療至市廟壞忤惡卒然冒面黑錯忘蘇合主次以木香平胃勻詳蘇合主謂中惡之病以蘇合香丸為主也次以木香平胃勻謂以中氣氣不香調氣散之方合平胃散之藥調理也

傷風總括 傷風屬肺咳嗽重鼻塞噴嚏涕流清鼻淵腦熱不噴嚏濁涕微久必鼻紅註傷風屬肺故噴嚏也鼻淵屬腦故不噴嚏也傷風寒邪故涕清也鼻淵熱邪故涕濁也鼻淵病久或有極氣則熱深故腦衄鼻血也

川芎茶調散 參蘇飲治虛傷風者茶調及頭痛鼻止薄草羌茶細荆防癥半枝蒿清註參蘇飲方在咳嗽門治氣虛之人傷風之病若氣實者用川芎茶調散即川芎白芷薄荷甘草羌活茶葉細辛荆芥防風傷風頭痛者亦可用也有疫者加牛夏清痰有熱者加石膏清熱可也

蒼耳散 蒼耳散治鼻淵病風熱入腦眼頭疼涕流不止鼻塞熱蒼耳辛夷芷薄荷荳蔻鼻淵病屬風熱入腦故目眼而頭疼涕流不止較之傷風為甚鼻塞氣不利也熱鼻孔中熱也甚者孔熱而痛及其腦也蒼耳散即蒼耳子炒去刺研破一兩加

辛夷三錢白芷薄荷各一錢熟地黃湯

黃連防風通聖散 鼻渊初病施蒼耳黃連防風久病方孔痛膽調冰硼散鼻血犀角地黃湯

風邪盛故用蒼耳散以散為主久病則熱鬱深故用防風通聖散加黃連以清為主也熟氣湯沸傷其鼻孔成瘡故痛也宜以猪膽汁調冰硼散敷之熱溫於腦傷久所過紫血故妙也宜以犀角地黃湯涼之可也

瘧病總括 瘥病項強背反張有汗為表無汗為裏瘧產後去血過多傷寒發汗過多則為內因瀆陽破傷狗咬則為外因皆風邪乘虛入太陽經而成此病也 瘟病死證 瘆證脈散多應死反張離席一掌亡眼目瞪眴不語額汗如珠命必傷註反張離席一掌謂離席四五指許也 眼小謂目瞤緊小也目睭謂眼珠不轉也

葛根湯 桂枝加葛根湯 小續命湯 桂枝加附子湯 當歸補血湯 大承氣湯 桃仁承氣湯 則癰葛根湯發汗未詳桂枝加葛良苦兼雜因小續命湯桂枝加附湯傷血桂枝合補血裏實瘀血承氣方瀆陽十全加風藥破傷狗咬等參詳註則用葛根湯即桂枝湯加麻黃葛根赤瓈用桂枝加葛根湯即桂枝湯加葛根汗之雜因謂風寒濕雜揉為病用小續命湯隨風寒濕輕重治之過汗表虛汗出不止因而成瘧用桂枝加附子也傷血謂產後金瘡大傷血後用桂枝湯合補血湯即當歸黃耆也裏實謂瘧病腹滿二便閉以大承氣湯及產後惡露不盡少腹硬急以桃仁承氣湯下之瀆陽去膿血過多為風所襲者用十全大補湯加祛風之藥治之

破傷風 破傷亡血筋失養微傷風入火之端燥起白加瘡不腫濕流汚水緊升關註破傷亡血過多筋失所養經絡而虛風邪乘之為病即經曰風邪乘虛而入也為風虛邪宜桂枝湯合當歸補血湯治之夫傷重出血過多而病風者常也然時有微傷淺損去血甚少風邪乘之而病者以其人素熱因風而然即劉完素曰熱甚風搏併於經絡也為風火邪宜防風通聖散加蠍尾治之凡此證不論虛實風毒內蘊不發於外瘡口周圍燥起白加瘡不甚腫濕流污黑之水牙關微緊不似蟲常活動皆破傷風之先兆也

防風通聖散加蠍尾方 全蠍散 左龍丸 斑蝥大黃方 火盛通聖加蠍尾風盛全蠍左龍丸外因燒酒火罐涼透風斑

大酒同煎註破傷火盛者名陽明證用防風通聖散加蠍尾治之風盛者多太陽症用全蠍散即生蠍尾七枚研末熱酒服之服後不解漸深入裏用龍丸即野鵠黃江蠍殼蠍雄黃蜈蚣天麻硃砂巴豆霜為丸也方詳在丹溪心法諸破傷風門內皆宣外用砂燒酒一壺盛多半壺燒酒先以一壺上火令凜無聲傾酒即按在破傷瘡口拔出污墨血水滿則自落再以次壺仍按瘡口輪流提拔以盡為度其風立愈天咬風毒入腹成瘻風者用斑蝥一枚以糯米拌炒米黃去米為末生大黃末一錢合勻黃酒一盞煎至半盞空心溫服取下毒物弱者減半服之可也

瘡病總括 三瘡之因風寒濕五瘡筋骨脈肌皮風勝行瘡寒瘡痛濕勝著瘡重難支皮麻肌木脈色變筋掣骨重遇邪時復感於邪入藏府周同脈瘡不相移註三瘡之因風寒濕三氣雜合而為病也其風邪勝者其痛流走故曰行瘡寒邪勝者其痛甚苦故曰痛瘡濕邪勝者其痛重著故曰著瘡此為病之因而得名曰三瘡也又有曰五瘡者謂皮脈肌筋骨之瘡也以秋時遇此邪為皮瘡則皮雖麻尚微覺痛癢也以夏時遇此邪為脈瘡則脈中血不流行而色變也以長夏時遇此邪為筋瘡則筋木不知痛癢也以春時遇此邪為筋繫節痛屈而不伸也以冬時遇此邪為骨瘡則骨重痠疼不能舉也曰入藏府者謂內舍五藏之瘡也以皮瘡不已復感於邪內舍於肺成肺瘡也脈瘡不已復感於邪內舍於心成心瘡也肌瘡不已復感於邪內舍於肝成脾瘡也筋瘡不已復感於邪內舍於腎成腎瘡也此皆以病遇邪之時及受病之處而得名曰五瘡也所謂邪者重感於風寒濕之氣也周瘡亦在血脉之中隨脈上下為病故同脈瘡但害有定處不似脈瘡左右相移也近世曰痛風曰流火曰歷節風皆行瘡之俗名也

周瘡 周瘡患定無歇止左右不移上下行似風偏廢隻手足口眼無斜有痛疼註周瘡或痛或脹或牛或足患有定處痛無歇止或從上病及於下或從下病及於上而不似衆瘡痛有歇止左右相移流走也周瘡或兩手或兩足或隻手足或偏廢不仁不用而似中風但不口眼喎身有疼痛也

瘡病生死證 痘在筋骨痛難忍連皮脈易為切瘡久入藏中虛死藏實不受復還生註瘡在筋骨則受邪深故痛久難已瘡在皮脈則受邪淺故易治也凡瘡病日久內傳所合之藏則為五藏之瘡若其人中虛受邪則難治多死其人藏實而不受邪復還於外則易治多生假如久病皮瘡復感於邪當內傳肺而為肺瘡若無胸滿而煩喘咳之證則是藏實不受邪餘藏倣此

辨入藏府證 肺癆煩滿喘吸噦脣脰皮腫脊背頭脳咽痛乾脣心煩悸噫氣時休數飲卧驚肝太息飲秘脹渴在腸完胞祕沃痛鼻清涕三焦胃附膀無憂註久病皮膚復感於邪見胸滿而煩喘咳之證是邪內傳於肺則為肺癆也久病骨癆復感於邪而見腹脹尻以代踵足掣不伸脊以代頭僵僵不直之證是邪內傳於腎則為腎癆也久病肌癆復感於邪而見嘔涎心下痞硬四肢懈墜之證是邪內傳於脾則為脾癆也久病脈癆復感於邪而見心煩心悸嗌乾噫氣有時則恐之證是邪內傳於心則為心癆也久病筋癆復感於邪而見喜飲小便數多夜卧則驚失息之證是邪內傳於肝則為肝癆也久癆不已復感於邪藏實不受而傳府者凡見喜飲小便祕不脹則濡不濡則脹之證是邪內傳於大小腸則為腸癆也凡見少腹胞中按如沃湯狀而痛小便祕澀鼻流清涕之證是邪內傳於膀胱則為胞癆也三焦之癆附於膀胱從水道也胃癆附於天小二腸從傳化也膽為清淨之府不受癆邪故曰無憂也

小續命湯 增味五痹湯 痾虛加減 小續命 痾實增味五痹湯 麻桂紅花苦杏附虎羊耆草二防羌註 痾虛謂氣虛之人病諸痹也 宜用加減小續命湯 風勝行痹倍防風寒膝痛 痾倍附子濕勝著痹倍防己皮痹 加黃耆或桂枝皮脈痹加薑黃或加紅花肌痹加葛根或加白芷筋痹加羚羊角或加續斷骨痹加虎骨或加狗脊有汗減麻黃便濤減防己夏勝減黃芩加乾薑熱勝減附子加石膏加減治之 痾實謂氣血實之人病諸痹也 宜用增味五痹湯 即麻黃桂枝紅花白芷葛根附子虎骨羚羊角黃耆甘草防風防己羌活也 行痹以羌活防風為主 痾以麻黃附子為主 痾以防己羌活為主 皮痹以黃耆桂枝皮為主 脈痹以紅花桂枝為主 肌痹以葛根白芷為主 筋痹以羚羊角為主 骨痹以虎骨為主 增味於五痹治之可也 木通湯 附子五苓散 蒼朮五苓散 三痹木通長流水濕加防己風羌防寒痹附麻分汗入胞陽五苓附子蒼朮三痹謂行痹痛痹著痹也 宜用木通一味不見水者二兩以長流水一碗煎一碗熱服取微汗不愈再服以愈為度若其痛上下左右流走相移者加羌活防風以祛風邪其痛若甚者有汗加附子無汗加麻黃以去寒邪其痛重著難移者加防己以勝濕邪其所應加之藥不可過三錢弱者俱減半服胞痹宜用五苓散加附子腸痹宜五苓散加蒼朮以利寒飲也 五苓散方在傷寒門

三痹湯 獨活寄生湯 三痹十全無白术牛膝續杜細獨活加桑除耆續入藏乘虛久痹方 註 三痹謂三痹湯即十全

大補湯無白朮加牛膝秦艽續斷杜仲細辛獨活防風也獨活謂獨活寄生湯依二牌湯方加桑寄生除去黃耆續斷也此皆治五痹不已乘虛入藏反留連日久調理療病之方也

黃耆益氣湯 黃耆益氣虛皮麻不如瘡與疹補中益氣加紅藥味秋令夏桂加冬桂黑實麻木用小續命湯加麻黃治之氣虛麻木用黃耆益氣湯即補中益氣湯加紅花黃藥也秋加五味子夏加黃芩冬加桂枝皮也

蠲痹湯 加味升陽散火湯 蠲痹冷痹身寒厥附歸耆草桂羌防肌熱如火名熱痹羚犀升陽散火湯註蠲痹湯即附子當歸耆草官桂羌活防風治瘡病而身寒無熱四肢厥冷名曰冷痹也加味升陽散火湯即內傷門升陽散火湯加羚羊

角犀角治療病而肌熱如火名曰熱痹也

痿病總括 五痿皆因肺熱生陽明無病不能成肺熱葉焦皮毛痺發為痿蹙不能行心熱脈痿腫節縱筋骨腰脊不能興肝筋拘掣失所養脾肉不仁燥渴頻註五痿心肝脾肺腎之痿也痿屬燥病故皆因肺熱而生也陽明者五臟六府之海主潤宗筋陽明無病則宗筋潤能束骨而利機關雖有肺熱不能成痿也肺熱葉焦陽明虛弱津液不化筋骨失養皮毛痺痿發為痿蹙不能行也因而心氣熱為脈痿則腫節縱而不任地肺兼心病也因而腎氣熱為骨痿則腰脊不能興舉肺兼腎病也因而肝氣熱為筋痿則筋失所養拘掣不伸肺兼肝病也因而脾氣熱為肉痿則胃燥而渴肌肉不仁肺兼脾病也

痿病辨似 瘦病足今痿病身仍在不疫病裏分但觀治痿無風藥始曉虛實別有因註痿病之證今人多為一病以其相類也然痿病而足痿軟不痛痿病通身肢節疼痛但觀古人治痿皆不用風藥則可知痿多虛病多實而所因有別也

痿病治法 瘦燥因何治濕熱遵經獨取治陽明陽明無故惟病肺胃壯能食審證攻控涎小胃濕痰熱陽明積熱法三承胃弱食少先養胃久虛按證始收功註痿屬燥病因何而用治濕熱苦燥之藥蓋遵內經之治法獨取於陽明胃也故胃家無病雖有肺熱惟病肺而不病痿也是知病痿者胃家必有故也或濕熱或積熱或濕痰不論新久若胃壯能食當先審證攻之胃有濕痰用控涎丹攻之有濕熱者用小胃丹攻之有積熱者用三承氣湯攻之此治胃壯能食之法也若胃弱飲食減少氣血津液不足當先以補養脾胃為主其有久病留連諸虛燥熱或攻下之後調理當審證治之始收全功也

謂牛膝秦艽蒼朮水

清燥湯 虎潛丸 十全大補湯 加味金剛丸 時令濕熱清燥效陰虛濕熱虎潛靈久虛痿軟全金主草爪牛膝杜仲等  
註清燥湯在內傷門虎潛丸有成方全金主謂十全大補湯加味金剛丸久病氣血虛以十全大補湯為主筋骨痿軟以加  
味金剛丸為主加味金剛丸即草薢木瓜牛膝菟絲子杜仲肉蓯蓉也

腳氣總括 腳氣風寒濕熱病往來寒熱狀傷寒腿腳痛腫熱為火不腫不熱是寒乾註脚氣乃內有濕熱外感風寒相合爲病故往來寒熱狀類傷寒兩脚腿痛腫熱如火者是火盛也不腫不熱而痛者是寒盛也名曰乾脚氣

腳氣死證

腳氣脈急少腹煩不三五日人心間嘔吐喘滿目額黑恍惚讞妄命難全註脚氣脈急少腹煩木不知痛癢不過

三五日內其邪必入心間若入心間嘔吐喘滿是為腳氣衝心之證目額昏黃恍惚讞妄則是水來犯火之徵故曰命難全也  
攢風散 羌活導滯湯 勝瀉餅子 五積散 獨活寄生湯 脚氣表解攢風散麻桂杏草草烏良裏解道滯羌獨活防己  
當歸枳大黃濕盛重脾勝濕餅二丑喬麵遂成方寒濕五積加附子寒虛獨活寄生湯註初病脚氣表實無汗用攢風散汗之即麻桂枝杏仁甘草草薢炮川烏也裏實熱盛二便不利用羌活導滯湯下之即羌活獨活防己當歸枳大黃也濕  
盛重腫用勝瀉餅子即黑丑白丑頭末甘遂末各五錢喬麥麴一兩五錢水和作餅三錢煮熟空心茶清服逐之寒濕肅用  
五積散加附子治之方在傷寒門寒虛者用獨活寄生湯補之方在痈門

當歸拈痛湯 當歸拈痛虛濕熱茵陳四苓與羌防人參當歸升葛草苦參知母葛根蒼註濕熱腳氣而形氣虛者宜用當歸拈痛湯即茵陳白朮茯苓豬苓澤瀉羌活防己人參當歸升葛草苦參知母葛根蒼朮也

加味蒼蠻散 加味蒼蠻實濕熱二活二木生地黃知母芍藥歸牛膝草不通用防己木瓜榔註濕熱脚氣而形質實者宜用加味蒼蠻散即羌活獨活蒼朮白朮生地黃知母芍藥亦為當歸牛膝草木通防己木瓜榔也

大防風湯 兩膝腫大而疼痛脾腫枯細鶴膝風大防風附羌牛朮十全大補咸茯苓註兩膝腫大疼痛膝上至髀膝下腫足枯細但存皮骨兩膝狀若鶴膝故名鶴膝風也宜大防風湯即防風附子羌活牛膝杜仲人參白朮芍藥當歸川芎白芍熟地炙耆肉桂也此病若得之於創瘡後名曰創風亦用此方

## 編輯雜病心法要訣

內傷總括 内傷勞役傷脾氣飲食傷胃傷其形傷形失節溫涼過無濕熱暑火寒中註勞役傷氣傷元氣也飲食傷形傷胃府也傷氣宜補有熱中濕熱暑火鬱寒中之不同傷形宜消有飲食失節過於溫涼之不一也

內傷外感辨似 内傷脈大見氣口外感脈大見人迎頭疾時痛與常痛寒溫解烈火仍熱在肌肉從內泛熱在皮膚捫內輕自汗氣短聲怯弱雖汗氣壯語高聲手心熱兮手背熱鼻息氣短鼻促鳴不食惡食內外辨初渴後渴少多明註內傷外感脈皆大內傷之脈氣口大於人迎不似外感之脈人迎大於氣口也內傷外感皆頭痛內傷之頭痛有時而痛有時不痛不似外感之頭痛常常而痛不休也內傷外感皆惡寒得就溫衣而即解不似外感之惡寒雖近烈火而仍惡也內傷外感皆發熱內傷之發熱熱在肌肉以手捫之熱從內泛不似外感之發熱熱在皮膚以手捫之熱自內輕也內傷外感皆自汗內傷之自汗氣短乏聲怯弱不似外感之自汗氣壯促語聲高內傷外感手皆熱內傷之熱手心熱不似外感之熱手背熱也內傷外感皆鼻不和內傷之鼻息氣短而喘不似外感之鼻息氣促而鳴也內傷外感皆不食內傷之不食口中無味不似外感之不食聞食則惡也內傷外感皆渴內傷之渴初病即渴其飲甚少不似外感之渴三日後始渴其飲甚多也

補中益氣湯 补中益氣升陽清熱傷氣陷大虛洪頭痛表熱自汗出心煩口渴畏寒風困倦懶言無氣動動則氣高喘促聲保元甘溫除大熱血歸氣木補脾經佐橘降濁散滯氣升柴從胃引陽升陰火腎躁加地藥陽熱心煩安神益註補中益氣治內傷清陽下陷因勞役過度熱傷元氣故脈虛大而洪也內傷頭痛時作時止也內傷表熱嘗自汗出也心煩氣虛煩煩勞也口渴氣陷不蒸化也畏寒畏風表氣虛失衛也困倦懶言中氣之不周也動則氣喘上氣不足息也保元謂人參黃芩生地補水救陰陽熱書夜心煩合硃砂安神丸瀉火安神

調中益氣湯 調中弦洪緩沉澀濕熱體倦骨瘦夜氣少心煩急肥瘦口沫食出耳鳴聾胸膈不快食無味二便失調殼血膜保元升柴芩橘葉姜黃加木亦同名註調中益氣湯亦治內傷清寒下陷濁氣上來清濁相干而兼濕熱者故二便不調殼

渴臘血也此湯與補中益氣湯雖互相發明然其證脈則不可不分別也內傷之病脾胃元氣一虛四臟失其調和所以藏之脈交相混見故肝弦心洪脾緩之脈反見於上按之沉澀肺脈而反見於下也身肢重倦氣不周也骨節痠疼血不榮也氣少中氣乏也心煩心血少也忽肥忽瘦者火來土位上併陽分則血脈上行而上盛故面赤紅而肥下併陰分則血脈下行而上虛故面青白而瘦即今之虛損病人早則面青白瘦而惡寒午後則面紅赤肥而發熱者是也口沫謂口中沫脾不散精也食出謂食入反出胃虛不納也耳鳴聲謂耳鳴耳聾陰火上衝也胸膈不快濁氣滯也飲食無味胃氣傷也二便不調謂大便時瀉不瀉小便時利不利脾濕不分也飧謂完穀不化之飧瀉脾虛濕不化也血膿謂大便後或見腥臭脾濕熱釀成也保元謂保元湯即人參黃耆炙草升麻柴胡蒼朮橘皮黃藥也去黃藥加木香亦名調中益氣湯以熱少氣不和者宜之也

升陽益胃湯 内傷升陽益胃湯濕多熱少抑清陽倦怠憊食身重痛口苦舌乾便不常瀝瀉惡寒屬肺病慘不樂乃陽傷六君白芍連澤瀉羌獨黃耆紫草防註內傷寒虛濕多熱少遏抑春生清氣不得上升脾胃之證宜服此湯其證倦怠憊食身重而痛口苦舌乾便不常謂大便不調小便頻數不如常也瀝瀉惡寒衛氣不足屬肺皮毛之病也慘不樂面白不和乃陽氣傷而不伸也六君謂人參白朮茯苓炙草橘皮半夏也加白芍黃連澤瀉羌活獨活胡防風即是升陽益胃也補脾胃溫陰火升陽湯 补中升陽溫陰火火多濕少因脾陽雖同升陽益胃證然無瀉數肺陽傷補脾胃氣虛者草升陽柴胡升羌石膏芩連瀉陰火長夏還令故加蒼註內傷氣虛濕多濕少陰火用脾陽氣不得上升脾胃之證宜服此方此方所治雖同升陽益胃之證然無大便不調小便頻數瀉瀉惡寒肺病慘不樂陽傷之證也

內傷補中調中益胃等湯加減法 冬加薑桂草蔻益秋芍白蔻縮柏榔夏月氣衝芩連華春加風藥或清陽長夏沉困精神少人參麥味津冷蒼肺熱咳嗽減參去春加金沸欬冬芍夏加麥冬五味子秋冬連根節麻黃鹽焗艾荆其芎入龜腦草本苦細嚼沉重懶倦或嘔逆痰厥頭疼半夏姜口乾嗌乾或表熱加葛生津清胃陽大使燥濁元明粉血燥歸桃熟大黃芩服杏砂連根朴寒減黃連加炒草豆蔻痛草蔻寒益智氣滯青皮白蔻杏腹痛芍草芩桂香附桂香腰下痛桂熟地黃內外煩痛歸和血脇下痛參草柴良身重脚軟己蒼藥身疼發熱藥防羌註冬加乾薑官桂草豆蔻益智助陽氣也秋加白芍白豆蔻縮砂

仁檳榔助燥收也。夏月加黃連、黃芩降陰火也。或腹中氣上衝逆屬陰火衝上雖非夏月亦加之春加風藥謂羌活獨活防風。當本之類佐參者之品能鼓清陽之氣上升也。長夏身肢沉困精神短少加人參麥冬五味子恐暑傷氣也。加澤瀉、茯苓、蒼朮去脾濕也。肺中有熱咳嗽減人參遠肺熱也。春加金沸草、款冬花散肺風也。夏加麥冬五味子保肺氣也。冬加連根節麻黃散肺寒也。頭痛加蔓荆子引太陽也。痛甚加川芎。上行捷也。顛痛腦痛加藁本入督脈也。苦頭痛加細辛走少陰也。痰厥頭痛沉重懶倦或嘔逆痰涎加半夏生薑治痰迷也。口乾噏乾或衣發熱加葛根生津解肌也。大便燥澀加元明粉血虛燥加當歸血實燥加桃仁。熱實燥加大黃心下痞脹氣不快加木香食不消加砂仁心下結熱加黃連心下結氣加枳實胃氣壅塞加厚朴如胃中寒或反胃減去竟連加炒乾薑而痛加草豆蔻胃寒或吐沫加益智氣滿不快加白豆蔻青皮腹痛加白芍甘草審其有熱加黃芩有寒加官桂。臍下痛加肉桂熟地黃腹內身外刺痛此屬血澀不足加當歸以活血也。脇下痛或急縮加甘草些許以和肝也。身重腳軟加防己。蒼朮、黃芩去濕熱在內也。身痛發熱加藁本防風羌活疏風在表也。清暑益氣湯 清燥湯 長夏濕暑交相病暑多清暑益氣功汗熱煩渴倦少氣乏食尿澀便溏行補中去燥加黃芩麥味蒼髮甘葛青溫多瘧厥清燥地豬苓連葛根青註長夏之令暑濕炎蒸交相為病暑多濕少為病其證則自汗身熱心煩口渴倦困少氣乏食小便澀少大便稀溏宜清暑益氣湯即補中益氣湯去柴胡加黃芩澤瀉麥冬五味子蒼朮神麪甘葛青皮也。若濕多暑少為病則成瘧厥之證腰以下痿軟難於轉動行走不正兩足欹側宜清燥湯即本方更加生地豬苓茯苓柴胡黃連減去甘葛青皮也。

升陽散火湯 火鬱湯 血虛胃弱過食涼陽鬱於脾散火湯肌膚筋骨肢困熱捫之焰手熱非常羌獨芎防升柴葛人參二草秦生薑火鬱加葱、減參獨惡寒沉數發之方註二草炙甘草生甘草惡寒謂身雖有如是焰手之熱而反惡寒脈來沉數則可知火鬱肌裏宜以此方發之。

白术附子湯 加味理中湯 內傷水來侮土病寒濕白术附子湯涎涕腹脹時多溺足軟無力痛為殃腰背脚眼脊背痛丸冷陰陰痛不常蒼附五苓陳半朴虛宜理中附苓蒼註東垣內傷熱中之病用補中益氣湯寒中之病用白术附子湯寒中為水來侮土寒濕之病其證內則腹脹多溺涎涕外則足斬胛脊腰背累九痛脾胃寒濕而氣不虛者宜用是方即五苓散

加蒼朮附子陳皮半夏厚朴也若脾胃寒濕而氣虛者則宜用理中湯加附子茯苓倉木是也

人參資生丸 資生脾胃俱虛病不寒不熱平補方食少難消倒飽脹面黃肌瘦倦難當註續仲醇製資生丸方為脾胃俱虛不寒不熱平補之藥其所治之證乃飲食減少過時不化倒飽脹悶面白黃肌肉漸瘦困倦無力也方見讀書故不錄藥味清胃理脾湯 清胃理脾治濕熱傷食平胃酌三黃大便黏穢小便赤飲食愛冷口舌瘡潰清胃理脾湯即平胃散加黃連黃芩大黃也酌三黃者謂有熱滯而不實者不可入大黃也傷食謂傷食病證如痞脹噦嘔不食吞酸惡心噫氣之類更兼大使黏臭小便赤澀飲食愛冷口舌生瘡潰傷酒厚味濕熱為病之證也

理中湯 理中治虛寒濕傷食少喜熱面目黃腹痛腸鳴吐冷沫大便腥穢似鴨溏註白木附子湯治脾胃寒濕形氣虛者也理中湯治脾胃寒濕形氣虛者也虛者其證食少喜食熱物面色青黃腹痛腸鳴吐冷涎沫大便腥穢不臭似鴨糞滑瀉也故宜此湯

消食健脾丸 胃強脾弱脾胃病能食不化用消食平胃炒鹽胡椒甘麥蘖香楂白芷藜蘆牌胃病中有胃強脾弱一證胃強所以能食脾弱不能消化宜服消食健脾湯丸助其消化用蒼朮陳皮厚朴甘草炒鹽胡椒山楂神麩麥芽茱萸木通丸服之更節其飲食自然脾胃和而能健運矣

開胃進食湯 開胃進食治不食少食難化胃脾虛丁木藿香蓮子朴六君砂麥與神麩註此方治不思飲食少食不能消化脾胃兩虛之證方即六君子湯加丁香不香藿香蓮子厚朴縮砂麥芽神麩也

平胃散 一切傷食脾胃病痞脹噦嘔不能食吞酸惡心並噫氣平胃蒼朴草陳皮快膈枳木炭芩半傷穀二升縮神麩肉

滯山楂麴米菔滯芩芩連華大宜註傷食等證宜用平胃散即蒼朮厚朴甘草陳皮也快膈加枳實白木有痰加半夏茯苓傷穀滯者加麥芽穀并縮砂神麩傷肉滯者加山楂傷麴滯者加米菔有熱者加黃芩黃連黃芩大黃酌而用之

葛花解醒湯 葛花解醒發酒汗懶食熱倦噦頭痛參葛四苓白蔻縮神麩乾薑陳木青荳傷酒宜用葛花解醒湯汗之汗出立愈其證頭痛懶食嘔吐身熱倦怠而煩似乎外感而實非外感皆因酒所致也方即人參葛花白木茯苓猪苓澤瀉白蔻

縮砂神麩乾薑陳皮木香青皮

秘方化滯丸 秘方化滯寒熱滯一切氣積痛攻方 巴豆醋製棗核木青陳連牛木丁香桂祕方化滯丸治不論寒熱一切氣滯積痛攻下之妙藥也 即巴豆三棱莪术青皮陳皮黃連半夏木香丁香也此方出自丹溪心法附餘書中屢試屢驗按證隨引量其老子虛實增損進退以意用之久久自得其效

虛勞總括 虛損成勞因復感陽虛外寒損肺經陰虛內熱從腎損飲食勞倦自脾成肺損皮毛瀉寒嗽損血少月經凝脾損食少肌消渴肝損脅痛惱於行臂損骨痿難久立午熱夜汗骨蒸蒸從下皮聚毛落死從上骨痿不起終日懶不解則傷精憇惕思慮則傷神喜樂無極則傷魄悲哀動中則傷魂憂愁不已則傷意盛怒不止則傷志勞倦過度則傷氣氣血脾胃筋精極註虛者陰陽氣血榮衛精神骨髓津液不足是也損者外而皮脈肉筋骨內而肺心脾肝腎消損是也成勞者謂虛損久留運不愈而成五勞七傷六極也因復感者謂不足之人陽虛復感外寒則損從皮毛肺始陰虛更生內熱則損從骨髓腎始內傷飲食勞倦則損從肌肉脾始此虛損成勞之必然其證有五一損皮聚毛落灑淅惡寒咳嗽肺勞也二損血脉虛少男子面無血色女子月經不通心勞也三損飲食減少肌肉消瘦大使溏瀉脾勞也四損兩脇引胸而痛筋緩不能行肝勞也五損骨痿不能久立午後發熱盜汗骨蒸腎勞也從下腎藏損起者損至皮聚毛落則死也從上肺藏損起者損至骨痿不能起於牀則終也從脾藏損起者或至皮聚毛落或至骨痿不起皆死也虛損為大傷之證一恐懼不解則傷精精傷則骨痿痿筋時自下蓋五藏主藏精者也不可傷傷則失守而陰虛陰虛則無氣無氣則死矣一怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破胆脫肉毛悴色夭死於冬也一喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂則意不存人皮革焦毛悴色夭死於夏也一悲哀動中則傷魂傷則狂妄不精不精則不正陰縮而攣筋兩脇骨不舉毛悴色大死於春也一盛怒不止則傷志傷則喜喜其前言腰脊不可以俯仰屈伸毛悴色大死於季夏也一勞倦過度則傷氣氣傷則火愈壯火則食氣故無氣以動喘乏汗出內外皆越則氣日耗則死矣虛損為六極之證一數轉筋十指爪甲痛筋極也一牙齒動手足痛不能久立骨極也一面白無血色頭髮皮落血極也一身上往往如鼠走削瘦乾黑肉極也一氣少無力身無膏澤筋脉羸瘦眼無精光立不能定身體苦瘡瘍之生瘡瘍極也一胸脇逆滿恒欲大怒氣少不能言氣極也按前人分七傷之證以多不確依內經改之庶後學易明也