

中等护士专业
医学多选题集
外科学及护理分册

1 9 8 4 . 9

中等护士专业

医学多选题集

外科学及护理分册

编 审

谷捷三 邢志强

齐乃刚 张魁元

辽宁省铁岭地区卫生学校

前 言

这套《医学多选题集》是根据部颁中等卫生学校护士专业教学大纲的要求和统编教材的内容，以我们在组织我校一九八四年护士毕业班总复习所编复习题和模拟试题为基础，并参考兄弟院校的多选题，整理编辑而成，供内部使用。

本《集》可供护士专业学生复习考试、从事护士专业者自学以及晋级考试参考使用。对其他卫生专业的初、中级人员的学习，也有一定参考意义。

本《集》包括《基础护理学分册》（1100余题）、《内科学及护理分册》（1800余题）和《外科学及护理分册》（1500余题）三部分。总共近4500余题。

《医学多选题集》编审成员：张魁元（主编）王英娴、包英华、张凤珍、张恩宏、毛大成、邢志强、谷捷三、齐乃刚。

由于我们的水平有限，时间仓促，错误和不妥之处在所难免，希望读者批评指正。

编 者

1984、9

解题说明

一、A型题(最佳回答题):

先列出一段叙述性主题,接着写出A、B、C、D、E五个备选答案,其中只有一个是正确的(亦可能是问题中要求指出错误的一个),称为正确选择或正确答案,另外四个为干扰答案,有的干扰答案全错,有的是部分正确的。答题时从五个备选答案中选一个最佳答案,在答卷上将相应题号的相应字母涂黑,表示正确回答。如果选择两个或两个以上答案,视为无效。

二、B型题(配伍题):

先列出A、B、C、D、E五个备选答案,接着是几个试题。要求回答每一问题时在五个备选答案中选择一个正确答案与之配伍,并在答卷上将相应题号的相应字母涂黑。备选答案中的每一答案,可以重复使用,也可以不被选用。

三、C型题(比较选择题)

先列出A、B、C、D四个答案,接着是几个试题。要求对A和B列出的两种现象进行对比,因此有四种可能性: A是正确的,答案为A; B是正确的,答案为B; A和B都正确,答案为C; A和B都不正确,答案为D。答题时,在答卷上将认为正确的相应题号的相应字母涂黑,每题只许选一个正确答案,否则视为无效。

四、K型题(复合是非题):

先列出一段叙述性主题,接着是①、②、③、④标出的

四个备选答案。答案是按固定的方式进行组合，其方式为：

A: ① + ② + ③

B: ① + ③

C: ② + ④

D: ④

E: ① + ② + ③ + ④

其意为：如果认为正确答案包括①、②、③则在答卷上将相应题号的 A 涂黑；如果认为正确答案包括①和③，则将答卷上相应的 B 涂黑；如果认为正确答案包括②和④，则将答卷上相应的 C 涂黑；如果认为正确答案为④，则将答卷上相应的 D 涂黑；如果认为正确答案包括①、②、③、④，则将答卷上相应的 E 涂黑。每题只许选择 A、B、C、D、E 五组答案中的一个，否则视为无效。

目 录

第 一 章	外科无菌方法	1
第 二 章	手术室工作	8
第 三 章	体液平衡与液体疗法	13
第 四 章	休克	25
第 五 章	麻醉	36
第 六 章	复苏术	42
第 七 章	手术前后护理	48
第 八 章	感染	55
第 九 章	损伤	68
第 十 章	伤口处理及更换敷料	79
第 十 一 章	肿瘤	82
第 十 二 章	先天疾病	90
第 十 三 章	颅脑损伤	94
第 十 四 章	颈部疾病	103
第 十 五 章	胸部疾患	110
第 十 六 章	腹部疾患	122
第 十 七 章	直肠肛管疾患	155
第 十 八 章	周围血管疾患	165
第 十 九 章	泌尿及男性生殖系疾患	171
第 二 十 章	骨与关节疾患	193

第一章 外科无菌方法

〔A型题〕

1. 关于煮沸灭菌法应当

A. 将被消毒物直接放锅内
煮沸20分钟

B. 将被消毒物包好放锅内
煮沸20分钟

☒ C. 将被消毒物包好放锅内
被水没过煮沸20分钟

D. 锋利器械的消毒一般可
用此法

E. 高原地区消毒时间亦为
20分钟

2. 关于物品的高压蒸汽灭菌
下列哪项是错误的?

A. 灭菌包裹不可超过 $50 \times$
 30×20 厘米

☒ B. 欲消毒物品均按压力
 $1.05 \sim 1.40$ 公斤/平方
厘米, 45~30分钟即可

C. 有盖容器应半开, 药液
不超过容量的 $2/3$

D. 刀剪等利器不用此法灭
菌

E. 灭菌后在干燥状态可保

持无菌10~14日

3. 用蒸笼对布类灭菌自煮沸
算须蒸时间为

A. 5~10分钟

B. 10~20分钟

C. 20~40分钟

D. 40~60分钟

☒ E. 60~120分钟

4. 关于化学法灭菌不正确的
是

A. 用化学法灭菌称为抗菌
术

B. 所用药品须不同的有效
浓度和消毒时间

☒ C. 此法适用于一切物品和
器械的消毒

D. 被消毒物应清洁、干
燥、去脂

E. 使用前须将物品上的药
液用无菌盐水冲净

5. 有关酒精消毒的叙述错误
的是

A. 常用于皮肤和器械消毒

- B. 按重量比计算, 96%酒精杀菌力最强
- C. 仅用于消毒带玻管之肠线, 保存剩余之肠线及引流橡皮片等
- D. 浸泡时间至少90分钟, 故用于金属器械易生锈
- E. 为防生锈可放入碳酸钠使成约1.4%液
6. 用1: 1000新洁尔灭溶液泡手消毒, 每桶可用
- A. 25人次
- B. 30人次
- C. 35人次
- D. 40人次
- E. 45人次
7. 手术人员戴手套时, 下述哪项不正确?
- A. 双手涂撒滑石粉
- B. 用右手提两手套之翻转部, 使两拇指相对, 戴入左手
- C. 将左手插入右手套翻转部, 戴入右手
- D. 将两腕端翻转部翻回压住袖口
- E. 以上穿戴过程中手套外面未与皮肤接触故可上台手术
8. 锐利器械的消毒宜用
- A. 高热蒸汽灭菌法
- B. 蒸笼法
- C. 化学药物灭菌法
- D. 煮沸法
- E. 干燥灭菌法
9. 关于戴无菌手套的叙述, 错误的是
- A. 手部不可触及手套外面
- B. 戴干手套时, 先穿手术衣, 再戴手套
- C. 戴湿手套时, 先戴手套, 举手使水流出再穿手术衣。
- D. 紧急洗手后用碘酊及酒精涂擦后戴两副手套
- E. 戴手套后未能立即手术, 应将手置腋下
10. 下列洗手法之肥皂刷洗步骤哪项不正确?
- A. 先用肥皂、清水将手及前臂洗涤一遍
- B. 再用灭菌毛刷肥皂消毒腋

皂液刷手

C、要自甲缘，甲指各面，指、手、腕、臂刷至肘上三寸

✓ D、两手交替，各刷两遍，共约五分钟，冲净

E、用灭菌巾将手、臂、肘上依次拭干

11、紧急情况下手臂洗手法选以下哪种消毒剂为最好？

A、0.1%新洁尔灭

B、0.1%升汞

C、2%来苏

✓ D、3%碘酊及75%酒精

E、75%酒精

12、下列哪项不属热力灭菌法？

✓ A、乳酸加热蒸发消毒

B、流动蒸汽灭菌法

C、干热灭菌法

D、煮沸灭菌法

E、高压蒸汽灭菌法

13、下列有关无菌术的叙述，哪项是正确的？

✓ A、消灭一般细菌用1—2%碳酸氢钠液消毒，煮沸时间可略少于20分钟

B、手及前臂清洁后可浸泡75%酒精中消毒3分钟

C、手术区皮肤消毒须包括切口周围12厘米

D、无菌术即消毒法

E、抗菌术一般以物理方法为主

14、关于芽胞菌的灭菌，下列哪项是不正确的？

A、煮沸1—2小时

B、流动蒸汽灭菌自沸后蒸1—2小时，连续2—3天内每日一次

C、高压灭菌30分钟

✓ D、1:1000新洁尔灭浸泡20分钟

E、75%酒精浸泡60分钟以上

15、氨水洗手法所用的氨水浓度应是

A、1%

B、0.5%

C、0.1%

D、0.01%

✓ E、0.05%

16、有关无菌术，下列哪项是

错误的?

- A. 锐利器械, 内窥镜不适于热力灭菌
- B. 煮沸消毒需45分钟才能杀死芽孢菌 60'
- C. 玻璃、橡胶制品可经煮沸消毒
- D. 对橡胶制品高压蒸汽灭菌, 温度115—121°C, 不得少于15分钟
- E. 灭菌后包裹干燥情况下, 10—14天内使用时可不再消毒
17. 刀剪, 缝针的消毒采用下列哪种方法为宜?
- A. 煮沸灭菌法
- B. 高压蒸汽灭菌法
- C. 流动蒸汽灭菌法
- D. 干热灭菌法
- E. 化学药品浸泡法

〔B、C型题〕

- A. 石炭酸溶液
- B. 酒精溶液
- C. 新洁尔灭溶液

D. 福尔马林溶液

E. 碘酊

18. 保存消毒剩余肠线及引流用橡皮片 B
19. 常配成器械消毒液浸泡锐利器械 A
20. 有机玻璃, 内窥镜、胶质导管 D
21. 杀菌力强, 宜用于橡胶, 塑料、金属但忌遇肥皂及盐类 C
- A. 石炭酸, 酒精
- B. 水化氯醛
- C. 过氧化氢, 漂白粉、碘
- D. 高锰酸钾
- E. 新洁尔灭

22. 使细菌体内蛋白质凝固变性 A
23. 使细菌体内酶蛋白中的一SH基氧化, 影响代谢而死亡 C
24. 使细菌细胞膜通透性改变, 致细胞破裂或溶解

- A. 抗菌术
- B. 无菌术
- C. 二者均用
- D. 二者均不用

25. 病人皮肤, 手术人员的手臂的消毒用 **A**

26. 敷料, 器械等的消毒用 **B**

27. 外科无菌法 **C**

A. 应用化学药品消灭细菌及其他微生物的方法

B. 将与手术区或伤口接触的物品予先彻底消灭其所附之细菌及其他微生物, 以防止感染的方法

C. 二者均用

D. 二者均不用

28. 无菌术 **B**

29. 抗菌术 **A**

30. 外科无菌方法 **C**

[K型题]

31. 下列关于感染的叙述哪些是正确的 **A**

①是细菌或其他微生物侵入机体后引起的炎症反应

②手术或治疗时切应尽量避免发生感染

③感染可致手术失败, 给病人带来痛苦和危害

④按无菌技术 无菌法则也不能减少感染的发生

32. 干热灭菌(酒精烧灼)法: **B**

①蛋白质不易凝固, 灭菌不彻底

②虽只烧灼片刻, 但温度较高, 灭菌较可靠

③为求烧灼彻底, 金属器械易损坏

④一般常采用此法

33. 正确的肥皂水刷手法是

①用肥皂一般洗手 **C**

②以灭菌刷蘸肥皂液两手交替由指尖刷至肘上三寸

③第一次刷完冲净, 再由指尖向上重刷三次, 约10分钟

④用灭菌小巾由手向肘擦干

34. 手术间紫外线照射消毒的原则是: **B**

①连续使用4小时后即应照射消毒

②此法不因湿度, 温度的不同而改变照射时间

③1支30瓦紫外线灯, 距地

面2.5公尺, 30立方米空间可照射30—40分钟

- ④此法较药物熏蒸消毒更为有效

35. 手术间药物熏蒸消毒的应用为

- ①用于污染手术后的终末消毒或定期消毒

- ②短期内需使用手术间时用乳酸0.3—0.5毫升/立方米关闭30分钟

- ③40%福尔马林4毫升/立方米加高锰酸钾2克, 关闭6—8小时

- ④消毒后室内家具勿须另行消毒

36. 穿无菌手术衣的正确步骤是

- ①提衣领两端, 抖开手术衣

- ②将手术衣里面对向自己向上向前轻掷

- ③两手就势插入袖筒, 伸出后于胸前交叉

- ④提起腰带之两端作结

37. 手术人员经肥皂刷手后, 怎样正确进行手臂消毒?

- ①浸泡于70%酒精或0.1%新洁尔灭内5分钟

- ②浸泡于95%酒精中5分钟

- ③紧急情况下用2.5%碘酊擦手及前臂一遍, 再用70%酒精脱碘后须戴两付无菌手套

- ④用0.1%高锰酸钾浸泡10分钟

38. 接台连续手术应

- ①洗净手套上血渍, 先脱手术衣再脱手套

- ②在流水下冲洗双手, 擦干、浸消毒液内5分钟

- ③穿无菌手术衣戴干手套

- ④有无菌手术后的接台连续手术均同

39. 手术区皮肤消毒的原则为

- ①一般用纱布蘸2.5—3%碘酊涂1—2遍, 待干用70%酒精涂两遍

- ②范围包括切口15厘米内的皮肤

- ③腹部先滴碘酊于脐, 再以切口为中心向外涂擦, 最后拭净脐处碘酊

- ④粘膜、面部、会阴部、婴幼儿皮肤，取皮区及碘过敏者应选用其他无刺激性药物
40. 粘膜及肛门部的消毒可用
- ① 0.1%新洁尔灭 **B**
 - ② 75%酒精
 - ③ 2%红汞
 - ④ 2.5%碘酒
41. 关于煮沸灭菌下列哪项正确? **A**
- ① 物品没入锅水，水沸后煮20分钟
 - ② 在海拔1500公尺以上处，消毒时间应相应延长
 - ③ 刀剪一般不采用煮沸灭菌法
 - ④ 水中加入碳酸氢钠可以防锈，对灭菌时间没有影响。

- | | | |
|------|------|------|
| 10.D | 11.D | 12.A |
| 13.A | 14.D | 15.E |
| 16.B | 17.E | 18.B |
| 19.A | 20.D | 21.C |
| 22.A | 23.C | 24.E |
| 25.A | 26.B | 27.C |
| 28.B | 29.A | 30.C |
| 31.A | 32.B | 33.E |
| 34.B | 35.A | 36.A |
| 37.B | 38.A | 39.E |
| 40.B | 41.A | |

答 案

- | | | |
|-----|-----|-----|
| 1.C | 2.B | 3.E |
| 4.C | 5.B | 6.D |
| 7.E | 8.C | 9.E |

第二章 手术室工作

〔A型题〕

1. 不符合接送病人规则的是
- A. 接病人时要查对姓名、性别、病室、床号、住院号、诊断、手术名称等
- B. 将病历、X线照片、取血单、输液用品等带至手术室
- C. 同时将病人贵重物品、假牙等一同带去
- D. 协助将病人肢体固定于手术床上
- E. 接送途中勿使病人受凉
2. 手术进行中的无菌原则，下列哪项是错误的？
- A. 始终严格按无菌技术操作
- B. 术中手套触及非无菌区或穿破，立即更换
- C. 切开胃肠道后要用70%酒精涂擦粘膜进行消毒
- D. 切开或缝合皮肤前用70%酒精消毒
- E. 术者需用器械时应由手术护士或助手传递
3. 关于缝合原则，不正确的是
- A. 分清层次，按次序将同层组织缝合
- B. 伤口内不得留有死腔
- C. 缝线越紧越好
- D. 缝线太松会延长愈合时间，瘢痕较大
- E. 感染伤口不得立即缝合
4. 下列哪项不属于器械（洗手）护士的职责？
- A. 了解手术步骤及配合要求
- B. 手术中密切观察病情变化，保持输液输血的通畅
- C. 按时清点器械、敷料、缝针数目
- D. 传递器械、物品
- E. 术后清洗及处理器械用品

5. 手术中传递器械时下列哪项是错误的?

- A. 由手术护士或助手传递
- B. 凡触及腹以下或背后者均不得再用
- C. 器械下坠超过手术床边以下者不再使用
- ☒ D. 术者可伸臂横过手术台取所需器械
- E. 助手不得从手术者背后递送

6. 手术中最常用的打结法是

- A. 外科结
- B. 三重结
- ☒ C. 方(平)结
- D. 滑结
- E. 假结

7. 手术时在器械台的管理上, 下列哪项是错误的?

- A. 台上保持干燥、整洁、无菌
- B. 器械按使用次序先后放置
- C. 用于切皮的刀及纱布要用弯盘盛接另置
- ☒ D. 吸引头每次用后均用热

盐水吸洗

E. 关闭胸膜腔切口前清点器械、物品无误

8. 铺无菌手术布时, 一般要求垂缘为

- A. 10~15厘米
- B. 15~20厘米
- C. 20~25厘米
- D. 25~30厘米
- ☒ E. 30厘米以上

〔B型题〕

- A. 侧卧位
- B. 颈仰卧位
- C. 俯卧位
- D. 膝胸位
- E. 仰卧位

9. 腹部和腹侧手术体位是

10. 颈前如甲状腺、气管手术体位是 **B**

11. 脊柱和其他背部手术体位是 **C**

12. 胸部和肾脏的手术体位是

- A. 手术巾(治疗巾)
- B. 孔巾

- C. 剖腹单
D. 中单
E. 包布
13. 常用于遮盖手术切口周围皮肤 **A**
14. 用于铺盖器械台等 **D**
15. 多用于表浅小手术或椎管麻醉穿刺时 **B**
A. 纱布垫
B. 纱布条
C. 纱布剥离子
D. 纱布球
E. 纱布卷或引流条
16. 用于手术时遮盖皮肤、擦血和遮盖保护脏器的是 **A**
17. 用于手术时探试深部是否有出血点或作压迫止血的是
18. 用特制钳子挟持, 剥离粘连组织的是 **C**
A. 胶片引流条
B. 卷烟引流条
C. 胶管引流条
D. 双管引流条
E. 纱布引流条
19. 表浅部位伤口的引流常用 **A**
20. 胸腔引流时常用
21. 腹腔深处引流时常用
A. 肠线
B. 丝线
C. 马尾线
D. 尼龙线
E. 不锈钢线
22. 适用于缝合膀胱、胆道、子宫的是
23. 适用于皮肤缝合的是
24. 易吸收的缝合线是
A. 单纯间断缝合法
B. 单纯连续缝合法
C. “8”字形缝合法
D. 间断外翻缝合法
E. 间断内翻缝合法
25. 适用于缝合皮肤、肌肉的是 **A**
26. 适用于胃肠道浆肌层缝合的是 **B**
27. 适用于血管吻合和腹膜吻合的是 **D**

〔C型题〕

A. 洗手护士

- B. 供应护士
C. 二者均是
D. 二者均不是
28. 术中准备缝合伤口时, 要检查核对器械、敷料、缝针等数目 C
29. 手术完毕包扎伤口 B
A. 供应护士
B. 洗手护士
C. 二者均是
D. 二者均不是
30. 参与手术器械、敷料的灭菌准备工作 B
31. 手术中监督无菌技术的正确执行 A
A. 三角针
B. 圆针
C. 二者均可
D. 二者均不可
32. 缝合皮肤和软骨 A
33. 缝合一般软组织 B
A. 肠线
B. 丝线
C. 二者均可
D. 二者均不可
34. 抗拉力强、结扎力可靠 B
- 组织反应小、价廉易得者
35. 在体内能被吸收, 不致形成粘连或结石者 A
A. 将器械洗刷干净, 放烤箱或沸水中(镊器泡消毒液中), 抹干、涂油
B. 将器械先泡消毒液中作初步消毒, 再洗刷并按上法处理
C. 二者均可
D. 二者均不可
36. 一般无菌手术后器械的处理 A
37. 感染手术后器械的处理 B
A. 硬引流胶管
B. 软引流胶管
C. 二者均可
D. 二者均不可
38. 较深部软组织脓肿的引流用 B
39. 胸腔引流用 A
- [K型题]
40. 巡回护士的分工为 A
①检查手术间设备是否完