

依据最新考试大纲 编写

2013

全国卫生专业 技术资格考试用书

护理学专业(护师)考试

最佳畅销书

通关必做2000题

卫生专业技术资格考试研究专家组 编写

● 权威专家精心打造 精选试题再现命题规律，名家解析指引答题迷津，融会贯通提升复习效果，致力于为考生提供最优秀的辅导用书，是医药科技人不懈的追求 ●

中国医药科技出版社

全国卫生专业技术资格考试用书

内容提要

本书根据《全国卫生专业技术资格考试大纲》（2005年版）编写，由全国护理学教材编审委员会组织编写。全书共分12章，主要内容包括：基础护理学、内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学、精神科护理学、中医护理学等。每章均设有“学习目标”、“考点与难点”、“考试要点”、“历年考试真题”、“历年考试分析”、“历年考试趋势”、“历年考试预测”、“历年考试真题”等栏目，帮助读者系统地掌握各科知识。

本书是一本非常适合护士执业资格考试的参考书，是参加护士执业资格考试的理想教材。

2013 护理学专业(护师)考试 通关必做2000题

卫生专业技术资格考试研究专家组 编写

第1版 (2013年版)

2013年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5067-3208-6

印数 1—10000

开本 787×1092mm

印张 15.5

长沙卫生职业学院图书馆

藏书章
长沙卫生职业学院图书馆



长沙卫生职业学院图书馆



CW0065225

中国医药科技出版社

内 容 简 介

《2013 护理学专业（护师）考试通关必做 2000 题》的策划理念是帮助忙碌的护理考生花最少的时间轻松突破护考的堡垒而快速过关取胜。因此高效性、趣味性和针对性成为本书追求的最高境界。围绕“学会做善于考试的白衣天使”这一目标，按照大纲和考试要求，参照历年考题，精心挑选了 2300 余道考前冲刺必做题，对难题、偏题和怪题做了解析，有助于考生强化记忆、提高答题技巧，帮助考生灵活应对考试、顺利通关。

本书是参加 2013 护理考试的上佳参考书，可以帮助忙碌的考生摆脱没完没了的考试而一次过关。

图书在版编目 (CIP) 数据

2013 护理学专业（护师）考试通关必做 2000 题/卫生专业技术资格考试研究专家组编写. —北京：中国医药科技出版社，2013. 1

全国卫生专业技术资格考试用书

ISBN 978 - 7 - 5067 - 5709 - 6

I. ①2… II. ①卫… III. ①护理学 - 资格考试 - 习题集 IV. ①R47 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 254044 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社
地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号
邮编 100082
电话 发行：010 - 62227427 邮购：010 - 62236938
网址 www.cmstp.com
规格 A4
印张 11 3/4
字数 448 千字
版次 2013 年 1 月第 1 版
印次 2013 年 1 月第 1 次印刷
印刷 大厂回族自治县德诚印务有限公司
经销 全国各地新华书店
书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 5709 - 6
定价 29.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编写说明

护师资格考试是一种职称资格考试，为了帮助读者能顺利地通过 2013 年的考试，我们根据最新版大纲的要求，结合多年从事考前辅导和基础教学工作的实践经验，编写了这本《2013 护理学专业（护师）考试通关必做 2000 题》。试题按章节进行编排，涵盖了护师资格考试各项考点，覆盖面全，针对性强，对于典型试题和易错题提供精当的解析，便于考生们复习理解。

护师资格考试通常在每年的 5 月举行，我们建议考生复习采用三段式复习方式，提升复习效率，巩固复习效果。

第一阶段，系统复习阶段（建议时间控制在 2 个月）。第一阶段全面复习考试大纲要求内容。以教材加考试大纲为主，配合《2013 护理学专业（护师）考试考点速记》（中国医药科技出版社出版）进行复习（时间分配：教材 + 大纲：速记 = 70% : 30%）。结束后，做《2013 护理学专业（护师）历年考点精析与避错》，深入了解考试重点和命题规律，发现复习中存在的问题。建议复习时，多动手，多总结，书和考点速记配合着学习。复习内容以历年考试重点为主，要把宝贵的时间用在刀刃上。

第二阶段，以教材和考点速记复习为主（建议时间 2 个月，时间分配：教材和笔记 50% : 50%）。有了第一阶段的系统复习，这个时候，你对考试内容都会有一定的感觉。这个阶段以重点复习为主。建议每章看后，配合《2013 护理学专业（护师）考试通关必做 2000 题》对本章复习成果进行检验。

第三阶段，冲刺为主（建议时间 1 个月），快速突破《2013 护理学专业（护师）历年考点精析与避错》。配合《2013 护理学专业（护师）考试冲刺试卷》继续巩固前两个阶段复习成果。真题练习是任何辅导练习题不能替代的。

相信，经过以上三个阶段的复习，加上你的决心和努力，圆梦 2013 不再是梦想。我们致力于为广大考生提供优秀的辅导图书，也欢迎广大读者为我们提出宝贵建议，不断修订完善图书质量，满足广大读者需求。邮箱：yykj401@163.com。

本书编委

2012 年 11 月

目 录

上篇 通关试题	(1)
第一章 基础护理学	(1)
第二章 内科护理学	(23)
第三章 外科护理学	(55)
第四章 妇产科护理学	(90)
第五章 儿科护理学	(110)
下篇 通关试题答案和精选解析	(127)
第一章 基础护理学	(127)
第二章 内科护理学	(136)
第三章 外科护理学	(155)
第四章 妇产科护理学	(166)
第五章 儿科护理学	(175)

上篇 通关试题

第一章 基础护理学

1. 5月12日国际护士节是

- A. 南丁格尔的生日
- B. 南丁格尔逝世的日期
- C. 南丁格尔奖宣布设立的日期
- D. 南丁格尔接受英国政府奖励的日期
- E. 南丁格尔创办第一所护士学校的日期

2. 按护理工作内容进行分工，各司其职、互不干扰的护理工作方式属于

- A. 个案护理
- B. 综合护理
- C. 功能制护理
- D. 小组制护理
- E. 责任制护理

3. 保持乐观、开朗、稳定的情绪，宽容豁达的胸怀，建立良好的人际关系，属于对护士哪一方面的要求

- A. 思想素质
- B. 文化素质
- C. 专业素质
- D. 心理素质
- E. 体态素质

4. 我国将护士教育列为中等护理专业教育的时间是

- A. 1938年
- B. 1943年
- C. 1948年
- D. 1950年
- E. 1985年

5. 有关护理学任务、研究范围的描述正确的是

- A. 护理学的服务形式只适于医院内
- B. 护理伦理不属于护理学的研究范围
- C. 促进和保持健康是护理学的任务之一
- D. 护理学的主要任务就是针对已经患病的人
- E. 护理人员的自身发展不属于护理学的研究范围

6. 中华护士会成立于

- A. 1835年
- B. 1888年
- C. 1909年
- D. 1934年
- E. 1936年

7. 护理的对象是

- A. 所有的人
- B. 健康的人
- C. 患病的人
- D. 有残疾的人
- E. 有心理障碍的人

8. 护理学的4个基本概念指的是

- A. 预防、治疗、护理、环境
- B. 病人、健康、社会、护理
- C. 人、环境、健康、预防
- D. 病人、预防、治疗、护理
- E. 人、环境、健康、护理

9. 下列不属于护理学四个基本概念的是

- A. 人
- B. 健康
- C. 保健
- D. 环境
- E. 护理

10. 下列有关“健康”的描述，正确的是

- A. 健康就是各器官功能正常
- B. 健康就是无躯体疾病或不适
- C. 健康就是个体能正确地评价自己
- D. 健康就是有完好的生理、心理和社会适应能力
- E. 健康与疾病是对立的，不能相互转化

11. 下列有关成长与发展的说法错误的是

- A. 成长与发展是按照一定的顺序进行的
- B. 个体心理的发展是没有规律可循的
- C. 每个人都要经历相同的发展阶段
- D. 每个发展时期都有一定的发展任务
- E. 婴幼儿期的发展影响个体的气质和生活方式

12. 下列属于内环境的是

- A. 物理环境
- B. 生理环境
- C. 自然环境
- D. 风俗习惯
- E. 社会交往

13. 以人为中心，以护理程序为基础，以现代护理观为指南，对人实施从生理、心理和社会各个方面的护理，从而使人达到最佳健康状况的护理是
 A. 个案护理 B. 功能制护理
 C. 小组护理 D. 责任制护理
 E. 整体护理
14. “疲劳、疼痛”属于
 A. 生理性的压力源 B. 心理性的压力源
 C. 社会性的压力源 D. 物理性的压力源
 E. 化学性的压力源
15. 爱瑞克森认为个体解决自我认同与角色紊乱危机的主要时期是
 A. 潜在期 B. 青春期
 C. 成人早期 D. 成人期
 E. 老年期
16. 病人处于安全的需要最希望
 A. 有知识、负责任护士的照顾
 B. 了解有关用药方面的知识
 C. 家属能够经常来院陪伴
 D. 尽量不要用药物治疗
 E. 获得一个安静的休养环境
17. 根据艾瑞克森的心理社会发展学说，需完成“亲密—孤独”这一发展任务的时期是
 A. 口感期 B. 肛—肌期
 C. 青春期 D. 青年期
 E. 成年期
18. 根据马斯洛的理论对人类基本需要各层次间关系的理解正确的是
 A. 需要层次上移后满足需要的差异性很小
 B. 不同层次的需要会出现重叠甚至颠倒
 C. 所有需要都必须立即和持续地给予满足
 D. 不同层次的需要的位置是固定不变的
 E. 各需要层次有其独立性不会相互影响
19. 护士为长期卧床的病人做背部护理，此时护士的角色是
 A. 健康照顾者 B. 健康教育者
 C. 病人权利的维护者 D. 协调人员
 E. 护理研究人员
20. 女，50岁，面部烧伤恢复期，面部留有瘢痕，病人常有自卑感，不愿见人。护士应特别注意满足病人哪方面的需要
 A. 生理的需要 B. 安全的需要
 C. 爱与归属的需要 D. 尊重的需要
 E. 自我实现的需要
21. 男，72岁，因右下肢股骨颈骨折入院，给予患肢持续牵引复位。病人情绪紧张，主诉患肢疼痛，评估病人后，护士应首先解决的健康问题是
 A. 躯体移动障碍 B. 焦虑
 C. 生活自理缺陷 D. 疼痛
 E. 有皮肤完整性受损的危险
22. 男性，56岁，直肠癌术后，肛门切除，腹部置假肛造瘘口。病人术后身体恢复良好，但不愿见人，不与人交流，此时护士应注意满足病人的
 A. 生理需求 B. 安全的需求
 C. 爱与归属的需求 D. 尊重的需求
 E. 自我实现的需求
23. 女，40岁，新被确诊为原发性高血压，她努力调整自己的心态去接受患病的事实，此种适应属于
 A. 生理适应 B. 心理适应
 C. 文化适应 D. 社会适应
 E. 技术适应
24. 系统的基本属性不包括
 A. 整体性 B. 独立性
 C. 动态性 D. 目的性
 E. 层次性
25. 有关系统论的描述正确的是
 A. 次系统与超系统是两个绝对的概念
 B. 系统各组成部分互不相关
 C. 人是自然系统中的次系统
 D. 系统论是护理学的唯一理论依据
 E. 开放系统与环境的作用是通过输出和输入过程完成的
26. 指导护士评估病人健康状况，预见病人需要的理论是
 A. 学习的理论
 B. 信息交流理论
 C. 人的基本需要层次理论
 D. 人、环境、健康与护理的理论
 E. 疾病系统论
27. 保健系统模式认为当应激原穿过机体正常防御线引起症状后，对病人的护理干预是
 A. 初级预防 B. 一级预防
 C. 二级预防 D. 三级预防
 E. 四级预防
28. 符合纽曼对“初级预防”阐述的是
 A. 采取早期诊断、治疗和护理措施
 B. 预防应激原侵犯或减少侵犯的可能，加强机体正常防御
 C. 帮助病人预防并发症
 D. 帮助病人进行康复锻炼

- E. 采取预防措施使其在受到侵犯后恢复平衡
- 29. 关于纽曼的健康保健模式，下列描述正确的是**
- 服务对象系统的核心部分是各级防线
 - 弹性防线位于正常防线与抵抗线之间
 - 当个体遇到压力源时，抵抗线首先被激活
 - 正常防线处于波动状态，但变化速度较慢
 - 当压力源侵入正常防线出现症状时，应采取一级干预
- 30. 罗伊适应模式中对“人”的阐述不正确的是**
- 人是一个适应系统
 - 包括个体、家庭、群体、社区人群
 - 人不断调整自己去适应变化的环境
 - 人体的生理调节器和认知调节器构成了适应的过程
 - 人的适应性反应体现在生理功能和角色功能保持平衡状态
- 31. 纽曼的保健系统模式认为护士协助病人进行康复锻炼是属于**
- 初级预防
 - 一级预防
 - 二级预防
 - 三级预防
 - 四级预防
- 32. 女性，75岁，脑血管意外，意识不清，长期卧床。根据奥瑞姆的自理模式，护士提供的护理应属于**
- 全补偿系统
 - 部分补偿系统
 - 支持系统
 - 教育系统
 - 辅助系统
- 33. 强调护患关系在护理中作用的理论是**
- 保健系统模式
 - 自理模式
 - 适应模式
 - 人际间关系模式
 - 人类基本需要层次论
- 34. 提出自我照顾模式的学者是**
- 纽曼
 - 马斯洛
 - 佩皮劳
 - 奥瑞姆
 - 汉斯·席尔
- 35. 有关佩皮劳人际关系模式内容的描述，不正确的是**
- 认识期需要护士帮助病人认识所发生的问题
 - 确认期病人可能会完全被动地依赖护士
 - 进展期病人情况可能出现反复
 - 当病人生理上基本恢复，治疗性关系也就基本结束了
 - 护患关系的四期可出现部分重叠，持续时间也可能不同
- 36. 有关Peplau人际间关系模式核心内容的描述，不正确的是**
- 人是一个生理、心理和社会都处于动态变化的有
- 机体
- 环境是指与人相互作用的其他重要的事或物
 - 健康表示生理和心理方面的需要得到满足
 - Peplau模式是关于需要满足的程度
 - 护理是帮助人们满足现有的需要
- 37. 有关Roy适应模式的描述正确的是**
- 健康是一种完整的适应状态
 - 人在适应环境变化时无需付出能量
 - 人是一个适应系统，只具有生物属性
 - 护理的目标是促进人在生理功能上的适应
 - 人是通过生理调节维持身体平衡而达到适应
- 38. 在Orem的自理模式中，对护理学基本概念的阐述，不正确的是**
- 护理是一种服务和助人的方式
 - 护理是克服自理缺陷发展的活动
 - 环境是人以外的所有因素，社会希望人能自我管理
 - 人是有能力通过学习行为来达到自我照顾需要的
 - 健康是指人的生理和心理两方面的完好状态
- 39. 关于初级卫生保健的描述不正确的是**
- 应费用低廉
 - 是一项社会福利的系统工程
 - 是居民最基本、必不可少的
 - 一般由社区卫生工作者承担
 - 仅是卫生部的职责之一
- 40. 家庭病床收治的范围是**
- 需进行急诊手术的病人
 - 需进行急诊留观的病人
 - 疾病急性期的病人
 - 需进行抢救治疗的病人
 - 年老体衰的慢性病病人
- 41. 女，53岁，因哮喘急性发作，急诊入院。护士在入院初步护理中，下列哪项不妥**
- 护士自我介绍，消除陌生感
 - 立即给患者氧气吸入
 - 安慰患者，减轻焦虑
 - 详细介绍环境及规章制度
 - 通知医生，给予诊治
- 42. 男性，30岁，井下矿工。近日感胸闷、气急、呼吸困难，X线检查怀疑矽肺。该病人诊治的最佳医院是**
- 专科医院
 - 综合医院
 - 一级医院
 - 职业病医院
 - 全民所有制医院
- 43. 社区卫生服务的特点不包括**
- 实用性
 - 广泛性
 - 综合性
 - 针对性

- E. 连续性
- 44. 下列关于社区卫生服务的原则中叙述错误的是**
- 以为人民服务为原则
 - 以经济效益为首位
 - 坚持量力而行
 - 以社区人群需求为导向
 - 坚持执行结构调整政策
- 45. 下列属于一级医院的是**
- 全国、省、市直属的市级大医院
 - 一般市、县医院及省辖市的区级医院
 - 农村乡、镇卫生院和城市街道医院
 - 诊治专科疾病而设置的医院
 - 医学院的附属医院
- 46. 男, 45岁, 因上消化道大出血被送至急诊室。值班护士在医生未到达前首先应**
- 记录病人入院时间和病情变化
 - 向家属了解病史, 耐心解释
 - 通知住院处, 办理入院手续
 - 测生命体征, 建立静脉通路
 - 注射止血药物, 抽血标本配血
- 47. “您回到家要注意休息, 按时服药并在规定的时间来复查。您慢走”, 属于**
- 招呼用语
 - 介绍用语
 - 电话用语
 - 安慰用语
 - 迎送用语
- 48. 女, 68岁, 患慢性肺心病近8年。近日咳嗽、咳痰加重、明显发绀。给予半坐卧位的主要目的是**
- 使回心血量增加
 - 使肺部感染局限化
 - 使膈肌下降, 呼吸通畅
 - 减轻咽部刺激及咳嗽
 - 促进排痰, 减轻发绀
- 49. 可促进护患有效沟通的行为是**
- 不评论病人所谈到的内容
 - 及时陈述自己的观点和看法
 - 对病人的问题迅速作出解答
 - 当病人叙述过多时及时打断叙述
 - 病人担心疾病预后时, 应立即作出保证
- 50. 某病人, 70岁, 有冠心病史, 可疑直肠癌, 准备进行直肠指检, 采用何种体位为宜**
- 仰卧位
 - 蹲位
 - 侧卧位
 - 截石位
 - 俯卧位
- 51. 男性, 45岁, 2型糖尿病, 多食、多饮、多尿、消瘦。**
- 护士通过收集资料了解到该病人存在知识缺乏, 并为其制订护理计划, 此时护士与病人处于护患关系发展时期的
- 熟悉期
 - 工作期
 - 开始期
 - 解决期
 - 结束期
- 52. 男性, 56岁, 鼻咽癌, 进行放疗。护士询问病人“你对放疗有什么想法?”这一问题属于**
- 客观问题
 - 间接问题
 - 开放式问题
 - 闭合性问题
 - 非指导性问题
- 53. 女性, 22岁, 未婚, 宫外孕10周入院。护士在收集资料时可促进有效沟通的措施是**
- 在大病房内进行提问, 不必回避任何人
 - 告诉病人自己对婚前性行为的看法
 - 当病人谈话离题时立即打断病人
 - 选择在没有其他人员的房间内进行交流
 - 采用亲密距离进行交流
- 54. 女性, 80岁, 肿瘤晚期, 全身极度衰竭, 意识有时模糊。为安慰病人, 护士与其交流时应使用的距离是**
- 亲密距离
 - 个人距离
 - 社会距离
 - 工作距离
 - 公众距离
- 55. 倾听是非语言交流技巧之一, 其正确方法是**
- 病人叙述时, 护士要思考问题
 - 避免眼神的接触
 - 用心倾听, 表示对所谈话题有兴趣
 - 避免看清对方表情
 - 说话声音宜大, 避免听不清楚
- 56. 人际沟通的两种形式是**
- 语言性沟通和非语言性沟通
 - 口头沟通和书面沟通
 - 书面沟通和非语言性沟通
 - 口头沟通和非语言性沟通
 - 语言性沟通和书面沟通
- 57. 男, 34岁, 无痛性血尿2周, 疑为膀胱癌, 做膀胱镜检查。应协助其采用的体位为**
- 仰卧位
 - 侧卧位
 - 半坐卧位
 - 截石位
 - 膝胸卧位
- 58. 下列不属于非语言性沟通形式的是**
- 手势
 - 面部表情
 - 身体运动
 - 身体姿势
 - 健康宣教资料

59. 小陈是病人严某的责任护士，但第一次交谈就失败，请分析造成其失败的原因是
 A. 表情沉着、从容
 B. 在病人吃晚饭前进行交谈
 C. 热情介绍自己
 D. 选择一个安静环境进行交谈
 E. 仪表大方、整洁
60. 与病人交谈的正确方法是
 A. 不要与病人有眼神的交流
 B. 及时纠正病人叙述的内容
 C. 适当点头或轻声说“是”
 D. 对病人谈话及时作出是非判断
 E. 不断提问引导谈话的进行
61. 在护患关系建立初期，护患关系发展的主要任务是
 A. 对病人收集资料 B. 确定病人的健康问题
 C. 为病人制订护理计划 D. 与病人建立信任关系
 E. 为病人解决健康问题
62. 属于语言性交流的是
 A. 手势 B. 沉默
 C. 倾诉 D. 面部表情
 E. 专业性皮肤接触
63. 发生重大医疗事故的部门应在多长时间内上报其卫生行政部门
 A. 6 小时 B. 12 小时
 C. 24 小时 D. 48 小时
 E. 2 周
64. 李某，40岁，不慎被烧伤。Ⅱ度烧伤面积达45%。入院后应采用
 A. 严密隔离 B. 接触隔离
 C. 呼吸道隔离 D. 消化道隔离
 E. 保护性隔离
65. 女，30岁，高热，腹泻，诊断为细菌性痢疾对其应采取
 A. 严密隔离 B. 消化道隔离
 C. 昆虫隔离 D. 接触隔离
 E. 保护性隔离
66. 下列执行医嘱的行为属违法行为的是
 A. 紧急抢救时，执行口头医嘱
 B. 常规情况下，不执行电话医嘱
 C. 发现医嘱有错误时，对其进行修改
 D. 发现医嘱有错误时，拒绝执行，并向医生提出质疑
 E. 病人对医嘱提出质疑时，对医嘱的准确性进行核实
67. 医疗事故的构成要件不包括
 A. 主体是医疗机构及其医务人员
 B. 行为具有违法性
 C. 过失造成病人人身损害
 D. 过失行为与后果之间存在因果关系
 E. 病人对诊疗过程有异议
68. 有关医疗卫生法规的基本原则，描述错误的是
 A. 卫生保护原则 B. 预防为主原则
 C. 优先原则 D. 保障社会健康原则
 E. 病人自主原则
69. 执行医嘱时正确的是
 A. 一般情况下可执行口头医嘱
 B. 医嘱须经医生签字方为有效
 C. 医嘱须隔日仔细核对一次
 D. 需下一班执行的医嘱书面注明即可
 E. 各种通知单次日早晨集中送有关科室
70. 对一位成年病人，可忽略的健康资料是
 A. 既往患病史 B. 免疫接种史
 C. 过敏史 D. 家族病史
 E. 婚育史
71. 关于护理程序，描述正确的是
 A. 是一种技术操作的程序
 B. 是一种护理工作的简化形式
 C. 是一种护理工作的分工类型
 D. 是一种护理活动的循环过程
 E. 是一种系统地解决护理问题的方法
72. 关于潜在的健康问题的护理诊断，正确的陈述方式是
 A. 潜在的……并发症：与……有关
 B. 有……并发症：由……引起
 C. 有……的危险：与……有关
 D. 潜在的：有……危险
 E. 潜在的：有……可能
73. 观察病人从何时开始
 A. 来院挂号时 B. 入院一天内
 C. 写护理病历时 D. 作护理体检时
 E. 接触病人时
74. 护理程序是一种系统地解决问题的方法，是护士为服务对象提供护理服务所应用的
 A. 工作内容 B. 管理模式
 C. 规章制度 D. 健康模式
 E. 工作程序
75. 护理评估不准确，最可能导致的护理活动后果是
 A. 护理预期目标不能实现
 B. 医疗措施不能落实
 C. 病人参与护理活动的积极性不高
 D. 家属在病人康复中产生依赖
 E. 病人角色强化

76. 患者李某，女，45岁。诊断为血小板减少性紫癜，检查头面部及双下肢有散在瘀血点，轻触牙龈可见出血，该患者在口腔护理时应特别注意
 A. 动作要轻勿损黏膜
 B. 夹紧棉球防止遗留在口腔
 C. 蘸水不可过湿以防呛咳
 D. 先取下假牙避免操作中脱落
 E. 擦拭时勿触及咽部以免恶心
77. 将多个护理诊断排列优先顺序时，其次优问题是
 A. 威胁病人生命，需立即解决的问题
 B. 生命体征发生了不可逆变化的问题
 C. 不直接威胁病人生命，但导致身体上不健康的问题
 D. 不威胁病人生命，但影响病人情绪变化的问题
 E. 在护理的过程中，可稍后解决的问题
78. 女，25岁，妊娠39周，于2:30正常分娩。6:40病人主诉下腹胀、痛。视诊：下腹膀胱区隆起；叩诊：耻骨联合上鼓音。病人存在的健康问题是
 A. 尿潴留 B. 体液过多
 C. 排尿异常 D. 分娩后疼痛
 E. 有子宫内膜感染的可能
79. 进行护理评估时，资料的来源不包括
 A. 病人 B. 病历
 C. 病人家属 D. 其他医务人员
 E. 护士的主观判断
80. 女性，60岁，腹胀、腹痛、嗳气，近日下蹲或腹部用力时，出现不由自主的排尿。对新出现症状正确的护理诊断是
 A. 功能性尿失禁：与膀胱过度充盈有关
 B. 压力性尿失禁：与腹压升高有关
 C. 反射性尿失禁：与膀胱收缩有关
 D. 完全性尿失禁：与神经传导功能减退有关
 E. 功能性尿失禁：与膀胱括约肌功能减退有关
81. 女婴，2岁，肺炎，T 39.1℃、P 98次/分、R 30次/分，咳嗽，痰不易咳出，颜面潮红。其中一项护理诊断为体温过高，主要的诊断依据是
 A. 皮肤发红、触之有热感 B. 体温高于正常范围
 C. 呼吸、心跳均加快 D. 痰液不能排出
 E. 不能出汗
82. 提供病史最可靠的是
 A. 家属 B. 转诊资料
 C. 同来者 D. 病人自己
 E. 单位领导
83. 问诊时避免使用的词
 A. 黄疸 B. 大便带血
 C. 咳嗽 D. 头痛
- E. 心慌
84. 下列属于主观资料的是
 A. 头晕 B. 肌张力三级
 C. 膝关节红肿、压痛 D. 血压 16.3/10.6kPa
 E. 骶尾部皮肤破损 1cm × 2cm
85. 病人的疼痛可能会导致多方面的反应，下列不是由疼痛所引起的反应是
 A. 皱眉、哭泣、呻吟、尖叫
 B. 退缩、抑郁、愤怒、依赖
 C. 胃肠道紊乱、骨骼肌紧张、内分泌改变
 D. 血压升高、心率加快、手掌出汗、面色苍白
 E. 血钙升高、血糖升高、血钠降低、血氯降低
86. 女，66岁，诊断为心房纤维颤动。护士为其测血压。动脉搏动微弱而不易辨清，需重复测量。下述做法错误的是
 A. 将袖带内气体驱尽
 B. 使汞柱降到“0”点
 C. 稍等片刻后重测
 D. 连续加压直到听清为止
 E. 测量值先读收缩压，后读舒张压
87. 男，70岁。反复咳嗽、咳痰10余年，近3年来劳累后心悸、气促。入院时发绀明显，呼吸困难，应取
 A. 仰卧位 B. 侧卧位
 C. 头高足低位 D. 端坐位
 E. 膝胸位
88. 男，59岁，收缩压为165mmHg，舒张压为80mmHg，最有可能的是
 A. 心包积液 B. 心肌梗死
 C. 心动过速 D. 动脉硬化
 E. 休克
89. 男，48岁，内源性哮喘病人，主诉呼吸费力，呼气时间显著长于吸气，该病人最可能出现哪种呼吸异常
 A. 深度呼吸 B. 潮式呼吸
 C. 吸气性呼吸困难 D. 呼气性呼吸困难
 E. 混合性呼吸困难
90. 将昏迷病人平卧，头偏向一侧的目的是
 A. 保持颈部活动灵活
 B. 便于头部固定，避免颈椎骨折
 C. 减少枕骨压迫，防止枕后压疮
 D. 利于观察病情，及时治疗护理
 E. 引流分泌物，保持呼吸道通畅
91. 教给病人控制呼吸、垂肩、仰视、自我发泄等方法分散注意力，达到解除疼痛的方法是
 A. 催眠术 B. 松弛术

- C. 心理护理 D. 心理咨询
E. 健康教育
- 92. 进行胰胆管造影时应采取的体位是**
- A. 俯卧位 B. 头低脚高位
C. 头高脚低位 D. 侧卧位
E. 仰卧屈膝位
- 93. 男, 40岁。交通事故致复合创伤后1小时入院。病人呼吸由浅慢逐渐加深加快, 又由深快逐渐变为浅慢, 继之暂停30秒后再度出现上述状态的呼吸。该病人的呼吸是**
- A. 间断呼吸 B. 潮式呼吸
C. 毕奥呼吸 D. 呻吟呼吸
E. 呼吸困难
- 94. 男, 50岁, 有吸烟史, 咳嗽两个月, 咯血或痰中带血两周。胸片示左肺上叶有 $1.5\text{cm} \times 2.0\text{cm}$ 病灶。病人入院后入睡困难, 易觉醒。引起病人睡眠不佳的主要原因是**
- A. 年龄 B. 生理因素
C. 病理因素 D. 心理因素
E. 环境因素
- 95. 能提高人的注意力和警惕性, 使人处于一种有益于学习的状态的焦虑属于**
- A. 安康状态 B. 心神安定
C. 轻度焦虑 D. 中度焦虑
E. 重度焦虑
- 96. 女性, 30岁, 因乙型肝炎入传染病科住院隔离治疗, 限制其活动。该病人活动受限是属于**
- A. 焦虑造成活动无力 B. 运动系统功能受损
C. 社会因素的需要 D. 治疗措施需要
E. 疾病影响机体活动
- 97. 女性, 32岁, 过马路时不慎被汽车撞成右下肢开放性骨折, 因失血过多发生休克。入院后应采取的体位是**
- A. 头高足低位 B. 头低足高位
C. 中凹卧位 D. 去枕仰卧位
E. 俯卧位
- 98. 适合采取中凹卧位的病人是**
- A. 脑出血 B. 心包积液
C. 休克 D. 支气管哮喘
E. 虚脱
- 99. 下列不是舒适的正常表现的一项是**
- A. 没有疼痛 B. 没有焦虑
C. 没有忧愁 D. 轻松自在
E. 十分欣快
- 100. 下列关于睡眠影响因素的描述, 正确的一项是**
- A. 睡眠时间通常与年龄成正比
B. 过度疲劳有助于入睡
C. 补充激素不能改善绝经期妇女的睡眠质量
D. 安眠药能够加速睡眠, 但只能在短时间内增加睡眠量
E. 大量饮酒会使睡眠变深
- 101. 下列用于描述一种宁静、安详、无焦虑及无拘无束状态的是**
- A. 舒适 B. 休息
C. 睡眠 D. 活动
E. 放松
- 102. 寻找不舒适原因, 实施护理措施的有效渠道及必要的条件是**
- A. 护患合作 B. 促进睡眠
C. 减少焦虑 D. 解除疼痛
E. 指导放松方法
- 103. 腰穿后病人取去枕平卧位的主要目的是**
- A. 有利于脑部血液循环 B. 防止脑缺血、缺氧
C. 减轻脑膜刺激症状 D. 防止发生昏迷和休克
E. 预防颅内压减低引起头痛
- 104. 腰椎穿刺后的病人颅内压过低引起头痛的机理是**
- A. 脑部血液循环障碍
B. 脑代谢障碍
C. 脑部缺血、缺氧
D. 牵张颅内静脉窦和脑膜
E. 脑膜受刺激
- 105. 影响舒适的身体方面的因素不包括**
- A. 焦虑 B. 体位不当
C. 活动受限 D. 身体不洁
E. 机体不适
- 106. 不属于治疗膳食的是**
- A. 忌碘膳食 B. 低盐膳食
C. 无盐膳食 D. 低脂膳食
E. 低蛋白质膳食
- 107. 低盐饮食每日限用食盐**
- A. 2g B. 4g
C. 6g D. 8g
E. 10g
- 108. 患儿, 3岁, 诊断为缺铁性贫血, 血红蛋白 80g/L 。为改善贫血症状, 最佳食物是**
- A. 米粉、橙汁 B. 海带、紫菜
C. 鱼、罐头、水果 D. 动物肝脏、乳制品
E. 紫皮茄子、白菜

- 109. 男, 26岁。慢性肾衰竭, 饮食中每日蛋白含量不应超过**
- A. 20g
 - B. 30g
 - C. 40g
 - D. 50g
 - E. 60g
- 110. 男, 52岁, 有胃溃疡病史。近日来上腹部疼痛加剧, 医嘱做大便隐血试验, 应给患者哪一组菜谱**
- A. 卷心菜、五香牛肉
 - B. 菠菜、红烧青鱼
 - C. 荸荠、鸡蛋
 - D. 油豆腐、鸡血汤
 - E. 青菜、炒猪肝
- 111. 男, 25岁。患肺结核半年, 应给予**
- A. 高蛋白、高热量饮食
 - B. 高脂肪、高热量饮食
 - C. 高热量、低脂肪饮食
 - D. 低盐、高蛋白饮食
 - E. 高热量、低蛋白饮食
- 112. 忌碘饮食要求在检查治疗前禁食海带、紫菜等含碘高的食物的具体时间是**
- A. 3天
 - B. 7天
 - C. 10天
 - D. 1个月
 - E. 2个月
- 113. 男, 26岁。慢性肾衰竭, 不属于体内产生的有害物质为**
- A. 肌酐
 - B. 尿素
 - C. 氨基酸
 - D. 高钾
 - E. 高镁
- 114. 下列不属于微量元素的是**
- A. 锌
 - B. 铁
 - C. 碘
 - D. 镁
 - E. 硒
- 115. 下列应给予鼻饲饮食的患者是**
- A. 婴幼儿
 - B. 拔牙者
 - C. 拒绝进食者
 - D. 食欲低下者
 - E. 经常呕吐者
- 116. 小儿使用要素饮食时最大的浓度是**
- A. 10%
 - B. 11.5%
 - C. 12.5%
 - D. 15%
 - E. 25%
- 117. 在给病人鼻饲插管时, 如果病人出现呛咳, 呼吸困难, 正确处理的方法是**
- A. 嘴病人深呼吸, 喝温开水
 - B. 休息片刻后嘱病人做吞咽动作
 - C. 托起病人头部, 使下颌骨靠近胸骨柄
 - D. 停止操作, 取取消鼻饲
 - E. 拔出胃管休息, 症状缓解后再重新插管
- 118. 属于脂溶性的维生素是**
- A. 维生素K
 - B. 维生素C
 - C. 维生素B₁
 - D. 维生素PP
 - E. 维生素B₆
- 119. 长期留置导尿病人, 需要定期更换导尿管的主要目的是**
- A. 锻炼膀胱反射功能
 - B. 使病人暂时休息
 - C. 防止导尿管老化、折断
 - D. 防止逆行感染
 - E. 保持尿液引流通畅
- 120. 长期留置导尿管的病人, 出现尿液混浊、沉淀或结晶时应**
- A. 经常清洁尿道口
 - B. 膀胱内用药
 - C. 热敷下腹部
 - D. 进行膀胱冲洗
 - E. 经常更换卧位
- 121. 大量不保留灌肠时, 灌肠筒内液面距肛门的距离是**
- A. <20cm
 - B. <30cm
 - C. <35cm
 - D. 40~60cm
 - E. 70~80cm
- 122. 对尿失禁病人的护理中, 措施不当的是**
- A. 做好皮肤护理
 - B. 可采用接尿器或尿壶接尿
 - C. 嘱病人少饮水, 以减少尿量
 - D. 指导病人进行盆底肌肉锻炼
 - E. 对长期尿失禁病人可给予留置导尿管
- 123. 对尿液颜色描述正确的是**
- A. 胆红素尿为棕红色
 - B. 乳糜尿呈乳白色
 - C. 肾癌尿液呈黄褐色
 - D. 脓尿呈酱油色
 - E. 溶血反应的尿液呈红色
- 124. 关于粪便性状异常的描述, 错误的是**
- A. 肠套叠患者粪便呈果酱样便
 - B. 下消化道出血时粪便呈暗红色
 - C. 上消化道出血时粪便呈柏油样便
 - D. 完全性胆道阻塞时粪便呈酱油色
 - E. 直肠狭窄时粪便呈扁条状或带状
- 125. 灌肠前后分别排便一次在体温单上的记录方法是**
- A. 2
 - B. 2/E
 - C. 1/E
 - D. 1/2E
 - E. 11/E
- 126. 男, 在剖腹探查术后3日出现腹部不适, 体检腹部膨隆, 叩诊呈鼓音。最佳的处理方法是**
- A. 清洁灌肠
 - B. 保留灌肠
 - C. 大量不保留灌肠
 - D. 肛管排气
 - E. 服药导泻

127. 男, 40岁, 左前臂Ⅱ度烧伤5天, 局部创面湿润、疼痛。可在局部进行的处理是
 A. 红外线照射, 每次20~30分钟
 B. 湿热敷, 水温40%~60%
 C. 冷湿敷, 促进炎症吸收
 D. 放置热水袋, 水温60~70℃
 E. 放置冰袋, 减轻疼痛
128. 留24h尿标本时加入甲醛的作用是
 A. 防止尿液改变颜色
 B. 固定尿中有机成分
 C. 防止尿液被污染变质
 D. 防止尿液中的激素被氧化
 E. 保持尿液中的化学成分不变
129. 留24小时尿标本作17-羟类固醇检查, 为防止尿中激素被氧化, 其标本应加的防腐剂是
 A. 甲苯 B. 浓盐酸
 C. 甲醛 D. 稀盐酸
 E. 亚硝酸钠
130. 男, 13岁, 上呼吸道感染发热, 体温40℃, 应选择
 A. 头部用冰袋 B. 乙醇擦浴
 C. 头部冷湿敷 D. 温水浴
 E. 颈下放置冰袋
131. 女, 30岁, 颅脑损伤住院治疗, 行冬眠降温疗法。错误的护理是
 A. 用药前量体温、脉搏、呼吸、血压
 B. 物理降温后用冬眠药物
 C. 病人在注射冬眠药物后半小时内不宜翻身或搬运
 D. 维持直肠内温度在32~34℃
 E. 维持电解质及酸碱平衡
132. 为男性病人导尿, 提起阴茎与腹壁呈60°角, 可使
 A. 耻骨下弯消失 B. 耻骨前弯消失
 C. 尿道膜部扩张 D. 尿道三个狭窄都消失
 E. 耻骨下弯和耻骨前弯均消失
133. 下列不属于大量不保留灌肠适应证的是
 A. 为便秘者软化、清除粪便
 B. 为急腹症病人做肠道准备
 C. 腹腔手术前的准备
 D. 为分娩者做肠道准备
 E. 为高热病人降温
134. 休克病人留置导尿管最主要目的是
 A. 保持床单位清洁干燥, 使病人舒适
 B. 引流尿液, 促进有毒物质的排泄
 C. 收集尿标本, 作细菌培养
 D. 避免尿液滞留在膀胱内
 E. 测尿量及比重, 了解肾血流灌注情况
135. 男, 18岁, 篮球比赛时不慎踝部扭伤。应立即给予
 A. 局部按摩 B. 红外线照射
 C. 松节油涂擦 D. 局部冷湿敷
 E. 放置热水袋
136. 不能杀灭芽孢的化学消毒剂是
 A. 环氧乙烷 B. 碘伏
 C. 过氧乙酸 D. 甲醛
 E. 戊二醛
137. 不宜用燃烧法消毒灭菌的物品是
 A. 污染的敷料 B. 治疗碗
 C. 镊子 D. 拆线剪
 E. 坐浴盆
138. 常用于黏膜的消毒溶液是
 A. 0.2%过氧乙酸 B. 0.05%新洁尔灭
 C. 0.1%氯胺 D. 70%酒精
 E. 0.5%碘酊
139. 陈某, 30岁。于23:00分娩一女婴, 至次晨7:00未排尿, 主诉下腹胀痛难忍, 查体发现膀胱高度膨胀, 对该产妇的护理下列哪项不妥
 A. 协助其坐起排尿 B. 让其听流水声
 C. 用力按压下腹部 D. 提供隐蔽的排尿环境
 E. 施行导尿术
140. 对病毒性肝炎病人使用过的化纤织物, 最好的消毒方法是
 A. 环氧乙烷气体消毒 B. 紫外线照射
 C. 氯胺喷雾 D. 过氧乙酸浸泡
 E. 高压蒸汽灭菌
141. 干烤法杀灭芽孢的条件是
 A. 箱温121~126℃; 时间30分钟
 B. 箱温120~140℃; 时间10~20分钟
 C. 箱温160~170℃; 时间20~30分钟
 D. 箱温100℃; 时间20~30分钟
 E. 箱温180℃; 时间20~30分钟
142. 男, 47岁, 诊断为尿毒症, 给予留置导尿12h后, 引流出尿液175ml, 估计该病人的排尿状况是
 A. 正常 B. 少尿
 C. 尿闭 D. 尿量偏少
 E. 尿潴留
143. 门诊发现传染病病人时, 应立即采取的措施是
 A. 转急诊室处理 B. 消毒候诊环境
 C. 将病人隔离诊治 D. 安排病人提前就诊
 E. 进行卫生宣教与候诊教育
144. 某传染病病室, 长5m、宽4m、高4m, 用福尔马林

- 进行室内消毒，福尔马林用量是**
- 800~1600ml
 - 1600~2000ml
 - 2000~2500ml
 - 2500~3000ml
 - 3000~3500ml
- 145. 男，62岁，先是夜间尿频，后逐步排尿时间延长，尿不净。今下午排不出尿，小腹胀痛来院就诊。护士首先应如何处理**
- 膀胱穿刺抽尿
 - 膀胱造瘘
 - 导尿并留置导尿管
 - 压腹部排尿
 - 急诊做前列腺摘除术
- 146. 男性，26岁，腿部外伤后发展为气性坏疽，为其换药用的剪刀最佳消毒方法是**
- 75% 酒精浸泡
 - 燃烧
 - 微波消毒灭菌
 - 高压蒸汽灭菌
 - 煮沸
- 147. 男性，30岁，炼钢工人，工作中不慎被烧伤，三度烧伤面积达60%，应采用**
- 接触隔离
 - 严密隔离
 - 消化道隔离
 - 呼吸道隔离
 - 保护性隔离
- 148. 男，56岁，患尿毒症，精神萎靡。下腹无胀满，24h尿量为60ml。请问病人的排尿状况属于**
- 正常
 - 尿闭
 - 少尿
 - 尿潴留
 - 尿量偏少
- 149. 使用无菌容器正确的操作是**
- 盖的内面朝下，以便放置稳妥
 - 物品取出后，未污染的物品可放回
 - 手握容器边缘，以便持物牢靠
 - 开盖30分钟内盖好，以防污染
 - 手指不可触及容器内面及边缘
- 150. 为防止交叉感染，具有针对性的措施是**
- 一份无菌物品只供一位病人使用
 - 无菌物品应放在清洁、干燥、固定处
 - 无菌物品与非无菌物品分开存放
 - 无菌物品应定期检查有效使用期
 - 用无菌钳夹取无菌物品
- 151. 无菌持物钳的正确使用方法是**
- 取放时钳端应闭合
 - 使用时保持钳端向上
 - 可夹取任何无菌物品
 - 到远处取物时应速去速回
 - 钳端可触碰搪瓷罐的内面和罐口
- 152. 下列属于传染病区中半污染区的是**
- 病室、厕所
 - 治疗室、库房
 - 浴室、洗涤间
 - 配餐室、更衣室
 - 走廊、病区化验室
- 153. 现有95%乙醇500ml，要配制70%乙醇，需加入灭菌蒸馏水约**
- 132ml
 - 179ml
 - 185ml
 - 279ml
 - 385ml
- 154. 用40%甲醛进行气化消毒时，需加入的氧化剂是**
- 乳酸钾
 - 乳酸钠
 - 氯化钾
 - 氢氧化钾
 - 高锰酸钾
- 155. 于先生，建筑工人，左下肢外伤后未得到及时、正确地处理，而导致感染破伤风。为该病人更换敷料后，污染敷料的处理方法是**
- 高压灭菌后再清洗
 - 过氧乙酸浸泡后清洗
 - 送焚烧炉焚烧
 - 丢入污物桶后再集中处理
 - 在日光下暴晒后再清洗
- 156. 属于高效性消毒剂的是**
- 乙醇
 - 碘伏
 - 戊二醛
 - 苯扎溴铵（新洁而灭）
 - 氯己定（洗必泰）
- 157. 紫外线杀菌的最佳波长是**
- 254nm
 - 245nm
 - 250nm
 - 452nm
 - 425nm
- 158. 超声雾化吸入的特点是**
- 雾量恒定，方便使用
 - 雾滴细小但不均匀
 - 气雾滴随呼吸最终可以到达段支气管
 - 气雾通过导管随病人吸气达到肺泡
 - 产生气雾温度低，治疗后不易着凉
- 159. 出现链霉素过敏反应时，使用葡萄糖酸钙的目的是**
- 收缩血管，增加外周阻力
 - 松弛支气管平滑肌
 - 使毒性症状减轻
 - 兴奋呼吸中枢
 - 缓解皮肤瘙痒
- 160. 发口服药注意事项中正确的内容是**
- 服酸性药物前要漱口
 - 铁剂药物宜浓茶水送服
 - 促进食欲药物宜饭后服

- D. 碳酸氢钠类的药物宜多饮水
E. 对胃黏膜有刺激性药物宜饭前服
- 161.** 发生青霉素过敏性休克时，最早出现的症状是
A. 烦躁不安、血压下降 B. 四肢麻木、头晕眼花
C. 腹痛、腹泻 D. 意识丧失、尿便失禁
E. 喉头水肿、呼吸道症状
- 162.** 封某，糖尿病，医嘱皮下注射普通胰岛素 8U ac 30 分，ac 的执行时间是
A. 早上 8:00 B. 晚上 8:00
C. 临睡前 D. 饭前
E. 必要时
- 163.** 服用时应避免与牙齿接触的药物是
A. 止咳糖浆 B. 棕色合剂
C. 稀盐酸 D. 碳酸氢钠
E. 颠茄合剂
- 164.** 关于自密封瓶内抽吸药液的方法，下列叙述错误的一项是
A. 自密闭瓶内抽药，针头与瓶塞应垂直
B. 药瓶内应先注入与所需药液等量空气后再抽吸药液
C. 排气时须以食指扶住针栓
D. 开启瓶盖后，用酒精棉签消毒瓶塞后再抽吸药液
E. 吸药时针头斜面应向下，空筒容量刻度朝上
- 165.** 患儿，1岁8个月，因支气管炎需肌内注射青霉素，其注射部位最好选用
A. 臀大肌 B. 臀中肌、臀小肌
C. 上臂三角肌 D. 前臂外侧肌
E. 股外侧肌
- 166.** 患者郭某，因足部被利器所伤，医嘱注射破伤风抗毒素，但皮试结果为阳性，此时应采取的措施是
A. 报告医师、停止医嘱
B. 将抗毒素分4次注射并逐渐增量，每20分钟一次，直至余量注完
C. 将抗毒素分4次注射并逐渐减量，每隔20分钟一次，直至余量注完
D. 将抗毒素平均分4次，每隔20分钟注射一次
E. 按原计划注射，同时给予抗过敏药
- 167.** 患者李某，患肠内阿米巴痢疾，医嘱为口服硫酸巴龙霉素 40~60 万 U, qid，连服五天，其中“qid”译成中文的正确含义是
A. 每4小时1次 B. 每6小时1次
C. 每日2次 D. 每日3次
E. 每日4次
- 168.** 肌内注射选用连线法划分部位时，其注射区应选择髂前上棘与尾骨两点连线的
A. 外上 1/3 处 B. 外上 1/2 处
C. 中 1/3 处 D. 后 1/3 处
E. 后 1/2 处
- 169.** 颈外静脉穿刺时其正确的进针角度是持穿刺针与皮肤呈
A. 45°进针，入皮后呈 25°穿刺
B. 25°进针，入皮后呈 45°穿刺
C. 60°进针，入皮后呈 15°进针
D. 15°进针，入皮后呈 60°进针
E. 30°进针，入皮后呈 30°进针
- 170.** 静脉注射过程中，如发现病人局部疼痛、肿胀明显，试抽无回血，可能的原因是
A. 静脉痉挛
B. 针刺入过深，穿破对侧血管壁
C. 针头斜面一半在血管外
D. 针头斜面紧贴血管内壁
E. 针头刺入皮下
- 171.** 静脉注射后，下列做法不当的是
A. 注射后迅速拔针
B. 注射后再次核对药物
C. 再次询问病人有无不适
D. 嘱病人横向按压皮肤进针点
E. 嘱病人纵向按压皮肤及血管进针点
- 172.** 静脉注射推药时，不正确的做法是
A. 固定针栓
B. 快速推注药液
C. 使病人保持舒适位置
D. 随时观察病人有无不适
E. 再次核对所用药物
- 173.** 剧毒药及麻醉药的最主要的保管原则是
A. 药名应用中、外文对照
B. 应加锁，专人管理并认真交班
C. 装密封瓶中保存，放于阴凉处
D. 药瓶上应有明显标签，用黑色边
E. 与内服药、外用药分别放置
- 174.** 链霉素过敏试验液 0.1ml 含链霉素
A. 25 单位 B. 150 单位
C. 250 单位 D. 500 单位
E. 2500 单位
- 175.** 每小时一次的外文缩写是
A. DC B. pC
C. qh D. ac
E. St

- 176.** 女性, 39岁, 因上呼吸道感染使用青霉素治疗, 在用药后10天, 出现发热、皮肤瘙痒、关节肿胀、淋巴结肿大、腹痛等现象, 根据症状病人最可能出现的是
 A. 皮肤过敏反应 B. 呼吸道过敏反应
 C. 消化道过敏反应 D. 速发型过敏反应
 E. 血清病型反应
- 177.** 女性, 63岁, 心慌、气短、面色发绀, 长期服用洋地黄类药物, 护士在每次发药前应特别注意的是
 A. 核对病人的床号、姓名
 B. 叮嘱病人在饭后服药
 C. 备足够量的温开水
 D. 测量病人的脉搏
 E. 发药到口
- 178.** 破伤风抗毒素过敏试验液0.1ml含破伤风抗毒素
 A. 10IU B. 15IU
 C. 150IU D. 500IU
 E. 1500IU
- 179.** 青霉素过敏性休克抢救时, 采取的关键措施是
 A. 立即通知医生
 B. 皮下注射0.1%盐酸肾上腺素0.5~1ml
 C. 针刺人中、内关等穴位
 D. 立即停药、平卧
 E. 给予保暖、吸氧
- 180.** 取血气分析标本时应注意
 A. 空腹采血
 B. 找粗、直有静脉窦处的静脉进针
 C. 止血带应扎于穿刺点上方5cm
 D. 穿刺毕用无菌纱布加压止血5~10min
 E. 常规消毒皮肤
- 181.** 容易潮解的口服药物是
 A. 酵母片 B. 胃蛋白酶
 C. 地西泮 D. 阿司匹林
 E. 硝酸甘油
- 182.** 如再次使用同批号青霉素注射时, 免做过敏试验要求间隔时间不超过
 A. 1天 B. 3天
 C. 5天 D. 7天
 E. 14天
- 183.** 为2岁以下的婴幼儿做肌内注射时, 不恰当的做法是
 A. 注射时固定肢体 B. 选择臀大肌注射
 C. 勿将针梗全部刺入 D. 注射部位交替使用
 E. 注射时固定针头
- 184.** 下列不符合无痛注射原则的一项是
 A. 病人侧卧位时上腿伸直, 下腿弯曲
- 185.** 下列不属于超声波雾化器的工作特点的一项是
 A. 雾滴小而均匀, 直径在5μm以下
 B. 药液随呼吸可被吸到终末支气管及肺泡
 C. 雾化液温暖、舒适
 D. 雾量的大小可以调节
 E. 用氧量小, 节约资源
- 186.** 下列哪类药物服用后需多饮水
 A. 铁剂 B. 止咳糖浆
 C. 助消化药 D. 健胃药
 E. 磺胺类药
- 187.** 下列有关超声雾化吸入的目的, 不正确的叙述是
 A. 预防感染 B. 解除痉挛
 C. 消除炎症 D. 稀释痰液
 E. 缓解缺氧
- 188.** 有关超声雾化吸入目的, 正确的叙述是
 A. 抑制细胞活性改善通气
 B. 减少局部血液改善通气
 C. 降低神经细胞兴奋性改善通气
 D. 刺激神经末梢改善通气
 E. 解除呼吸道痉挛改善通气
- 189.** 有关无痛注射正确的叙述是
 A. 病人注意力要集中
 B. 刺激性强的药物先注射
 C. 取侧卧位, 上腿弯曲
 D. 推注药物的速度要匀而快
 E. 刺激性强的药物做深部注射
- 190.** 病人周某输液后发现穿刺点周围沿静脉走向出现条索状红线, 局部红、肿、热、痛, 此症状是输液的
 A. 循环负荷过重 B. 发热反应
 C. 静脉炎 D. 空气栓塞
 E. 过敏反应
- 191.** 大量输注库存血后要防止发生
 A. 碱中毒和低血钾 B. 碱中毒和高血钾
 C. 酸中毒和低血钾 D. 酸中毒和高血钾
 E. 低血钾和低血钠
- 192.** 当输血发生溶血反应时, 出现黄疸和血红蛋白尿的机制是
 A. 红细胞凝集成团, 阻塞部分小血管
 B. 凝集的红细胞发生溶解, 血红蛋白释放入血浆