

御纂醫宗金鑑卷五十九

編輯痘疹心法要訣

痘中雜證下

痘後癰毒 餘毒未盡痘毒生輕則瘡癰重為癰內用解毒湯俱可外敷紅玉膏有功註凡痘後癰毒皆因灌漿之時毒氣太盛未得盡化留藏於經絡聚而不散輕則發為瘡癰重即成癰或在肌肉之虛處或發於關節搖動之際皆不論已潰未潰均

以解毒內託湯主之外用紅玉膏攤貼患處

解毒內託湯 生黃耆 荊芥 防風 連翹 去心 當歸 赤芍藥 金銀花 甘草節 木通 水煎服 方解毒內託湯最靈黃耆荊芥共防風連翹當歸赤芍藥銀花甘草與木通

紅玉膏 紫草一兩 紅花一兩 當歸二兩 黃蠟三兩 用香油半觔先將藥煉焦去渣後下黃蠟令勻以冷為度攤貼患處

目病 目病之由風熱成痘毒火鬱上攻睛赤腫澀痛洗肝散翳膜遮睛龍膽從註目痛固多由風熱而起也夫痘臨非常之熱自裏達外氣血弱則不能逐毒外出火鬱上攻目斯病矣如赤腫疼痛應澀流淚不能開者以洗肝散主之膜翳遮睛隱澀羞明者加味龍膽湯主之

洗肝散 羌活 歸尾 防風 山梔仁 穀精草 薄荷 生甘草 川芎 水煎食後服 方洗肝散治目痛疼羌活歸尾及防風山梔仁同穀精草薄荷甘草與川芎

龍膽湯 防風 木賊草 密蒙花 蟬蛻 蔓荊子 龍膽草 菊花 黃連 白芷 蒺藜 水煎服 方翳遮龍膽湯堪誇防風木賊密蒙花蟬蛻蔓荊龍膽菊黃連白芷蒺藜佳

唇 脾經脈絡繞唇口出痘始終貴潤紅紫裂焦黑急宜治島根解毒二方從註脾經絡之脈繞於唇口故經曰六府之華在唇必津液充足氣血和暢唇口方能紅潤故出痘之始終以此為貴不然一為毒火所製則毒乘於中熱熾於外不惟不能紅潤且或赤或紫或焦裂者治皆不可緩也初宜加味升麻葛根湯起脹後則以黃連解毒湯治之

潤且或赤或紫或焦裂者治皆不可緩也初宜加味升麻葛根湯起脹後則以黃連解毒湯治之

唇 脾經脈絡繞唇口出痘始終貴潤紅紫裂焦黑急宜治島根解毒二方從註脾經絡之脈繞於唇口故經曰六府之華在唇必津液充足氣血和暢唇口方能紅潤故出痘之始終以此為貴不然一為毒火所製則毒乘於中熱熾於外不惟不能紅潤且或赤或紫或焦裂者治皆不可緩也初宜加味升麻葛根湯起脹後則以黃連解毒湯治之

唇 脾經脈絡繞唇口出痘始終貴潤紅紫裂焦黑急宜治島根解毒二方從註脾經絡之脈繞於唇口故經曰六府之華在唇必津液充足氣血和暢唇口方能紅潤故出痘之始終以此為貴不然一為毒火所製則毒乘於中熱熾於外不惟不能紅潤且或赤或紫或焦裂者治皆不可緩也初宜加味升麻葛根湯起脹後則以黃連解毒湯治之

唇 脾經脈絡繞唇口出痘始終貴潤紅紫裂焦黑急宜治島根解毒二方從註脾經絡之脈繞於唇口故經曰六府之華在唇必津液充足氣血和暢唇口方能紅潤故出痘之始終以此為貴不然一為毒火所製則毒乘於中熱熾於外不惟不能紅潤且或赤或紫或焦裂者治皆不可緩也初宜加味升麻葛根湯起脹後則以黃連解毒湯治之

唇 脾經脈絡繞唇口出痘始終貴潤紅紫裂焦黑急宜治島根解毒二方從註脾經絡之脈繞於唇口故經曰六府之華在唇必津液充足氣血和暢唇口方能紅潤故出痘之始終以此為貴不然一為毒火所製則毒乘於中熱熾於外不惟不能紅潤且或赤或紫或焦裂者治皆不可緩也初宜加味升麻葛根湯起脹後則以黃連解毒湯治之

唇 脾經脈絡繞唇口出痘始終貴潤紅紫裂焦黑急宜治島根解毒二方從註脾經絡之脈繞於唇口故經曰六府之華在唇必津液充足氣血和暢唇口方能紅潤故出痘之始終以此為貴不然一為毒火所製則毒乘於中熱熾於外不惟不能紅潤且或赤或紫或焦裂者治皆不可緩也初宜加味升麻葛根湯起脹後則以黃連解毒湯治之

唇 脾經脈絡繞唇口出痘始終貴潤紅紫裂焦黑急宜治島根解毒二方從註脾經絡之脈繞於唇口故經曰六府之華在唇必津液充足氣血和暢唇口方能紅潤故出痘之始終以此為貴不然一為毒火所製則毒乘於中熱熾於外不惟不能紅潤且或赤或紫或焦裂者治皆不可緩也初宜加味升麻葛根湯起脹後則以黃連解毒湯治之

唇 脾經脈絡繞唇口出痘始終貴潤紅紫裂焦黑急宜治島根解毒二方從註脾經絡之脈繞於唇口故經曰六府之華在唇必津液充足氣血和暢唇口方能紅潤故出痘之始終以此為貴不然一為毒火所製則毒乘於中熱熾於外不惟不能紅潤且或赤或紫或焦裂者治皆不可緩也初宜加味升麻葛根湯起脹後則以黃連解毒湯治之

唇 脾經脈絡繞唇口出痘始終貴潤紅紫裂焦黑急宜治島根解毒二方從註脾經絡之脈繞於唇口故經曰六府之華在唇必津液充足氣血和暢唇口方能紅潤故出痘之始終以此為貴不然一為毒火所製則毒乘於中熱熾於外不惟不能紅潤且或赤或紫或焦裂者治皆不可緩也初宜加味升麻葛根湯起脹後則以黃連解毒湯治之

加味升麻葛根湯 赤芍 梔子 藿香 升麻 葛根 生甘草 防風 石膏 水煎服 方加味升麻葛根湯赤芍梔

子與霍香升麻葛根生甘草防風石膏共煎膏

黃連解毒湯 方見結痂落痂

痘後牙疳 痘後牙疳毒熱攻口臭齲腫牙痛疼內服清毒涼血飲外敷中白散極靈 痘後生牙疳者乃餘毒未解上攻牙

齒而然也初起口臭齲腫牙縫出血尚覺疼痛甚則色黑腐爛牙齒脫落穿腮破頰蝕透鼻唇多至不救見之須急急調治內

服清毒涼血飲外敷人中散

清毒涼血飲 知母 石膏 生地 黃連 當歸 赤芍 大黃 山梔子 丹皮 荊芥穗 連翹 去心 水煎服 方

清毒涼血治牙疳知母石膏生地連翹大黃山梔子丹皮荊穗連翹煎

人中白散 人中白 二錢 雄黃 分 冰片 四 硼砂 青黛 兒茶 各一錢 共為細末搽敷患處

舌 舌乃心苗五內通毒火一犯先見形赤紫黑腫并舒弄總以清熱犀角平 註 舌為心苗內通五臟毒熱舉發舌先受之或

赤或黑或紫或腫舒舌弄舌種種不一要皆熱留於心而使然也治宜清熱為主以加味犀角湯治之

加味犀角湯 荊芥 防風 牛蒡子 炒 生甘草 桔梗 升麻 犀角 麥冬 去心 梔子 黃連 石膏 煨 水煎服

加味犀角能散熱荊防牛蒡同甘桔升麻犀角麥冬梔子黃連石膏提

咽喉 咽喉之地司出入毒火沖熾痛難堪內用甘桔利咽劑外吹牛黃散即安 註 咽者飲食之道喉者呼吸之門乃最緊要

之處若痘毒不能發越於外火熱壅塞膈間上沖咽喉則或腫痛或啞喑甚而不能呼吸飲食難入速用加味甘桔湯治之或

用加減利咽解毒湯外用牛黃散吹入腫處

加味甘桔湯 方見失音

利咽解毒湯 防風 山豆根 麥冬 去心 牛蒡子 炒 黑參 苦桔梗 生甘草 萊豆 水煎服 方利咽解毒用防

風山豆根與麥門冬牛蒡黑參苦桔梗甘草萊豆共煎濃

牛黃散 川黃連生 黃蘗生 薄荷 各八分 雄黃 火硝 青黛 各二 牛黃 冰片 硼砂 各一 共為細末每用少

許吹患處

夾疹 痘中夾疹因時氣毒火觸動發其機臨期休將痘疹治速將升葛透疹宜註痘已見形其中又有顆粒細密如麻子者

此夾疹也因出痘時恰遇天行時疫感受其氣一時並發不須治痘當先治疹以升麻葛根湯加荊芥防風蟬蛻牛蒡子犀角

疹散而痘自起矣○升麻葛根湯方見發熱證治

夾癰 片片結就如雲頭毒傷陰血浮火遊表散荊芥敗毒劑清熱黃連解毒投註癰乃血之餘也因毒火鬱遏傷於陰血血

熱相搏故浮遊之火散布皮膚之間與痘相夾而出片片如雲頭突起謂之夾斑以荊防敗毒散主之七日後見此謂之發癰

乃血熱不解故也以黃連解毒湯主之

荊防敗毒散 羌活 獨活 柴胡 前胡 荊芥 防風 生甘草 川芎 枳殼麤炒 桔梗 赤茯苓 引用生薑水

煎服方夾癰宜用疎解劑荊防敗毒進裏遲羌獨柴前荊防草川芎枳桔赤苓宜○黃連解毒湯方見結痂落痂證治

夾痧 痧形發時粟一般顆粒形圓頂又尖粒中含水清漿樣敗毒調治自然安註痧亦疹類但形如粟米尖圓白靨內含清

水為異此亦熱毒所發往往夾痘而出宜於疎散以荊防敗毒散主之

荊防敗毒散 方見夾痘

水痘 水痘皆應濕熱成外證多與大痘同形圓頂尖含清水易脹易靨不漿膿初起荊防敗毒散加味導赤繼相從註水痘

發於脾肺二經由濕熱而成也初起與大痘相似面赤唇紅眼光如水咳嗽噴嚏涕稠黏身熱二三日而始出其形尖圓而

大內含清水易脹易靨不作膿漿初起荊防敗毒散主之繼以加味導赤散治之○荊防敗毒散 方見夾痘

加味導赤散 生地 木通 生甘草 連翹 黃連 滑石 赤苓 麥冬去心 引用燈心水煎服 方加味導赤除濕

熱生地木通甘草協翹連滑石麥冬引加燈心稱妙訣

男婦年長出痘門

男子年長出痘 年長出痘總不宜真陰虧損元氣虛一逢出痘毒油熾水不勝火豈能支夾熱參麥清補劑攻聚參歸鹿茸

宜註男子自十六歲後皆謂之年長嗜慾情關元精走洩又遇痘毒之火沖熾則真陰虧損水虛不能制火故每至行漿之際

口渴心煩鼻衄咽痛不能成膿結痂者有之治者不可妄用寒涼五六日前只宜麥麥清補湯調治至七八日如膿漿不行急宜改漿以參歸鹿茸湯內調雞冠血酒治之但得漿行庶可無虞

麥麥清補湯 當歸 川芎 花粉 白芍 酒炒 生地 人參 生薑 前胡 桔梗 牛蒡子 炒研 生甘草 紅花

南山查 麥冬 去心

引用生薑水煎服

方參麥清補用歸芍花粉白芍生地同參膏前胡牛蒡草紅花山查麥門冬

參歸鹿茸湯 方見灌漿證治

雞冠血酒 方見灰陷白陷

婦女出痘行經 婦女發痘過經行當期毒解不須驚非期涼血解毒治過期四物解毒從去血過多氣血弱十全大補服通

靈效女子出痘或過經行須問其是期非期如期而出者則毒熱隨血解去不須施治其證自愈若非期而至者此毒火內擾

於胞中致血妄行以涼血解毒湯治之若過期不止乃毒熱乘入血室以四物解毒湯加元參甘草主之若行漿時去血過多

此氣血虛弱不能統攝也急用十全大補湯治之若稍緩痘漿不行則無救矣○涼血解毒湯 方見結痂落痂證治

四物解毒湯 當歸 白芍 酒炒 生地 元參 梔子 炒 川芎 生甘草 黃連 酒炒 黃蘗 酒炒 黃苓 酒炒 水煎

服 四物解毒湯如神歸芍生地元參梔子川芎生甘草黃連黃蘗黃苓

十全大補湯 方見結痂落痂證治

孕婦出痘 妊娠出痘勢最難母子相連掌握間審其所因隨證治如聖安胎效通仙 註孕婦最忌出痘蓋熱能動胎胎落則

氣血因之而傷又安望其起脹灌漿結痂耶故遇孕婦出痘始終以安胎為上用如聖散隨證加減治之不可輕用犯胎之藥

致有觸動

如聖散 當歸身 陳皮 白朮 土炒 大腹皮 黃苓 縮砂仁 連殼炒 甘草 生 黑豆 酒洗 桑上羊兒藤 水煎服

初發熱加升麻葛根連翹 出而稠密者加酒炒黃連牛蒡子連翹南山查 不起發者加牛蒡子赤芍藥 渴加麥門冬

知母花粉血動者四物湯加苓連 脾虛食少毒發不出者十全內託湯去肉桂倍加參耆 身熱有外邪者參蘇飲加木

香 方安胎如聖散最宜歸陳白朮大腹皮黃苓砂仁共甘草黑豆羊藤服莫疑

產出過產 痘出正感逢臨產束手無策勢最險無恙十全大補湯惡露未盡黑神散 註孕婦當痘正出之際忽然發產候產

育後無他急者只宜大補氣血十全大補湯主之若腹中微痛此惡露未盡也黑神散主之
十全大補湯方見結痂落痂證治

黑神散 當歸 川芎 熟地黃 青皮醋炒 香附醋炒 蒲黃 桂心 乾薑 水煎服 方惡露未淨黑神良當歸川芎熟地黃青

皮香附俱醋炙蒲黃桂心合乾薑

產後出痘 產後如逢出痘瘡惟憑補益莫驚惶十全大補全功效莫用寒涼致損傷 註婦人產後血氣已傷又遇出痘則氣血之供用難給不能領戴其毒惟宜大補氣血以十全大補湯治切不可妄用寒涼之劑致傷生發之機也○十全大補湯方見結痂落痂證治

疹門

疹原 麻為正疹亦胎毒毒伏六腑感而出初發之狀有類痘形尖漸密不漿殊始終調護須留意較痘雖輕變化速 註疹非一類有癰疹癰疹溫疹益痘疹皆非正疹也惟麻疹則為正疹亦胎元之毒伏於六腑感天地邪陽火旺之氣自肺脾而出故多咳嗽噴嚏鼻涕流清涕淚汪汪兩胞浮腫身熱二三日或四五日始見點於皮膚之上形如麻粒色若桃花間有類於痘大者此麻疹初發之狀也形尖疎稀漸次稠密有顆粒而無根暈微起泛而不生漿此麻疹見形之後大異於痘也須留神調治始終不可一毫疎忽較之於痘雖稍輕而變化之速則在頃刻也○麻痘輕重 麻疹出時非一端其中輕重要詳參氣血和平輕而易表裏交雜重則難 註麻疹出時有輕重之分臨時須要詳察若氣血和平素無他病者雖感時氣而正能制邪故發熱和緩微微汗出神氣清爽二便調勻見點則透微散沒不疾不徐為輕而易治者也若素有風寒食滯表裏交雜一觸邪陽火旺之氣內外合發而正不能制邪必大熱無汗煩燥口渴神氣不清便閉尿澀見點不能透微收散或太緊速則為重而難治者也○麻疹主治大法 疹宜發表透為先最忌寒涼毒內含已出清利無餘熱沒後傷陰養血 註凡麻疹出貴透徹宜先用表發使毒盡達於肌表若過用寒涼冰伏毒熱則必不能出透多致毒氣內攻喘悶而斃至若已出透者又當用清利之品使內無餘熱以免疹後諸疹且麻疹屬陽熱甚則陰分受傷血為所耗故沒後須以養血為主可保萬全此首尾治疹之大法至於臨時權變惟神而明之而已

麻疹未出證治 欲出麻疹身微熱表裏無邪毒氣鬆若兼風寒食滯熱隱伏不出變叢生宣毒發表為主劑隨證加味莫亂從註麻疹一證非熱不出故欲出時身先熱也表裏無邪者熱必和緩毒氣鬆動則易出而易透若兼風寒食熱諸證其熱必壯盛毒氣鬱閉則難出而難透治以宣毒發表湯其間或有交雜之證亦照本方隨證加減治之

宣毒發表湯 升麻 葛根 前胡 桔梗 枳殼 麩炒 荊芥 防風 薄荷葉 木通 連翹 去心 牛蒡子 炒研 淡

竹葉 生甘草 引加芫荽水煎服 感寒邪者加麻黃夏月勿用 食滯加南山查 內熱加黃芩 歌方疹伏宣毒發表

湯升葛前桔枳荆防薄通翹麥淡竹草引加芫荽水煎嘗

麻疹見形證治 麻疹已出貴透徹細密紅潤始為良若不透徹須分晰風寒毒熱氣須詳風寒升葛湯加味毒熱三黃石膏

湯氣虛人參敗毒散託裏透疹散非常註麻疹見形貴乎透徹出後細密紅潤則為佳美有不透徹者須察所因如風寒閉塞

必有身熱無汗頭疼嘔惡疹色淡紅而黯之證宜用升麻葛根湯加蘇葉川芎牛蒡子因毒熱壅滯者必面赤身熱謔語煩渴

疹色赤紫滯黯宜用三黃石膏湯又有正氣虛弱不能送毒外出者必面色㿔白身微熱精神倦怠疹色白而不紅以人參敗

毒散主之

升麻葛根湯方見痘門發熱證治

三黃石膏湯 麻黃 石膏 淡豆豉 黃蘗 黃連 梔子 黃芩 水煎服 助疹出不透因毒熱三黃石膏湯急尋麻

黃石膏湯淡豆豉黃蘗黃連梔子苓

人參敗毒散 人參 川芎 羌活 獨活 前胡 枳殼 麩炒 桔梗 柴胡 生甘草 赤苓 引用生薑水煎服 歌方

疹因氣虛出難透人參敗毒有奇功參芫獨前枳桔柴胡甘草赤茯苓

麻疹收沒證治 疹因三日當收沒不疾不徐始無虞收沒太速毒攻內當散不散虛熱醫毒感荊防解毒治外用 芫酒法

宜虛熱柴胡四物劑應證而施病漸離註麻疹見形三日之後當漸次沒落不疾不徐始為無病若一二日疹即收沒此為太

速因調攝不謹或為風寒所襲或為邪穢所觸以致毒反內攻輕則煩渴譫狂重則神昏悶亂急宜內服荊防解毒湯外用胡

蔓酒薰其衣被使疹透出方保無虞當散不散者內有虛熱留滯於肌表也其證潮熱煩渴口燥咽乾切不可純用寒涼之劑

蔓酒薰其衣被使疹透出方保無虞當散不散者內有虛熱留滯於肌表也其證潮熱煩渴口燥咽乾切不可純用寒涼之劑

以柴胡四物湯治之使血分和暢餘熱悉除疹即沒矣

荊防解毒湯 薄荷葉 連翹去心 荊芥穗 防風 黃芩 黃連 牛蒡子炒研 大青葉 犀角共人中黃 引用燈

心蘆根水煎服 方收沒太速毒內攻荊防解毒治最靈薄翹荊防芩連芩大青犀角共人中 胡荽酒方見痘門水泡證

治

柴胡四物湯 白芍炒 當歸 川芎 生地 人參 柴胡 淡竹葉 地骨皮 知母炒 黃芩 麥冬去心 引加生

薑紅棗水煎服 方當散不散因虛熱柴胡四物芍歸生地人參柴竹葉地骨知母芩麥冬

身熱不退 麻疹已發身猶熱毒熱壅遏使之然出用化毒清表劑沒後柴胡清熱煎 註 麻疹非熱不出若既出透其熱當減

倘仍大熱者此毒感壅遏也宜用化毒清表湯治之疹已沒落而身熱者此餘熱留於肌表也宜柴胡清熱湯治

化毒清表湯 葛根 薄荷葉 地骨皮 牛蒡子炒研 連翹去心 防風 黃芩 黃連 元參 生知母 木通 生

甘草 桔梗 引用生薑燈心水煎服 方疹已出透身壯熱化毒清表為妙訣葛薄地骨芩翹防芩連元知通甘桔

柴胡清熱飲 柴胡 黃芩 赤芍 生地 麥冬去心 地骨皮 生知母 生甘草 引用生薑燈心水煎服 方疹已

沒落熱不減柴胡清熱效通仙柴胡黃芩芍生地麥冬地骨知母甘

煩渴 毒熱內感火上炎心胃擾亂煩渴漆未出升葛湯加味已出白虎湯為先沒落竹葉石膏用因時醫治莫遲延 註凡出

疹麻煩渴者乃毒熱壅盛也蓋心為熱擾則煩胃為熱鬱則渴當未出時宜升麻葛根湯加麥冬天花粉已出者宜白虎湯沒

後煩渴者用竹葉石膏湯

升麻葛根湯 方見痘門發熱證治

白虎湯 石膏 生知母 生甘草 引用粳米水煎服 方麻疹已發多煩渴白虎清熱自能安石膏知母生甘草引加

粳米用水煎

竹葉石膏湯 人參 麥冬去心 石膏 生知母 竹葉 生甘草 水煎服 方疹已沒落當安靜若加煩渴熱未清

竹葉石膏湯參麥石膏知母竹甘從

謔妄 疹發最怕毒火盛熱昏心神謔妄生未出三黃石膏湯治已出黃連解毒靈註謔妄一證乃毒火之太盛熱昏心神而然
也疹未出而謔妄者三黃石膏湯主之疹已出而謔妄者黃連解毒湯主之

三黃石膏湯方見麻疹見形證治

黃連解毒湯方見痘門結痂落痂證治

喘急 疹初無汗作喘急宣發麻杏仁甘宜毒熱內攻金受剋保肺清氣化毒醫註喘急為惡候麻疹尤忌之如初出未透無
汗喘急者此表實拂鬱其毒也宜用麻杏仁甘湯發之疹已出胸滿喘急此毒氣內攻肺金受剋宜用清氣化毒飲清之若遲
延失治以致肺葉焦舉則難救矣

麻杏仁甘湯

石膏煨

麻黃蜜炒杏仁去皮尖炒

生甘草

引用生薑水煎服

方喘用麻杏仁甘湯石膏火煨合麻黃

杏仁去皮尖須微炒甘草相配引生薑

清氣化毒飲

前胡

桔梗

括葉仁

連翹去心

桑皮炙

杏仁去皮尖炒

黃芩

黃連

元參

生甘草

麥冬去

心

引用蘆根水煎服

方毒熱內攻肺喘滿清氣化毒飲最靈前胡桔梗連翹桑杏仁參草麥冬

欬嗽

疹初欬嗽風邪鬱加味升麻葛根良毒熱薰蒸金受制清金寧嗽自堪膏註麻疹發自脾肺故多欬嗽若欬嗽太甚者

當分初沒治之初起欬嗽此為風邪所鬱以升麻葛根湯加前胡桔梗蘇葉杏仁治之已出欬嗽乃肺為火灼以清金寧嗽湯

主之○升麻葛根湯方見痘門發熱證治

清金寧嗽湯

橘紅

前胡

生甘草

杏仁去皮尖炒

桑皮蜜炙

川連

括葉仁

桔梗

浙貝母去心

引用生薑

紅棗水煎服

方嗽用清金寧嗽湯橘紅前胡杏仁桑川連括葉桔貝母引用紅棗共生薑

喉痛

疹毒熱甚上攻喉腫痛難堪實可憂表邪入升麻用裏熱涼膈消毒求註疹毒熱甚上攻咽喉輕則腫痛甚則湯水不

下最為可慮表邪鬱遏疹毒不能發舒於外致咽喉作痛者元參升麻湯主之裏熱壅盛或疹已發於外而咽喉作痛以涼膈

消毒飲主之

元參升麻湯

荊芥

防風

升麻

牛蒡子炒研

元參

生甘草

水煎服

方表鬱疹毒喉腫痛急服元參升麻湯荆

芥防風升麻等元參甘草水煎膏

涼膈消毒飲

荆芥穗

防風

升麻

薄荷葉

黃芩

生梔子

生甘草

牛蒡子

芒硝

大黃

生

燈心水煎服

方裏熱喉痛苦難當涼膈消毒飲最良荆防翹薄生梔草牛蒡芒硝生大黃

失音

疹毒聲啞肺熱壅元參升麻大有功已發加減涼膈散沒後兒茶音即清失音者乃熱毒閉塞肺竅而然也疹初失

音者元參升麻湯主之疹已發而失音者加減涼膈散主之疹沒後聲啞者兒茶散主之○元參升麻湯方見喉痛

加減涼膈散

薄荷葉

生梔子

元參

連翹

生甘草

苦桔梗

麥冬

牛蒡子

黃芩

水煎服

方加減涼膈治失音薄荷梔子共元參連翹甘草苦桔梗麥冬牛蒡與黃芩

兒茶散

硼砂二錢

孩兒茶五錢

共為細末涼水一盞調藥一匙服之

嘔吐

疹發緣何嘔吐逆火邪擾胃使之然竹茹石膏為主治和中清熱吐能安註麻疹嘔吐者由於火邪內迫胃氣沖逆也

須以竹茹石膏湯和中清熱其吐即止

竹茹石膏湯

半夏薑製

赤苓

陳皮

竹茹

生甘草

石膏

引用生薑水煎服

方竹茹石膏湯治吐半夏薑製

配茯苓陳皮竹茹生甘草石膏火燉其合煎

瀉泄 毒熱移入大腸經傳化失常瀉泄成初起升葛湯加味已發黃連解毒清註麻疹瀉泄乃毒熱移入腸胃使傳化失常

也治者切不可用溫熱諸劑疹初作瀉者以升麻葛根湯加赤苓豬苓澤瀉主之疹已出作瀉者以黃連解毒湯加赤苓木通主

主之

升麻葛根湯

方見痘門

黃連

解毒湯

方見痘門

結

痢疾 夾疹之痢最重難當毒熱凝結移大腸腹痛下利赤白色悉用清熱導滯良註麻疹作痢謂之夾疹痢因毒熱未解移

於大腸所致也有腹痛欲解或赤或白與赤白相兼者悉用清熱導滯湯主之不可輕投瀉劑

清熱導滯湯

山查

厚朴

生甘草

枳殼

檳榔

當歸

白芍

酒炒

條芩

酒炒

連翹

研

青皮

黃連

吳茱萸

引用生薑水煎服

方痢用清熱導滯湯

山查

朴草

殼檳榔

歸芍

條芩

連翹

牛蒡子

引生薑

腹痛 小兒發疹腹中疼毒鬱腸胃食滯凝曲腰啼叫眉頻蹙加味平胃散堪行註 麻疹腹痛者由食滯凝結毒氣不得宣發

於外故不時曲腰啼叫兩眉頻蹙頃以加味平胃散治之滯消毒解而痛自除矣

加味平胃散 防風 升麻 枳殼炒 葛根 蒼朮炒 陳皮 厚朴薑炒 南山楂 麥芽炒 生甘草 引生薑

燈心水煎服 方加味平胃散如神防風升麻枳殼陳厚朴蒼朮草生薑燈心水煎勻

鯽血 疹家鯽血莫倉惶毒從血解妙非常鯽甚咬鼻髮灰散內服犀角地黃湯註 肺開竅於鼻毒熱上沖肺氣載血妄行則

鯽作矣然鯽中有發散之義以毒從鯽解不須止之但不可太過過則血脫而陰亡也如鯽甚者宜外用髮灰散吹入鼻中內

服犀角地黃湯其血乃止

髮灰散○犀角地黃湯方俱見痘門鯽血便血

瘡疹 兒在母服血熱蒸生後不免遇涼風偏體發出如粟米此名瘡疹何須評註 瘡疹者兒在胎中受母血熱之氣所蒸

已久及生後外遇涼風以致偏體紅點如粟米之狀滿月內見者名為爛衣瘡百日內見者又名百日瘡未出痘瘡之先見者

即名為瘡疹調攝謹慎不治自愈

益痘疹 痘後出疹益痘傳餘毒未盡夾食寒偏身作瘡如雲片加味消毒服即安註 益痘疹者謂痘方愈而疹隨發也因痘

後餘毒未盡更兼恣意飲食外感風寒以致偏身出疹色赤作瘡始如粟米漸成雲片宜加味消毒飲疎風清熱疹即愈矣

加味消毒飲 荊芥穗 防風 牛蒡子炒 升麻 生甘草 赤芍 南山楂 連翹去心 引生薑水煎服 方益痘

疹因風熱成加味消毒飲最靈荊防牛蒡升麻草赤芍山查連翹從

癰疹 心火灼肺風濕毒隱隱疹點發皮膚疎風散濕羌活散繼用消毒熱盡除註 癰疹者乃心火灼於肺金又兼外受風濕

而成也發必多瘡色則紅赤隱隱於皮膚之中故名曰癰疹先用加味羌活散疎風散濕繼以加味消毒飲清熱解毒表裏清

而疹愈矣 加味羌活散 羌活 前胡 薄荷葉 防風 川芎 枳殼炒 桔梗 蟬蛻 連翹去心 生甘草 赤苓 引生

薑水煎服 方癰疹羌活散相當羌活前胡薄荷防川芎枳殼桔蟬蛻連翹甘草赤苓薑○加味消毒散方見益痘疹

編輯幼科種痘心法要旨

天痘胎毒也伏於有形之始因感而發為生人所不能免然其發也或染時氣或感風寒或因飲食或由驚恐以病引病為患多端變更莫測且其間順吉者少險逆者多有千方百計而不能冀其愈於萬一者此其所以為難也古有種痘一法起自江右達於京畿究其所源云自宋真宗時峨眉山有神人出為丞相王旦之子種痘而愈遂傳於世其說雖似渺茫然以理揆之實有參贊化育之功因時制宜之妙蓋正痘感於得病之後而種痘則施於未病之先正痘治於成病之時而種痘調於無病之日自表傳裏由裏達表既無諸證夾雜於其中復有善方引導於其外童叟漸染胎毒盡出又何慮乎為患多端變更莫測以致良工束手於無可如何之地耶此誠去險履平避危就安之良法也然種痘一科多日傳心授方書未載恐後人視為虛誕之辭相沿日久無所攷稽使至理良法竟置無用之地神功湮沒豈不大可惜哉今將種痘一法細加研究審度精詳纂輯成書永垂千古庶為種痘之津梁咸登赤子於壽域也

種痘要旨 當攷種痘之法有謂取痘粒之漿而種之者有謂痘衣痘兒之衣而種之者有謂以痘痂屑乾吹入鼻中種之謂之旱苗者有謂以痘痂屑濕納入鼻孔種之謂之水苗者然即四者而較之水苗為上旱苗次之痘衣多不應驗痘漿太涉殘忍故古法獨用水苗蓋取其和平穩當也近世始用旱苗法雖捷徑微覺遲裂若痘衣痘漿之說則斷不可從夫水苗之所以善者以其執其和平不急不徐漸次而入既種之後小兒無受傷之處胎毒有漸發之機百發百中捷於影響盡善盡美可法可傳為種痘之最優者其次則旱苗雖裂猶與水苗之法相近免體壯感猶或可施至若痘痂之何以為順選苗之何以善藏天時之何以得正種期之何以為吉調攝之何以合宜禁忌之何以如法形氣之何以可種與痘衣痘漿之弊一一條分縷晰細列於後學者必細心體閱則中有灼見不致有他歧之惑庶種法既善而成功可必矣○選苗 苗者痘之痂也種痘者全資乎此以為胎毒之引導關係匪輕選苗時宜留神細察不可輕忽其中有可用者有不可用者惟在痘之順與不順別之痘之不順者出不尖圓色不紅潤漿不充滿所落之痂黑暗而薄此天人合病內外合邪所致即幸而愈亦不過良工之善為調治非天然之美此等痘痂斷不可用痘之順者始終無夾雜之證出則尖圓色則紅潤漿則充滿所落之痂蒼蠟光澤肥大厚實

此得天地陰陽之正氣極順之苗也收而用之效如響應但此病甚少所遇無多或不能親其事而假手他人亦必令彼身親目親方可否則盡置而不用切勿濫用種者審之○黃苗 種痘必資於苗而苗之所可恃者在氣之相通耳若遇熱則氣洩日久則氣薄觸汚穢則氣不清藏不潔則氣不正此黃苗之法所以不可不慎也如遇好苗須胎新磁瓶內上以物密覆之置於潔淨之所清涼之處其所貯之苗在春天者一月之期可種冬令嚴寒四五十日之期尚可種蓋寒則氣收藏熱則氣易洩故時日有不同也然於未收苗時即當先與出痘之家明言其故使彼樂從無所疑忌彼方肯用心收貯不致稍有貽誤也

天時 種痘貴得天時得其時則種不得其時則不種夫天時之正莫過於春春為萬物發生之際天氣融和不寒不熱種之則痘自隨其氣而發生此正二三月之時所以可種也若交夏之後六陽盡出地上人之陽氣亦皆外浮暑熱燦金受病者衆斯時種痘免何以堪此四五月之時所以必不可種也至於十月名曰小春收斂之時雖遇可種之免而無引毒之具此七八九月之時勢有不能種也至於十月名曰小春雖亦可種然斯時寒氣固結純陰用事不若俟冬至後一陽鼓動借其生生之氣種之甚吉此十月之所以可種猶不若十一月十二月之尤可種也然當可種之時亦有不可種者如春應溫而反寒夏應熱而反涼秋應涼而反熱冬應寒而反溫當其時而非其氣是天地不正之氣也常人感熱而成時疫小兒調理未遑況敢言種痘乎倘或遇此只宜稍避俟時氣平定再為議種方係萬全亦有未種之時天時甚正既種之後忽爾寒暄不時此又人事所遇不齊偶爾變氣出乎意外者也則宜屋中適其寒溫順會天時常燒辟穢香飲食起居更加謹慎可保無恙種痘者宜詳審而體察之○擇吉 下苗之日必擇成日開日栽種日及合天月二德日則吉倘三者不能兼備即成開之日亦可若值人神所在之日忌不可種

種痘吉日 成日 開日 栽種日 天月二德日 正五九月在丙 二六十月在申 三七十一月在壬 四八十二月

在庚 人神所在之日 十一月在癸 十五日在癸

調攝 種痘之在調攝最為緊要自始至終不可稍忽如避寒熱慎飲食是也天氣嚴寒蓋覆宜溫煖勿使受寒恐被寒氣所

觸則痘不得出亦不可過於重棉疊破使熱氣滯滯致痘不宣發天氣溫煖蓋覆宜適中恐客熱與毒相併致增煩熱亦不可輕易着單露體使寒邪外侵阻遏生發之氣此寒熱所以貴得其平也人之氣血必藉飲食生化痘之始終全賴乎此若飲食

虧少血氣何所資助乎但不可過甚若過飲則飲停不化津液過食則食滯必生痰熱所以吮乳之兒勿餐辛熱炙煇勿啖粘硬生冷勿恣意茶水勿使飲涼漿食不過飽亦不過飢此飲食所以貴得其平也至於寒熱飲食之外凡舉止動作既不可任意驕縱亦不可過於拂逆惟在調攝之人耐其性情兢兢業業善為保護不但慎於既種之後且當慎於未種之先不但慎於見苗之初尤當慎於落痂之後種痘者宜詳告誠務期詳細使彼知關係非輕心存謹慎如法調攝始保萬全倘稍可不謹以致小兒或為寒熱所侵或為飲食所傷咎將誰諉乎此不知調攝者所以斷不可與種也○禁忌種痘之家房中更要潔淨切忌沖犯最喜明亮不可幽暗擇老成耐事之人經過小兒出痘者令其調護不離左右一切忌禁俱當謹遵勿言罵呼怒勿言語驚慌勿對梳頭勿對搔癢勿嗜酒勿歌樂凡房中淫液氣婦人經候氣腋下狐臭氣行遠夢汗氣誤燒頭髮氣誤燒魚骨氣吹滅燈燭氣硫磺柴烟氣蔥蒜酒醉氣溝渠污穢氣悉宜避之更當預囑其左右之人倘值迅雷烈風暴雨之變大宜安定勿使兒驚其帷帳宜謹蓋覆宜密切勿暴動生風當燒辟穢香以避偶爾不正之氣再令人謹伺其門不許生人往來不許僧道師巫孝服之人入室以上禁忌二遵守則吉稍有疎忽每至敗事種痘者切宜詳告誠之辟穢香 南蒼朮 半肋 川大黃 四兩 右剉細片爐中燒之不可間斷

可種 小兒面部紅潤精采明亮透達印堂山根年壽眼下口角無青暗之色 兩目黑白分明視瞻平正愈看愈有神氣精光 顙不陷不填 頭不解顙 鼻孔不小 氣清不濁 聲音清亮 天柱骨正 頸不至斜 骨肉相稱又宜緊束肥不見肉瘦不露骨 小便遠而長腎囊繫小微帶紫黑色如荔枝殼 身無癰癤瘡疥 項無結核 腹無積聚 形氣充實精神強健 臟腑調順 脈息和平 以上皆可種

不可種 小兒面色青白或鰐黑痿黃無精采 兩目黑多白少睛帶青色視瞻歪斜暗昧無神 顙陷顙填 解顙 顙不合 五癩 五鞭 龜胸 鶴膝 鼻孔小 氣濁 龜背 聲音不亮不長肉不束骨鬆如發麵樣 身體瘦無肥肉 身有癰癤疥瘡 腹有疳積 項有結核 病後元氣未復 素有驚癇之證 失乳之後 氣血不足 脾胃虛弱 精神倦怠 脈不和平 以上皆不可種 凡小兒父母行事疎忽不知調攝不聽禁忌不信醫藥過於溺愛驕縱者亦斷不可與種水痘種法 種痘之時要細閱小兒氣血沖和臟腑均平內無痰熱食積所傷外無六淫之氣相侵方可用上好痘痂種之一

成者用二十餘粒三四歲用三十餘粒置於淨磁罐內以柳木作杵碾為細末以淨水滴為五點入罐內春溫用冬熱用乾則再加水幾點總以調勻為度不燥不濕用新棉些須攤極薄片裏所謂痘屑在內捏成棗核樣以紅線拴定仍留寸許長則剪去將苗納入鼻中分男女左右不可離人時時看守倘小兒用手拈弄急禁止之或被嚏出急將苗塞鼻內不可稍緩恐苗苗氣下苗後必以六個時辰為度然後取出如遇天氣嚴寒多留數刻若遇時令和暖早取數刻亦可矣要在臨時斟酌痘苗取出之後其苗氣漸次而入傳遍五臟至七日始發熱發熱三日而苗見見苗三日而出齊出齊三日而灌漿漿足三日而回水結痂大功成矣○五臟傳送之理 鼻者肺之外竅也水苗種法以苗塞鼻中其氣已傳於肺肺主皮毛肺傳於心心主血脈心傳於脾脾主肌肉脾傳於肝肝主筋肝傳腎腎主骨痘毒藏骨髓之內感苗氣而發其毒自骨髓盡達於筋腎臟之毒解矣自筋盡達於肌肉肝臟之毒解矣自肌肉盡達於血脈脾臟之毒解矣自血脈盡達於皮毛心臟之毒解矣自皮毛盡達於顆粒肺臟之毒解矣五臟之毒層遞而解然後毒化變成收靨落痂此種痘傳送之次序也不可不知○旱苗種法 旱苗種法用銀管約長六七寸曲其頸碾痘痂極細納於管端按男左女右對準鼻孔吹入之至七日而亦發熱今時多用此法蓋取其簡便捷入不致脫落而有透漏苗氣之患也第恐後人用之不善輕吹之則不驟入重吹之則迟裂難當且恐流涕過多苗隨涕去往往不驗今欲垂法後世當取其法之和平穩當萬全者而則效之此所以獨取於水苗也○痘衣種法 小兒出痘者當長漿漿足之時則彼痘氣充盛取其貼身裏衣與未出痘之兒女服之服二三日夜間亦不脫下至九日十一日始發熱此乃衣傳然恐氣薄不透多有不熱不出其法不靈故不可用○痘漿種法 擇小兒出痘之順者取其痘漿以棉拭之分男女左女右塞入鼻中亦能發痘但取痘漿之時不令本家知覺痘破痘漿盜以作種使彼真氣宣洩毒不能解此忍心害理不仁之事也同志者切宜深惡而痛絕之又豈可尤而效之也哉○信苗 種痘發熱以前小兒面部上忽出顆粒似痘名曰信苗此痘之將發毒氣之標也色紅而輒聽之自消若紅紫堅硬有如魚目者急以銀針挑破上以二聖散則無虞

二聖散

明雄黃

紫草 各等分

共碾為細末用油臘脂調之

補種

下苗後宜令親切之人左右看守恐他人用心之不慎也若視為泛常看守疎忽恐小兒惡其苗塞鼻發不時捏出使苗氣一洩種多不驗所以種而不發者亦有之也然或小兒五內壯實不受苗氣艱於傳進不發者亦有之更有胎毒深遠潛


藏內蓄雖苗氣傳至不能引出不發者亦有之俱當俟踰十一日為度過此不發然後察天時和順再為補種之亦可 自出
種痘以七日為期五臟傳遍始發熱者常也或有至九日十一日而發者此傳送遲慢之故亦無足慮若發熱於五日以前
此時苗氣尚未傳至其毒何由而發必因種後適逢天行時氣小兒感染而成是乃自出之痘非關苗氣引出者種痘者不可
不知要當於未種之先預為申明其說焉 治法 種痘乃引毒達表來免安寧無病之時事屬順吉又何言治然恐痘家過
於溺愛者居不謹飲食不節此病所由生也故治法亦所不免當悉照治正痘之法治之可也

卷六十一

編輯眼科心法要訣

目睛原始歌 天有日月陰陽精人有二目藏府精眾精之窠為之眼肉精上下兩胞名血精兩皆氣精白筋精為黑骨精瞳
約束裏攝系屬腦目睛原始要詳明 註 天有日月猶人之有二目也天之日月乃天之陰陽之精而為之也人之二目亦人之
五臟六腑之精上注於目而為之也故眾精之窠為之眼也內之精為上下胞也血之精為兩皆也氣之精為白眼也筋之精
為黑眼也骨之精為瞳人也約束裏攝氣血筋骨之精其系上屬於腦不可不明此目睛之原始也

五輪之圖




肉輪屬脾主肉
血輪屬心主血
氣輪屬肺主氣
風輪屬肝主筋
水輪屬腎主骨

五輪所屬部位歌 五輪肉血氣風水肉輪兩胞血輪皆氣輪
白睛風輪黑水輪瞳子自當知 註 五輪者肉輪血輪氣輪風輪
水輪也謂之輪者目睛運動如輪之意也上下兩胞為肉輪內
外兩皆為血輪白睛為氣輪黑睛為風輪瞳人為水輪此明五
輪之部位分屬五臟也 五輪主五臟病歌 胞為脾病皆主
心肺白肝黑腎瞳人五臟為病主五臟寒熱虛實證分註胞
為肉輪主脾病也內外二皆為血輪主心病也白睛為氣輪主
肺病也黑睛為風輪主肝病也瞳人為水輪主腎病也五輪之

病五臟主之其寒熱虛實當隨所現之證而分之也

八廓之圖



水廓屬膀胱又名津液廓
風廓屬胆又名養化廓
天廓屬大腸又名傳導廓
地廓屬胃又名水穀廓
火廓屬小腸又名抱陽廓
雷廓屬命門又名闢景廓
澤廓屬三焦又名清淨廓
山廓屬包絡又名倉陰廓

○八廓部位歌

瞳人水廓黑睛風天廓白睛部位同內皆火

雷外山澤上下胞屬地宮註八廓者水廓風廓天廓火廓雷廓

山廓澤廓地廓也謂之廓者猶城郭衛禦之義也瞳人屬坎水

廓也黑睛屬巽風廓也白睛屬乾天廓也內皆火也屬離火

震雷之廓也外皆小皆也屬艮山兌澤之廓也兩胞屬坤地廓

也此明八廓以八卦立名示人六腑命門包絡之部位也○八

廓所屬歌 津液水廓屬膀胱養化風廓是膽方傳導天廓大

腸是水穀地廓胃家鄉闢泉雷廓命門主抱陽內皆火小腸外

皆三焦清淨澤會陰山廓包絡疆註內皆火小腸謂內皆火廓屬小腸也外皆三焦清淨澤謂外皆火三焦清淨澤廓也津液

廓即水廓水廓屬腎與膀胱為表裏膀胱為津液之府故又名馬養化廓即風廓風廓屬肝肝與膽為表裏膽為少陽主長

養化育故又名馬傳導廓即天廓天廓屬肺肺與大腸為表裏大腸為傳導之官故又名馬水穀廓即地廓地廓屬脾脾與胃

為表裏胃納水穀故又名馬抱陽廓即火廓火廓屬心心與小腸為表裏依附於陽故又名馬闢景廓即雷廓命門者龍雷之

火故名闢景附於火廓也清淨即廓澤廓三焦者陽相火也蒸化水穀為清淨之官故名清淨附於火廓也會陰廓即山廓包

絡者陰相火也依附於心心臣使之官故名會陰附於火廓也○八廓主六腑命門包絡病歌 風廓屬膽水膀胱大腸天廓

地胃鄉火廓小腸雷廓命山澤三焦包絡方註此明八廓所屬也風廓即風輪也風輪屬肝肝與膽為表裏故輪主藏為肝病

廓主府為膽病水廓即水輪也水輪屬腎腎與膀胱為表裏故輪主藏為腎病廓主府為膀胱病天廓即氣輪也氣輪屬肺肺

與大腸為表裏故輪主藏為肺病廓主府為大腸病地廓即肉輪也肉輪屬脾脾與胃為表裏故輪主藏為脾病廓主府為胃

病火廓雷廓澤廓山廓即血輪之部位也血輪屬心心與小腸為表裏故輪主藏為心病廓主府為小腸病其雷廓命門澤廓

三焦山廓包絡皆附於血輪者以命門三焦包絡俱屬相火當稟命於君火故當附焉按眼科皆以五輪屬配五行八廓屬

府配八卦遂使藏府混淆無所適從夫五輪既屬藏八廓自應屬府今改訂之俾學者按輪廓之部位視之而病之在藏在府