

临床常用 中药饮片 原色图谱

刘绍贵 主审

欧阳荣 周新蓓 李顺祥 主编

CS
湖南科学技术出版社

本书将临床上常用的500余种中药采用不同炮制方法所得的1300多种中药饮片，拍摄成形态逼真，并加以简洁而准确的文字说明。书中描述的中药按药用部位分为根及根茎类、茎木类、皮类、叶类、花类、果实种子类、全草类、动物类等十二类，内容包括品名、来源、产地、炮制加工、

本书呈现了**500**余种临床常用中药；
1300多种中药饮片；
1300多幅形状色彩逼真的原创中药饮片图。



临床常用 中药饮片 原色图谱

Linchuang Changyong Zhongyao Yinpian
Yuanse Tupu

CS
湖南科学技术出版社

主 审：刘绍贵

主 编：欧阳荣 周新蓓 李顺祥

副主编：陈 征 皮小华 胡盛松 胡铁骊 任卫琼 彭平建 李 珊
王 芳 左美玲 李 雅 焦志海 王月爱 阳 力 李 珍

编 委（按姓氏笔画排列）：

万艳群	王 芳	王月爱	邓桂明	左美玲	皮小华	任卫琼
刘绍贵	刘文魁	刘红宇	阳 力	李 珊	李 康	李 芬
李 珍	李 雅	陈迎春	陈 征	吴 可	严建业	张裕民
欧阳林旗	欧阳荣	罗 懿	杨 磊	杨雪娇	周新蓓	周 萍
周智慧	胡盛松	胡铁骊	胡 鸿	胡炜航	胡新华	贺喜果
徐玲郡	凌 可	黄开颜	焦志海	曾元璋	彭平建	覃薛文
廖建萍						

摄 影：胡盛松

图书在版编目 (C I P) 数据

临床常用中药饮片原色图谱 / 欧阳荣, 周新蓓, 李顺祥主编 ; 刘绍贵主审.
-- 长沙 : 湖南科学技术出版社, 2013. 10
ISBN 978-7-5357-7778-2
I. ①临… II. ①欧… ②周… ③李… ④刘… III. ①饮片—图谱
IV. ①R283.3-64
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 197697 号

临床常用中药饮片原色图谱

主 编: 欧阳荣 周新蓓 李顺祥
主 审: 刘绍贵
责任编辑: 曹 鹍
出版发行: 湖南科学技术出版社
社 址: 长沙市湘雅路 276 号
<http://www.hnstp.com>
邮购联系: 本社直销科 0731-84375808
印 刷: 湖南天闻新华印务有限公司
(印装质量问题请直接与本厂联系)
厂 址: 湖南望城·湖南出版科技园
邮 编: 410219
出版日期: 2013 年 10 月第 1 版第 1 次
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 32.75
字 数: 630000
书 号: ISBN 978-7-5357-7778-2
定 价: 236.00 元
(版权所有 · 翻印必究)



中药入药历来讲究药材道地、依法炮制和形色气味，强调品规等级质量和用药安全有效。中药饮片即炮制加工的成品，既是进入中医临床治疗的全部处方药，又是中成药的原料药，其质量的高低或好坏，与治疗效果和人民的生命安危直接攸关。故古往今来，众多医药学家和有识之士，为道地药材的选用、加工炮制、饮片质量保证，以及药材、饮片真伪优劣的辨识，总结提出了许多传世名言，整理出版了大量经典之作，图谱、图经之类的书刊亦可谓琳琅满目。但由于时过境迁，环境与品种、形态质量变异，加之经济利益的过度驱动，采收不时、不炮不制或乱炮乱制、净制不净、掺杂使假、混伪冒充、滥用硫熏，使许多中药饮片固有的形色气味失真，给从业者准确辨识无疑更增添了难度。可喜的是湖南中医药大学第一附属医院的欧阳荣教授，以其长期从事中药质量监测与质量管理的实践经验和研究成果，就目前临床常用的 500 多味中药及其 1300 多种炮制品，组织多名中药炮制、中药鉴定方面的专家和中药技术工作者编撰摄制成《临床常用中药饮片原色图谱》一书，并经湖南省著名中药专家刘绍贵老先生审校后出版。

吾喜读书稿，复卷细玩，深感文字记叙简洁而准确，药图配置形态逼真，品种收录适宜，炮制品规齐全，结构体例纲目有序，勘为一本图文并茂的精品之作。编者为广大中药、中医工作者提供了一本极有价值的辨识中药饮片真伪优劣、并指导医家选药的凭借之作。探其编撰之宗旨、立意之深邃、汇集资料之翔实、用心之良善，诚精诚有嘉，故欣然命笔，乐以为序。

湖南省中医药管理局局长

2013 年 8 月

前言

中药饮片既是进入治疗的处方药，又是中成药的原料，其质量的高低或优劣，直接影响着临床用药的安全、有效和人民的生命安危，受到众多医药学家的重视及大众的关注。党和国家在“十一五”、“十二五”中医药事业发展规划中，将中药饮片质量的标准化、科学化、现代化列为重要研究内容，《中华人民共和国药典》现行版及将要颁行的新版，均逐步扩大了饮片收载品种，强化和增加了中药饮片质量控制标准，从外观和内在质量上进行严格要求，以求逐步统一全国中药饮片标准。

但随着用药需求的不断增加，生态环境的变化，野生资源的日益贫乏，栽培变异及多来源品种增多，加之经济利益的过度驱动，不炮不制，乱炮乱制，掺杂使假等不法行为频繁出现，饮片外观和内在质量严重受损，且性状特征均有变异。目前，书市上属于中药原植物、原药材及炮制成品的著作虽有多见，但部分描述与市场所见有较大差异。编者既以“药典”和有关省市炮制规范为依据，又紧密联系市场和用药实践，组织部分药学专家及专业技术人员编著出版《临床常用中药饮片原色图谱》一书，一为弥补书市的缺漏，二为中药饮片外观性状提供真实的判断依据，提高从业人员和大众对中药饮片真伪优劣的辨识能力。

本书将临床上常用的 500 余种中药采用不同炮制方法所得的 1300 多种中药饮片，分别拍摄成形状逼真的彩图，并加以简洁而准确的文字说明。书中描述的中药按药用部位分为根及根茎类、茎木类、皮类、叶类、花类、果实种子类、全草类、动物类等 12 类，内容包括品名、来源、产地、炮制加工、成品性状、功效主治、用法用量、化学成分、不良反应、使用注意、贮藏保管、附注，每味药及炮制品均附有彩图，诚为一本名副其实的饮片图鉴。书中内容分类科学，品种收录齐全，栏目设置与众不同，文字简明，图谱栩栩如生，既有利于中医药工作者识药、选药，也便于炮制生产、经营流通、质量监管及教学、科研和医药消费者参阅。不过，任何精美之作总有瑕疵和纰漏，敬请读者不惜赐教。

本书在编写过程中，著名中药药专家刘绍贵主任药师担任主审，对本书进行了指导。湖南三湘中药饮片有限公司、亳州市沪谯药业有限公司、安徽盛海堂中药饮片有限公司为本书的编写提供了大量样本，在此一并表示衷心感谢！同时，向所引用文献的原作者致以崇高的敬意！

编者

2013 年 7 月

第一章 根及根茎类

巴戟天	002	当归	039
白及	003	党参	041
白蔹	004	地黄	043
白前	004	地榆	044
白芍	005	独活	045
白术	007	莪术	046
白薇	008	防风	047
白芷	009	防己	048
白附子	010	粉葛	049
白茅根	011	附子	051
白头翁	012	干姜	052
百部	013	甘草	053
百合	014	甘松	055
板蓝根	015	甘遂	055
半夏	016	高良姜	056
北豆根	019	藁本	057
北沙参	019	葛根	057
苍术	020	狗脊	058
草乌	022	骨碎补	059
柴胡	023	何首乌	060
常山	025	红大戟	062
赤芍	026	红景天	063
川乌	027	胡黄连	063
川芎	028	虎杖	064
川贝母	029	红参	064
川木香	031	黄连	066
川牛膝	032	黄精	068
穿破石	033	黄芪	070
大黄	034	黄芩	071
大伸筋	037	黄药子	072
丹参	037	姜黄	073
		金果榄	074
		九节菖蒲	075

桔梗	075
苦参	076
藜芦	077
龙胆	078
漏芦	079
芦根	079
麻黄根	080
麦冬	081
猫爪草	082
绵草薺	083
绵马贯众	083
明党参	085
木香	085
南沙参	087
牛膝	087
片姜黄	089
前胡	089
茜草	090
羌活	092
秦艽	093
拳参	094
人参	095
人参须	096
三棱	098
三七	099
山柰	101
山药	102
山豆根	104
升麻	106
生姜	107
石菖蒲	108
太子参	109
天冬	110
天麻	110
天花粉	113
天葵子	115
天南星	115
土茯苓	116
威灵仙	117
乌药	118
西洋参	119

细辛	121
仙茅	122
香附	123
薤白	125
徐长卿	126
续断	127
玄参	128
延胡索	128
银柴胡	130
玉竹	131
郁金	132
远志	133
泽泻	134
浙贝母	135
知母	136
重楼	138
紫草	138
紫菀	139

第二章 藤、木、茎枝类

安痛藤	144
沉香	144
刺五加	145
川木通	146
大血藤	146
灯心草	147
丁公藤	148
功劳木	149
钩藤	150
桂枝	150
海风藤	151
槲寄生	152
鸡血藤	152
降香	153
麻黄	155
络石藤	157
南蛇藤	157
忍冬藤	158
青风藤	158
肉苁蓉	159

山木通	160
桑寄生	160
桑枝	161
石斛	162
首乌藤	164
苏木	165
锁阳	166
檀香	166
天仙藤	167
通草	168
西河柳	168
小通草	169
皂角刺	170
竹茹	171
紫苏梗	172

第三章 皮类

白鲜皮	174
地枫皮	175
地骨皮	176
杜仲	177
关黄柏	178
海桐皮	179
合欢皮	180
厚朴	181
黄柏	183
苦楝皮	184
牡丹皮	185
皮子药(麻口皮子药)	186
秦皮	186
肉桂	187
桑白皮	188
土荆皮	189
五加皮	190
香加皮	190
紫荆皮	191

第四章 叶类

艾叶	194
----------	-----

侧柏叶	195
大青叶	196
淡竹叶	197
荷叶	198
番泻叶	199
橘叶	200
苦丁茶	201
罗布麻叶	201
枇杷叶	202
桑叶	203
石韦	204
银杏叶	204
紫苏叶	205
棕榈	206

第五章 花类

丁香	208
葛花	208
谷精草	209
合欢花	209
红花	210
厚朴花	211
槐花	212
鸡冠花	213
金银花	214
荆芥穗	215
菊花	216
款冬花	217
牵牛子	218
凌霄花	218
玫瑰花	219
密蒙花	220
蒲黄	221
三七花	222
山银花	222
西红花	223
辛夷	224
旋覆花	225
芫花	226
野菊花	227

玉米须	227
月季花	228
紫苏花	228

第六章 果实及种子类

八角茴香	232
白果	233
白扁豆	234
柏子仁	235
苳苳	236
苳澄茄	237
槟榔	237
补骨脂	238
苍耳子	239
草果	241
草豆蔻	242
车前子	243
陈皮	244
赤小豆	246
茺蔚子	247
楮实子	248
川楝子	249
大腹皮	250
大枣	251
大风子	251
淡豆豉	252
稻芽	253
地肤子	254
冬瓜子	255
冬瓜皮	256
豆蔻	256
榧子	257
佛手	258
浮小麦	259
覆盆子	259
枸杞子	261
瓜蒌皮	262
瓜蒌子	262
谷芽	265
诃子	265

核桃仁	267
鹤虱	267
黑豆	269
黑芝麻	269
红豆蔻	270
胡椒	270
胡芦巴	272
花椒	273
化橘红	274
火麻仁	274
槐角	275
急性子	277
蒺藜	277
芥子	278
金樱子	279
韭菜子	280
橘核	281
橘络	282
决明子	283
苦杏仁	284
莱菔子	286
荔枝核	287
连翘	287
莲子	288
莲子心	289
莲房	289
龙眼肉	290
路路通	291
罗汉果	292
马兜铃	293
马钱子	294
麦芽	295
蔓荆子	297
母丁香	297
木瓜	298
木鳖子	299
木蝴蝶	300
南鹤虱	301
南山楂	301
南天仙子	302
牛蒡子	303

女贞子	304	枳壳	348
胖大海	305	枳实	349
千金子	306	枳椇子	350
牵牛子	307	猪牙皂	351
青果	308	紫苏子	351
青皮	308		
青葙子	310	第七章 全草类	
苘麻子	311	矮地茶	354
芡实	312	白英	354
肉豆蔻	313	白花蛇舌草	355
蕤仁	314	败酱草	356
桑椹	315	半边莲	356
沙苑子	315	半枝莲	357
砂仁	317	菖蓄	358
山楂	320	薄荷	358
山茱萸	321	车前草	359
蛇床子	322	穿心莲	359
石榴皮	323	垂盆草	360
石莲子	324	大蓟	360
使君子	325	地耳草	361
柿蒂	326	地锦草	362
丝瓜络	326	鹅不食草	362
酸枣仁	327	浮萍	363
桃仁	328	凤尾草	363
葶苈子	329	凤仙透骨草	364
菟丝子	330	杠板归	364
王不留行	332	广藿香	365
乌梅	333	广金钱草	366
吴茱萸	335	鸡骨草	366
五味子	336	绞股蓝	367
香橼	338	金钱草	367
西青果	338	荆芥	369
夏枯草	339	卷柏	370
小茴香	340	瞿麦	371
亚麻子	341	辣蓼	371
薏苡仁	342	元宝草	372
鸦胆子	343	龙葵	372
郁李仁	343	鹿衔草	373
预知子	344	马鞭草	374
皂荚	345	马齿苋	374
栀子	346		

墨旱莲	375
木贼	375
佩兰	376
蒲公英	377
千里光	377
青蒿	378
伸筋草	378
天山雪莲	379
委陵菜	380
寻骨风	380
豨莶草	381
仙鹤草	382
香薷	382
小蓟	383
益母草	384
茵陈	384
淫羊藿	385
鱼腥草	386
泽兰	387
紫花地丁	387

第八章 藻、菌、地衣类

冬虫夏草	390
茯苓	391
海金沙	393
海藻	394
昆布	394
雷丸	395
灵芝	396
马勃	397
树舌	398
银耳	398
云芝	399
猪苓	399

第九章 树脂类

阿魏	402
龙血竭	402
没药	403

乳香	404
血竭	405

第十章 动物类

鳖甲	408
蝉蜕	409
蟾酥	410
蚕沙	410
穿山甲	411
地龙	412
蜂房	413
蛤蚧	414
龟甲	415
海龙	417
海马	417
蛤壳	419
海狗肾	420
海螵蛸	421
黑蚂蚁	422
鸡内金	422
僵蚕	424
金钱白花蛇	425
九香虫	427
羚羊角	427
蝼蛄	429
鹿鞭	429
鹿筋	430
鹿茸	431
牡蛎	433
牛黄	434
蕲蛇	434
全蝎	436
桑螵蛸	436
石决明	438
水蛭	439
水牛角	440
土鳖虫	441
乌梢蛇	442
蜈蚣	444
五谷虫	445

五灵脂	446
瓦楞子	448
原蚕蛾	449
鱼脑石	449
夜明砂	450
燕窝	451
珍珠母	451
紫河车	452

第十一章 矿物类

白矾	456
赤石脂	456
磁石	457
胆矾	458
鹅管石	459
浮石	459
花蕊石	460
滑石	460
炉甘石	461
金礞石	462
硫黄	462
龙齿	463
龙骨	465
密陀僧	466
南寒水石	466
硼砂	467
硼砂	468
青礞石	468
蛇含石	469
石膏	469
雄黄	470
阳起石	471


阴起石	471
赭石	472
朱砂	473
紫石英	474
自然铜	474

第十二章 其他类

阿胶	478
冰片(合成龙脑)	479
儿茶	480
伏龙肝	480
琥珀	481
龟甲胶	481
鹿角胶	482
鹿角霜	482
芦荟	483
芒硝	484
青黛	484
轻粉	485
神曲	486
天竺黄	487
五倍子	487
湘曲	488
血余炭	489
玄明粉	489
樟脑	490
附录 I 中药炮制通则	491
附录 II 中药炮制用辅料	497
中文笔画索引	504

第
一
章

根及根茎类



巴戟天

【来源】为茜草科植物巴戟天 *Morinda officinalis* How 的干燥根。

【产地】主产于福建、广东、广西等地。

【炮制加工】巴戟天 取原药材，除去杂质，洗净，置蒸器内蒸透，趁热除去木心或用水润透后除去木心，切段，干燥，筛去碎屑。

盐巴戟天 取净巴戟天，照盐炙法（附录 I）用文火炒干。每 100kg 巴戟天用食盐 2kg。

制巴戟天 取净巴戟天与甘草煎液拌匀，照煮制法（附录 I）用文火煮透，液尽时取出，干燥，筛去灰屑。每 100kg 巴戟天用甘草 6kg，煎液约 50kg。

【成品性状】巴戟天 呈空心扁圆柱形节段或不规则小块，直径 0.5~2cm，表面灰黄色或暗灰色，具纵纹及横裂纹，切面皮部厚，紫色或淡紫色。周边灰黄色，质韧肉厚。气微，味甘而微涩（图 1-1）。以肉厚、断面紫色、无木心者为佳。



图 1-1 巴戟天

盐巴戟天 形同巴戟天，质较软润，味微咸（图 1-2）。

制巴戟天 形同巴戟天，表面微黄色，味甜（图 1-3）。



图 1-2 盐巴戟天



图 1-3 制巴戟天

【功效主治】巴戟天 补肾阳，强筋骨，祛风湿。可用于阳痿遗精，宫冷不孕，月经不调，少腹冷痛，风湿痹痛，筋骨痿软。

盐巴戟天 增强补肾助阳作用。

制巴戟天 增强补益作用。

【用法用量】入汤剂，每日 3~10g。亦可入丸、散、酒剂。

【主要成分】主含糖类、黄酮、氨基酸等，另含少量蒽醌类及维生素 C。

【不良反应】过量服用，可出现恶心、呕吐、口

渴、头痛、眩晕、睡眠不安、烦躁、嗜睡等反应。

【使用注意】阴虚火旺、小便不利、口干舌燥者不宜用。

【贮藏保管】置阴凉通风干燥处，防霉，防蛀。

【附注】常见伪品

1. 恩施巴戟：为茜草科植物四川虎刺 *Damnacanthus officinalum* Huang 的根。多呈念珠状（图 1-4）。



图 1-4 巴戟天伪品-恩施巴戟

2. 羊角藤：为茜草科植物羊角藤 *Morinda umbellata* L. 的干燥根。根呈圆柱形，略弯曲，长短不等，直径 5~15mm。表面灰黄至灰棕色，有的微带紫红色，较粗糙，具纵皱纹和横纹；有的皮部断裂而露出木部，但不似连珠状。肉薄而稍易剥落。断面皮部厚 1~4mm，灰黄棕色至灰紫色。木部较粗，呈放射状，直径 3~9mm，黄棕色。质坚韧。气微，味淡微甜（图 1-5）。

3. 白木通：为木通科植物白木通去木心后的根皮。呈圆柱形而弯曲，长 30~60cm，直径 1.2~2cm。表面灰褐色，外皮极粗糙而有许多不规则裂纹，节不明显，仅可见侧枝断痕。质坚硬，难折断，断面显纤维性，皮部较厚，黄褐色，木部黄白色，密布细孔导管，夹有灰黄色放

射状花纹。中央具小髓。气微弱，味苦而涩（图 1-6）。



图 1-5 巴戟天伪品-羊角藤



图 1-6 巴戟天伪品-白木通



【来源】为兰科植物白及 *Bletilla striata* (Thunb.) Reichb.f. 的干燥块茎。

【产地】主产于贵州、四川、湖南、湖北等地。

【炮制加工】取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，晒干，筛去灰屑，或研粉用。

【成品性状】呈不规则的横切片或纵切片。切面类白色，角质，微显筋脉小点，有黏性。气微，味苦（图 1-7）。以片大、坚实、色白明亮、光洁者为佳。

【功效主治】收敛止血，消肿生肌。用于咯血，



图 1-7 白及

吐血，外伤出血，疮疡肿毒，皮肤皲裂。

【用法用量】入汤剂，每日 6~15g，大剂量可用至 30g；亦可入丸、散剂，每次用 2~5g；研末吞服，每日 3~6g。外用适量。

【主要成分】主含联苄类、二氢类、联菲类成分，二氢菲并吡喃类成分及蒽醌类成分和酚酸类成分。

【不良反应】少数患者用药后，可出现恶心、呕吐；大剂量使用可致轻度间质性肝炎、肾盂肾炎，部分肾小管腔内有蛋白管型。

【使用注意】不宜与乌头类药材同用。

【贮藏保管】置阴凉通风处。粉末宜贮于玻璃瓶中，密闭，防潮。



【来源】为葡萄科植物白蔹 *Ampelopsis japonica* (Thunb.) Makino 的干燥块根。

【产地】全国多数地区有分布，主产于河南、湖北。

【炮制加工】取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，晒干，筛去灰屑。

【成品性状】呈不规则或长圆形厚片，直径 1~2cm。外表皮红棕色至红褐色，具纵皱纹及横长

皮孔，外皮可层层剥落。切面类白色或淡红棕色，有的可见深色环纹导管及放射状纹理。周边较厚，微翘起或略弯曲，体轻，质硬脆，易折断，折断时有粉尘飞出，气微，味甘(图 1-8)。以断面色白、肥大、粉性足者为佳。




图 1-8 白蔹

【功效主治】清热解毒，消痈散结，敛疮生肌。用于痈疽发背，疔疮，瘰癧，烧烫伤。

【用法用量】入汤剂，每日 5~10g。外用适量，煎汤洗或研成极细粉敷患处。

【主要成分】主含黏液质、淀粉、酒石酸、龙脑酸及其糖苷、脂肪酸和酚性化合物等。

【不良反应】个别患者服后出现畏寒肢冷症状。

【使用注意】①脾胃虚寒者及无实火者、痈疽已溃者或阴疽色淡不起者不宜用。②不宜与川乌、草乌、附子同用。

【贮藏保管】置通风干燥处，防蛀，防霉。



【来源】为萝藦科植物柳叶白前 *Cynanchum stauntonii* (Decne.) Schltr. ex Lévl. 或 芫花叶白前 *Cynanchum glaucescens* (Decne.) Hand. -Mazz. 的干燥根茎和根。秋季采挖，洗净，晒干生用或蜜炙用。

【产地】主产于浙江、安徽、江苏、福建、湖北、

江西、湖南等地。

【炮制加工】 白前 取原药材，除去杂质，洗净，润透，切长段，干燥，筛去灰屑。

蜜白前 取净白前，照蜜炙法（附录 I）炒至不粘手。每 100kg 白前，用炼蜜 25kg。

【成品性状】 白前 呈圆柱形小段，表面黄棕色、淡黄色或灰绿色。切面灰黄色或灰白色，中空。质脆。气微，味微甜（图 1-9）。以根茎粗、表面色黄者为佳。



图 1-9 白前

蜜白前 形同白前，表面深黄色，微有光泽，略带黏性，具蜜香气，味甜（图 1-10）。



图 1-10 蜜白前

【功效主治】 降气，消痰，止咳。用于肺气壅实，咳嗽痰多，胸满喘急。

【用法用量】 入汤剂，每日 3~10g；或入丸、散剂。

【主要成分】 主含皂苷类成分。

【使用注意】 咳喘属气虚者不宜用。

【贮藏保管】 置通风干燥处，防虫蛀、霉变。蜜白前缸坛盛装，密闭，置阴凉干燥处。

【附注】 常见伪品 可见萝藦科、石竹科、百合科等数种植物的根及根茎。主要品种为龙须菜：百合科植物龙须菜 *Asparagus schoberioides* Kunth 的干燥根及根茎。根茎长 2~9cm，上有多数膜质黄棕色鳞叶，根簇生根茎上，呈扁圆形，弯曲，长可至 50cm，直径 0.1cm 左右。表面灰棕色至暗紫色，常密生灰白色绒毛。质柔韧，不易折断，断面中心有小木心。气微，味淡微苦（图 1-11）。



图 1-11 白前伪品-龙须菜



【来源】 为毛茛科植物芍药 *Paeonia lactiflora* Pall. 的干燥根。

【产地】 主产于浙江、安徽、四川等地。山东、贵州、湖南、湖北、甘肃、陕西、河南、云南等地亦产。浙江产者称为“杭白芍”，品质最佳；安徽产者称“亳白芍”，产量最大；四川产者名“川白芍”，又名“中江芍”，产量亦大。

【炮制加工】 白芍 取原药材，洗净，润透，切