

护士专业参加国家统考参考资料

医学多选题集

(内部资料)

江西省景德镇市卫生学校

主 编

胡 念 璋

副 主 编

徐 树 绵 吴 畏

编 写 编 辑

胡 念 璋	徐 树 绵	吴 畏
陈 富 强	吴 京 明	吕 茹 玲

前 言

为帮助我校护士专业毕业班学生参加省、卫生部举办的国家统一考试，我们按照卫生部科教司规定的医学多选题命题原则和要求，以卫生部颁发的护士专业外科学及护理、内科学及护理、基础护理学教学大纲为基准，以全国统编教材为依据，组织我校外科、内科、护理等教研组的教师编写了这本《医学多选试题集》，供同学们在复习中作参考。

本试题集概括了外科学及护理、内科学及护理，基础护理学中主要问题。试题命题着重于大纲规定的要求学生掌握、熟悉的内容和重点内容也包括了部份要求学生了解的内容。试题在毕业班同学测试中，P值等于0.3~0.7之间，T值大于Y0.15—0.30。

此外，并选用了国内外出版的或医学院校编写的内部参考资料中有关外科、内科、护理方面的多选题集（汇编）中，在护士专业统编教材中有备选答案可解题的部分试题，有的作了适当修改。

本试题集编入试题近2000题，约22万字，后附试题答案。试题按统编教材章次排列，分A、B、C、D四种题型。

该集主要供护士专业毕业班同学作复习参试用，也可作为中、初级护理班人员学习参考书。由于水平有限，加上为了毕业班复习急用，故匆忙编写付印，错误一定难免，恳请同道及同学们批评指正。

江西省景德镇市卫生学校

一九八四年五月十日

多 选 题 解 题 说 明

A型题 (最佳回答题)

每一个考题下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。解题时, 只许从中选择一个最合适的答案, 并把答卷相应位置上的字母涂抹, 以示正确回答。

B型题 (配伍选择题)

A、B、C、D、E 是备选答案, 阿拉伯序码是考题。解题时注意: 如果这道题只与答案 A 有关, 则把答卷相应位置上的 A 涂抹; 如果这道题只与答案 B 有关, 则把答案相应位置上的 B 涂抹; ……每个答案可以选择一次或一次以上, 也可以一次也不选择。

C型题 (比较选择题)

A、B、C、D 是备选答案, 阿拉伯序码是考题。解答时注意: 如果这道题只与答案 A 有关, 则把答卷相应位置上的 A 涂抹; 如果这道题只与答案 B 有关, 则把答卷相应位置上的 B 涂抹; 如果这道题与答案 A 和 B 都有关, 则把答卷相应位置上的 C 涂抹; 如果这道题与答案 A 和 B 都无关, 则把答卷相应位置上的 D 涂抹。

K型题 (复合是非题)

考题提供了①②③④四个备选答案, 解题时, 必须按照一定的格式用五种不同的组合来回答。

如果这道题与答案①②③有关, 则把答卷相应位置上的 A 涂抹;

如果这道题与答案①③有关, 则把答卷相应位置上的 B 涂抹;

如果这道题与答案②④有关, 则把答卷相应位置上的 C 涂抹;

如果这道题与答案④有关, 则把答卷相应位置上的 D 涂抹;

如果这道题与答案①②③④都有关, 则把答卷相应位置上的 E 涂抹;

目 录

外 科 学 及 护 理

第一章	外科学无菌方法 (1~35题)	(1)
第二章	手术室工作 (36~59题)	(3)
第三章	体液平衡与液体疗法 (60~147题)	(5)
第四章	休克 (148~199题)	(11)
第五章	麻醉 (200~242题)	(15)
第六章	复苏术 (243~284题)	(18)
第七章	手术前后的护理 (285~300题)	(20)
第八章	外科感染 (301~371题)	(22)
第九章	损伤 (372~434题)	(27)
第十章	伤口处理及更换敷料 (435~467题)	(32)
第十一章	肿瘤概论及常见体表 良性肿瘤 (468~509题)	(34)
第十二章	先天性疾病 (510~522题)	(36)
第十三章	颅脑损伤 (523~553题)	(37)
第十四章	颈部疾病 (554~588题)	(40)
第十五章	胸部疾病 (589~636题)	(42)
第十六章	腹部疾病 (637~770题)	(46)
第十七章	直肠肛管疾病 (771~802题)	(55)
第十八章	周围血管疾病 (803~805题)	(57)
第十九章	泌尿系及男性生殖系 疾病 (806~826题)	(57)
第二十章	骨与关节疾病 (827~867题)	(59)

内 科 学 及 护 理

第一篇	诊断学基础 (1~195题)	(63)
第二篇	系统内科疾病及护理	
第一章	内科疾病护理总论 (196~200题)	(74)
第二章	呼吸系统疾病及护理 (201~303题)	(75)
第三章	消化系统疾病及护理 (304~400题)	(83)
第四章	循环系统疾病及护理 (401~558题)	(89)
第五章	泌尿系统疾病及护理 (559~593题)	(99)
第六章	造血系统疾病及护理 (594~623题)	(101)
第七章	内分泌, 代谢性疾病 及护理 (624~652题)	(103)

第八章	理化因素所致疾病及 护理 (653~682题)	(105)
第九章	胃关节病及护理 (683~688题)	(107)
第十章	神经精神病及护理 (689~727题)	(108)
第十一章	诊疗技术 (728~734题)	(110)
内科附加补充题	(735~800题)	(111)

基 础 护 理 学

A型题	(1~150题)	117
C型题	(151~186题)	(128)
B型题	(187~225题)	(130)
K型题	(226~300题)	(131)

外 科 学 及 护 理

第一章 外科无菌方法

A 型 题 (1—13)

- 1、下列哪项不属于热力灭菌法？
A、煮沸灭菌法 B、高压蒸汽灭菌法 C、流动蒸汽灭菌法 D、干热灭菌法 E、乳酸加热蒸发消毒
- 2、用一小瓶硫磺粉检查高压蒸汽灭菌效果，该瓶应放在：
A、所有包裹的最低层 B、所有包裹的最上面 C、各包裹之中间 D、各包裹旁边 E、最大包裹的中心
- 3、手术室空气消毒法，下列哪项不对？
A、紫外线照射，30立方米空间，30瓦灯，离地面2.5公尺 B、乳酸消毒
每立方米空间用乳酸0.3~0.5毫升，关闭30分钟 C、每立方米空间40%福尔马林4~8毫升，加过锰酸钾2~4克，封闭6~8小时 D、每立方米空间40%福尔马林4~8毫升，加漂白粉3~5克，封闭4~8小时 E、以上都不对
- 4、有关无菌术叙述，下列哪项正确？
A、手术区皮肤消毒包括切口周围10厘米 B、手及前臂消毒浸泡75%酒精中3分钟 C、无菌术即消毒法 D、抗菌术一般以物理方法为主 E、1~2%碳酸氢钠液煮沸灭菌，消灭一般菌煮沸时间可稍少于20分钟
- 5、杀灭芽胞菌灭菌法，下列哪项是错误的？
A、煮沸100℃，持续1小时， B、蒸笼灭菌水沸后持续2小时，1日1次，连续消毒三天 C、高压灭菌121℃，持续30分钟 D、1:1000新洁尔灭浸泡20分钟 E、75%酒精浸泡60分钟以上
- 6、手术人员在手术中，视为有菌区的范围为：
A、头颈部及下肢 B、头颈部及脐以下部位 C、头部、背部及下肢 D、头颈部、腰以下及背后 E、头部、腹部以下区域
- 7、氨水洗手法，0.05%氨水液配制方法是：
A、温水500毫升+10%氨水10毫升
B、温水1000毫升+10%氨水20毫升
C、温水2000毫升+10%氨水50毫升
D、温水2000毫升+10%氨水10毫升
E、温水1000毫升+20%氨水50毫升
- 8、氨水洗手法，配制氨水液的浓度是：
A、1% B、0.5% C、0.1% D、0.01% E、0.05%
- 9、关于接台连续手续的洗手、穿衣、戴手套应该是：
A、小心脱去手术衣、手套，冲洗双手，擦干，再浸于消毒液中5分钟，再穿无菌

手术衣,戴手套 B、用1%新洁尔灭消毒液消毒前臂,然后穿无菌手术衣,戴手套 C、小心脱去原来穿的手术衣、手套,再穿上灭菌手术衣、带手套 D、脱去原来的手术衣手套,用碘酒消毒双手后,然后穿上无菌手术衣,戴手套, E、必须按肥皂水或氨水洗手法重新洗手,穿无菌手术衣,戴手套

10、有关无菌术,哪项是错误的?

A、锐利器械、内窥镜不适于热力灭菌 B、煮沸消毒需45分钟煮沸才可杀死芽胞菌 C、玻璃、橡胶制品亦可煮沸灭菌 D、对任何物品高压蒸汽灭菌,温度均应在115—121℃以上,时间不少于15—30分钟 E、灭菌后包裹干燥情况下10—14天内使用可不再消毒

11、刀片、缝针最好的消毒方法是:

A、煮沸灭菌法 B、干热灭菌法 C、化学药品浸泡灭菌法 D、高压蒸汽灭菌法 E、流动蒸汽灭菌法

12、下列哪项是违犯手术中无菌原则的?

A、手术人员双手不可下垂超过腰以下 B、术中手套接触到无菌区或刺破小孔,用酒精涂擦消毒, C、切开胃肠等空腔内脏前,应先用纱布垫将四周包盖 D、切开皮肤前切口用酒精再消毒一次 E、缝合皮肤前切口用酒精再消毒一次

13、在高原地区作急诊手术需无菌敷料,下列哪种消毒灭菌方法最快最彻底?

A、蒸笼 B、新洁尔灭溶液 C、煮沸消毒 D、高压蒸汽 E、甲醛熏蒸

B 型 题 (14—17)

A、压力15~20磅/平方寸,温度121~126℃,维持30~45分钟 B、压力15~17磅/平方寸,温度121~125,维持20~30分钟 C、压力10~15磅/平方寸,温度115~121℃,维持20~30分钟 D、0.1%新洁尔灭浸泡30分钟 E、10%福尔马林浸泡1小时

14、布类敷料

15、金属器械

16、玻璃用品

17、光学内窥镜光学部分

C 型 题 (18—26)

A、金属器械 B、玻璃器械 C、两者均可 D、两者均不可

18、高压蒸汽灭菌法

19、煮沸灭菌法

A、杀灭一般化脓菌 B、杀灭芽胞菌 C、两者均可 D、两者均不可

20、煮沸消毒2小时

21、蒸笼法蒸1—2小时

22、高压蒸汽灭菌20磅/平方寸,121—126℃,30分钟

A、先穿无菌手术衣,后戴手套 B、先戴手套后穿无菌手术衣 C、两者均可

D、两者均不对

23、用干手套

24、用湿手套

A、无菌术

B、抗菌术

C、两者均是

D、两者均不是

25、对患者手术区及周围用化学药品灭菌

26、对敷料、器械用高压蒸汽灭菌

K 型 题 (27—35)

27、粘膜及肛门部的消毒可选用:

① 0.1%新洁尔灭

② 75%酒精

③ 2%红汞

④ 2.5%碘酒

28、关于煮沸灭菌哪几点是正确的?

①物品放入锅内煮沸,水沸后煮20分钟

②如海拔1500公尺以上,消毒时间应延长

③水中加入碳酸氢钠,使成1—2%碳酸氢钠液,可提高沸点到105℃

④刀剪一般不宜用煮沸法

29、高压蒸汽灭菌的注意事项正确的应包括:

①、灭菌包裹不应超过60×50×40厘米

②、锋利刀剪不宜高压蒸汽灭菌

③、液体容器药液应存满瓶,以免影响效力

④、有盖容器应半开,

30、化学药品灭菌作用的原理是:

① 使菌体蛋白质凝固变性

② 菌体内酶蛋白中的—SH基氧化,活力消失

,影响代谢

③ 影响细胞膜通透性而破坏之

④ 以上都不是

31、用化学药品浸泡器械,其浓度、时间下列哪些组是正确的?

① 70~75%酒精泡金属器械仅需30分钟

② 0.1%新洁尔灭浸泡橡胶、塑料

导管需30分钟

③ 石炭酸配制的消毒液泡刀剪15分钟

④ 10%福尔马林浸

泡胶质导管、有机玻璃需1小时

32、手术人员紧急情况下手臂消毒法可采用:

① 两手用2.5%碘酊涂擦,再用酒精脱碘

② 两手浸泡70%酒精中3分钟

③ 两手用肥皂水洗刷各五分钟,再用2.5%碘酊涂擦,后用70%酒精脱碘

④ 迅速用肥皂洗净手及前臂,再2.5%碘酊涂擦,后用70%酒精脱碘

33、无菌术应用的范围为:

① 敷料、手术用品

② 病人皮肤

③ 器械、药品

④ 手术者的手、臂

34、引起外科伤口外源性感染途径有:

① 接触

② 空气

③ 飞沫

④ 消化道

35、手术室空气消毒宜选用的方法有:

① 1:2000新洁尔灭喷雾

② 乳酸蒸汽消毒

③ 1:5000过锰酸钾液喷雾

④ 紫外线照射

第二章 手术室工作

A 型 题 (36—38)

36、关于术中器械物品传递法,下列哪项是错误的?

A、手术刀应握住刀柄中段、刀峰向上,使术者接刀柄处 B、血管钳及剪刀握住尖端或轴部,以柄给术者 C、弯针、持针器应夹着针的前后1/2交界处
D、纱布垫先应用温盐水浸湿挤干,拉开递给术者

37、关于缝合原则哪项不正确

A、分清层次,按次序同层组织对准缝合 B、伤口不能留有死腔 C、缝线越紧越好 D、感染伤口不应立即缝合 E、伤口太松延长愈合时间,且瘢痕较大

38、外科打结种类最常用的是

A、方结 B、外科结 C、三重结 D、滑结 E、假结

B 型 题 (39—44)

A、腹部和腹侧部手术 B、胸部、肾部手术 C、颈部如甲状腺、气管切开术 D、脊柱及其他背部手术 E、肛门及会阴部手术

39、俯卧位

40、颈仰卧位

41、侧卧位

42、仰卧位

A、方结 B、外科结 C、三重结 D、假结 E、滑结

43、皮肤缝合

44、小血管结扎止血

C 型 题 (45—56)

A、巡回护士 B、手术护士 C、两者均是 D、两者均不是

45、根据手术需要摆好病人体位

46、负责检查手术物品器械是否齐全、完善、安全

A、巡回护士 B、手术护士; C、两者均是 D、两者均不是

47、负责准备好麻醉所用的一切药品、器械

48、手术开始前与术毕缝合伤口时,清点器械、敷料、缝针

A、手术护士 B、巡回护士 C、两者均是 D、两者均不是

49、术毕送病人回病房,并进行病情交班,点交物品

50、将术中标本保管、固定、送病理室检查

A、缝合皮肤软骨 B、缝合一般软组织 C、两者均可 D、两者均不可

51、三角针

52、圆针

A、肠线 B、丝线 C、两者均是 D、两者均不是

53、皮肤以下一般剪线后留线头1—2厘米

54、皮肤以下一般剪线后留线头3—4厘米

A、外科结 B、三重结 C、两者均可用 D、两者均不可用

55、结扎大血管

56. 一般小血管出血

K 型 题 (57—59)

57. 关于手术器械台的管理应该是:

- ①、升降台无简单铺式层 ②、吸引器不宜用热盐水冲洗 ③、缝线穿好后, 要保持干燥 ④、传递器械给术者应用柄, 不用头部

58. 有关缝线, 下列叙述正确的有:

- ①、肠线抗拉力强, 结扎可靠, 组织反应小, 价廉 ②、丝线采用反复高压蒸汽灭菌为宜 ③、肠线在体内不吸收, 成为异物刺激 ④、肠线从玻管取出, 应在等渗盐水中浸泡变软再用。

59. 分配你为洗手护士, 参加腹部手术, 有哪些项目是你的职责?

- ①、摆好病人体位, 输血和输液准备 ②、了解病情和手术目的, 提前洗手 ③、术中应观察病情变化 ④、术前和关腹前清点器械和敷料。

第三章 体液平衡与液体疗法

A 型 题 (60—90)

60. 代谢性酸中毒最突出的症状是:

- A、呼吸慢而浅, 口唇红 B、唇干舌燥, 眼球凹陷 C、头痛, 头晕, 嗜睡甚至昏迷 D、呼吸深而快, 有酮味 E、心率快、脉弱, 甚至血压下降

61. 关于高渗性脱水的表现, 哪项是错误的?

- A、病人疲乏, 头昏, 但口渴不明显 B、口唇粘昧干燥, 皮肤弹性差 C、小儿前囟可凹陷, 尿量减少 D、脉搏稍快或正常, 血压可正常 E、血清钠 142 毫当量/升以上

62. 下列症状中, 哪项不是低血钾的表现?

- A、肌肉软弱无力 B、肌肉麻木感, 重者心室纤颤, 甚至舒张期停搏 C、腹胀, 肠鸣音减弱或消失 D、心电图 T 波低平倒置, S—T 段降低等表现 E、腱反射减弱或消失

63. 关于低血钾的表现, 哪项是不对的?

- A、肌无力, 腱反射减弱 B、血钾在 5 毫当量/升 C、心音可低沉, 过速或心律不齐 D、神志可表现淡漠 E、心电图可出现 u 波

64. 休克血压测不到时, 股动脉内注射全血或 50% 高渗葡萄糖主要作用是:

- A、扩张血容量, 提高血压 B、迅速提高输养能力 C、迅速供给大量的能量, 纠正低血糖 D、改善微循环灌注 E、反射性加强心肌收缩力和改善心脏灌注

65. 引起高血钾症常见的原因, 下列哪条是错误的?

- A、大量组织破坏, 细胞内钾外溢 B、急性肾衰, 无尿少尿 C、静脉输入钾盐过多 D、溶血 E、长期应用皮质激素或双氢克尿塞

66. 代谢性酸中毒常见原因, 下列哪项是错误的?

- A、长期禁食 B、剧烈腹泻，肠梗阻 C、高热 D、持续剧烈呕吐
E、休克、急性肾衰
- 67、肠梗阻患者发病4天入院，血压80/60毫米汞柱，血钠122毫当量/升，血钾3.5毫当量/升，二氧化碳结合力30%容积，其治疗程序应首先：
A、先输电解质液，补充血容量 B、纠正酸中毒 C、补钾 D、急症手术，解除肠梗阻 E、边补液边急症手术
- 68、给高渗性脱水补液应：
A、全部输5%葡萄糖液 B、全部输等渗盐水 C、5%葡萄糖与等渗盐水同时补 D、先补5%葡萄糖液后补等渗盐水 E、先补等渗盐水后补5%葡萄糖液
- 69、腹手术后并发肺炎，呼吸功能不全，呼吸浅促，血中二氧化碳蓄积，血PH7.3。此时二氧化碳结合力常可为：
A、20—30容积% B、30—40容积% C、>50容积% D、15—20容积% E、以上均不是
- 70、有关代谢性酸中毒，代谢性碱中毒的治疗哪项正确？
A、代谢性酸中毒提高二氧化碳结合力1容积%每公斤体重需11.2%乳酸钠0.5毫升
B代谢性酸中毒提高二氧化碳结合力1容积%每公斤体重需5%碳酸氢钠0.5毫升
C、代谢性酸中毒时每公斤体重用三羟甲基氨基甲烷4毫升 D、代谢性碱中毒时用11.2%乳酸钠每公斤体重0.3毫升 E、代谢性碱中毒用5%碳酸氢钠每公斤体重0.5毫升
- 71、有关呼吸性碱中毒下列哪项正确？
A、多见于呼吸道梗阻，术后肺炎等 B、因换气过度血中二氧化碳明显降低引起 C、程度严重可用三羟甲基氨基甲烷纠正 D、血中二氧化碳结合力升高 E、迅速给纯氧吸入
- 72、有关等渗性脱水，下列哪项正确？
A、细胞外渗透压变化明显 B、不及时补液可转为低渗性 C、饮入大量液体可转为低渗性 D、血清钠在120—130毫当量/升之间 E、多见呕吐腹泻液体大量丢失后，饮入或输入无盐液体
- 73、有关脱水，缺钠下列哪项正确？
A、高渗性脱水达体量4%可出现神昏，高热，躁动 B、等渗性脱水多见于高热大汗 C、低渗性脱水口渴明显 D、低渗性脱水垂体后叶释放抗利尿激素减少，细胞外液减少 E、高渗性脱水细胞内渗透压比组织液低
- 74、关于脱水的病理生理，下列哪项是错误的？
A、高渗性脱水细胞内缺水 B、低渗性脱水细胞内缺水 C、低渗性脱水抗利尿激素分泌减少 D、等渗性脱水细胞外液渗透压无变化 E、高渗性脱水抗利尿激素分泌增加
- 75、有关补钾注意事项哪项不对？
A、尿量每小时30毫升以上方可补钾 B、争取口服，术后争取早进食 C、浓度适宜不超过3% D、滴入不过快每分钟40—60滴 E、24小时补钾不超过

过6—8克

- 76、制定补液方案，确定补什么，下列哪项不正确？
A、高渗性脱水先给5—10%葡萄糖液 B、低渗性脱水一律补生理盐水 C、等渗性脱水生理盐水及5—10%葡萄糖液各半 D、盐水输入较多，1/3量用1/6克分子的乳酸钠代替 E、有钾离子损失，酌加入10%氯化钾
- 77、下列溶液不属于电解质溶液的是：
A、0.9%氯化钠液 B、5%葡萄糖等渗盐水 C、5—10%葡萄糖液 D、乳酸钠或碳酸氢钠液 E、10%氯化钾
- 78、下列哪项不是输液监测观察指征？
A、精神状态是否好转 B、注意心肺体征 C、口渴，粘膜干燥皮肤弹性有无改变 D、体温：不发热，减少或停止输液，发热加快输液 E、血压、脉搏，尿量及比重说明血容量恢复情况
- 79、低血钾可引起：
A、全身小血管收缩 B、神经肌肉应激性减退 C、心电图S—T段及T波升高 D、腱反射不变 E、心音亢进，血压上升
- 80、等渗性脱水的主要病理生理变化是：
A、细胞外液水钠均减少 B、细胞外液浓缩 C、细胞外液低渗 D、细胞内液水钠均减少 E、细胞内低渗
- 81、细胞内液主要阳离子为：
A、钾 B、钠 C、钙 D、镁 E、以上都不对
- 82、血浆中主要阴离子是：
A、碳酸氢根 B、磷酸根 C、硫酸根 D、氯 E、蛋白离子
- 83、血浆中主要阳离子为：
A、钾 B、钙 C、钠 D、镁 E、以上均不对
- 84、某病人电解质紊乱入院测得钾为3.0毫当量/升，血清钠125毫当量/升，可诊断为：
A、低血钾高渗性脱水 B、高血钾中度缺钠 C、低血钾重度缺钠 D、低血钾中度缺钠 E、低血钾，等渗脱水
- 85、抢救“肾衰”高血钾哪项是错误的？
A、腹膜透析 B、血液透析 C、平衡盐液静滴 D、5%碳酸氢钠静滴 E、10%葡萄糖加胰岛素静滴
- 86、常用“平衡液”中，不含下列哪种成份？
A、氯化钠 B、氯化钾 C、氯化钙 D、乳酸钠 E、5%葡萄糖等渗液
- 87、大量较快补液时病人出现心率增快，呼吸急促，咳嗽或咳出粉红色痰，其补液速度宜：
A、加快补液 B、维持原速 C、加快或维持原速均可 D、减慢或停止补液 E、快速、维持原速、减慢均可
- 88、长期反复呕吐易造成
A、代谢性酸中毒 B、代谢性碱中毒 C、代谢性酸中毒并高血钾 D、高血钾 E、高血钙

89、下列哪项是低渗性脱水的表现?

- A、口渴 B、皮肤弹性尚可 C、粘膜干燥 D、尿量减少 E、脉搏细速, 血压常可降低

90、下列哪种情况最易出现代谢性碱中毒?

- A、肠梗阻 B、肠痿 C、幽门梗阻 D、颅脑伤换气过度 E、吞咽困难、禁食

B 型 题 (91—106)

- A、血容量不足 B、心功能不全 C、补液量已足 D、急性肾衰 E、低渗性脱水

91、中心静脉压 4 厘米水柱, 尿少

92、中心静脉压: 12 厘米水柱, 尿多, 血压正常

93、中心静脉压 15 厘米水柱, 尿少, 血压正常

- A、二氧化碳结合力下降, PH 值下降 B、二氧化碳结合力升高, PH 值升高
C、二氧化碳结合力升高, PH 值下降 D、二氧化碳结合力下降, PH 值升高
E、二氧化碳结合力升高, PH 下降碳酸氢根升高

94、代谢性酸中毒

95、代谢性碱中毒

96、呼吸性碱中毒

- A、幽门梗阻, 长期呕吐 B、胸部外伤, 肺炎, 呼吸道梗阻 C、禁食, 脱水, 休克 D、颅脑外伤, 瘧病, 换气过度

97、代谢性酸中毒 98、代谢性碱中毒 99、呼吸性酸中毒 100、呼吸性碱中毒

- A、病人在输液中出现心率过速, 呼吸气促, 咳嗽, 血性泡沫痰 B、病人输液中寒战, 高热, 头痛, 尿正常 C、经输液后仍口渴, 尿少 D、经输液后仍烦躁, 皮肤冷 E、经输液后血压渐稳定, 脉减慢, 尿增

101、“心衰”, 肺水肿可能

102、血容量已补足

103、输液发热反应

- A、低渗性脱水 B、等渗性脱水 C、高渗性脱水 D、高血钾症 E、以上都不是

104、长期呕吐腹泻, 输入大量 5% 葡萄糖液疲乏, 呕吐, 脉细弱

105、高热大汗, 口渴, 尿少, 体温升高

106、禁食三天仅输葡萄糖盐水每日 3 升, 四肢软弱无力, 腹胀

C 型 题 (107—127)

- A、血中二氧化碳结合力下降 PH 值下降 B、血中二氧化碳结合力升高, PH 值升高 C、两者均有 D、两者均无

107、严重绞窄性肠梗阻, 腹膜炎

108、疤痕性幽门梗阻

- A、高渗性脱水 B、低渗性脱水 C、两者均有 D、两者均无
- 109、口渴
- 110、重症昏迷
- A、代谢性酸中毒 B、呼吸性酸中毒 C、两者均有 D、两者均无
- 111、PH值小于7.35
- 112、二氧化碳结合力下降
- A、乳酸钠或碳酸氢钠静脉点滴 B、静脉输高渗葡萄糖 C、两者均可
- D、两者均不可
- 113、促使钾离子转入细胞内，治疗高血钾
- 114、促使钾离子转入细胞外，治疗低血钾
- 115、纠正代谢性酸中毒
- A、中度脱水 B、重度脱水 C、两者均有 D、两者均无
- 116、严重口渴，尿少、比重高
- 117、昏迷高热
- A、中度缺钠 B、重度缺钠 C、两者均有 D、两者均无
- 118、皮肤弹性减退，眼球凹陷血压下降
- 119、表情淡漠、休克、昏迷
- A、等渗盐水 B、高渗盐水 C、两者均可 D、两者均不可
- 120、一般低渗性脱水选用
- 121、严重低渗性脱水选用
- A、全血 B、血浆 C、两者均可 D、两者均不可
- 122、大面积烧伤病人选用
- 123、感染性休克和失血性休克宜用
- A、以失水为主 B、以失盐为主 C、两者均相等 D、两者均不等
- 124、低渗性脱水
- 125、等渗性脱水
- A、轻度代谢性碱中毒 B、重度代谢性碱中毒 C、两者均是 D、两者均不是
- 126、一般静脉补给等渗性盐水及钾盐
- 127静脉输给氯化氨溶液

K 型 题 (128~147)

- 128、低血钾可表现
- ① 神经肌肉兴奋性增强 ② 腱反射减弱 ③ 腹部绞痛 ④ 肠蠕动减弱或肠麻痹
- 129、高血钾的表现有：
- ① 肌肉乏力、麻木、甚至软瘫 ② T波低平、倒置 ③ 心传导系统紊乱，甚至停搏 ④ 出现u波
- 130、为预防溶血反应，输血前应注意：
- ① 应仔细核对血型 ② 做主型和交叉配血试验 ③ 贮血瓶中血液不可剧烈

振荡 ④ 冷藏血用热水急速加热

131、下列静脉输液安排, 哪些是错误的?

- ① 低渗性脱水应静滴注5%葡萄糖液为主 ② 高渗性脱水应静滴平衡盐液
③ 等渗性脱水应静滴5%葡萄糖液 ④ 估计补液总量后, 当日先补总量的1/2

132、低渗性脱水病理生理变化可出现:

- ① 细胞外液减少, 细胞水肿 ② 垂体后叶释放抗利尿激素减少 ③ 血容量减少
④ 血清钠上升

133、高渗性脱水的病因有:

- ① 禁食、昏迷、不能饮水 ② 大量应用渗透性利尿剂 ③ 高热多汗
④ 剧烈呕吐腹泻

134、低血钾的病因有:

- ① 禁食时间长 ② 呕吐腹泻严重 ③ 长期用双氢克尿噻 ④ 持续静脉
注射大量葡萄糖

135、补钾原则是:

- ① 见尿补钾 ② 补钾不过浓, 滴入不过快 ③ 24小时补钾一般不超过
6~8克 ④ 所有缺钾病人应尽量静注

136、制订补液方案确定补多少下列哪几项正确?

- ① 补液总量=生理需要量+体液累积损失量+继续损失量 ② 生理需要量每
天补给2000~2500毫升 ③ 生理需要量包括等渗盐水500毫升, 其余补5~
10%葡萄糖液 ④ 累计丧失量一般第一天只补给全量的1/2

137、输液程序“先盐后糖、先晶后胶”的原理是:

- ① 脱水如先给胶体, 胶体渗透压吸收水分入血管, 加重组织脱水 ② 晶体液
对机体细胞功能更主要 ③ 脱水情况下输入胶体, 增加血粘度易形成微血栓
④ 晶体液比胶体液排出慢, 保持水份好

138、关于常用液体及适应证一般是:

- ① 等渗盐水可纠正轻度酸、碱中毒 ② 平衡盐液适用于抗休克及伴酸中毒脱
水病人 ③ 葡萄糖~胰岛素~氯化钾液适用需大量供热及缺钾病人 ④ 紧
急扩容宜选用低分子右旋糖酐

139、日常用“平衡液”在1000毫升中应由下列哪些药物组成?

- ① 氯化钠6克 ② 氯化钾0.3克 ③ 氯化钙0.2克 ④ 乳酸钠3克

140、脱水病人补液量可以从哪几个方面来估计?

- ① 继续损失量 ② 累计损失量 ③ 生理需要量 ④ 正常消化泌尿道
排出量

141、输枸橼酸钠贮存血液2000~2500毫升时预防合并症每输1000毫升应:

- ① 输林格氏液1000毫升 ② 输入10%葡萄糖1000毫升 ③ 输“平衡液”
1000毫升 ④ 10%葡萄糖酸钙10毫升静注

142、输血发生溶血反应时, 可有以下哪些症状?

- ① 头痛、胸痛 ② 腰背痛 ③ 呼吸困难 ④ 血红蛋白尿

143、深静脉高营养液的配制主要是

- ① 10%葡萄糖液 ② 50%葡萄糖液 ③ 等渗盐水 ④ 水解蛋白

144、深静脉高营养液输入途径常为:

- ① 颈静脉插管 ② 大隐静脉滴注 ③ 锁骨下静脉插管 ④ 肘正中静脉滴注

145、关于液体疗法输注电解质液和葡萄糖目的是:

- ① 预防体液紊乱 ② 纠正液体紊乱 ③ 供给营养 ④ 增加抗体

146、输血溶血反应抢救原则为:

- ① 抗休克 ② 保护肾功能,碱化尿 ③ 重者人工透析 ④ 使用大量利尿、脱水剂

147、下列哪种或哪些情况易出现低血钾?

- ① 严重挤压伤 ② 单纯性急性阑尾炎 ③ 溶血反应 ④ 长期静脉滴注葡萄糖

第四章 休 克

A 型 题 (148—171)

148、关于中心静脉压,以下说法哪项是正确的?

- A、指右心房、左心房的压力 B、指腹腔、胸腔静脉压力 C、指右心房及胸腔内上、下腔静脉的压力
D、指右心房、右心室的压力 E、指胸腔内上腔静脉压力

149、成人中心静脉压正常值是:

- A 6~8厘米水柱 B 5~12厘米水柱 C 15~18厘米水柱 D 5~8毫米水柱 E 9~12毫米水柱

150、休克病人输液的监测,以下哪项较可靠?

- A 按照当天需要量和额外丧失量 B 尿量和中心静脉压测定 C 血压及脉搏
D 颈静脉充盈情况 E 皮肤颜色、温度

151、关于休克的治疗,下述哪项是错误的?

- A、失血性休克的治疗主要是扩容和止血 B 感染性休克首先一定要纠正休克,再处理原发病灶
C、治疗血容量减少性休克,升压药使用不是主要手段
D、感染性休克可用大量肾上腺皮质激素 E、过敏性休克选用血管收缩药

152、成年,烧伤面积二度以上40%,48小时入院,经注射吗啡、青、链霉素,输生理盐水1500毫升后,仍有休克,应为:

- A、神经性休克 B、感染性休克 C、低血容量性休克 D、创伤性休克
E、感染合并神经性休克

153、休克的基本病理改变实质是:

- A、血压过低 B、心率速、弱、中心静脉压下降 C、有效循环血量锐减,微循环灌注不足,细胞缺氧
D、心排血量下降 E、中枢神经障碍、神志淡漠

154、失血性休克,经输血输液2000毫升后,中心静脉压13厘米水柱,血压80/60毫米