

御纂醫宗金鑑卷五十五

編輯幼科雜病心法要訣

發熱門

諸熱總括 小兒有病多發熱表裡虛實宜分別觀形色辨因由審證切脈有妙訣表證須汗裡下之虛則宜補實則瀉平昔體認要精詳方得臨時無遺闕註小兒發熱有表裏虛實之異治亦有汗下補瀉之殊須觀形色審證切脈以別之惟在平昔講習精詳臨證庶不致誤

表熱 表熱之證因外感脈浮發熱惡風寒頭痛身疼而無汗十神通聖表為先註小兒外感寒邪脈浮發熱惡風寒頭痛身痛無汗此表熱也宜十神湯主之若兼內熱者雙解通聖湯兩解之

十神湯 升麻 葛根 麻黃 香附炒 陳皮 蘇葉 赤芍藥 川芎 香白芷 甘草生 引用生薑水煎服 方十

神湯治表熱證升麻乾葛共麻黃香附陳皮蘇葉芍芍止甘草引生薑

雙解通聖湯方見傷寒

裡熱 裡熱之證因內熱偏身蒸熱小便紅面赤唇焦舌燥渴調胃白虎解毒清註小兒肥甘過度必生內熱以致發熱蒸蒸小便赤澀面赤唇焦舌燥而渴脈實有力者先以調胃承氣湯下之不愈用白虎湯或黃連解毒湯清之

調胃承氣湯 大黃 芒硝 甘草 引用生薑水煎服 方調胃承氣治裡熱大黃甘草共芒硝引用生薑水煎服大便通

利熱自消

白虎湯 石膏煨 知母生 甘草生 粳米 水煎服 方調胃白虎湯知母生用良石膏合甘草粳米共煎膏

黃連解毒湯 黃芩 黃連 梔子 黃蘗 水煎服 方黃連解毒湯清熱效非常苓連梔子蘗煎服保安康

虛熱 虛熱病後榮衛弱神倦氣乏用補中嘔渴竹葉石膏湯治面赤尿白厥白通註虛熱者因小兒病後氣血虛弱榮衛尚未

調勻之故其證神倦氣乏宜用補中益氣湯治之若兼口渴引飲而嘔者宜用竹葉石膏湯治之又有陰盛格陽外浮發熱者

其面色雖赤然小便必清白四肢必厥逆宜用白通湯收斂陽氣熱退自愈

補中益氣湯 方見殭泄

竹葉石膏湯 竹葉 石膏 煨 人參 麥冬 法 甘草 生 半夏 製 粳米 引生薑水煎服 方病後虛熱煩渴皆

因氣弱胃津亡竹葉石膏麥冬半夏粳米共生薑

白通湯 乾薑 附子 製 葱 水煎服 方虛熱原於陰格陽真寒假熱白通湯散寒薑附葱白並厥同熱退自然康

實熱 實熱積熱午潮熱腹脹尿紅大便難煩渴口瘡腮頰赤涼膈大柴紋通仙 註 小兒有餘積熱以致午後潮熱蒸蒸有汗

肚腹脹滿小便赤大便難煩渴啼叫口舌生瘡腮頰紅赤脈洪數有力法宜清熱通利時時熱者涼膈散主之午後潮熱者大

柴胡湯主之 涼膈散 方見急驚風 大柴胡湯 方見傷寒

積滯門

積滯總括 小兒養生食與乳搏節失宜積滯成停乳傷食宜分晰因證調治保安寧 註 夫乳與食小兒資以養生者也胃主

納受脾主運化乳貴有時食貴有節可免積滯之患若父母過愛乳食無度則宿滯不消而病成矣醫者當別其停乳傷食之

異臨證斟酌而施治焉

乳滯 嬰兒乳滯睡不安多啼口熱吐驚煩肚脹腹熱便酸臭慎攻宜用消乳丸 註 乳滯之兒其候睡卧不寧不時啼叫口中

氣熱頻吐乳片肚脹腹熱大便酸臭也但臟腑嬌嫩不可過攻惟宜調和脾胃為上以消乳丸消導之 消乳丸 方見傷乳吐

食滯 小兒食滯任意餐頭溫腹熱便膿酸臭惡食煩作渴大安承氣密宣先 註 小兒恣意肥甘生冷不能運化則腸胃積

滯矣其證頭溫腹熱大便酸臭惡氣惡食煩不安眠口乾作渴滯輕者宜木香大安丸消導之滯重便秘者宜小承氣湯攻下

之

木香大安丸 木香 黃連 陳皮 白朮 炒 枳實 炒 山楂肉 各二錢 連翹 二錢 神麴 炒 麥芽 各三錢 砂仁 萊菔

子 各二錢 右為細末神麴糊為丸每服一錢陳倉米湯下 小承氣湯 方見食痛

癖疾門

癖疾總括 癖疾過食腸胃滿濁液外溢被寒凝潮熱冷飲肌削瘦腹滿硬塊面黃青 註 癖疾一證皆因飲食過節腸胃填滿

濁汁外溢復感寒氣凝結而成每生於左脇之下始如雞卵堅硬成塊漸如覆盆之形越臍則難治矣其候身體潮熱喜飲涼水肌膚削瘦面色青黃也治者宜詳察之

癰疾證治 癰疾潮熱渴飲冷肚大青筋兼硬痠內服消癰木香散外貼紅花膏最靈癰疾之始作也午前潮熱口渴飲冷肚大青筋漸至堅硬成塊不時作痛內以千金消癰丸治之外貼紅花膏內外兼治其癰自消若無熱渴者先以木香丸治之外亦以紅花膏貼之

千金消癰丸 蘆薈 阿魏糊為 青黛 木香 厚朴炒 檳榔 陳皮 甘草各一錢 史君子去殼 胡黃連 山查

肉 香附炒 三棱炒 莪朮各二錢 水紅花子 神麴炒 麥芽各四錢 人參 白朮土炒 茯苓各三錢 右為細末

將阿魏一錢白水和麴打糊為丸萊豆大米飲下量兒大小服之

木香丸 木香 蓬朮 縮砂仁 青皮 硃砂各二錢 右為細末和勻飛白麴糊和丸麻子大每服二三丸乳傷乳飲

下食傷以所傷物熬湯下

紅花膏 沒藥 五錢 血竭 麝香 阿魏各三錢 當歸 赤芍各一錢 水紅花料一捆煎汁去渣熬膏一碗 右為細末入膏內攪勻以

青布攤貼患處

汗證門

汗證總括 自汗屬陽有虛實或因胃熱或表虛睡中盜汗為陰弱心虛血熱隨證醫汗乃人之津液存於陽者為津存於

陰者為液發泄於外者為汗若汗無故而出者乃因陰陽偏勝也如小兒無因而汗自出者謂之自汗自汗屬陽有虛實之別

虛者汗出翕翕發熱惡寒乃表虛也汗出蒸蒸發熱不惡寒乃裡熱也表虛者法當固表裡實者法當攻熱又有睡則汗出覺

則汗止謂之盜汗盜汗者主陰虛然當分心虛不固心火傷陰也心虛當補心心熱當涼血治者當詳辨之庶無差謬

自汗 表虛自汗玉屏風甚者桂枝加附從裡實自汗用白虎便秘調胃承氣攻表虛瀼瀼自汗玉屏風散主之若惡寒冷

陽氣虛也桂枝湯加附子固之陽明裡實蒸蒸自汗用白虎湯清之便秘者以調胃承氣湯攻之

玉屏風散 黃耆蜜炙 防風 白朮土炒 水煎服 方表氣虛弱時自汗玉屏風治頗相宜黃耆防風炒白朮水煎溫服不拘

汗證門 失血門

時

桂枝加附子湯 白芍藥 桂枝 甘草炙 附子製 引用薑棗水煎服 方表氣虛弱甚桂枝湯最良芍藥桂枝草加附

病漸康 白虎湯方見裡熱 調胃承氣湯方見裡熱

盜汗 心虛盜汗睡多驚酸棗仁湯服即寧心火傷陰必煩熱當歸六黃湯奏功 註盜汗有二虛實兩分心虛者陰氣不斂也

睡則多驚以酸棗仁湯主之心熱者火傷於陰也身多煩熱以當歸六黃湯主之

酸棗仁湯 當歸 白芍炒 生地 茯苓 酸棗仁炒 知母炒 黃蘗炒 五味子 人參 黃耆炙 水煎服 方酸

棗仁湯治盜汗陽不能藏陰本虛歸芍生地茯苓棗仁五味共參者

當歸六黃湯 當歸 生地黃 熟地黃 黃芩 黃蘗 黃連 黃耆炙 引用浮麥水煎服 方當歸六黃治盜汗陽盛

傷陰液自流生熱二地芩連藥歸耆浮麥汗能收

失血門

失血總括 陰乘陽熱血妄行血犯氣分不歸經血病及腑滲濁道傷於藏者溢出清熱犯陽絡上吐衄熱侵陰絡下失紅又

有努勞成血病血止仍嗽勢多凶 註凡失血之證陽盛乘陰則血為熱迫不能安於脈中犯於氣分妄行不能歸入經脈也若

血分傷及於腑者則血滲入腸胃之濁道上行於咽出而為吐為衄下從二便而出為便為溺也若血病傷及於藏者則溢出

於胸中之清道上從咳出而兼咳嗽下從精竅而出為溺也夫血藏於臟內行於脈中流於軀殼之內不可得而見也非損傷

不能為病而損之之因有三一曰熱傷陽絡腑病也熱傷陰絡藏病也宜以清熱為主一曰勞傷宜以破逐為主一曰勞傷宜

以理損為主若日久血止而咳嗽不休者主必死之證故勢多凶也

衄血 衄血之候鼻乾燥身熱不渴苦頭疼失表分汗麻桂治內熱犀角瀉心清 註衄血者鼻中出血也其候鼻中乾燥身熱

不渴苦頭痛是熱傷陽絡也有因傷寒失汗衄血者乃熱鬱於榮其身無汗宜以麻黃汗之身有汗者宜以桂枝湯解之設無

表病因內熱而衄血者宜以犀角地黃湯清之熱盛者四物三黃瀉心湯瀉之外俱用髮灰散或黑梔子末吹鼻其衄自止

麻黃湯 麻黃 杏仁炒去 桂枝 甘草生 引用生薑水煎服 方傷寒失表榮鬱熱身體無汗血妄行須用麻黃湯調

治桂枝麻黃杏草同 桂枝湯方見自汗

犀角地黃湯 牡丹皮 白芍藥 犀角 生地黃 水煎服 便硬者加川大黃 方犀角地黃湯治衄效非常丹皮芍犀

地便祕加大黃

四物三黃瀉心湯 川芎 當歸酒洗 生地黃 赤芍藥 黃芩 黃連 川大黃酒洗 水煎服 方四物三黃瀉心湯熱盛

吐衄功最良芍歸生地赤芍藥黃芩黃連川大黃

髮灰散 取壯寔人頭髮陰陽五煨成灰放在地上去火性研細末吹入鼻中血衄自止

吐血 吐血下咳因熱逆若兼咳嗽勞傷內熱犀角地黃治勞傷承氣四物膏勞傷有熱雞蘇散無熱須用救肺良註小

兒吐血不咳嗽者多因內熱致血妄行上逆也宜以犀角地黃湯主之若因勞傷吐血者兼咳嗽先用桃仁承氣湯以破逐之

次用加味四物湯和之又有勞傷吐血者亦兼咳嗽痰中帶血有熱者雞蘇散主之無熱者救肺散主之 犀角地黃湯方見

本門衄血

桃仁承氣湯 桃仁去皮尖研 大黃 芒硝 甘草 桂枝 加當歸芍藥木紅花 水煎服 方勞傷吐血先破逐桃仁承氣

氣湯妙絕桃仁黃硝草桂枝加入歸芍蘇紅旋

加味四物湯 當歸 芍藥 川芎 生地黃 茅根 蒲黃 牡丹皮 梔子炒黑 甘草生 引用藕節酒水煎服 方

勞傷吐血須活血四物為主真妙訣再加茅根與蒲黃丹皮梔草引藕節

雞蘇散 雞蘇薄荷葉 川貝母法 麥門冬法 桔梗 阿膠蛤粉炒 生地黃 甘草生 黃耆炙 白茅根 蒲黃炒

水煎服 方勞傷有熱咳嗽痰血雞蘇貝母麥門冬桔梗阿膠生地草黃耆茅根蒲黃同

加味救肺散 麥冬法 人參 黃耆炙 鬱金 五味子 當歸酒洗 白芍藥 川貝母法 甘草炙 馬兜鈴 水

煎服 方勞傷無熱咳嗽痰血加味救肺麥門冬參耆鬱金五味子歸芍貝母草兜鈴

便血 熱傷陰絡病便血藏毒血熱腸風紅須辨腹痛肛腫痛熱甚濕甚要分明藏毒初起腫痛甚大黃皂刺莫消停熱甚俱

宜槐花散濕盛平胃地榆靈日久脈微氣血弱升陽和血其養榮 註大便下血皆因小兒恣食肥甘致生內熱傷陰絡也若血

色黯而濁肛門腫痛先血後糞此為近血名曰藏毒若血鮮而清腹中不痛先糞後血此為遠血名曰腸風藏毒肛門每多腫痛初起宜用皂刺大黃湯清之天下血後熱微感痛者以槐花散和之濕盛不痛者以平胃地榆湯和之腸風亦宜以槐花散主之使血日久脈微氣血弱者升陽和血湯和之繼以人參養榮湯補之

皂刺大黃湯 皂刺 生川大黃 各等 量小兒年歲大小虛實酌其多少水酒煎服

槐花散 槐花炒 側柏葉 枳殼 麩炒 川黃連 荊芥 穗炒 水煎服 臟毒加蒼朮苦楝 腸風加秦艽防風 方臘

毒腸風槐花散黃連枳殼槐柏荆臘毒蒼朮苦楝入腸風須加羌防風

平胃地榆湯 蒼朮炒 陳皮 厚朴 薑炒 甘草 地榆 引用生薑水煎服 方便血濕感腹不痛須用平胃地榆湯

求陳皮厚朴草地榆同煎引生薑

升陽和血湯 黃耆 炙 當歸 洗 白芍 炒 牡丹皮 陳皮 肉桂 秦艽 生地黃 熟地黃 生甘草 炙甘草 蒼

朮 炒 升麻 水煎服 方下血日久腹中痛治宜升陽和血湯二地二草者歸芍陳丹秦艽升桂蒼

人參養榮湯 人參 黃耆 炙 白朮 炒 白茯苓 白芍 藥炒 肉桂 熟地黃 當歸 洗 甘草 炙 陳皮 引用薑棗

水煎服 方失血日久氣血虛人參養榮湯頗宜參耆朮苓白芍桂地黃當歸草陳皮

弱血 弱血多緣精竅病尿血分出莖或疼牛漆四物湯調治急宜煎服效從容益弱血為精竅之病乃尿與血先後分出者

也宜用牛漆四物湯治之其證自愈

牛漆四物湯 牛漆 木通 鬱金 甘草梢 瞿麥 當歸 川芎 生地 赤芍 藥炒 水煎服 方小兒弱血精竅病

宜用牛漆四物湯牛膝鬱金通瞿麥歸芎赤芍生地黃

雜證門

二便秘結 小兒熱結二便秘口渴舌乾唇面紅八正尿秘少腹滿神苦便秘腹脹疼 注此證多因乳食停滯生熱結於腸胃

以致二便秘結其候舌乾口渴面唇焦也熱結則小便秘澀少腹滿急宜八正散主之若食積大便秘腹脹痛者宜神芎丸

主之 八正散 方見不小便

神芎丸 大黃 滑石各一兩 薄荷 川芎各四錢 黃芩 黃連各五錢 牽牛 四錢 共為細末滴水為丸每服五丸蜜湯送下

氣虛脫肛 瀉利日久中氣陷肛鬆腸薄滑而脫面色青黃指稍冷脈來沉細唇淡白補中益氣湯并舉真人養藏固滑脫外

用潤腸散調敷氣升肛潤腸自合註脫肛一證因瀉痢日久中氣下陷腸胃薄遂令肛門滑脫不收現證當用青黃指稍冷

脈沉細唇色淡白宜溫補為主先以補中益氣湯并提其氣再以真人養藏湯溫補固滑外以溫腸散按之則氣升肛潤而腸

自收矣 補中益氣湯方見發瀉 真人養藏湯方見寒痢 腸散 訶子 赤石脂 龍骨各等分 右為細末用臘

茶調敷和藥按頭上綿帛揉入

肛腫翻肛 積熱肛腫大便難努力肛出翻不還外用蟠龍散消腫內宜皂刺大黃煎註小兒積熱太甚以致肛門作腫大便

艱難努力翻出肛脫不還外用蟠龍散消其腫內服皂刺大黃湯其腫一消肛自收矣

皂刺大黃湯方見便血

曾氏蟠龍散 乾地盤龍一兩 風化朴硝 二錢 右剉研為細末仍和勻朴硝每以二錢至三錢肛門濕潤者乾塗乾燥

者用清油調塗先用荆芥生葱煎水候溫洗浴輕與拭乾然後敷藥

通胸 肺積痰熱病通胸胸骨高聳若通形氣急喘咳嗽體瘦寬氣百令酌量行註通胸一證多因小兒飲食不節痰熱熾盛

復為風邪所傷風熱相搏以致肺經脹滿攻於胸膈高如覆杯現證咳嗽喘急身體羸瘦治宜清肺化痰為主先以寬氣飲開

其氣道再以百合丹除其壅滯肺熱清而脹滿自除矣

寬氣飲 杏仁去皮 桑白皮炒 橘紅 蘇子炒 枳殼麩炒 枇杷葉蜜炙 麥門冬法 生甘草 苦葶藶 水煎服

方寬氣飲治兜通胸杏仁桑皮合橘紅蘇子枳殼枇杷葉甘草葶藶麥門冬

百合丹 百合 天門冬 杏仁炒去 木通 桑白皮炒 甜葶藶 石膏各五錢 大黃三錢 共為細末煉蜜丸如菜豆大

量兒大小服之臨臥滾白水送下

龜背 龜背坐早被風吹偃偻背高狀如龜內服松蘿丹緩治外用灸法點龜尿註龜背者因嬰兒坐早被客風吹入脊脊遂

致偃偻曲折背高如龜往往為終身痼疾內以松蘿丹調治之外用點龜尿六法灸肺俞心俞膈俞三六三五壯或以龜尿點

致偃偻曲折背高如龜往往為終身痼疾內以松蘿丹調治之外用點龜尿六法灸肺俞心俞膈俞三六三五壯或以龜尿點

骨節上亦可得效

松莖丹 松花 枳殼 麩炒

防風 獨活 略一

麻黃 前胡

川大黃 生

桂心 各五錢

右為細末煉蜜為丸如黍米大

每服十九粥飲送下

五軟 五軟稟賦不足證頭項手足口肉肌地黃丸與扶元散全在後天調養宜註五軟者謂頭項軟手軟足軟口軟肌肉軟

是也頭軟者項軟無力也手足軟者四肢無力也肉軟者皮寬不長肌肉也口軟者唇薄無力也此五者皆因稟受不足氣血

不充故骨脈不強筋肉痿弱治宜補氣為主先以補腎地黃丸補其先天精氣再以扶元散補其後天麋粥漸次調理而五軟自痊矣

補腎地黃丸

熟地黃 一兩 五錢

山萸肉 一兩

懷山藥 炒

茯苓 各八錢

牡丹皮

澤瀉 各五錢

牛膝 錢八

鹿茸 五錢 酥炙

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二錢用鹽湯下

扶元散

人參 白朮 土炒

茯苓 熟地黃

茯神 黃耆 蜜炙

山藥 炒

炙甘草

當歸

白芍藥

川芎

石菖蒲

引用薑棗水煎服

五鞭 陽氣不榮成五鞭仰頭取氣難搖動手足強直冷如冰氣壅胸膈牽連痛小續命湯最為良烏藥順氣散極應若遇肝

木乘脾經加味六君妙無竟註五鞭者仰頭取氣難以動搖氣壅疼痛連胸膈間手足心冰涼而鞭皆由陽氣不榮於四末

最為難治重者以小續命湯疎其風輕者以烏藥順氣散調其氣若肝木乘脾食少氣弱者加味六君子湯治之內外交治而

證自日瘥矣

小續命湯

人參 麻黃 川芎 黃芩 芍藥 甘草 炙

防風 官桂 去皮

附子 炮去

杏仁 炒去

漢防己 引用

薑棗水煎服

烏藥順氣散 麻黃 白芷 川芎 桔梗 枳殼 炒 殭蠶 炒 烏藥 炮薑 甘草 生 橘紅 引用葱白水煎服

加味六君子湯 人參 白朮 炮薑 陳皮 半夏 製 茯苓 炙甘草 升麻 炙 柴胡 炒 肉桂 水煎服

加味六君虛五鞭人參白朮共炮薑陳半夏苓炙甘草升麻柴胡肉桂良

證自日瘥矣

小續命湯

人參 麻黃 川芎 黃芩 芍藥 甘草 炙

防風 官桂 去皮

附子 炮去

杏仁 炒去

漢防己 引用

薑棗水煎服

烏藥順氣散

麻黃 白芷 川芎 桔梗 枳殼 炒

殭蠶 炒 烏藥 炮薑 甘草 生

橘紅 引用葱白水煎服

加味六君子湯

人參 白朮 炮薑 陳皮 半夏 製 茯苓 炙甘草 升麻 炙 柴胡 炒 肉桂 水煎服

加味六君虛五鞭人參白朮共炮薑陳半夏苓炙甘草升麻柴胡肉桂良

證自日瘥矣

小續命湯

人參 麻黃 川芎 黃芩 芍藥 甘草 炙

防風 官桂 去皮

附子 炮去

杏仁 炒去

漢防己 引用

薑棗水煎服

烏藥順氣散

加味六君子湯

人參 白朮 炮薑 陳皮 半夏 製 茯苓 炙甘草 升麻 炙 柴胡 炒 肉桂 水煎服

加味六君虛五鞭人參白朮共炮薑陳半夏苓炙甘草升麻柴胡肉桂良

證自日瘥矣

小續命湯

人參 麻黃 川芎 黃芩 芍藥 甘草 炙

防風 官桂 去皮

附子 炮去

杏仁 炒去

漢防己 引用

薑棗水煎服

烏藥順氣散

加味六君子湯

人參 白朮 炮薑 陳皮 半夏 製 茯苓 炙甘草 升麻 炙 柴胡 炒 肉桂 水煎服

加味六君虛五鞭人參白朮共炮薑陳半夏苓炙甘草升麻柴胡肉桂良

證自日瘥矣

小續命湯

人參 麻黃 川芎 黃芩 芍藥 甘草 炙

防風 官桂 去皮

附子 炮去

杏仁 炒去

漢防己 引用

薑棗水煎服

烏藥順氣散

加味六君子湯

人參 白朮 炮薑 陳皮 半夏 製 茯苓 炙甘草 升麻 炙 柴胡 炒 肉桂 水煎服

加味六君虛五鞭人參白朮共炮薑陳半夏苓炙甘草升麻柴胡肉桂良

證自日瘥矣

小續命湯

人參 麻黃 川芎 黃芩 芍藥 甘草 炙

防風 官桂 去皮

附子 炮去

杏仁 炒去

漢防己 引用

薑棗水煎服

烏藥順氣散

五遲 小兒稟氣血虛筋骨軟弱步難移牙齒不生髮疎薄身坐不穩語言遲加味地黃為主治補中益氣繼相醫邪來心

氣葛蒲好血虛髮遲皆勝宜註小兒五遲之證多因父母氣血虛弱先天有虧致兒生下筋骨軟弱行步艱難齒不速長坐不

能穩要皆腎氣不足之故先用加味地黃丸滋養其血再以補中益氣湯調養其氣又足少陰為腎之經其華在髮若少陰之

血氣不足即不能上榮於髮皆勝丹主之又有驚邪乘入心氣至四五歲尚不能言者葛蒲丸主之

加味六味地黃丸 熟地黃一兩 山茱肉一兩 懷山藥炒 茯苓錢八 澤瀉 牡丹皮錢五 鹿茸三錢 五加皮五

錢 麝香五分 共為細末煉蜜為丸如桐子大大兒每服二錢小兒一錢五分鹽湯送下 補中益氣湯方見癆瘵

皆勝丹 當歸洗焙 生地黃 白芍藥炒各一兩 荳勝子二兩 胡粉三錢 右同研勻煉蜜為丸如黍米大每服十粒煎

黑豆湯送下

葛蒲丸 人參 石葛蒲 麥門冬去心 遠志去心 川芎 當歸酒洗 乳香 硃砂各一錢 右為細末煉白蜜為丸

如黍米大食遠用米湯送下

鶴膝風 小兒稟賦不充盈肌肉削瘦少崢嶸膝骨外露如鶴膝多緣腎弱髓難生血脈不榮筋攣縮膝貶風涎時作疼大防

風湯是服地黃繼進莫從容註小兒鶴膝風多因稟賦不足血氣不榮肌肉削瘦遂至骨節外露筋脈攣縮股漸細小而膝益

愈大要皆腎虛不能生精髓之故也須先服大防風湯繼以補腎地黃丸治之庶氣血充而證自愈矣

大防風湯 人參 白朮土炒 茯苓 甘草炙 熟地黃 當歸身 白芍藥炒 川芎 黃耆蜜炙 羌活 防風附

子製 杜仲 牛漆 引用薑棗水煎服 方大防風湯八珍耆羌防附子杜仲移藥筋更有川牛膝虛風鶴膝最相宜

補腎地黃丸 方見五載

解頤 小兒解頤最堪憐先天有損腦髓乾面色皎白形瘦弱二目多白若愁煩補腎地黃丸堪服補陽扶元散為先更有封

頤散極效臨時攤貼保安然註解頤者乃頤大骨縫不合也蓋腎生髓腦為髓海腎氣有虧腦髓不足亦如花木無根現證面

色皎白形體瘦弱目多白睛悲愁少笑治宜補腎養氣為主先以補腎地黃丸滋補其陰再以扶元散補養其氣外用封頤散

攤貼之則精血稍充或可轉危為安也 補腎地黃丸 扶元散 俱見五載

封顛散 柏子仁 防風 天南星各四 右為細末每用一錢以猪膽汁調勻攤在緋絹帛上看顛大小剪貼一日一換不

得令乾時時以湯潤動

顛陷 小兒緣何顛下陷瀉久脾虧虛弱見面目青黃四肢涼六脈沉緩神慘淡補中益氣湯最宜固真湯進有奇驗外用烏

附膏攤貼溫中理脾功無限註小兒藏府有熱渴飲水漿致成瀉痢久則脾氣虛寒不能上充腦髓故顛陷成坑名曰顛陷現

證面目青黃四肢逆冷六脈沉緩神氣慘淡先以補中益氣湯升提其氣再以固真湯溫補其脾外用烏附膏攤貼於陷處極

效 補中益氣湯方見瘡瘍 固真湯方見慢脾風

烏附膏 雄黃二錢 川烏 附子各五錢 右為細末用生葱和根葉細切杵爛入前藥末同煎作成膏每早空心貼陷處

顛填 顛門腫起氣上衝其間虛實要分明毛髮憔悴頻頻汗胸高氣促口唇紅肝盛瀉青丸最效裡熱連翹飲堪行因表防

風升麻剉鞭冷屬陰用理中註顛填者謂顛門腫起也蓋因乳哺無度或寒或熱乘於脾經致使藏府不調其氣上衝為之填

脹腫突現證毛髮憔悴頻頻出汗肝高氣促口唇色紅須分虛實治之肝氣盛者瀉青丸主之裡熱盛者大連翹飲主之因表

者防風升麻湯主之堅鞭不熱者屬陰理中湯主之 瀉青丸方見急驚風

大連翹飲 柴胡 荊芥 連翹去心 木通 滑石水飛 梔子 蟬退去翅足 瞿麥 當歸酒洗 赤芍藥 黃芩 甘

草生 防風 水煎服 防連翹飲治熱上衝柴胡荊芥翹木通滑石梔子蟬退麥歸芍黃芩草防風

防風生麻湯 麥冬去心 木通 甘草節 山梔 升麻 防風 引用淡竹葉水煎服 防防風升麻湯顛填效非常麥

冬木通草山梔升麻防風理中湯方見不乳

中惡 小兒神氣未充寔觸惡何能自主持目閉面青驚悶亂蘇合皂角功効奇註小兒神氣未充一為邪惡所觸何能主持

自然神魂離舍目悶面青悶亂不省人事內以蘇合香丸降其邪外以皂角末開通其閉嚏出則氣通而甦矣 蘇合香丸方

見疳門內合

卷五十六

編輯痘疹心法要訣

痘原 上古無痘性溫樸中古有痘情欲恣痘稟胎元出不再毒之深淺重輕識天瘡之名因天稟瘡形如痘且名居塞北不出寒勝熱毒發必自待天時註上古之人無出痘者天性溫樸也中古之人有出痘者情欲漸熾也古人謂痘稟胎毒此定論也惟稟於胎元故一出不再出也毒有淺深故出有輕重也名為天瘡者因毒稟於先天也名為痘瘡者因瘡形如痘也其毒伏於形中而塞北不出者以其氣多寒涼鮮邪陽火旺之氣以觸發其毒故伏藏於內而不出也中土之人必出者以其氣多溫熱一觸邪陽火旺之氣毒隨內發而即出此皆醫所能當識者也

出痘形證 欲識小兒出痘形類是傷寒發熱驚氣粗粗眼眼中指冷耳尻不熱耳筋紅註痘證初起見證大抵與傷寒相似其候身體發熱不時驚悸口鼻氣粗兩眼發眵惟中指獨冷耳尻不熱耳後有紅筋皆為出痘之形證也

痘出五藏形證 痘出五藏主證形呵欠煩悶是肝經肺證欬嗽痰喘涕心證驚煩面赤紅脾證喜睡肢熱利耳尻俱涼是腎徵肝泡肺膿心赤小脾大黃淺腎黑形註痘瘡之毒伏於五藏故內出何藏外即應之如呵欠煩悶此痘出肝經證也欬嗽有痰噴嚏泣涕此痘出肺經證也驚悸煩躁面色紅赤此痘出心經證也喜睡自利四肢發熱此痘出脾經證也惟腎經但見耳尻發涼者是火不能勝水也肝痘之形為水泡其色青而小脾痘之形為膿泡其色白而大心痘之形其色赤而小脾痘之形其色黃淺而大至於腎經不宜有證若水不勝火痘色黑者非吉兆也

痘主部位 額心額腎鼻脾部左頰肝位右肺方周身分主面屬胃頭背膀胱腰腎心肺胸膈肝膽腸腹肢屬脾大小腸包絡之絡聯藏府三焦之氣應無方註小兒出痘自頭面以及周身各有藏府所屬部位治者須詳察部位以定吉凶如額先見點者是毒發於心也額先見點者是毒發於腎也左頰先見點者是毒發於肝也右頰先見點者是毒發於肺也鼻先見點者是毒發於脾也面屬腎經部位也頭背屬膀胱經部位也腰屬腎經部位也胸膈屬心肺二經部位也脇膀屬肝膽二經部位也肚腹四肢屬脾大小腸三經部位也至於包絡乃周身脂膜之絡聯屬百骸藏府者也三焦為周身水精之氣充滿軀殼藏府者也凡周身發痘俱從此出故無一定部位也

痘形順逆 痘形見點喜失圓惡隱蚊迹瘡毒蠶起脹漸綻充肥順頂平不突板是難生漿斂束形完固軟嫩皮薄瘡塌纏結痂如螺先後落最忌凝滯潰爛粘註痘形氣為之也氣勝毒則毒為氣馭其毒解矣故順也毒勝氣則氣為毒蝕其氣竭矣故

逆也氣毒相平則勢界於險惟在醫者調治得宜使險變順也如始出之形頂尖而根圓此氣勝毒為順也若隱如蚊咬或如
熱癰寒凍驚種此毒勝氣為逆也起脹之形漸綻充肥此氣勝毒為順也若項平不突板是逆此毒勝氣為逆也成漿之形
根紅飲末痘殼完固此氣勝毒為順也若殼軟皮薄則必瘡塌此毒勝氣為逆也結痂之形如螺殼先結先落後結後落此
氣勝毒為順也若加薄如髮潰爛粘聚此毒勝氣為逆也此痘形順逆之大畧也

痘色順逆 痘色桃花漸漸紅淡白枯紫晦多山起脹頂白根紅潤頂灰根散或深紅生漿由白而黃厚最忌反乾與薄清屬
喜瘡惡癰白疳喜紅滿惡白平 註 痘色血為之也血勝毒則毒為血載其毒化矣故順也毒勝血則血為毒滯其血涸矣故
逆也血毒相平則勢界於險亦在醫者之調治得宜也始出之色如桃花而漸加滋潤此血勝毒為順也若初出即淡白乾紫
晦而不亮此毒勝血為逆也起脹之色頂漸放白根紅光潤此血勝毒為順也若頂色灰滯根血散漫或地腳深紅此毒勝血
為逆也生漿之色白而漸黃蒼而濃厚此血勝毒為順也若灰色不潤或漿薄清稀此毒勝血為逆也結痂之色蒼如栗殼此
血勝毒為順也若茄色髮白此毒勝血為逆也疳痕之色紅潤凸起為順若淡白黑紫平凹無突起之狀皆為不順之色醫者
詳之

痘證老嫩 蒼濁嬌艷老嫩色厚實浮虛老嫩形濃濁稀清漿老嫩厚薄痂之者嫩明 註 痘之一證自始至終喜老惡嫩如蒼
濁嬌艷此色之老嫩也肥實浮虛此形之老嫩也肥濁稀清此漿之老嫩也薄軟厚堅此痂之老嫩也總之老者多順易於成
功嫩者多險逆難於施治也

痘證疏密 頭項胸背痘疎者手足雖密不為凶疎兼陽熱須防變密者磊落不必驚 註 頭面清陽元首頭項管輪咽喉胸膜
乃藏府所附惟稀疎則吉也至於手足無甚關係雖多不為凶也疎固是順若見陽證謬妄大渴大熱唇舌燥裂煩躁不寧大
小便秘等證此毒壅遏不出雖疎未為吉也密固是逆若鋪排磊落大小勻淨精神寢食二便如常雖密亦不須驚也

辨形神聲氣飲食之虛實 軀之肥瘦形衰盛聲之粗細氣虛實目睛不瞭神強弱胃氣虛實食不食 註 欲治痘者先看兒體
之肥瘦體肥者形盛可知也體瘦者形衰可知也次聽聲氣之粗細聲粗者聲實雄粗此氣實也聲細者聲微細此氣虛也
再觀其目中之神瞭瞭精彩者此神強也目不瞭不精彩者此神弱也更問其飲食能否飲食如常者胃氣實也

胃氣虛也此辨形神聲氣飲食之虛寔也

辨氣血虛寔證 氣虛頂陷多軟薄氣過成泡少漿膿血虛淡紅摸轉白血過發斑紫黑凝註痘之形色乃氣血外現也如頂凹陷手摸之多軟薄者此氣虛也氣過者氣過盛也泡者發水泡也少漿膿者不能生漿也謂氣若過盛則發水泡而漿不能生也如痘色淡紅以手摸過隨即轉白者此血虛也血過者血過盛也痘者地界有斑暈也紫黑凝者謂毒盛則色黑紫凝滯也此就痘斑形色以辨氣血之虛寔也

辨表證虛寔 發熱惡寒身痛表有汗為虛無汗寔寔隱稠密灰紅帶血平塌爛水浸濕註痘出有發熱惡寒身體疼痛者屬表證也若有汗則為表虛無汗則為表寔表寔悶塞痘毒隱伏難出也稠密者痘出稠密也灰者痘色灰白也紅者痘色紅赤也滯者謂痘稠密不論灰紅若帶滯暗者皆表毒盛也若表虛之證則痘平不起塌瘡無漿也爛者痘潰爛也水浸濕者痘膿水浸漬濕而不乾也此辨表證之虛寔也

辨裏證虛寔 發熱惡熱鞭痛裏便秘為寔下利虛寔則板寔根緊鞭虛則倒陷壓收遲註痘出發熱惡寒者表證也不惡寒惡熱者裏證也鞭者不大便而鞭也痛者肚腹作痛也此皆屬裏熱之證若便秘則為裏寔下利則為裏虛板寔者痘裏板寔不活動也根緊鞭者根腳緊束堅鞭不鬆皆裏寔證也倒陷者痘已出復陷入於內也倒壓者痘正灌漿即收靨也收遲者痘已灌漿日久不靨皆裏虛證也此辨裡之虛寔也

辨陽熱證 陽熱壯熱面唇赤舌乾飲冷爪尿紅煩燥昏狂譫失血紫黑焦枯不潤通註凡痘屬陽熱者身必壯熱面唇皆赤舌上乾燥好飲冷水爪甲尿溺皆現紅色煩燥不寧神氣昏憤發狂譫語失血者吐血衄血也紫黑焦枯者痘色紫黑焦枯也不潤通者九竅不潤通也此皆屬陽熱之證也

辨陰寒證 陰寒無熱口鼻冷面唇爪色白青厥冷難回利不臭水泡灰白無暈紅註凡痘屬陰寒者身肢不熱口鼻皆冷面唇尿溺爪甲色現青白也厥冷難回者謂四肢厥冷不能即溫也利不臭者謂下利無臭穢也水泡濕盛也灰白無暈者謂痘色灰白根腳無紅暈也此皆屬陰寒之證也

辨虛寔寒熱誤治 溫補過則痘潰爛毒攻咽喉目腫癰清瀉過則痘白陷嘔吐不竭厥利清註痘有虛寔治有補瀉要在審

當而施也如虛者當補亦須酌量施治若溫補過甚則反助毒熱而症潰爛也以致毒熱上攻或咽喉腫痛或牙齦發疳或眼目赤腫生翳甚而攻於榮衛發為癰疽也如熱者當瀉亦須中病即止若清瀉過甚則損傷正氣而痘白陷或嘔吐不渴或厥逆下利此皆發明溫補清瀉之過當也

稟賦順逆險 毒微氣血寔則順毒甚而虛逆自明毒微者虛恐化險毒甚達熱變險能註痘由稟賦毒氣輕者固順然必兒之氣血不虛則始為順也重者固逆亦必兒之氣血虛則始為逆也毒微者順也若兒之氣血虛弱雖順恐化險也毒甚者逆也若兒之氣血不虛雖逆能變順也此以兒之胎毒重輕氣血虛寔是定痘之順逆險也

天時順逆險 毒微天時和者吉毒甚天時不和毒微不和順中險毒甚時和逆或更註毒微吉矣然必逢天時之和始為順而吉也毒甚凶矣然必遇天時不和則始為逆而凶也毒微者順也若值天時不和恐順中化險也毒甚者逆也若值天時之和或逆中轉險也此以胎毒之輕重天時之和和不和定痘之順逆險也

人事順逆險 險逆時和無病吉不和有病定然凶由此故識痘痘善人事能回天命幸註凡痘險逆之證固不和矣若逢天時之和兒又無病險者可以變順逆者可以變險故曰吉也若逆天時不和兒又有病則險者變逆逆者更逆故曰凶也由此觀之可識痘痘之善以得其天時之和兒素無病其中即有毒之重者而人事克盡亦能挽回天命而致亨也

發熱順證 發熱和緩微汗飲食如常二便調睡臥安然神氣爽此為順證不須療註發熱和緩身不其熱毒輕也微微汗身微微有汗表也和也飲食二便如常裡也和也神氣清爽睡臥安然精神氣血大和故為順證不須治療也

發熱險證 發熱三日熱不退煩渴咬牙面赤紅驚喘戰慄乳食少夜不安眼險證明註發熱三日見點者常候也若見點熱不退者毒盛也更兼煩躁口渴頻頻咬牙面色紅赤驚悸多啼身體戰慄乳食甚少不能安眠等證此是毒盛伏鬱難出其為險證明矣急宜隨證施治庶或從險化順也

發熱逆證 發熱神昏悶亂成妄言喘滿腹腰痠不食不眠搐不止乾嘔失血證逆凶註發熱神昏悶亂成妄言毒伏於心也喘

滿喘急毒伏於肺也腹痠毒服於脾也腰痠毒伏於腎也不食不眠毒伏於胃也驚搐不止毒伏於肝也不時乾嘔失血吐血尿血是毒攻氣血內亂也此皆為不治之逆證勢多凶也

發熱證治

痘出發熱固自內必因其誘使之然時氣風寒驚食熱表裡虛實隨證參表熱惡寒而無汗裡熱有汗漫便難氣

弱熱微不足治形是熱感有餘看註痘出發熱者謂痘本火毒故未出先發熱也自內謂其熱自內達外也必因其誘使之然

者謂必因其四時不正風寒邪氣使之發熱也驚謂外觸異物跌撲驚嚇使之發熱也食謂內傷食滯使之發熱也熱謂內熱

積久因而熱發於外也內外既有所因之邪又當以表裡虛實隨證參詳施治也表熱者謂發熱在表則惡寒而無汗也裡熱

者謂發熱在裡則有汗小便短澀大便燥難也氣弱熱微者謂形氣不足發熱微輕也形是熱感者謂形氣有餘發熱太甚也

醫者果能臨時詳察因證施治則汗下清補之法自得其宜矣

升麻葛根湯

發熱升麻葛根湯表邪痘疹兩得方升麻葛根赤芍草隨證宜加法最良無汗表寔加麻薄便秘腹痛裡大黃

形怯氣弱參者入熱感犀連荊防尿澀通滑車前子驚搐荊防鈎連羊煩渴石膏麥冬粉欬嗽前桔杏蘇柔傷食腹熱查芽

枳下利荅連嘔半薑咽痛勞梗身羌獨頭痛荊穗芫芷羌註痘出發熱當以升麻葛根湯為主以其能發表邪透痘疹兩得之

良方也然必隨證加佐使之品斯為盡善如身熱無汗者此表寔也本方中加麻黃薄荷如大小便秘腹作痛者此裡寔也本

方中大黃如形氣怯弱者稟賦不足也本方中加人參黃耆熱感者內熱熾盛也本方中加犀角黃連荊芥牛蒡子防風如

小便短澀者熱結膀胱也本方中加木通滑石車前子如發驚搐者肝心有熱也本方中加荊芥防風鈎藤鉤川黃連羚羊角如

煩渴者內熱盛也本方中加石膏麥冬花粉如欬嗽喘急者肺熱風邪也本方中加前胡桔梗杏仁蘇葉桑皮如傷食腹皮熱

者胃中停滯也本方中加山查麥芽枳殼如下利者腸胃熱滯也本方中加黃連黃芩如作嘔者如膈有痰飲也本方中加半

夏生薑如咽痛者火在上焦也本方中加牛蒡子苦桔梗如遍身痠疼者外染風寒也本方中加羌活獨活如頭疼者加冒風

寒也本方中加荊芥穗川芎白芷羌活此治發熱之大畧又貴臨時詳察融會貫通也

升麻葛根湯

升麻

葛根

赤芍藥

生甘草

引加羌萎水煎服

歸宗湯

形寔無表毒火感所以歸宗主大黃地芍查青通荊芫荇熱爪紫肢厥涼惡熱頭汗蒸蒸汗便秘謔語煩躁狂大渴

唇焦舌生刺失血腰痛不循常

註

發熱之初形寔者形氣壯寔也無表者無風寒表邪也若證見毒火太盛法當攻之所以用

歸宗湯者因其以大黃為主也而佐使生地赤芍山查青皮木通荊芥穗牛蒡子也痘未見點時如壯熱不已毒火熾盛也爪

甲色紫血熱凝滯也四肢厥冷同陽證見者熱深厥深也惡熱內熱盛也頭汗出胃熱上蒸也通身蒸蒸汗出毒火內迫津液也大小便秘腸胃熱結也譫語胃熱也煩躁狂亂毒火擾心神也大渴引飲毒火灼津液也唇口焦裂舌生芒刺毒火胃熱並盛也失血者口中失血小便尿血也皆緣火毒迫血妄行也其腰痛不尋常者毒攻腎位也以上諸證非險則逆若見之急用此方峻攻火毒庶可挽回少有逡巡瞻顧則無及矣

歸宗湯

大黃

生地黃

赤芍藥

山查

青皮

木通

荊芥穗

牛蒡子

引如燈心水煎服

清解散

痘驚清解升葛旁荊芥甘草桔連芩蟬翹芩前查通紫表羌蘇正弱耆參註痘欲出而發驚搐者皆由其毒不得快

然宣發而鬱於經也其現證則面赤心煩口渴手足抽搦俱以清解散主之或因風寒束於表者其現證則無汗頭疼身體痠痛欬嗽噴涕本方中加羌活蘇葉白芷以表發之若兼形氣虛弱者其現證則面色淺淡身體微熱四肢微溫倦怠嗜卧本方中加人參黃耆以託之

清解散

防風

荊芥

牛蒡子

生甘草

升麻

葛根

桔梗

黃連

黃芩

蟬蛻

紫草茸

川芎

查木通

連翹

去心

引如生薑燈心水煎服

寬中透毒飲

傷食寬中透毒飲葛桔前青樸枳查麥蟬翹芩連荊草便秘大黃木通加註症欲出發熱有現證嘔吐煩渴大便酸臭此兼傷食也以寬中透毒飲主之若更大便秘小便赤澀腹熱悶痛者此兼滯熱也本方中加大黃木通通利之

寬中透毒飲

葛根

桔梗

前胡

青皮

厚朴

薑炒

枳殼

薑炒

南山查

麥芽

蟬蛻

連翹

黃連

荊芥穗

甘草

生

引如生薑燈心水煎服

見點順證

發熱三朝始見點熱減身和不渴煩顆粒稀疏漸次出色潤紅活頂尖圓註發熱三朝之後始見點者此痘如期而出也熱減身和者毒已先發透徹也不渴不煩者無裡熱壅滯也顆粒稀疏者不稠密連絡也漸次出者先自頭面漸至周身而出也色潤紅者痘色紅活滋潤也頂尖圓者痘形頂尖而體圓也此皆見點順證

見點險證

痘已見形身仍熱稠密連絡不潤紅稀疏淡影精神少痘順兼雜病險名註痘已見形身仍發熱者此毒氣未盡透也稠密者痘出稠密不少也連絡者顆粒粘連不分也不潤紅者痘色雖紅而黯滯也稀疏淡隱者痘雖稀而色淺淡隱於