

湖南省药学会编
湖南省医药科技开发咨询服务有限公司

新药手册

第四辑



- 重组干扰素 $\alpha 1b$ 滴眼液(一滴灵)
国内独家生产,湖南省公费医疗产品
- 注射用重组干扰素 α_{2a} (福康泰)
国家批准的第一个基因工程药品
- 注射用重组人白介素-2(安特鲁克)
“863”计划重点项目,国家级抗癌新药

公司总部销售电话:0431-5188598

长春市前进大街1号长生大厦 邮编:130012

e-mail: csgp @ public.cc.jl.cn

http://www.csgp.cbh.com.cn

长春长生基因药业股份有限公司

新 药 手 册

(第四辑)

江苏工业学院图书馆
藏书章

湖南省医药科技咨询服务公司编

1999 年 5 月

前 言

我公司于九七、九八年曾编辑了新药手册“第一辑”、“第二辑”、“第三辑”，受到医疗单位的欢迎。为继续做好传递新药信息的工作，今年我们又编辑了“第四辑”。

本书共收集新药 103 种。按药理作用排列，每个药品收录项目有：

药名：中文、外文名，以商品名为主，辅以通用名。

制剂：主要是指剂型、规格。

【作·】包括作用机理、作用特点、药动学数据、适应症。

【用·】包括用法、用量、疗程及两个疗程之间隔时间。

【副·】指不良反应，毒副作用。

【注·】指注意事项。

【相·】指药物相互作用。

表明生产厂家及经销公司的目的是便于有关医院购买。由于价格经常变动，因此所标价格，仅供参考。

本书在编写过程中，得到了多家厂家和公司的支持，在此深表感谢。

由于编者水平有限，错误之处，望不吝指正。

编者

1999 年 5 月于长沙

入册单位和品种

长春长生基因药业股份有限公司	安特鲁克(123) 福康泰(122) 一滴灵(129)
华卫药品有限公司	福宁糖浆(106) 麦咪诺(16)
广东丹丽医药集团有限公司	补血康(120)
西安力邦医药有限公司	哌欣冲剂(66) 适泰宁(86)
浙江亚东制药有限公司	回音必虎梅含片(69) 回音必断血流(91)
香港荣伟贸易公司	消得良片(76)
北京协和医药集团	巴斯特关节止痛膏(138)
辉瑞制药有限公司	赛特赞(104) 培洛克(15)
山东齐鲁制药厂	络活喜(45) 舒普深(7) 先锋必(5) 盐酸特比萘芬(22) 艾司洛尔(48)
珠海市华一生物技术有限公司	贝复济(134)
江苏华阴集团溧阳市制药厂	柳胺苄心定(43) 8-甲氧补 骨脂素(132) 希尔生(133) 复方阿米洛利(46)
浙江海力生制药公司	贝特令(108) 肯特令(75)
北京诺华制药有限公司	凯扶兰(32) 兰他隆(99)
岳阳制药三厂	欧必亭(74) 泮托拉唑钠肠溶胶囊(71)

北京泰德制药有限公司	前列腺素 E ₁ 注射液(54)
山东新华制药股份有限公司	安卡片(100)
丽珠集团广州分公司	丽珠风(19) 丽珠威(17)
英国捷利康制药有限公司	佐米格(26)
杭州胡庆余堂制药厂	胃复春(80)
湖南银海药业有限公司	前列安栓(62) 莎普爱思(130)
杭州天诚药业有限公司	妇宁颗粒(89)
西安杨森制药有限公司	妥泰(35)
怀化正好制药有限公司	果宇强肝糖浆(79)
浙南药业有限公司	薄芝注射液(94)
中瑞康芝制药有限公司	止咳橘红冲剂(67)
广东天普生物化学制药有限公司	注射用乌司他丁(125)
沈阳双鼎制药厂	GPS 素注射液(93) 云芝菌 胶囊(96) 双鼎抑眩宁胶囊 (36) 立复欣(9)
天津市联想药业有限公司	卡瑞林(84) 美天福(109)
扬州第三制药厂	恬倩混悬液(30)
武汉汉康药业有限责任公司	沃丽汀片(142)
苏州立达制药有限公司	特治星(2) 倍美安和倍美盈 (88)
成都永康制药有限公司	小金丹(143)
珠海金沙(湖南)制药有限公司	中理脂康颗粒(57) 托恩(28)
山东烟台益生药业有限公司	维生素 E 烟酸酯胶囊(110)
中国威海迪沙药业	迪沙片(85)
四川抗菌素研究所	明竹欣(17) 明维欣(52) 明 齐欣(11)

株洲千金药业股份有限公司	补血益母颗粒(90) 养阴清肺糖浆(68) 妇科千金片(91) 灵芝口服液(97)
四川成都蜀阳企业(集团)有限公司 成都蜀阳制药厂	白蛋白(118) 静注丙球(113) 组胺球蛋白(116) 肌注丙球(112)
南京医药股份有限公司	舍尼通(61) 赛莱乐(49)
海南普利药业有限公司	诺福丁(31)
江苏连云港正大天晴制药有限公司	可耐(21) 泽桂癯爽胶囊(63)
无锡阿斯特拉制药有限公司	恩纳(136) 耐乐品(38) 美洛平(1)
云南施普瑞制药厂	施普瑞(95)
杭州民生药业集团公司	福洛必(60) 青霉素皮试剂(5)
中国医药对外贸易总公司	胃达喜(73)
扬子江药业集团	替硝唑(24) 舒血宁(57) 罗红霉素(10) 洛伐他汀(51)
贵州仙灵药业有限责任公司	仙灵骨葆胶囊(127)
徐州万邦生物化学制药厂	心先安(41)
成都蓉信制药有限公司	谷参肠安胶囊(77)
浙江新昌京新制药有限公司	京必舒新(53)
山东烟台绿叶制药有限公司	利百素凝胶(131)
四川禾正制药有限责任公司	五酯胶囊(78)
苏州东瑞制药有限公司	西可韦(105)
四川科伦实业集团有限公司 下属四川珍珠制药厂	欣匹特(13)
南京中医药大学制药厂	通塞脉片(58) 复方南星止痛

吉林鹿王制药	膏(140)
湖南医药销售有限公司	肾炎舒(64)
四川省医药工业公司	慈丹(102)
	熊胆胶囊(143) 正骨水(141)
广东台城制药厂	维脉宁(56)
西安中胜制药有限责任公司	止咳宝片(69)
	致康胶囊(82)

目 录

一、抗微生物感染药物

美洛平(1) 特治星(2) 青霉素皮试剂(5) 先锋必(5)
舒普深(7) 立复欣(9) 罗红霉素(10) 明齐欣(11) 欣匹
特(13) 培洛克(15) 麦咪诺(16) 丽珠威(17) 明竹欣(17)
丽珠风(19) 可耐(21) 盐酸特比萘芬(22) 替硝唑(24)

二、解热镇痛及镇痛药

佐米格(26) 托恩(28) 恬倩(30) 诺福丁(31) 凯扶
兰(32)

三、神经系统药物

妥泰(35) 抑眩宁(36)

四、局部麻醉药

耐乐品(38)

五、心血管系统药物

心先安(41) 柳胺苄心定(43) 络活喜(45) 复方阿米
洛利(46) 盐酸艾司洛尔(48) 赛莱乐(49) 洛伐他汀(51)
明维欣(52) 京必舒新(53) 凯时(54) 维脉宁(56) 舒
血宁(57) 中理脂康(57) 通塞脉片(58)

六、泌尿系统药物

福洛必(60) 舍尼通(61) 前列安栓(62) 泽桂癃爽胶
囊(63) 肾炎舒(64)

七、呼吸系统药物

脉欣(66) 止咳橘红冲剂(67) 养阴清肺糖浆(68) 虎梅含片(69) 止咳宝片(69)

八、消化系统药物

健朗晨(71) 胃达喜(73) 欧必亭(74) 肯特令(75) 消得良(76) 谷参肠安胶囊(77) 五脂胶囊(78) 果宇强肝糖浆(79) 胃复春(80)

九、血液系统药物

致康胶囊(82)

十、激素、内分泌及有关药物

卡瑞林(84) 迪沙片(85) 适泰宁(86)

十一、妇科用药

倍美安和倍美盈(88) 妇宁颗粒(89) 补血益母颗粒(90) 妇科千金片(91) 断血流片(91)

十二、免疫系统药物

GPS素注射液(93) 薄芝注射液(94) 施普瑞(95) 云芝菌胶囊(96) 灵芝口服液(97)

十三、抗肿瘤及辅助药物

兰他隆(99) 安卡(100) 慈丹(102)

十四、抗过敏药物

赛特赞(104) 西可韦(105) 福宁糖浆(106)

十五、维生素类药物

贝特令(108) 美天福(109) 维生素 E 烟酸酯胶囊(110)

十六、生物制剂

肌肉注射丙种球蛋白(112) 静脉注射丙种球蛋白(113)
冻干组织胺丙种球蛋白(116) 人血白蛋白(118) 补血康
(120) 福康泰(122) 安特鲁克(123) 怡速康(125)

十七、骨科用药

仙灵骨葆胶囊(127)

十八、外用药

一滴灵(129) 莎普爱思(130) 利百素凝胶(131) 敏
白灵(132) 希尔生(133) 贝复济(134) 恩纳(136) 巴斯
特酸痛贴布(138) 复方南星止痛膏(140) 正骨水(141)

十九、其他

沃丽汀(142) 小金丹(143) 熊胆胶囊(143)

一 抗微生物感染药物

美洛平(巴氨西林)

Penglobe, Bacampicillin

【制剂】 片剂 400mg/片

【作·】 本品是一种广谱抗生素,为氨苄西林的前体药物。作为前体药物本身没有抗菌活性。口服本品迅速而几乎完全被吸收,吸收后的前体药物被酶水解成为有活性的氨苄西林,并释放到血液中发挥抗菌作用。主要特点是生物利用度好,本药抗菌谱与氨苄西林一样。给药后 30-60 分钟达到血药峰值,400mg 的本品一次剂量平均最大血药浓度为 7mg/升,相当于口服氨苄西林 1000mg。服用本品 8 小时后,近乎 70-75% 尿中出现有活性的氨苄西林,在血浆中的蛋白结合率低约 18%,半衰期($t_{1/2}$)约 60 分钟。肌酐清除率低于 50ml/分/1.73 平方米的病人半衰期会明显增加。适用于治疗对氨苄西林敏感的革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌引起的感染,如:呼吸道感染、泌尿生殖道感染及皮肤和软组织感染。

【用·】 口服,成人:一般剂量每天二次,一次 400mg;重症患者每次 800mg,每天二次。

儿童:一般剂量 25mg/千克体重/天,严重感染时剂量可加倍。

无并发症淋病:1600mg + 丙磺舒 1g(单一剂量)。

【副·】 不良反应发生率低:

1. 皮肤反应:皮疹,极少发生荨麻疹。

2. 胃肠道反应:上消化道症状发生率约 3%,主要为恶心和呕吐,罕见情况下发生食道溃疡,(与没有用水吞服有关)。下消化道症状发生率约 2-4%,主要为稀便和腹泻,罕见病例发生伪膜性肠炎且与病原菌的重复感染有关。

3. 其他:过敏、血管性水肿、血清病、药物热、血管炎及 Stevens-Johnson 综合症等严重高敏反应在使用青霉素类抗生素病例中曾有报道。

【注·】 1. 已知对青霉素和/或头孢菌素过敏者及传染性单核细胞增多症者禁用。

2. 氨苄西林能通过胎盘屏障进入胎儿血循环,也能通过母乳,但至今未见有害作用报道。

3. 服用本品时,应与半杯水或一些其它液体一起吞服。

【相·】 本品与别嘌醇同时服用,有皮疹发生率增高情况。

【生产厂家】 阿斯特拉(无锡)制药有限公司

【经销公司】 长沙市三九医药有限公司

湖南省医药公司进出口部

湖南省医药供销公司

【参考价格】 (零售价) 34.80 元/400mg×10 片/盒

特治星(哌拉西林/他佐巴坦)

【制剂】 粉针剂 4.5g/支 每瓶含哌拉西林 4g,他佐巴坦 0.5g

【作·】 本品为广谱半合成青霉素哌拉西林和强力 β -

内酰胺酶抑制剂他佐巴坦的复方制剂,这种联合提供了下列理想特性:

1. 扩展抗菌谱包括对产生 β -内酰胺酶细菌有抗菌活性。

2. 和第三代头孢菌素相比,抗菌活性增加。

3. 和氨基糖甙类抗生素在体外试验中对许多细菌有协同作用,包括绿脓杆菌。

4. 对多重细菌感染有单药治疗潜力。

临床适用于:敏感细菌引起的下呼吸道感染,腹腔内感染,复杂和不复杂的尿路感染,皮肤软组织感染,妇科感染,菌血症,中性粒细胞减少病人的细菌感染以及可疑或经证实的需氧/厌氧菌产生的多重菌感染。

【用·】 1. 静脉缓慢推注,或在 20-30 分钟内静滴:

在中性粒细胞减少发热患者,每 6 小时或 8 小时应用 4.5g 加氨基糖甙类抗生素治疗。

肾功能不全患者,需根据肾功能情况进行调整。

肌酐清除率 >40 , 每天用量 13.5g(3.375g, q6h)

肌酐清除率 $20\sim40$, 每天用量 9g(2.25g, q6h)

肌酐清除率 <20 , 每天用量 6.75g(2.25g, q8h)

血液透析病人,每天最低剂量为每 8 小时 2.25g,另外,因透析在 4 小时内清除 30%-40% 的药量,故每次透析后加 0.75g。急性感染,至少需要连续使用 5 天,在发热和其他临床症状缓解后持续使用 48 小时。

2. 肌注:用量同静注,本品 2.25g 可用 5ml 0.5% 利多卡因或无菌注射用水溶解后注射,每个肌注注射部位不要注射超过 2.25g 本品。

【副·】 1. 胃肠道反应:腹泻、呕吐。

2. 头昏。

3. 皮疹、瘙痒症。

【注·】 1. 本品不宜与其他药物混合于同一注射器或输液瓶中使用。也不能和碳酸氢盐溶液同时使用,亦不能加入血制品和白蛋白水解物中。

2. 本品如加到乳酸林格氏液中应用,必须在 2 小时内滴完。

3. 配制的本品溶液室温下须 24 小时内用完。在 $2^{\circ}\sim 8^{\circ}\text{C}$ 储存时必须 48 小时用完。

4. 本品在妊娠妇女中的应用安全性尚未确立,也未知是否会分泌于乳汁中,因此除非必要,不推荐用于怀孕及哺乳妇女。

5. 已在儿童中开展临床试验,但现有的数据尚不足以治疗儿科病人的感染作出推荐剂量。

【相·】 1. 丙磺舒减少本品的清除率,延长半衰期。

2. 妥布霉素缩短本品的半衰期,并用时,妥布霉素 $\text{AUC}_{0-\infty}$ 减少 11%。万古霉素也有相似的作用,妥布霉素和万古霉素的这一作用并不证明需要调整药物的剂量。药物剂量应根据妥布霉素和万古霉素的血浆浓度检测结果调整。

【生产厂家】 苏州立达制药有限公司

【经销公司】 湖南省外贸医保公司

【参考价格】 (零售价) 209 元/4.5g/支

青霉素皮试剂

Penicillin skin test Reagent

【制剂】 粉针剂 每支含青霉素钠 2500 单位

【作·】 青霉素皮试剂是以中国药典规定的青霉素钠为原料经精确分量,科学配制的白色或类白色疏松块状或粉状冻干品,密封于西林瓶内,不易污染,其特点:1. 含量准确,安全有效;2. 稳定性好,易于保存;3. 操作方便,结果可靠。用于供做青霉素皮内敏感试验。

【用·】 用灭菌生理盐水 5ml,移入青霉素皮试剂瓶内摇匀、溶解(供分次使用),皮内注射 0.1ml。通常注入前臂屈侧皮内,如 20 分钟后局部出现红肿并有伪足出现,皮丘直径超过 1cm 者,或出现头晕、胸闷及全身发痒等症状,均为阳性。本品稀释后供 24 小时内使用。

【注·】 极个别患者在皮试过程中会出现青霉素过敏反应,故仍应密切观察,并配备必要的抢救设备。

【生产厂家】 杭州民生药业集团公司

【经销公司】 湖南省医药公司进出口部

长沙市三九医药有限公司

【参考价格】 (零售价) 9.68 元/2500u/支

先锋必(头孢哌酮钠)

Cefobid, Cefoperazone Sodium

【制剂】 粉针剂 1g/支

【作·】 本品为美国辉瑞公司研制开发的第三代头孢菌

素类抗生素,可用于治疗由敏感细菌所引起的下列感染:上、下呼吸道感染,上、下泌尿道感染,腹膜炎,胆囊炎,胆管炎及其他腹内感染,败血症,脑膜炎,皮肤及软组织感染,骨骼及关节感染,盆腔炎,子宫内膜炎,淋病及其他生殖器道感染。可预防因腹内、妇科、心血管及骨科手术所引起的手术后感染。

本品由于其抗菌谱广、副作用小,被广泛用于临床。目前国内已有十几个厂家生产该化学结构的仿制品,有关部门对国内十几个主要生产厂家的样品及部分进口样品的质量作了较为全面的考察,其结果表明除本品是唯一符合国家药典(1995)标准的头孢哌酮,其他生产厂家样品及部分进口产品均存在不同程度的质量问题(如纯度、色泽、稳定性等)。

【用·】 静注或肌注。

成人每日常用量 2~4g,分为等量,每 12 小时 1 次。

严重感染每日剂量可增至 8g,分为等量,每 12 小时 1 次。单纯性淋球菌尿道炎的推荐剂量为单剂肌注 500mg。婴儿及儿童的每日剂量为 50~200mg/kg,分为等量,每 12 小时 1 次,如需要亦可分为多次注射。

出生不足 8 月的新生儿须每 12 小时注射一次。

【副·】 1. 过敏反应:主要症状是斑丘疹、荨麻疹、腹泻及药物热。

2. 中性白细胞数量略微减少,血红蛋白或血细胞比容降低,短暂性嗜曙红细胞增多及凝血酶原减少等。

3. 曾有血清谷草转氨酶,血清谷丙转氨酶和碱性磷酸酶数值的短暂升高。

【注·】 1. 使用前,应确定病人是否对头孢菌素类、青霉素类或其他药物有过敏史。

2. 本品大部分经胆汁排泄,当病人有肝脏疾患及或胆道梗阻时,血清半衰期会延长,且尿中排泄增多,严重胆道梗阻和肝脏疾患,或同时肾脏功能障碍时,血清浓度应加以监测,剂量需要调整,否则剂量不应超过 2g/日。

3. 尚未有妊娠期或授乳期妇女的临床试验报告。

4. 对于早产及新生儿尚未作广泛研究,曾有个别病人使用后引起维生素 K 缺乏,但停药后恢复正常。

5. 每日剂量 2~4g,肾衰病人无需调整剂量,如病人肾小球滤过率低于 18ml/min,或血清肌酐值高于 3.5mg/100ml,每日的最高剂量为 4g。

【相·】 如需与氨基糖甙类抗生素联合使用,存在着物理配伍禁忌,故必须不同部位注射。

【生产厂家】 辉瑞制药有限公司(中国·大连)

【经销公司】 湖南省医药供销公司

【参考价格】 (零售价) 105 元/1g

舒普深(注射用舒巴坦钠/头孢哌酮钠)

Sulperazon, sulbactam/cefoperazone.

【制剂】 粉针剂 1g/瓶(内含舒巴坦钠及头孢哌酮钠各 0.5g)

【作·】 本品由于舒巴坦与头孢哌酮钠联合,具有明显的协同作用,降低了大多数细菌包括肠杆菌、葡萄球菌和厌氧菌的 MIC₉₀,增强了对耐药菌的敏感性。用于治疗由敏感细菌所引起的下列感染:上、下呼吸道感染,上、下泌尿道感染,腹膜炎,胆囊炎和其他腹腔内感染,败血症,皮肤和软组织感染,骨骼及关节感