

御纂醫宗金鑑內科

御纂醫宗金鑑卷四十五

編輯婦科心法要訣

崩漏門

崩漏總括 淋瀝不斷名為漏忽然大下謂之崩紫黑塊痛多屬熱日久行多損任衝脾虛不攝中氣陷暴怒傷肝血妄行臨證審因須細辨虛補瘀消熱用清 註婦人行經之後淋瀝不止名曰經漏經血忽然大下不止名為經崩若其色紫黑成塊腹脇脹痛者屬熱瘀若日久不止及去血過多而無塊痛者多係損傷任衝二經所致更有夢思傷脾脾虛不能攝血者有中氣下陷不能固血者有暴怒傷肝肝不藏血而血妄行者臨證之時須詳審其因而細細辨之虛者補之瘀者消之熱者清之治之得法自無不愈

崩漏證治

荊芩四物湯

崩漏血多物膠艾熱多知相少荊芩漏滑香附桃紅破崩初脹痛塊攻日久氣血衝任損八珍

大補養榮宜虛傷脾歸脾治傷肝逍遙香附青 註崩血漏血去血過多者宜用膠艾四物湯補之如屬熱多者宜用知藥四

物湯清之熱少者宜用荊芩四物湯和之若漏血滯少此屬血滯宜用四物湯加香附桃仁紅花破之若崩血初起脹痛此屬

瘀凝宜用琥珀散攻之崩漏日久氣血已虧衝任傷損者宜用八珍湯十全大補湯人參養榮湯量補其損傷若因思慮傷脾

者宜用歸脾湯補之悲怒傷肝者宜用逍遙散如炒香附青皮平之 膠艾四物湯 四物湯 琥珀散 八珍湯 十全大

補湯

人參養榮湯

歸脾湯

逍遙散

方俱見前調經方內

補中益氣湯

益胃升陽湯

氣陷補中益氣舉係元升柴歸木陳益胃升陽加芍藥減參 註崩漏日久脾傷食少中氣下陷不能載血者宜用

補中益氣湯益胃升陽湯升舉之補中益氣湯即人參黃耆甘草保元湯加升麻柴胡當歸白朮陳皮也益胃升陽湯即補中

益氣湯加黃芩神麴也若腹痛者宜加白芍藥有熱者用黃芩無熱者用肉桂調之咳嗽者肺熱也減人參

調經升陽除濕湯 夾水水瀉不甚弱調經升陽除濕湯者草升柴歸蒼朮羌獨薑本蔓荊防 註崩漏下血夾水或日水瀉一

二次形氣不甚弱者宜用調經升陽除濕湯其方即黃耆甘草升麻柴胡當歸蒼朮羌活獨活薑本蔓荊子防風也以風藥先

勝其濕若形氣虛弱者則當加人參陳皮合補中益氣湯補中勝濕可也

失笑散 地榆苦酒煎 殺血心痛失笑散清黃五靈脂定痰崩血不已防滑脫地榆苦酒煎止崩 崩血心腹痛甚者名曰

殺血心痛乃血滯不散宜用失笑散其方即蒲黃五靈脂也先定其痛痛止然後隨證治之若崩血補之仍然不止者當防

其滑脫宜用地榆一兩醋煎露一宿次早溫服立止止後隨證治之各地榆苦酒煎

崩漏門室方 補中益氣湯 黃芪 人參 白朮 甘草 當歸 陳皮 升麻 柴胡 右劉蘆漿水煎

服

益胃升陽湯 黃耆 人參 神曲 白朮 當歸 陳皮 甘草 升麻 柴胡

生黃芪 右為粗末每服三錢或五錢如食添再加之如食減只服三錢或更減之不可多服水煎去滓熱服

升陽除濕湯 黃耆 蒼朮 羌活 防風 薑本 升麻 柴胡 甘草 獨活 蔓荊子 右改

咀水五大盞煎至一大盞去滓稍熱服空心服畢待少時以早膳壓之

失笑散 五靈脂 蒲黃 右為末先用醋調二錢熬膏入水一大盞煎至七分食前熱服良驗

地榆苦酒煎 地榆 醋煎露一宿次早溫服立止止後隨證調治之 苦酒即醋也

帶下門

五色帶下總括 帶下勞傷衝任邪入胞中五色分青肝黃脾白主肺紅血黑腎赤屬心隨人五臟兼濕化治從補瀉燥寒

溫更審瘡膿瘀血化須別胞膀濁與淫 帶下者由於勞傷衝任風邪入於胞中血受其邪隨人臟氣濕熱濕寒所化故色青

者屬肝為風濕色赤屬心為熱濕色黃屬脾為虛濕色白屬肺為清濕色黑屬腎為寒濕也其從補從瀉從燥從溫從寒從濕

則隨證治之更審其帶久淋瀝之物或臭或腥穢乃敗血所化是胞中病也若似瘡膿則非瘀血所化是內癰膿也若如米泔

兼尿寢不利乃膀胱白濁病也若尿寢通利從精寢出或如膠粘乃胞中白淫病也

帶下證治 邪入胞中吳茱萸赤粘連梔青防梔白主益氣黑六味黃淡六君或歸脾 帶下因六淫之邪入於胞中者宜吳

茱萸湯若色赤色黃而濁粘者熱也色黃者加黃連梔子色青者加防風梔子若色白色黑而清稀者虛寒也色白者用補中

益氣湯色黑者用六味地黃湯色黃而淡者宜六君子湯或加味歸脾湯分證調治可也

吳茱萸湯 補中益氣湯 六味地黃湯 六君子湯 歸脾湯 方俱見首卷方內

加味四物湯 胞中冷痛乃寒濕四物附子桂薑宜其膠兼合知藥用久滑升柴龍牡脂註帶下而胞中熱痛乃熱濕也今胞

中冷痛乃寒濕也宜四物湯加川附子炮薑官桂服之日久滑脫者加升麻柴胡參之龍骨牡蠣赤石脂註四物湯

前調經明
方內

清白散 帶下濕熱清白散四物薑炭草薢赤榆荆芥濕二木滑加龍牡久合君註帶下五色帶下也皆濕熱所化宜用清

白散其方即四物湯加薑炭甘草黃蘗椿皮也色赤加地榆荆芥黃芩濕加蒼朮白朮滑加龍骨牡蠣久則合四君子湯也

四物湯 四君子湯俱見前調經門方內

導水丸 萬安丸 帶下有餘皆濕化少腹脹疼污水綿導水牽滑益軍熱萬安牽椒固木寒註五色帶下皆從濕化若少腹

脹痛污水綿綿屬濕熱者宜用導水丸其方即牽牛滑石黃芩生軍治熱有餘也屬濕寒者宜用萬安丸其方即牽牛胡椒

小茴香木香治寒有餘者也

威喜丸 固精丸 瘀化瘡膿濁淫病虛實寒熱酌其宜威喜蠟苓固精菟韭味桑苓龍牡脂註帶下有因瘀血所化或瘡傷

膿出及白濁白淫者皆帶下類也其虛實寒熱當酌其宜藥用威喜丸即黃蠟茯苓也固精丸即菟絲子韭菜子五味子桑

螵蛸茯苓龍骨牡蠣赤石脂也

帶下門彙方

清白散 當歸 黃蘗 鹽水泡 白芍 炒 檳榔皮 酒炒 生地 川芎 貝母 各一錢 炮薑 甘草 各五分 右劉生薑

三片水煎服

導水丸 牽牛 頭末 滑石 水飛 黃芩 川大黃 右末蒸餅為丸量虛實服

萬安丸 牽牛 頭末 胡椒 木香 小茴香 各等分 右末水泛為丸量虛實服

威喜丸 白茯苓 四兩去皮作塊用猪苓二錢半同於磁器內煮二十餘沸出曬乾不用猪苓 黃蠟 四兩 右以茯苓為末煉黃蠟為丸如彈子大空心細嚼滿

口生津徐徐咽服以小便清為度忌米醋只喫糠醋忌動氣

固精丸 牡蠣 煨粉

菟絲子 酒蒸焙

韭子 炒

龍骨

五味子

白茯苓

桑螵蛸 酒炙

白石脂 各等分

右為末酒

糊丸如桐子大每服七十九空心鹽湯下

瘕瘕瘕諸證明

瘕瘕積聚瘕瘕血血蠱總括

五積六聚分藏府七瘕八瘕氣血凝瘕積不動有定處瘕聚推移無定形瘕悶不宜氣壅塞未

成堅塊血瘕名蓄久不散成血蠱產後經行風冷乘

註

五藏氣積名曰積故積有五證六府氣聚名曰聚故聚有六證難經有

心肝脾肺腎五藏之積而無六聚蓋以積為血病而聚為氣病也故李泉有五積丸方治法藥以病源載七瘕八瘕但有八瘕

名證而無七瘕病形其他方書亦不概見大抵又以瘕為氣病而瘕為血病也夫病皆起於氣必氣聚而後血凝不必過泥於

黃膏燥血脂狐蛇驚等名但以牢固不移有定處者為瘕為積推移轉動忽聚忽散者為瘕為聚可也故曰瘕者微也言有形

可徵也瘕者微也言微物成形也若夫瘕者瘕悶不通氣道壅塞之謂也瘕者血瘕腹中未成堅塊也蓄之既久必成血蠱

矣凡此諸證皆由新產之後經行之時不知謹避以致風冷外襲邪正相搏結於腹中而成也

瘕瘕證治

大七氣湯

婦人一切瘕瘕病上下攻疼七氣湯霍香益智稜莖木甘桔青陳肉桂香

註

婦人一切瘕瘕隨氣上

下攻瘕瘕瘕者宜大七氣湯其方即霍香葉益智仁京三稜蓬莖木甘草桔梗青皮陳皮肉桂心木香也

食瘕證治

烏藥散

經行產後食生冷臟氣相搏結塊形牢固不移日漸長開滯消積溫散行烏藥散烏藥桃莖木木香當歸

青桂心註

婦人經行產後食生冷之物壅臟氣互相搏聚結成堅塊牢固不移日漸長大者治宜開滯消積用烏藥散即烏

藥桃仁莖木木香當歸青皮桂心以溫散之自愈

血瘕證治

血竭散

乘臟虛冷風冷干飲食內與血相搏因成血瘕堅牢固腸腹脹痛熱而煩少食多忘頭汗出血竭歸芍

蒲桂延註婦人產後經行之時臟氣虛或被風冷相干或飲食生冷以致內與血相搏結遂成血瘕牢固不移腸腹脹痛內熱

心煩食少善忘但頭汗出者宜用血竭散即血竭當歸赤芍蒲黃桂心延胡索也

瘕證治

助氣丸

三焦痞滿胸膈悶氣不宣通助氣清白木三稜蓬莖木枳殼檳榔香與陳註婦人胸膈痞悶謂之瘕由於

氣壅不宣所致宜助氣丸即青皮白朮三稜莖木枳殼檳榔木香陳皮為丸服也

積聚證治 開鬱正元散 積聚通用正元散 蒼朮青陳麴麥延香砂海粉壹甘桔痰飲食積血氣痺 註五積六聚乃痰飲食

積氣血搏結而成通用開鬱正元散其方即茯苓白朮青皮陳皮神麴麥芽延胡索香附砂仁海粉山查甘草桔梗也用以健脾胃消食化痰滲飲理氣和血則積聚未有不愈者矣

瘀血血蠱證治 桃奴散 腹中瘀血未成形面黃發熱腹脹疼產後經來風冷客血室之內有瘀停產後惡露失笑散經開

瘀滅王燭攻血蠱桃奴穢鼠糞延桂砂桃附五靈 註婦人產後經行之時傷於風冷則血室之內必有瘀血停留未成堅塊故

不名癥瘕也其人必面色萎黃臍腹脹痛內熱哺熱若產後惡露不行者宜失笑散若經閉不通瘀血凝聚者宜王燭散瘀血

不行蓄之既久必成血蠱宜用桃奴散即桃奴穢鼠糞延胡索桂心砂仁桃仁香附五靈脂也穢鼠糞一名兩頭尖即雄鼠屎

桃奴即桃樹上未成不落之乾桃子也 失笑散 方見前 玉燭散 方見前

痙瘳痙證總括 膈旁左右一筋疼突起如弦痙證名僻在兩肋名曰痙高起如山痙病稱必引少腹腰脇痛三證皆由風冷

成或作或止因寒發痛時方見不痛平 註婦人膈之兩旁有筋突起疼痛大者如臂小者如指狀類弓弦者名曰痙僻在兩肋

之間者名曰痙若小腹牽連腰脇疼痛高起者謂之痙名雖有三其實皆因風冷客於胞中而然故其發作皆因再受風冷發

則痛痛則見不痛則平復如初也

痙瘳證治 葱白散 婦人痙瘳腹肋痛風冷氣血氣結而成葱白四物參苓枳桂朴薑香薷義緩茴香麴麥苦棟子並鹽煎服

訶黃散 註婦人痙瘳腹肋疼痛者皆因風冷與氣血搏結而成宜用葱白散溫散之其方即四物湯加人參茯苓枳殼肉桂厚

朴乾薑木香青皮義尤三稜茴香神麴麥蘗苦棟子葱白食鹽煎服也大便結燥去鹽加大黃如大便自利加訶子 四物湯

方見首卷藥方內

痙病證治 當歸散 婦人痙病氣攻冲脇腹刺痛當歸芍藥甲吳萸桃仁芍桂柳青木大黃蓬 註婦人痙病攻衝刺痛多因

風冷寒濕客於胞中血室故其病皆屬厥陰肝經宜當歸散即當歸川芍藥甲吳萸黃芩桃仁赤芍肉桂檀榔青皮木香大黃蓬

義尤也

治諸積大法 形虛病盛先扶正形證俱實去病急大積大聚衰其半須知養正積自除 註凡治諸積宜先審身形之壯弱

病勢之緩急而治之如人虛則氣血衰弱不任攻伐病勢雖盛當先扶正氣而後治其病若形證俱實宜先攻其病也經云大積大聚衰其半而止蓋其過於攻伐傷其氣血也羅天益曰養正積自除可謂得經旨者矣

癥瘕積痞血蟲閉壅方

大七氣湯 三棱 莪朮 各煨切 青皮 去穢 陳皮 去白 木香 藿香 益智仁 桔梗 肉桂 甘草 各七錢

烏藥散 烏藥 莪朮 桂心 當歸 炒 桃仁 青皮 木香 各等分 右為末每服二錢熱酒調下

血竭散 真血竭 如無紫 當歸 赤芍 蒲黃 延胡索 右等分研細頻篩再研取盡為度每服一錢用童便合好酒半

大蠶煎一沸溫調下方產下時一服上牀良久再服其惡血自循經下行不致衝上免生百病

助氣丸 京三稜 蓬莪朮 二味各用濕紙包煨火 青皮 去白 陳皮 去白 白朮 各十五兩 枳殼 炒去穢 檳榔

木香 各十兩 右為末糊丸桐子大每服五十丸滾水下

開鬱正元散 白朮 陳皮 青皮 香附 山查 海粉 桔梗 茯苓 砂仁 延胡索 麥芽 炒 甘草 炙 神麴 各

等分炒 右劉每服一兩生薑三片水煎服

桃奴散 桃奴 炒 雄鼠糞 炒兩頭 延胡索 肉桂 五靈脂 香附 炒 砂仁 桃仁 各等分 右為末每服三錢酒調下

葱白散 當歸 熟地 赤芍 川芎 人參 茯苓 枳殼 肉桂 厚朴 乾薑 木香 青皮 莪朮 三稜 茴香

神麴 麥芽 苦楝子 各等分 右末加葱白三寸食鹽五分煎服三錢大便結燥去鹽加大黃便自利加訶子

當歸散 當歸 川芎 各二錢 鬱金 三錢 醋炙 吳茱萸 桃仁 中五粒 赤芍 肉桂 各一錢 檳榔 青皮 各八分

木香 莪朮 川大黃 各七分 右為末每服一錢水一盞入乾臙脂一錢同煎六分服食後

嗣育門

胎孕之原 天癸先天身氣精血後天化成形男子二八天癸至屬陽應日精日盈女子二七天癸至屬陰應月血月通男

女媾精乃有子乾道男成坤女成 註 天癸乃父母所賦先天身之真氣也精血水穀所化後天成形之本也男子二八先天

腎氣感天癸至與後天所生之精會合而盈男子屬陽陽應日故精盈而日舉也女子二七天腎氣實天癸至與後天所

生之血會合而感然女子屬陰應月故血盛而月下也所以至期男女構其先天真氣後天精血陰陽會和乃能有子也當此陰陽會合時陽感自然成男是乾道成男陰感自然成女是坤道成女也

男女完實 精通必待三十聚天癸二十始適人皆欲陰陽完實後育子堅壯壽備增註男子十六而精通必待三十而娶女子十四而天癸至必待二十而嫁者皆欲陰陽完實然後交而孕孕而育而其子必堅壯長壽也今未笄之女天癸始至已近男色則陰氣早瀉未完而傷未實而動所以雖交而不孕孕而不育育而其子必脆弱不壽也

種子時候 男子聚精在寅欲交接乘時不可失須待網縊時候至樂育難及是真機註聚精之道惟在寡欲交接女子必乘其時不可失之遲早蓋婦人一月經行一度之後必有一日網縊之時氣蒸而熱如醉如癡有欲交接不可及之狀乃天然節候是成胎生化之真機也

分男女論 精血先後分男女或以奇偶少多分或以子宮左右定是皆不曉箇中因欲識此中真消息乾道陽男坤女陰註分男女之說先賢有以血先至裏精則成男精先至裏血則成女精血散分並裏則為駢胎品胎之原者有以月水盡後一三五日成男二四六日成女與夫經水斷後一二日成男四五六日成女者有以受氣於左子宮成男受氣於右子宮成女者皆各執一見殊為不曉此中因也蓋攝男攝女之胎可以日數論駢胎品胎或男或女亦可以日數論乎稽之史載一產三子四子有半男半女或男多女少男少女多者則三三五日為男二四六日為女之說不可憑矣抑豈有一日受男而二日復受女之理乎丹田命門也在男子曰精室在女子曰子宮形如合鉢並無兩歧可分曰左右則是有兩子宮矣此說尤屬不經然則何以定之亦唯以會合天人陽盛乾道成男陰盛坤道成女斯足為確論耳

雙胎品胎 古以雙胎精氣盛不成男女或兼形陰陽變常駭氣感事之所有理難明註古以雙胎乃精氣有餘歧而分之血因分而攝之故也若男同孕者剛日陽時也女同孕者柔日陰時也男女同孕者剛日陰時或柔日陽時也其他或有不成果女男不可為父女不可為母與男女之兼形者又皆陰陽變常駭氣所感事之所有理之所無莫可稽考者也

脈見有子 少陰動甚知有子陰搏陽別尺寸憑但搏不滑胎三月搏而滑右五月形註少陰腎脈動甚者有子脈也但當憑其兩尺陰脈搏指有力兩寸陽脈不搏指而別於兩尺斯為有子脈無疑也其但搏不滑者主三月之胎搏而滑者主五月之

胎也

胎男女辨 上小下大女腹箕中正圓高男腹釜右疾為女左疾男胎氣鍾於陰陽主註上小下大如箕之形蓋以女胎面向母腹其足膝抵腹故有是形也中正圓高如釜之形蓋以男胎面向母背則背脊抵腹故有是形也右手屬陰脈疾為女左手屬陽脈疾為男是胎氣鍾於陰則右感主女鍾於陽則左感主男也

辨別孕病 孕病不分須診乳五月之後乳房升何以知其母子吉身雖有病脈和平註婦人經水不至不分是孕是病者五個月之後以孕婦乳房辨之若乳房升大有乳者是孕若乳房不大無乳者是病也凡孕婦有病其險可知亦何以知其母子俱吉惟診其脈象和平則雖有病知均吉無慮也

分經養胎 分經養胎不足憑無所專養論不經形始末分無不具陰陽之道漸分形註巢元方曰妊娠一月名胚胎足厥陰脈養之二月名始膏足少陽脈養之三月名始胎手心主脈養之當時血不流行形象始化四月始受水精以成血脈手少陽脈養之五月始受火精以成氣足太陰脈養之六月始受金精以成筋足陽明脈養之七月始受木精以成骨手太陰脈養之八月始受土精以成膚草手陽明脈養之九月始受石精以成毛髮足少陰脈養之十月五藏六府闕節人神皆備又有推巢元方養胎之說謂四時之令必始於春所以一月二月間是足厥陰少陽木也三月四月間手厥陰少陽火也五月六月間足太陰陽明土也七月八月間手太陰陽明金也九月十月間足少陰太陽水也惟手少陰太陽二經無所專養者以君主之官無為而已此說更為不經夫男女交接精血聚而成胚此孕形之始也雖未分身軀藏府而其理無不具也猶太極渾然包羅萬象而陰陽之一氣氤氲浸漸化生而成子母分形自然如草木成熟脫落蒂也

受孕分房靜養 受孕分房宜靜養謹戒食味使脾安調其喜忌防驚恐慎慮起居避風寒註受孕之後分房靜養忌動相火致生胎毒謹戒飲食五味使其脾胃調和母之氣血易生子之形成必有內調七情外避風寒起居安順不持重用力不安逸多睡不登高涉險則母無病子亦安矣

安胎母子二法 安胎之道有二法母病胎病要詳分母病動胎但治母子病致母寯胎因註安胎之道有二法母病胎病當詳分而施治也凡因母病以致胎動者但療其母母安則胎自安或因胎病有所觸動以致母病者但宜安胎胎安則母自愈矣

胎前用藥三禁 胎前清熱養血主理脾疏氣是為三禁汗下利小便便隨證虛實寒熱看 丹溪曰胎前當清熱養血為主
恐傷陰血也理脾健則氣血易生疏氣順則氣血調和理脾疎氣兼以清熱養血則胎自安矣三禁者汗下利小便也蓋
恐過汗亡陽傷氣過下亡陰傷血利小便傷津液也然又當隨證詳審表裏虛實寒熱以施其治不可過峻也

安胎審宜調治 形瘦不宜過熱品體虛弱氣恐動癢安胎者尤為要藥佐以他藥任抽添火盛倍令癢倍木血虛四物氣四
君杜續膠艾胎不穩氣感蘇腹枳砂陳 形瘦之人多火過用溫熱則傷陰血肥盛之人多痰過於補氣壅氣動癢白朮消
痰健脾條芩清熱養陰二味為安胎要藥若有他證則以藥佐之或減白朮加條芩或加白朮減條芩任其抽添如火盛則當
倍芩以清火痰盛則當倍朮以消痰血虛則合四物湯以補血氣虛則合四君湯以補氣胎不安穩更佐以杜仲續斷阿膠艾
葉以安之若氣感胎高則加紫蘇大腹皮枳殼砂仁陳皮以舒之 四物湯 四君子湯方俱見前首卷藥方內
嗣育門藥方

加味地黃丸 治婦人經水不調必不能受孕即使受之亦不全美宜常服此方 熟地四兩 山萸肉 山藥各二兩 壯

丹皮 白茯苓 各一兩 澤瀉 香附 各一兩 便浸三次 右為末煉蜜丸如桐子大每服七十九白沸湯送下

滌痰湯 治婦人肥盛者多不受孕以身中有脂膜閉塞子宮也以此湯送後丸藥 當歸一兩 茯苓四兩 川芎七錢

白芍藥 白朮 土炒 半夏 香附末 陳皮 甘草 各一兩 右作十貼每貼薑三片水煎吞後九子

滌痰丸 白朮 二兩土炒 半夏 川芎 香附末 各一兩 神麴炒 茯苓 各五錢 橘紅四錢 甘草二錢 右為末

粥丸每服八十九 如熱者加黃連枳實 各一兩

大補丸 治婦人瘦弱多由血少不能受孕宜常服此方 天冬 去心 麥冬 去心 菖蒲 茯苓 人參 益智仁

枸杞子 地骨皮 遠志肉 右為細末煉蜜丸如桐子大空心酒下三十九

養容菴然子丸 此方不寒不熱助陰生子 肉蓯蓉 三錢 覆盆子 蛇牀子 川芎 當歸 菴然子 各一兩 白芍藥

一兩 牡蠣 鹽泥固服 烏鰂魚骨 各八 五味子 防風 各六錢 條芩 五錢 艾葉 三錢 右為末煉蜜丸如桐子大

每服三四十丸鹽湯下早晚皆可服

調經丸 理氣養血調經種子 香附 川杜仲八兩薑汁炒 大川芎 白芍藥 當歸去尾 懷生地 陳皮 小茴香酒炒

延胡索略炒 肉桂卷酒炒 舊青皮麩炒 台烏藥炒 枯黃芩酒炒 烏鯽魚骨以上各四兩酥炙 右十四味稱足真正好

醋和麵打糊為丸如梧桐子大每服百丸空心好酒送下 一方無陳皮地黃有人參黃耆各二兩

卷四十六

編輯婦科心法要訣

胎前諸證明

胎前總括 妊娠胎前病惡阻胞阻腫滿氣煩嘔轉胞與子淋激經胎漏胎不安小產死胎胎不長子瘕臟燥鬼胎連餘

病當參雜證治須知刻刻顧胎原註此言妊娠胎前有惡阻胞阻子腫子滿子煩子嘔子瘕子癢子轉胞子淋激經胎漏胎動不

安小產墮胎子死腹中胎萎不長子瘕臟燥鬼胎等證皆當一一詳辨熟記其餘胎前傷寒傷食癰痢霍亂泄瀉當於雜證附

中參考治之但須時刻保護胎原不致誤犯為要也

惡阻總括 惡心嘔吐名惡阻擇食任意過期安重者須藥主胃弱更分胎逆痰熱寒註婦人受孕月餘之後時時嘔吐者名

曰惡阻若無他病擇食者須隨其意而藥之輕者過期自然勿藥而愈重者須以藥治之當以胃弱為主更審其或因胎氣阻

逆或痰飲阻逆與夫兼熱兼寒而分治之

惡阻證治 保生湯 胎氣阻逆惟嘔吐無他兼證保生湯砂朮香附烏陳草量加參朮引生薑註惡阻有因胎氣阻逆者乃

受胎後胞門閉塞氣內阻被胎氣上逆於胃故令惡心嘔吐也若平素胃虛所致雖無痰飲寒熱相兼而亦有惡阻證者宜

用保生湯即砂仁白朮香附烏陳陳皮甘草也引用生薑者以止其嘔也若氣弱者量加人參氣實者量加枳殼

加味六君湯 痰飲惡阻吐痰水煩眩加味六君湯枳杷藿香旋縮枳熱秘於重寒桂薑註惡阻因於痰飲者其吐必多痰水

且心煩頭目眩暈必其人平素胃虛中停痰飲也宜用加味六君湯於六君湯內加枳杷葉藿香旋縮花縮砂枳殼若胃熱便

秘加黃芩太黃以利之胃寒喜熱加肉桂乾薑以溫之 六君湯方見首卷

加味溫膽湯 熱阻惡食喜涼熾心煩悶溫膽湯橘半茯苓甘與枳竹更加苓連蘆薈薑註惡阻因於胃熱者必嘔吐心中熱

煩憤悶喜飲涼漿也宜用加味溫膽湯其方即陳皮半夏茯苓甘草枳實竹茹名溫膽湯更加黃芩黃連蘆根麥冬引生薑也

胞阻總括 妊娠腹痛名胞阻須審心腹少腹間傷食心胃胎腰腹少腹胞寒水尿難註孕婦腹痛名為胞阻須審其痛或上在

心腹之間者多屬食滯作痛或下在腰腹之間者多屬胎氣不安作痛若在少腹之間者則必因胞血受寒或停水尿難作痛也

胞阻證治 加味半胃散 延胡四物湯 心胃痛多傷食滯者補陳甘果枳麴使秘加軍倍甘草胎動延胡四物宜註孕婦

心胃作痛者多因傷食停滯宜平胃散即陳皮厚朴蒼朮甘草也加草果枳殼神麴以消之若更大便秘結日久則加硝黃以

攻之然必倍甘草以緩其峻性庶不傷胎若腰腹作痛胎動下血則當用四物湯若以延胡以定痛而保胎也 四物湯訪觀

加味膠艾四物湯 蜜硝湯 腰痛痛甚防胎墮膠艾四物杜酒葱外邪宜加羌獨活內熱使秘蜜硝攻註胞蒂繫於腰凡腹

腰痛者須防胎墮宜用膠艾四物湯加杜仲大豆淋酒葱白以定痛而保胎若因外感風寒之邪則加羌活獨活以散之若內

熱大小便閉者則用蜂蜜蜜硝前湯以攻之經曰有故無損是也 膠艾四物湯方見首卷

加味芎歸飲 導赤散 五苓散 胞血受寒少腹疼痛參吳膠艾草歸芍尿澀熱甚導赤散木通生地甘草靈水感陽虛五苓

散木澤肉桂茯苓註少腹作痛者乃胞中之血受寒也宜加味芎歸飲溫之其方即人參吳茱萸阿膠斷艾炙甘草當歸川

芎也若因尿澀而痛則是膀胱水病熱甚則以導赤散清利之其方即生地木通甘草也若水感陽虛不化則以五苓散滲利

之其方即茯苓白朮澤瀉豬苓肉桂也

子腫子氣子滿脆腳皺腳總括 頭面四肢腫子腫自膝至足子氣名腫脹喘滿曰子滿但腳腫者脆腳稱註頭面偏身浮腫

小水短少者屬水氣為病故名曰子腫自膝至足腫小水長者屬濕氣為病故名曰子氣偏身俱腫腹脹而喘在六七個月時

者名曰子滿但兩腳腫而膚厚者屬濕名曰皺腳皮膚薄者屬水名曰脆腳大凡水之為病多喘促氣之為病多脹滿喘促屬肺

脹滿屬脾也以其人幸有水氣濕邪故受孕有脹滿之證兒未成形被水浸漬其胎每致損壞成形尚可調治故在五六月後

有是證者多有生育者也

子腫子氣子滿脆腳皺腳證治 茯苓導水湯 妊娠腫滿與子氣水氣濕邪脾肺間水氣浸胎喘難臥濕氣傷胎脹難堪均

宜茯苓導水湯治香瓜櫛腹四苓櫛藥砂蘇陳腹加枳腿腳防已喘寧添註妊娠水腫脹滿子氣皺腳脆腳等證皆由水氣濕

胎前諸證門

邪傷於脾肺為病也若水氣盛而浸胎則必喘而難臥若濕氣盛而傷胎則脹滿難堪皆宜用茯苓導水湯治之方用木香木瓜續榔大腹皮白朮茯苓澤瀉桑皮砂仁蘇葉陳皮以和脾肺而利水濕脹甚者加枳殼以破結腿腳腫者加防己以利下濕喘者加苦葶藶以泄上水也

子煩證治 知母飲 孕婦時煩名子煩胎熱乘心知母產子苓知麥冬耆草犀角熟參虛膏湯煎註孕婦別無他熱惟時時心煩者名曰子煩由胎中鬱熱上乘於心也宜用知母飲即子苓知母麥冬茯苓黃耆甘草熟其者加犀角氣虛加人參口渴

加石膏煎服

子懸胎上逼心證治 紫蘇飲 胸膈脹滿子懸名喘甚由胎上逼心紫蘇飲用歸苓芍陳腹蘇甘虛人參註孕婦胸膈脹滿

名曰子懸更加喘甚者名曰胎上逼心俱宜紫蘇飲即當歸川芎白芍陳皮大腹皮蘇梗黃甘草虛者加人參煎服

子癰證治 羚羊角散 鈎藤湯 暴仆抽搐不識人須臾自醒子癰名羚羊角散防獨杏五加龍草薑苡仁茯苓木香羚羊角抽搐鈎藤湯寄生人參茯苓神歸桔梗口喎肢廢中風成註孕婦忽然顛仆抽搐不省人事須臾自醒少頃復如好人謂之

子癰乃肝心二經風熱所致宜用羚羊角散即防風獨活杏仁酸棗仁五加皮甘草薑苡仁茯苓木香羚羊角也抽搐甚者

用鈎藤湯乃鈎藤寄生人參茯苓神歸桔梗也若口眼喎斜半身不遂則已成中風廢證當參風閉治之

子嗽證治 枳殼二陳湯 桔梗湯 妊娠咳嗽名子嗽陰虛痰飲感風寒痰飲二陳加枳殼風寒桔梗湯可安紫蘇桔梗麻

桑杏亦令冬令冬令合員前久嗽陰虛宜清潤麥味地黃湯自痊註妊娠咳嗽謂之子嗽嗽久每致傷胎有陰虛火動痰飲飲逆

有感冒風寒之不同因痰飲者用二陳湯加枳殼桔梗治之因感冒風寒者用桔梗湯即紫蘇薑桔梗麻黃桑白皮杏仁赤

茯苓冬令冬令合員前胡也若久嗽屬陰虛宜滋陰潤肺以清潤之用六味地黃湯治之六味地黃湯方見首卷

轉胞證治 舉胎四物湯 阿膠五苓湯 飲食如常煩不臥不得小便轉胞稱舉胎救急丹漢法四物升麻參朮陳服後揉

吐吐再服不應阿膠入五苓註妊娠胎壓胞系于尿不得小便飲食如常心煩不得臥者名曰轉胞宜用丹溪舉胎法令穩

婆香油塗手舉胎起則尿自出以暫救其急然後以四物湯加升麻人參白朮陳皮煎服服後以指揉吐吐後再服再吐如

此三四次則胎舉而小便利矣如不應則是有飲用五苓散加阿膠以清利之四物湯方見首卷

子淋證治 加味五淋散 子淋頻獨寢溼疹五淋施苓歸芍苓甘草再加生地澤車前滑石木通導引孕婦小便頻數窘澀
點滴疼痛名曰子淋宜五淋散即黑施赤茯苓當歸白芍黃苓甘草加生地澤瀉車前子滑石木通以清熱而利水則小便
自通矣

激經胎漏尿血總括 妊娠經來名激經胎漏下血腹不疼若是傷胎腹必痛尿血漏血要分明 孕婦人受孕之後仍復行經
者名曰激經為血有餘若孕婦無故下血或下黃汁豆汁而腹不痛者謂之胎漏若其胎已傷而下血者其腹必疼孕婦又有
尿血一證腹亦不痛然與胎漏之證又不同蓋尿血出於溺孔漏血出自人門三者俱下血而各不同治者不可不詳辨也

激經胎漏尿血證治 阿膠湯 黃耆湯 銀朮酒 加味四物湯 激經無病不須治子大能食經自停胎漏下血多因熱

四物阿膠湯側苓或下黃汁豆汁樣黃耆糯米芒根銀若是尿血膀胱熱四物血餘共茅根 註 激經無他證相兼者不須用

藥其胎壯子大能食其血而經自停若胎漏下血多屬血熱宜阿膠湯清之其方即四物湯加阿膠黑施側柏葉黃苓也或

漏下黃汁或如豆汁甚多者其胎乾枯必倚而墮宜用黃耆湯即黃耆二兩糯米一合煎服或銀朮酒即芒根紋銀煎酒

服若尿血則是膀胱血熱宜四物湯加血餘白茅根以涼之 四物湯方見首卷

胎不安小產墮胎總括 氣血充實胎自安衝任虛弱損胎原暴怒房勞傷肝腎疾病相干跌撲顛五月成形名小產未成形

象墮胎言無故至期數小產墮胎為熱火愈 註 孕婦氣血充足形體壯實則胎氣安固若衝任二經虛損則胎不成實或因

暴怒傷肝房勞傷腎則胎氣不固易致不安或受孕之後患生他疾干犯胎氣致胎不安者亦有之或因跌撲墮胎從高墮下

以致傷胎者亦有之然小產墮胎亦有別五七月已成形象者名曰小產三月未成形象者謂之墮胎以上小產墮胎皆出

有因若懷胎三五月無故而胎自墮至下次受孕亦復如是數數墮胎即謂之滑胎多因房勞太過熱火愈熾其胎因而不

安不可不慎者也

胎不安小產墮胎證治 加味聖愈湯 加味佛手散 十聖散 加味芩歸湯 益母丸 胎傷腹痛血未下聖愈湯加杜

續砂下血腹痛佛手散膠艾杜續尤加十全續縮減苓桂因病傷胎十聖跌撲芩歸調益母怒勞遺遠地黃佳 註 妊娠

胎傷若腹痛不下血者宜用聖愈湯加杜仲續斷砂仁安之若下血腹痛者宜用佛手散加阿膠斷艾杜仲續斷白木條苓

卸纂醫示監 卷四下 胎前諸證門

安之若因母病以致傷胎欲墮者宜十聖散加十全大補湯減茯苓肉桂加續斷砂仁若因跌撲傷胎欲墮者宜芩歸湯調益母丸服之芩歸湯即川芎當歸也若暴怒房勞傷肝腎以致胎動不安者宜逍遙散地黃湯治之 聖愈湯 佛手散 逍遙散 地黃湯 方俱見首卷

墮胎下血不止血瘀不出證治 獨參湯 回生丹 墮胎暴下血不止面黃唇白獨參湯惡血不出凝脹痛回生益母酌相

當註妊娠胎墮後血暴下不止面黃唇白者名脫榮宜用獨參湯峻補其氣以生其血所謂無形能生有形也若惡血瘀滯不行腹脇脹痛者宜於回生丹益母丸酌其虛實緩急相宜而用之 回生丹 見產後集方

子死腹中總括 子死腹中須急下舌青腹痛冷如冰時久口中穢氣出寒熱峻緩詳斟平註 凡一應傷胎子死腹中者須當

急下勿使上奔心胸然必驗其舌青面赤肚腹脹大腹冷如冰久之口中有穢氣出者方可議下然猶必審其人之虛實寒熱或宜寒下熱下峻下緩下隨其宜而施之

子死腹中證治 佛手散 平胃散加芒硝方 下胎緩劑佛手散峻劑平胃加芒硝宜寒須細審產婦虛實莫潤滑註

孕婦子死腹中宜下者緩下用佛手散峻下用平胃散加芒硝或宜寒下或宜熱下須細詳審而投之蓋以產母之虛實或緩或峻不可潤滑輕率以致誤也 佛手散 方見首卷

辯子母存亡 妊娠一切垂危候母子存亡可預推面赤舌青必子死面青舌赤母命危面舌俱青口吐沫子母俱亡二命虧

註凡妊娠一切凶危之候欲知母子存亡者當於孕婦面舌之色定之若面赤舌青則其子必死面青舌赤則其母必亡若面舌二者俱見青色口角兩邊流涎沫者則子母二命俱不能保也

胎兼癰癰 妊娠有病當攻下衰其大半而止之經云有故無殞言藥雖峻有病則病受之不能傷胎也攻其大半與病相當又攻下者俱攻其大半餘俟其自消不可盡攻經云有故無殞言藥雖峻有病則病受之不能傷胎也攻其大半與病相當又

何疑於有妊必不可攻之說耶

胎不長證治 八珍湯 六君子湯 胎萎不長失滋養氣血不足宜八珍脾虛胃弱六君子散化精微氣血生註 妊娠五六

個月胎萎不長由於妊母血虛弱若屬氣血兩虛者宜用八珍湯若脾虛胃弱宜用六君子湯但使飲食強壯俾水穀

運化精微則氣血日生而胎自長矣 八珍湯 六君子湯 方俱見首卷

子瘡證治 子瘡聲啞細無音非謂絕然無語聲九月胎盛阻其脈分挽之後自然通 註 妊娠九月孕婦聲音細啞不響謂之

子瘡非似子啞絕然無語也蓋少陰之脈終於舌本九月腎脈養胎至其時胎盛阻遏其脈不能上至舌本故聲音細啞待

分挽之後腎脈上通其音自出矣

子啼腹內鐘鳴證治 黃連煎 腹內鐘鳴與哭子啼之證出偶然空房鼠穴土能治黃連煎湯亦可相 註 孕婦腹內有鐘

聲或嬰兒在內啼哭者名曰子啼古書雖載其證然不經見或偶然有之古方用空房中鼠穴土同川黃連煎湯名黃連煎

飲之自愈

臟燥證治 甘麥大棗湯 臟燥無故自悲傷者若神靈大棗湯甘草小麥與大棗方出金匱效非常 註 孕婦無故時時傷悲

哀痛象若神靈憑依者名曰臟燥宜用金匱甘麥大棗湯服之其方即甘草小麥大棗三味煎服其效非常也

鬼胎總括 邪思情感鬼胎生腹大如同懷子形豈緣鬼神能交接自身血氣結而成 註 鬼胎者因其人思想不遂情志相感

自身血氣凝結而成其腹漸大如懷子形狀古云實有鬼神交接其說似屬無據婦人石瘕腸覃二證亦俱如懷孕之狀由氣

血凝結而成則可知其必無是理矣

腸覃石瘕證治 香棱丸 腸覃石瘕氣血分寒客腸外客子門二證俱如懷子狀辨在經行經不行石瘕吳茱萸湯最效腸

覃香棱丸若神丁木苗香川棟子青皮廣茂與三棱 註 經云寒氣客於腸外與衝氣相搏氣不得榮因有所繫癥而內著惡

氣乃起瘕肉乃生始如鷄卵稍以益大如懷子狀按之則堅推之則移月事以時下石瘕生於胞中寒氣客於子門子門閉

塞氣不得通惡血當下不下衄以留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可孕而下由經文觀之二證雖皆

如懷子狀腸覃氣病而血不病故月事以時石瘕先氣病而後血病故月事不來也石瘕宜吳茱萸湯腸覃宜香棱丸即木

香丁香苗香川棟子青皮廣茂三棱醋煮麵糊為丸也 吳茱萸湯 方見首卷

胎前母子盛衰 母盛子衰胎前病母衰子盛產後病子母和平無衰盛坦然分娩不須忙 註 此言觀孕婦與所懷之胎有盛衰之辨

也若娠母氣血壯盛而胎元弱看胎前必多病若孕婦衰弱而胎元壯實則產後其母必多病若子母俱知子無偏盛偏衰則

胎前產後均平安無疾可地然無憂也 胎前有餘詳不足產後不足審有餘產後惟多虧損病胎前子母感衰知 古云胎前無不足產後無有餘此言其常也然胎前雖多有餘之證亦當詳察其亦有不足之時產後雖多不足之病亦當詳審其每挾有餘之證也欲知產後常多虧損之故於胎前子母感衰求之可預知也

胎前門彙方

保生湯 人參 甘草 各三錢半 白朮 香附子 烏藥 橘紅 各五錢 右劉每服三錢薑五片煎服

加味六君湯 人參 白朮 土炒 茯苓 陳皮 半夏 各一錢五分製甘草五分炙 藿香葉 枇杷葉 各一錢 縮砂仁 枳

殼各八分 右劉加生薑煎服

加味溫膽湯 陳皮 半夏 製 茯苓 各一錢 甘草 五分炙 枳實 竹茹 黃芩 各一錢 黃連 八分 麥冬 二錢 蘆

根一錢 右劉薑棗煎服

加味平胃散 厚朴 薑汁炒 蒼朮 米泔浸炒 陳皮 甘草 炙 人參 各一錢 右為末每服三錢加薑煎服

延胡四物湯 當歸 川芎 白芍 熟地 各五錢 延胡索 二兩酒煮 右劉水煎服

加味膠艾四物湯 當歸 熟地 阿膠 白芍 各二錢 杜仲 五錢 川芎 斷艾 各八分 右加葱白三寸大豆淋酒煎服

蜜硝煎 蜂蜜 芒硝 右煎溶化服

加味芎歸飲 川芎 二錢 當歸 五錢 人參 一錢 吳茱萸 五分 阿膠 二錢 斷艾 八分 甘草 炙 右劉水煎服

導赤散 生地 三錢 木通 二錢 甘草梢 一錢 燈心 一團煎服

五苓散 白朮 土炒 茯苓 豬苓 澤瀉 各二錢半 桂 三分 右劉作一服水煎服

茯苓導水湯 茯苓 檳榔 猪苓 縮砂 木香 陳皮 澤瀉 白朮 木瓜 大腹皮 桑白皮 蘇梗 各等分 右

加薑煎服 脹加枳殼 喘加苦葶藶子 腿腳腫加防已

知母飲 知母 麥冬 甘草 各五錢 黃耆 子苓 赤苓 各七錢 右吹咀每服四錢水一盞煎至七分去滓入竹瀝一