

博物彙編 藝術典

古今圖書集成

中華書局 已蜀書社

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百三十卷目錄

醫部彙考二百十

後陰門四

單方

鍼灸

導引

醫案

藝術典第二百三十卷

醫部彙考二百十

後陰門四

單方

大腸脫肛烏龍尾同鼠屎燒烟於桶內坐上熏之數

次即不脫烏龍尾即梁上塵也

風熱脫肛鐵粉研同白蠟末傳上按入

虛冷脫肛石灰炒熱故帛裏坐冷即易之

大腸脫肛磁石半兩火煨酢泮七次為末每空心米

飲服一錢

又方用磁石末麝糊調塗臍上入後洗去

大腸脫肛苦參五倍子陳壁土等分煎湯洗之以木

賊末傳之

痔痢脫肛冷水調黃連末塗之

大腸脫肛蛇牀子甘草各一兩為末每服一錢白湯

下日三服并以蛇牀末傳之

老小脫肛香附子荆芥穗等分為末每服一匙水一

大碗煎十數沸淋洗之

下血脫肛白雞冠花防風等分為末糊丸梧子大空

心米飲每服七十九

又方白雞冠花炒櫻櫚灰羌活一兩為末每服二錢

米飲下

肛門腫痛生芋根搗爛坐之

大腸脫肛木賊燒存性為末摻之按入即止一方加

龍骨

脫肛不收莖荳子炒研傳之

大腸脫肛曼陀羅子連殼一對像斗子十六箇同剉

水煎三五沸入砂硝少許洗之

大腸脫肛生苦薏搗汁溫服之以猪肉汁洗手按之

令暖自入

久痢脫肛女萎切一升燒熏之

大腸脫肛木便頭連皮子切炒茯苓猪苓等分為末

每服二錢米飲下亦治夢遺名鎖陽丹

脫肛不收蒲黃和猪脂傳日三五度

大腸脫肛用紫浮萍為末乾貼之

脫肛不收生韭一斤切以酥拌炒熱綿裹作二包更

互熨之以入為度

大腸脫肛生藥煎搗實臍中束覺有痛即除

諸痔痔漏久不結痂用生薑連皮切大片塗白礬末

炙焦研細貼之勿動

痔漏脫肛胡荽子一升粟糠一升乳香少許以小口

瓶燒烟熏之

凡大人小兒脫肛每天冷及吃冷食即暴痢不止肛

則下脫久瘰不瘳者春間收紫葢花二斤曝乾為散

加磁末末七兩相和研細塗肛上納入即使人噤冷

水於面上即吸入腸中每日一塗藥噴面不過六七

度即瘳又以熱酒半升和散一方寸匕空腹服之日

再漸加至二方寸匕以瘳為度若五歲以下小兒即

以半杏子許和酒服之忌生冷陳倉米

穀道生瘡若葉搗爛棉裹納之下部日三次

脫肛瀉血不止用桑黃一兩熟附子一兩為末煉蜜

丸梧子大每米飲下二十九

大腸脫肛久積虛冷以鼈頭炙研米飲服方寸匕日

二服仍以末油調塗臍上托入

大腸脫肛蟻蟻燒存性為末入冰片研勻摻肛上托

之即入

痔漏脫肛每日空心嚼川椒一錢凉水送下二三次

即收

大腸脫肛脫下三五寸者用大田螺二三枚將井水

養三四日去泥用雞爪黃連研細末入唇內待化成

水以濃茶洗淨肛門將雞翎蘸掃之以軟帛托上自

然不再復發也

腸頭挺出蟾蜍皮一片瓶內燒烟熏之并傳之

陽證脫肛以荊芥生薑煎湯洗之用地龍蟾如錢樣

者去土一兩砂硝三錢為末油調傳之

大腸脫肛狗涎抹之自上

大腸脫肛蝸牛殼去土研末羊脂鑄化調塗送入即

愈

大腸脫肛炙麻鞋底頻按入仍以故麻鞋底隨頭各

一枚燒研傳之按入即不出也

脫肛不收貼水荷葉焙研酒服二錢仍以荷葉盛末

坐之聖藥

大腸脫肛蝟皮一斤燒磁石煨五錢桂心五錢爲末每服二錢米飲下方氏集

脫肛痔疾五倍子半斤燒烟熏之或水煮極爛盛坐桶上熏之待溫以手輕托上內服參芪升麻藥方氏集又方用五倍子百草霜等分爲末酢熬成膏鵝翎掃傳上即入下回方

瀉血脫肛石耳五兩炒白枯礬一兩密陀僧半兩爲末蒸餅丸梧子大每米飲下二十九

下痢脫肛橡斗子燒存性研末猪脂和傳方氏集又方橡斗殼燒存性研末猪脂和搽并煎汁洗之

大腸脫肛不蛙皂角五挺搥碎水浸取汁二升浸之自收上收後以湯盪其腰肚上下令皂角氣行則不再作仍以皂角去皮酥炙爲末棗肉和丸米飲下三十九方氏集

大腸脫肛黃皮桑樹葉三升水煎帶溫罨貯之方氏集坐板瘡疥絲瓜皮焙乾爲末燒酒調搽之方氏集脫肛不收五花椿葉陰乾爲末每服二錢米飲調下

象塗腸頭方氏集大腸久積虛冷每因大便脫肛用蝟牛一兩燒灰猪脂和傳立驗

又方治上證及痢後脫肛用乾蝟牛一百枚炒研每用一錢以飛過赤汁磁石末五錢水一盞煎半盞調服日三

泄痢脫肛已久者黑聖散主之太蜘蛛一箇乾葉兩重包紮定燒存性入黃丹少許爲末先以白礬葱椒煎湯洗拭乾以前藥末置軟帛上托入收之甚是有

效也方氏集

鷹嘴爪炙入麝香煎酥爲末酒一盞服之治痔漏有驗王右軍

肛門腫痛欲作痔瘡急取屠刀磨水服之甚效方氏集腎生濕瘡日以新磚坐之能去濕氣方氏集

痔瘡腫痛鉛白霜白片腦各半字酒調塗之隨手見效方氏集

外痔腫痛黃丹滑石等分爲末新汲水調日五上之漏瘡不合童尿製爐甘石牡蠣粉外塞之內服滋補

藥方氏集痔漏腫痛無名異炭火煨紅米酢淬七次爲細末以溫水洗瘡綿裹筋頭填末入瘡口數次愈方氏集

痔瘡有蟲并漏古礪石灰川烏炮等分爲末燒飯丸梧子大每服二三十丸食前酒或米飲下方氏集

痔瘡熱腫用鴨嘴青膽礬研蜜水調傳可以消脫方氏集

一切漏瘡有孔用信石新瓦火煨研末以津調少許於紙燃上插入使去惡管漏多勿齊上最妙方氏集

一切漏瘡故布裹鹽燒赤爲末每服一錢方氏集痔瘡漏瘡白礬青鹽各四兩爲末猪尿脬一箇盛之陰乾每服五錢空心溫水下方氏集

冷瘡成漏明礬生牛熟熟者生肉生者追膿五靈脂水飛各五分爲末以皮紙裁條啞和末作小捻子香油捏濕於末上拖過剪作大小捻安入漏內早安

午換候膿出盡後有些少血出方得乾水住藥自然生肉痊好

外痔腫痛白頭翁草一名野丈人以根搗塗之逐血

止痛方氏集

雞冠痔疾黃連末傳之加赤小豆末尤良方氏集痔病祕結用此寬腸黃連枳殼等分爲末米糊丸梧子大每服五十九空米飲下方氏集

脫肛取東壁土湯泡先熏後洗亦治小兒脫肛痔瘡瘰癧不可忍胡黃連末鵝膽汁調搽之方氏集

下部漏瘡苦參煎湯日日洗之方氏集痔瘡腫痛不可忍蛇牀子煎湯熏洗方氏集

痔漏出血香白芷爲末每服二錢米飲下并煎湯熏洗神效方氏集

痔瘡腫痛先以皂角烟熏之後以鵝膽汁調白芷末塗之即消方氏集

痔瘡腫痛鬱金末水調塗之即消方氏集痔漏腫痛荆芥煮湯日日洗之方氏集

野雞痔病先以槐柳湯洗過以艾灸上七壯取效方氏集

酒痔便血青蒿用葉不用莖用莖不用葉爲末糞前冷水糞後酒水調服方氏集

痔疾下血益母草葉搗汁飲之方氏集五痔肛腫久不愈變成漏瘡用雞冠花鳳眼草各一兩水二碗煎湯類洗方氏集

腸痔下血多年不止用木賊枳殼各二兩乾薑一兩大黃二錢半並於饒內炒黑存性爲末每粟米飲服二錢甚效也方氏集

痔漏瘡發早蓮草一把連根類洗淨用石臼搗如泥以極熱酒一盞沖入取汁飲之查傳患處重者不過三服即安累治有效方氏集

痔瘡腫痛連綿前湯藥洗後以刀上飛過絲繫入磨香貼之方集

痔瘡腫痛扁竹搗汁服一升一二服未瘥再服亦取汁和麪作餅食日三次方集

內痔不出草烏為末津調點肛門內痔即翻出乃用枯痔藥點之方集

下部膿蟲痛痒膿血旁生孔竅蟻蟯七枚五月五日收者新牛糞半兩肥羊血一兩炒黃同搗成膏丸蓮子大炙熱綿裹納肛中半日即大便中蟲出三四度永瘥

穀道赤痛或痔如蟲咬莧絲子炒黃黑為末雞子白和塗之方集

肛門痔痛用木龍仁三枚砂盆搗如泥入百沸湯一椀乘熱先熏後洗日用三次仍塗少許方集

又方用木龍仁帶潤者雄雞各五箇乳細作七丸槐覆溫處勿令乾每以一九唾化開貼痔上其痛即止

一夜一丸自消也屢用有效方集

痔瘡腫痛以馬兜鈴於瓶中燒烟熏病中夏日華本草

五痔下血槌藤子燒存性米飲服二錢有功方集

痔漏有蟲黑白牽牛各一兩炒為末以猪肉四兩切碎炒熟蘸末食盡以白米飲三匙壓之取下白蟲為效

又方白牽牛頭末四兩沒藥一錢為細末欲服藥時先日勿夜飲次早空心將猪肉四兩炙切片蘸末細細嚼食取下膿血為效量人加減用忌酒色油膩三日

漏瘡水淫乃腎虛也牽牛末二錢半入切開猪腎中

竹葉包定煨熟空心食溫酒送下借腎入腎一縱一橫兩得其便惡水既泄不復淋瀝

一切漏疾王瓜根搗傳之燥則易方集

腸風痔漏用草薢貫衆去土等分為末每服三錢溫酒空心服之方集

痔瘡腫痛威靈仙三兩水一斗煎湯先熏後洗冷再溫之方集

瘡久成漏忍冬草浸酒日日常飲之方集

瘡血內漏蒲黃末二兩每服方寸匕水調下服盡止方集

腸痔出血蒲黃末方寸匕水服之日三服

痔瘡腫痛虎耳草陰乾燒烟桶中熏之

痔瘡腫痛鵝不食草搗貼之

痔瘡出血雀林草一大握水二升煮一升服日三次見效方集

痔瘡風腫作痛胡麻子煎湯洗之即消

一切漏瘡鹽麪和團燒研傳之方集

下血成痔稻葉燒灰淋汁熱洗三五度瘥方集

五痔作痛胡荽子炒為末每服二錢空心溫酒下數服見效或水薤取汁冷服半升日二方集

肛門腫痛馬齒莧菜三葉酸草等分煎湯熏洗一日二次有效方集

痔瘡初起馬齒莧不拘鮮乾煮熱急食之以湯熏洗一月內外其孔閉即愈矣方集

痔瘡腫痛魚膽草一握煎湯熏洗仍以草挹痔即愈

又方魚膽草煎湯熏洗後以枯礬入片腦少許傳之痔瘡腫痛苦壺盧苦實煎湯先熏後洗乃貼熊膽密陀僧膽礬片腦末良方集

肛門酒痔絲瓜燒存性研末酒服二錢方集

痔漏脫肛絲瓜燒灰多年石灰雄黃各五錢為末以猪膽雞子清及香油和調貼之收上乃止方集

五痔下血桑耳作羹空心煎食二日一作待孔卒痛如鳥啄狀取大小豆各一升合搗作兩藥蒸之及熱更互坐之即瘥方集

腸痔下血用槐樹上木耳為末飲服方寸匕日三服

五痔下血杏仁去皮尖及雙仁者水三升研濾汁煎減半同米煮粥食之方集

腸痔出血桃葉一斛杵納小口器中坐蒸之有蟲自出方集

五痔作痛桃根水煎汁浸洗之當有蟲出

又方用桃皮并葉杵爛水漬令濃去查盛盆中漬之蟲自出方集

痔瘡腫痛隔年曬乾燈子桶內燒烟熏之神效醫方
痔瘡腫痛批把葉蜜炙烏梅肉焙為末先以烏梅湯洗貼之集要

痔瘡出血燈子粉糯米各一升炒黃滾水調作果子取出蒸熟食之不過四五次效幸方

腸風血痔熱多者尤佳樹葉微炙研末一錢米飲調服未止再服衍義

螻蛄瀉疾樹葉燒存性研以米泔別浸樹葉取汁洗瘡後乃納灰少許於瘡中聖惠

蟲痔裏急檳榔為末每日空心以白湯調服二錢漏瘡惡穢大腹皮煎湯洗之直指

痔漏脫肛每日空心嚼川椒一錢涼水送下三五次即收救急

痔漏腫痛椒目一撮碾細空心水服三錢如神痔上

腸痔下血下部痒痛如蟲咬者掘地作坑燒赤以酒沃之搗吳茱萸二升入坑乘熱坐有孔板熏之冷乃下不過三四度愈附後

久近痔漏三十年者三服除根用蓮花蕊黑牽牛頭末各一兩半當歸五錢為末每空心酒服二錢忌熱物五日見效方後

漏瘡膿血白乳香二錢牡蠣粉一錢為末雪糕丸麻子大每薑湯服三十九直指方

血痔腸風血竭未傳之

內外痔瘡片腦一二分薑汁化搽之醫便

大腸脫肛緣桑蠶燒研和猪脂塗之立縮方正

九米飲下方生
又方葦葦子生用甘草炙為末每服二錢水煎服之

痔瘡腫痛諸蘆草根煎湯先熏後洗直指

內外痔瘡用槐角子一斗搗汁曬稠取地脂為末同前九梧子大每米飲服十九兼作槐子湯下或以苦參末代地脂亦可外要

外痔長寸用槐花煎湯頻洗併服之數日自縮集簡

腸風痔疾用槐葉一斤蒸熟曬乾研末煎飲代茶久服明目食醫

痔瘡有蟲作痒或如膿血多取槐白皮濃煮汁先熏後洗良久欲大便當有蟲出不過三度即愈仍以皮為末綿裹納下部中梅師

漏瘡腫痛柳根紅紫煎水日洗

一方用楊柳條罐內燒烟熏之出水即效

痔瘡腫痛楮葉半斤搗爛敷之方後

又方枳殼末入瓶中水煎百沸先熏後洗本草

痔漏出水用蛻螂一枚陰乾入冰片少許為細末紙然蘸末入孔內漸漸生肉藥自退出即愈唐氏

又方用蛻螂焙乾研末先以薑湯洗過貼之補珍

一切漏瘡不拘蜂蟻鼠蟻蛻螂燒末酢和傳千金

痔漏脫肛虎脛骨兩節以蜜二兩炙赤搗末蒸餅九梧子大每侵晨溫酒下二十九取效醫方

肛門凸出虎骨燒末水服方寸匕日三服治積年漏下

鵲巢藥燒研飲服方寸匕一日三服治積年漏下

不斷困篤者一月取效

十年痔瘡熊膽塗之神效一切方不及也外要

腸風痔瘡熊膽半兩入片腦少許研和猪膽汁塗之

坐板瘡疥生之麻細嚼敷之醫方

漏瘡不合以紙粘臘猪脂納瘡中日五夜三錢千金

藏毒下血新槐花炒研酒服三錢日三服或用槐白皮煎湯服普濟

痔漏疼痛用田螺一箇入片腦一分在內取水搽之

仍先以冬瓜湯洗淨乾時

藏毒下血苦楝子炒黃為末蜜丸梧子大米飲每吞十九至二十九方後

又方馬齒莧湯洗淨搗活螺螄敷上其病即愈補珍

痔漏神方赤白茯苓去皮沒藥各二兩破故紙四兩

石白搗成一塊春秋酒浸三日夏二日冬五日取出

木龍蒸熟曬乾為末酒糊丸梧子大每酒服二十九

漸加至五十九方後

腸風痔瘡下血年深日近者如聖散用臘月野狸一

枚蟠在罐內炒大蠟半斤甘草四兩猪牙皂莢二兩

同入罐內蓋定瓦上穿一孔鹽泥固濟煅令乾作一

地坑以十字瓦支住罐于用炭五秤煅至黑烟盡青

烟出取出濕土一宿為末每服二錢鹽湯下

又方以狸肉作羹其骨燒灰酒服醫方

痔瘡疼痛用赤足蜈蚣焙為末入片腦少許睡調傳之方

又方用蜈蚣三四條香油煮一二沸浸之再入五倍子末二三錢瓶收密封如遇痛不可忍點上油即時痛止大效方

痔瘡初起痛痒不止用紙襪烘熱熨之冷又易方

痔漏疼痛鯉魚鱗二三片綿裹如梨形納入坐之其痛即止方

腸風血痔用活鯽魚翅側穿孔去腸留鱗入白礬末二錢以櫻包紙裹煨存性研末每服二錢米飲下每日二服方

腸痔下血鱸魚作鱗以蒜煮食之忌冷毒物方

內痔出血鱸魚煮食即止其性涼也方

風痔腫痛發歇不定者是也白礬薑二兩洗剉炒黃為末烏梅肉和九梧桐子大每薑蜜湯空心下五九方

痔漏下血蠶紙半張碗內燒灰酒服自除方

肛門鼠痔蜘蛛絲纏之即落

諸痔發痒用全蠍不拘多少燒烟熏之即效方

痔瘡腫毒磨香當門子印城鹽等分塗之不過三次方

大腸痔疾蟾蜍一箇以磚砌四方安於內泥住火煨存性為末以猪廣腸一截繫定兩頭煨熟切碎蘸蟾末食之如此三四次其痔自落

血痔漏瘡鷺鷥一隻治如常法炙熟細切以五味酢食之作羹亦妙方

痢類脫肛黑色堅硬用巴豆殼燒灰芭蕉自然汁煮入砂少許洗軟用真麻油點火滴於上以枯礬龍骨少許為末搽肛頭上以芭蕉葉托入方

諸痔疼痛青蛙丸用青色蛙長脚者一箇燒存性為末雪糕和丸如梧子大每空心先吃飯二匙次以枳殼湯下十五九方

蟲蝕腎虧肛盡腸穿用青蛙一枚雞骨一分燒灰吹入數用大效方

痔漏有蟲用狗肉炙汁空腹服能引蟲也方

又方用熟犬肉煎鹽汁空心食七日效方

痔瘡下蟲不止者用瓶月砂慢火炒黃為末每服二錢入乳香五分空心溫酒下日三服方

痔瘡腫痛用蝸牛浸油塗之或燒研傳之方

腸風痔疾用槌皮及骨燒灰米飲空心服二錢甚者入紅雞冠花白礬為末和之方

腸痔有血賴肝燒末水服一錢方

脫肛不收舊根石榴皮各一握酒一盞煎七分溫服方

花上粉主治諸蟲瘻惡瘡痔疾納之方

腸痔氣痔出膿血用穿山甲燒存性一兩肉豆蔻三枚為末每米飲服二錢甚者加蟬皮灰一兩中病即止方

鼠痔成瘻腫痛用穿山甲尾尖處一兩炙存性鹽甲酥炙一兩麝香五分為末每服一錢真茶湯服取效方

諸漏有膿蛇蛇灰水和傳上即蟲出方

一切冷漏白死蛇取骨為末封之大痛以杏仁膏摩之即止方

大腸氣痔作痛下血百藥煎末每服三錢稀粥調服日二天方

五痔下血蠅皮三指大雄黃如聚大熟艾一錢穿地作坑調和取便熏之口中有烟氣為佳火氣稍盡即停三日將息更熏之三度末瘻勿犯風冷羹薩將養切忌雞魚猪生冷二十日後補之方

腸痔有蟲蠅皮燒末生油和塗方

痔瘡成漏膿水不止用羊羔兒膏鹽泥固濟煨過研末五錢入麝香雄黃末各一錢填瘡口三日外必令

下部漏痔大露蜂房燒存性研搗之乾則以真菜子油調方

五痔及腸風脫肛五倍子白礬各五錢為末順流水九如梧子大米飲下七九方

漏血不止水蛭炒為末酒服一錢日二服惡血清即愈方

殺道生瘡久不愈用雞膽胚燒存性為末乾貼之如神方

肛門生瘡蓋肛門主肺肺熱即肛寒腫痛生瘡白蜜一升猪膽汁一枚相和微火煎令可丸九三寸長作挺塗油納下部臥令後重須臾過洩方

痔瘻出水用牛膽蠅膽各一枚賦粉五十文麝香二十文以三味和勻入牛膽中懸四十九日取出為丸如大麥大以紙燃送入瘡內有惡物流出為驗方

鼠乳痔疾牛角鯉燒灰酒服方寸匕方

脫肛五倍子末三錢白礬一塊同煎湯先熏後洗又取末摻肛托入

諸痔腫痛蠶繭內入男子指甲令滿外用童子頂髮纏裹燒存性研末蜜調傳之仍日日吞牛膽製過槐子甚效

九漏有蟲乾人屎乾牛屎隔綿貼之蟲聞其氣即出若痒則易之蟲盡乃止

蟲食肛爛見五臟者即死以猪脂和馬蹄灰綿裹導入下部日數度瘻方

內外痔瘡片腦一二分葱汁化搽之

一切漏疾白馬通汁每服一升良方

治血痔用地榆皮為細末每服二錢食前米飲調下日三服

痔漏脫肛生鐵一斤水一斗煮取五升日再洗

治痔以白芷黃白芋作線快手緊繫痔上微疼不妨其痔自然乾癢而落

臟毒下血車前草連根一握生薑一小塊新水研碎取汁候血欲下時腰間必覺重便服一盞血即止甚

者不過再服

痔漏蝨蝕肛門熟艾一團雄黃少許同燒灰以竹筒納下部引烟熏之良方

血痔取雞冠花不拘多少濃煎湯空心服一盞
腸風血痔及脫肛木賊槐花及桑耳水煎脫肛為末摻肛托上
五痔及腸風臟毒槐花炒水煎服或同荊芥側柏葉為末米飲下二三錢名曰槐花散
五痔及腸風臟毒槐實剉為末米飲下一錢或密丸

服亦佳
槐木上耳治諸痔及腸風臟毒取耳為末米飲下一錢日三

五痔及腸風下血痔漏桑耳二兩粳米三合煮粥空心食之

桑樹木上寄生治腸風痔漏如神取葉乾為末水酒米飲任下一錢或為丸服亦佳

馬蘭根治痔漏取根研細傳上片時看肉平去藥稍遲恐肉反出以爐甘石煅牡蠣粉末塞之

血痔腸風臟毒取栲根白皮人參等分為末空心米飲下二錢佳

腸痔及痔漏取有子蜂房焙乾為末麝香和九梧子大空心酒下二三十丸

五痔漏瘡取雙鱸魚治如食法煮熟入椒鹽醬調和食之

血痔腸風臟毒取栲根白皮切酒洗蜜炒為末粟肉和丸酒下三五十丸

酒痔下血取蘿蔔二十枚留葉寸許及根入罐內水煮極爛以薑鹽酢醃空心食之立止

肛門脫出取胡荽切一升燒熏之即入又酢煮熨之亦效

肛門熱腫取青葱葉刮取涎對停入蜜調勻先以藥水洗後敷痔上其冷如冰

治瘻取冬瓜藤濃煎湯熏洗即愈

痔漏取啄木鳥燒為末納孔中不過二三度瘻
諸痔臘月牛脾一具熟食之勿與鹽醬未瘻再吃
五痔痔漏腸風脫肛一切痔病取蠟皮燒為末米飲

下一錢空心服
痔漏瘻骨炙和麝香雄黃為丸服或為末酒下二錢十服見效

五痔痔瘻蹄甲不拘多少燒為末米飲下二錢名曰猪甲散

血痔腸風瀉血取野猪肉二斤切著五味炙熟空心食之作羹亦得又取外腎連皮燒作末米飲空心下即止

痔漏陰蝕爛瘻取鼠尾燒為灰空心米飲下二錢又取油塗之妙

痔漏濕匿猪膽一枚苦酒一合同煎三兩沸滿口飲之蟲立死即愈或灌肛內亦下蟲及惡物

大腸熱腫木鼈子五倍子研末蜜水調敷

塞漏孔方如痔漏有瘻用赤石脂白石脂枯白礬黃丹腦子同為末塞之或飯和搽條插入

痔漏祕方用煉蜜半盞入熊膽一分再煉入水成珠不散將猪鬃裹燃成燃子將蜜塗在燃子上仍用片腦熊膽各半研細搽在燃子上插入漏眼內底至盡頭則止如服多醫得一箇又醫一箇不可一齊

上藥如見外皮潰爛用黃蠟黃丹麻油煎膏貼瘻上縛緊一七日效

取朽骨久疽及痔漏烏骨雞脛骨以上等雜黃實之鹽泥固濟火煨通紅取出地上出火毒去泥用骨研細飯丸如粟大以紙撚送入孔中瘻內更用膏藥貼之

痔漏用蠶魚腸以五味炙熟貼之良久蟲出即去之

三次盡出

痔漏用蠶魚腸以五味炙熟貼之良久蟲出即去之

痔瘡有蟲蟻蛭生搗為丸塞肛門中引蟲出盡末差便毒用木髓子大黃苦薤桃仁草龍膽石咬咀濃煎露星月一宿侵早溫服立愈

又方白蠟蠶槐花為末酒調服一方加酒大黃

痔漏反花馮血者用狐手足一副陰乾穿山甲蝟皮各三兩黃明膠白附子五靈脂蜀烏頭川芎藕乳香各二兩剉細入砂鍋內固濟候乾炭火煨紅為末入木香末一兩以芫荽煎酒調下二錢日三服屢效

方針

治濕置方取生薑刮去皮斷理切之極熟研取汁一升半又以水一升半合和先得平旦空腹服之仍削生薑二枚如蘭大以楸葉苦桃葉數重裹訖於爐灰中燒令極熱內下部中食頃若溫盛者三日一作頻服無有不瘥

治鼻蝕下部方胡粉雄黃二味各等分為末著穀道中亦治小兒濕匿

治傷寒熱病多睡變成濕置四肢煩疼不得食方羊桃十斤切搗以熟暖湯三斗淹浸之日正午時入中坐一炊久不過二度瘥

下部蟲匿病人齒無色唇上白喜睡憤憤不知痛痒處或下痢乃下部生蟲食肛也桃仁十五枚苦酒二升鹽一合煮六合服之

下部蟲瘡桃白皮煮取濃汁如稀湯入熊膽少許以綿蘸藥納入下部瘡上

臟毒下血烏犀散用淡豉十文大蒜二枚煨同搗丸梧子大煎香茶湯服十二丸日二服安乃止末絕根本無所忌

治腸隨肛出轉廣不可入方生苦薤根為粉以猪脂膏溫塗隨手押按自得縮入

治積冷利脫肛方枳實一枚石上磨令滑澤鑽安柄蜜塗炙令暖熨之冷更易取縮入止

痔漏脫肛累棟和諸藥熏之時

瘡毒欲作未作之時服之立消牙皂七片炭火煨黃色去皮陰地上去火毒為末酒下

痔漏祕方用牡蠣二兩煨過入地坑埋之去火氣為末若溫乾摻若乾以津調搽痔上

痔漏鯽魚一箇去腸入白礬令滿合之於瓦上燒過為末以雞羽掃藥敷之立效

諸痔用蠅姑五枚搗碎水銀一錢麝香冰片各五釐用銀替蘸汁滴患上

痔漏用團魚一枚扯出頭殺之取血即將團魚頭燒灰為末血為丸如棗核大諒痔大小為之入內

漏孔不合用石楠葉煎湯放在桶內熏洗待湯通手就將漏洗淨後將黃牛面前牙齒四枚裝在小瓶內

用水屑燃之待白烟出為度取出研末用津液蘸牙末點入漏孔處出黃水為效黃牛牙齒須預製備用

痔貼藥之後恐毒水未盡將槐米一兩炒黃色用水一鍾煎至七分加酒半鍾溫服之痔永不發矣

治下部生蟲者桃皮煎如饌取內下部口中有瘡含之千金

股陰瘻瘻無名異二錢麝香一字研酒半盞午後空腹服立效

治大孔蟲痒方蒸大棗搗膏以水銀捻和長三寸綿裹內大孔中明日蟲皆出也然水銀損腸胃宜慎之

痔瘡

痔漏用青荷葉燒灰為末空心酒下三錢

又方用金銀藤并花為末每日酒下三錢

五痔及腸痔下血蠶魚作脂和薑養食之又和五味作羹食之亦佳

五痔及血痔鯽魚作脂和薑酢芥醬食之又作羹飽食良

熏痔方用大雄雞宰去血在湯鍋內燂去毛取出雞將此燂毛垢湯燒之二沸傾在淨桶內蓋定俟少溫

將陽物放桶上坐緊熏之候湯溫洗痔淨拭乾隨將蜈蚣一條碾末艾二錢和捻成條放馬桶內坐熏之

其痔焦熱尤妙新生者一兩次得愈久生者五次得愈加蜈蚣并艾熏後隨服益氣清臟湯秦光蒼水湯調治之

洗痔方馬蘭頭一斤皮硝四兩煎滾坐熏候湯溫洗之

又方牛膝搗爛煎洗之

又方水紅花子打碎煎湯洗之

又方魚腥草煎湯洗之

又方白地菰煎湯洗之

下部生瘡已決洞者牡丹末湯服方寸匕日三

治男女脫肛用五倍子荆芥小便濃煎洗之

治腸風并脫肛及有血用蛇牀子不拘多少炒為末貼大腸脫垂處立收甚妙

治諸般痔脫肛以死蛇一條如指大濕者用掘地坑燒之將有孔板蓋坑上坐熏烟絕為愈

大腸脫肛權皮或葉煎湯熏洗後以白礬五倍末傳之方

腸頭出用皂角熏大用蜈蚣一箇入蜜浸去蜈蚣將蜜調土硃傳上即入

治殺道赤痛熬杏仁杵作膏傳之良愈

患五種痔水研山豆根服

治痔瘡用半新馬桶一箇入新磚一箇放桶底上再用新磚一箇燒紅於磚上用全蠟兩三枚燒烟患人坐桶上熏之二三次即愈

穿腸痔漏極痛魚鱗搗如泥貼之其痛即止用藥

痔瘡便血用活鯽魚一箇八兩重者洗淨鱗尾腸肚皆不去用椶皮二兩洗淨寸截先將椶一兩鋪在瓦罐內次安魚上面却將椶一兩蓋之罐口黃泥固濟火畔炙乾量罐大小開一地坑先安小磚一片後坐罐子四面用炭火七斤燒煨候烟絕取罐於淨地以瓦盆合定淨土壅勿令透氣經一宿出火毒取藥細研每服一錢食前用米飲調下忌動風之物

治痔瘡痛不可忍者木綿花煎湯旋入朴硝乘熱熏之候溫浸之單用硝水極妙

又方用槐花艾葉荊芥枳殼水煎入白礬末打勻熏洗從前

腸風痔漏有蟲如絲黑頭取去除根羅麥半升牙皂角一寸共為末入猪腰子一雙內米泔煮空心食之少頃肚痛上攻蟲皆隨出作地坑埋之薄粥補之

治五痔方蒼耳莖葉以五月五日採乾為末水服方寸匕或九桐子大服之立效千金方

洗痔方輕者用朝東馬齒莧劉寄奴濃煎湯熏待溫

却用手洗拭乾重者加大青葉梗乾者一半同煎痔瘡用灰莧菜根濃煎湯先熏後洗

又方取河水頓洗用蝸牛塗之

一治痔瘡用雄雞膽片腦和勻貼之

肛門邊腫硬痛痒用白礬三分碎研用熱童便二盞化開洗痔上一日二三次洗之

治痔瘡痛不可忍以枸杞根杵爛煎湯熏洗痛立止今古

肉痔腫痛朝陽黃土黃連末皮硝各一兩用猪膽汁同研如泥每日旋丸棗大納入肛門過一夜隨大便去之內服烏梅黃連二味丸藥孫氏集效方下

痔瘡腫痛孩兒茶麝香為末唾津調傳

脫肛氣熱孩兒茶二分熊膽五分片腦一分為末人乳搽肛門上熱汁自下而肛收也亦治痔瘡並痔方

漏瘡腫痛猪膽七箇細臙脂十箇清水和勻搽七次即可收愈

吐血痔血向東囊荷根一把搗汁三升服之方用後

臟毒下血黃連為末獨蒜蒜根研和九梧子大每空心陳米飲下四十九方生

酒痔下血黃連酒浸炙熟為末酒糊丸梧子大每服三四十丸白湯下一方用自然薑汁焙炒集學方

臟毒赤白地錦草洗暴為末米飲服一錢立止方經驗

鍼灸
靈樞曰熱病頭痛顙顙目瘳脈痛善衄厥熱病也取之以第三鍼視有餘不足寒熱痔
甲乙經曰痔痛攢竹主之
痔會陰主之凡痔與陰相通者死陰中諸病前後相引痛不得大小便皆主之
痔皆蝕商丘主之
痔纂痛飛揚委中及承扶主之
痔纂痛承筋主之
脫肛下利氣衝主之
千金方曰飛揚主痔纂傷痛
絕骨主癢馬刀腹腫
天突章門天池支溝主漏
商丘復溜主痔血泄後重
勞宮主熱痔
承筋承扶委中陽谷主痔痛腋腫
久冷五痔灸脊中百壯
五痔便血失尿灸回氣百壯穴在脊窮骨上
病寒冷脫肛出灸臍中隨年壯
脫肛歷年不愈灸橫骨百壯又灸龜尾七壯龜尾即後窮骨是也
痔瘍全書曰臟毒初起微腫即用濕蚯蚓糞捻成餅如錢厚放患上艾壯如半粒豆大者燒之微熱即去再換餅燒之再易如前法以十四壯為期外用冰香散搽之
虛人脫肛夫冬至前天道嚴寒其氣極沉極降之際况人身小天地天在上人居中地居下豈不相應乎

治之不能即奏功也陽生後日長一線陽漸長陰漸消矣宜用灸法治之無不效者病人亦要戒氣少勞爲上策擇晴明和暖吉日在不通風淨暖室中坐臥取頂上旋毛中百會穴以舊一匕捺上艾灸三壯隨服升元大補湯其肛漸收矣蓋百會爲一身之樞紐大能升提下陷之氣故能奏功若冬至前不可灸灸之何益次日再灸尾骶骨又灸臍中隨年壯此法余用之甚效諸痔漏亦治之

丹溪心法曰凡痔瘡先取頭垢捏成餅子安痔頭上其上又安大蒜一片以艾灸之

又痔痛以附子末津唾和作餅子如錢大安漏上以艾灸令微熱乾則易以新餅再灸明日又灸直至肉平爲效

醫學綱目曰脫肛取大腸俞百會長強肩井合谷氣衝

針灸痔獨取足太陽經云足太陽之脈所生病者痔瘡視虛熱寒陷下取之蓋後世取承山穴者是也其二論督脈而不見其取法經云督脈生病癰痔蓋後世取長強穴是也

痔漏下血裏急後重或痒或疼二白在掌後橫紋上四寸手厥陰脈兩穴相並一穴在兩筋中一穴在大筋外針入三分瀉兩吸

又法取長強一寸大痛方到穴瀉三吸如灸可七壯雖久不愈者亦效

又法取承山二寸半補一呼如灸可七壯

古今醫統曰命門一穴脊在中與臍相對灸七壯治五種痔病

又法長強一穴在尾骶上隨年壯灸之治五痔便血最效

又法治痔疾大如黃瓜貫於腸頭發則僵仆以荊芥湯洗之次以艾灸其上三五壯若覺一道熱氣入腸中大瀉鮮紅血穢一時許痛後其疾乃愈

又法治痔初起痛痒不止以舊布鞋底烘熱頻熨之痛痒處冷則再烘熨其痛痒立止

脫肛灸長強穴三壯愈臍中隨年壯百會一穴在頂中灸三壯治小兒脫肛

導引

古今醫統曰痔漏乃氣血下墜衝突爲痔既不能坐又不能行立惟導引之法可愈矣其法高枕偃臥息心調氣氣定其腫自收

又法兩手抱足頭不動足向口受氣衆節氣散來去三七欲得提左右側身各急挽腰不動去四肢腰上下氣血凝滯髓內冷血冷筋急痔漏腫痛

又法兩足相踏向陰端急蹙將兩手捧膝頭兩向急勢捧之二十七身側兩向取勢二七前後努腰七去心勞痔病

又法踞坐合兩膝張兩足不息兩通治五痔又法一足踏地一足屈膝兩手抱膝鼻下急挽向身極勢左右換易四七去痔五勞三里氣不下

保生祕要曰痔瘡導引法於尾閭骶骨間長強穴上掐六十四度擦亦如數兼用吸提呵法自爾安樂運動坐定息均注念存瘡吸提咽濁九口再凝良背

法運尾閭運瘡百徧復升腰逾運二七數逐日行功不問自去患根

痔漏導引法依患處念推而散之復兩手抱兩膝吹而吸之

又法吹而散之各六徧旋轉其皮膚患處想火燒之次升湧泉水入肺經推而散之

良背法靜坐片時將萬慮掃除凝神定志於本穴之中昔之腔子裏平心元慮處初從口念太乙救苦而漸歸於心歸於背存無守有念茲在茲有復冥於無神自虛而靈矣

醫案

瘡瘍全書曰一人患痔每日食海螺蛸半升因鹹以苦茶漱口納及一斗又能清心寡慾痔即消矣痔乃臟火屬陽海螺蛸乃性寒味鹹屬陰寒能敵火鹹能軟堅茶又苦涼之味殆有理也

儒門事親曰趙君玉常病痔鳳眼草刺蝟皮槐根埋首之類皆用之或以乾薑末塗指肉炙食之大便燥結不利且腫後數日因病黃予治令大瀉瀉數次

不言痔作麻先生偶記而書之君玉自識戴人之後痔更不發耳

丹溪心法曰許孺人產後痔作瘡有頭如蒜頭大或下鮮血或紫血大便疼與黑神散又多食肉大飽此濕熱在大腸所爲以榔杏仁麻仁槐角各七錢枳實皂角仁各五錢蒼朮歸尾生地各三錢大黃炒一錢

分六貼內三樣仁另研煎服而愈

醫學綱目曰一女子脫肛以糯米濃煎汁洗肛將磚燒紅沃酢青布鋪其上令溫和坐布上肛自吸入唐峽州王文顯充西路安撫司判官乘驛入駱谷有

痔疾因此大作其狀如胡瓜貫於腸頭熱如湯灰火至驛僱仆主驛吏云此病予曾思來須灸即瘥用柳枝濃煎湯先洗痔便以艾炷其上連灸三五壯忽覺一道熱氣入腸中因轉瀉鮮血穢物一時出至痛楚馮後遂失胡瓜所在登驛而馳去

薛氏醫案曰一人不慎酒色患痔瘡腫肛門墜痛下血便燥脈洪大而滑以當歸榔杏仁湯加桃仁四劑少愈更以四物湯加紅花桃仁條芩槐花數劑而愈一人素有痔勞役便脫肛腫痛出水氣下陷也用

補中益氣湯加茯苓芍藥十餘劑中氣復而愈後復脫作痛誤服大黃九腹鳴惡食幾危余用前湯加炮薑芍藥漸愈後去薑加熟地五味二十餘劑而愈

一人脾胃素弱或因勞或入房肛門即下腫痛甚用補中益氣湯加麥冬五味兼六味丸而愈後因過飲下墜腫痛誤用降火消毒虛證蜂起余用前湯加炮薑木香一劑再用前湯并加減八味丸兩月而安

一男子患痔大便秘結瘡痛作渴脈數按之則實以秦艽蒼朮湯二劑少愈更以四物湯加芩連槐花枳殼四劑而愈

一人患痔成漏每登廁則痛以秦艽防風湯加條芩枳殼四劑而愈以四物加升麻芩連連刺防不復作

一男子患痔漏每登廁則肛門下脫作痛良久方收以秦艽防風湯數劑少愈乃去大黃加黃芪川芎芍藥而痛止更以補中益氣湯二十餘劑後再不脫

一婦人患痔腫瘡痛甚以四物湯加芩連紅花桃仁牡丹皮四劑少止又數劑而愈

黃連治之即愈後因大勞瘡腫痛經水不止脈洪大按之無力此勞傷血氣火動而然也用八珍湯加芩連蒲黃二劑而止後去蒲黃芩連加地骨皮數劑而安丹溪云婦人崩中者由臟腑傷損任二脈血氣俱虛故也二脈為脈經之海血氣之行外循經絡內營臟腑若氣血調適經下依時若勞動過極臟腑俱傷衝任之氣虛不能約制其經血故忽然而下謂之崩中暴下治宜大補氣血之藥調養脾胃微加鎮壓心火之藥治其心補陰瀉陽經自正矣

一男子有痔漏每登廁肛脫良久方上診其脈細而微用補中益氣湯三十餘劑遂不再作丹溪云脫肛屬氣熱氣虛血熱血虛

一男子腎虛漏口乾發熱喜癢不清稀脈來遲緩以豆豉餅灸及服八珍湯加麥門冬五味子軟柴胡地骨皮三月餘而愈後因不慎房勞復潰膿清脈大請辭不治果及河間云因病致虛則為輕蓋病勢尚淺元氣未虛也至病初愈而勞復或飲食勞倦或房勞七情六慾陽痿陰弱加致羸損此因虛致損則為重病勢已過元氣已索故也

一男子痔瘡腫痛便血尤甚脈洪且瀉經云因而飽食筋脈橫解腸胃為痔蓋風氣通於肝肝生風風生熱風客則淫氣傷精而成斯疾遂與黃連當歸黃芪生地黃防風枳殼白芷柴胡槐花地榆甘草治之漸愈大以黃連九而瘥又姜生便血數年百藥不應而

召接黃眼花頭眩亦以黃連九治之而平曹銓因飲法酒肛門腫痛便閉脈實服利防敗毒散不應予用黃連內疏湯而愈

一男子患痔脈浮鼓午後發熱作痛以八珍湯加黃芪柴胡地骨皮治之稍可彼欲速效用劫藥蝕之痛甚絕食而歿夫瘡之潰斂氣血使然也脈浮鼓日痛此氣血虛也丹溪云瘡口不合用大劑參芪米歸芎補之外以附子餅灸之更以補藥作膏貼之

一男子年踰四十有痔漏大便不實服五苓散愈加泄瀉飲食少思予謂非濕毒乃腸胃虛也當以理中湯治之彼不為然仍服五苓散愈甚復請予乃以理中湯及二神丸月餘而平

李達因痔瘡怯弱以補中益氣湯少加芩連枳殼治之稍愈後因怒加甚時仲冬脈得洪大予謂脈不應時此乃腎水不足火來乘之藥不能治果歿於火旺之月常見患痔者腎脈不足難治

劉商有痔肛門脫出此濕熱下注真氣不能升舉診其脈果虛遂以四君子湯加黃芪芎歸蒼朮黃蘗升麻柴胡服之更以五倍子煎湯熏洗彼以爲錢乃用砒霜等毒藥蝕之而歿夫劫藥特治其末且能伐真元鮮不害人慎之慎之

徐生因痔氣血愈虛飲食不甘小便不禁夜或遺精此氣虛兼濕熱而然非瘡故也以補中益氣湯加山茱萸山藥五味子兼還少丹治之而愈

一男子患痔漏膿出大便諸藥不應診其脈頗實令用猪腰子一箇切開入黑牽牛末五分線紮以荷葉包煨熟空心細嚼溫鹽酒送下數服頓退更以托裏藥而愈

一男子患痔漏口乾胃脈弱此氣不足津液短少不能上潤而然以黃芪六一湯七味白朮散治之或

曰諸痛痒皆屬心火遂服苦寒之藥大便不禁而殁夫諸痛痒皆屬心火言其常也始熱終寒則反常矣可泥此而不察乎

一男子腎癰腐潰肌肉不生用藥數之四浴反硬予診之脈瀉而弱此氣血虛不能榮於患處故敷涼藥反硬乃氣血受寒凝結而非毒也用大補藥而愈

一男子腎癰腫硬作痛尺脈浮緊按之無力以內托羌活湯一劑痛止以金銀花散四劑膿潰而愈

一男子腎癰腫硬痛甚隔蒜灸之更服仙方活命飲二劑痛止腫消以托裏消毒散加黃蘗蒼朮羌活諸頭膿潰而愈

一男子腎癰作膿而痛以仙方活命飲二劑痛止更以托裏消毒散膿潰而癒

一男子腎癰不作膿飲食少思先用六君子湯加荷歸黃芪飲食漸進更以托裏消毒散膿潰而愈

一男子潰而膿清不斂以豆豉餅灸之更飲十全大補湯兩月餘而痊凡瘡不作膿或不潰或潰而不斂皆氣血之虛也若膿清稀尤其虛甚也

一男子腎癰膿水不止肌肉漸瘦飲食少思胃脈微弦以六君子湯加藿香當歸數劑飲食遂進以十全大補湯及豆豉餅灸之兩月餘而斂

一弱人腎癰膿成不潰以十全大補湯數劑始托起乃針之又二十餘劑而愈夫腎居僻位氣血罕到老弱人患之尤宜補其氣血庶可保全

一男子腎漫腫色不變脈滑數而無力此腎癰也膿將成尚在內予欲治以托裏藥待發出而用針彼欲內消服攻伐藥愈虛復求治仍投前藥托出針之以

大補藥而愈凡瘡毒氣已結不起者但可補其血氣使膿速成而針去不可論內消之法膿成又當辨其生熟淺深而針之若大按之乃痛者膿深也小按之便痛者膿淺也按之不甚痛者未成膿也按之即復起者有膿也按之不復起者無膿也若腫高而亮者發於血脈腫下而堅者發於筋骨肉色不相變者發於骨髓也

巡撫陳和峯脾胃不健服消導之劑左腿股及腎患腫此脾氣虛而下注非瘡毒也當用補中益氣倍加白朮彼惑於衆論云白朮能潰膿乃專以散腫消毒爲主而腫益甚體益倦余用白朮一味煎飲而消儒者楊啓元左腎患癰數貼涼藥腫微內股服連劑消毒散左體皆痛余以爲足三陰虛損用補中益氣湯以補脾肺用六味丸加五味子以補肝腎股內消而腎間潰又用十全大補湯而瘡口斂

一儒者腎癰腫痛甚此邪毒壅滯用活命飲隔蒜灸而消後因飲食勞倦腫痛仍作寒熱頭疼此元氣虛而未復也與補中益氣湯頓用葱熨法兩月而愈

一男子腎癰漫腫而色不變脈滑數而無力膿將成矣余用托裏而欲針彼畏針而欲內消誤用攻伐之劑頓加惡寒發熱自汗等證余用十全大補湯數劑腫起色赤仍外針內補而愈

吳輔之父患腎癰內潰腫脹發熱口乾飲食少思此脾胃虛弱也先用六君子湯加荷歸參芪數劑而潰又用十全大補湯倍加參芪五十餘劑而愈

一人年三十脈如屋漏雀啄腎癰腫硬色天膿水清稀誤服敗毒之藥余曰此足三陰虧損而藥復傷也

余用六君子加歸芪附子一錢二劑腫潰色赤又減附子五分數劑元氣復而瘡愈

一男子腎癰腫痛發熱此膀胱氣虛而濕熱壅滯用內托羌活湯二劑熱痛悉退後用托裏消毒散而潰又用托裏散四十餘劑而斂

平湖袁上舍患持外敷寒涼內服消毒攻潰於腎膿水清稀脈洪大而數寒熱作渴余辭不治後果殞此足三陰虧損之證失滋化源以致真氣益虛邪氣愈甚矣不死何俟

進士周希輔素有疝痔勞則小腹作痛莖出白津痔亦腫痛若飲食勞倦起居失宜則發寒內熱肢體疲倦服十全大補湯諸證並退彼欲去病根乃用攻病生肌之藥肌體骨立余用益氣湯地黃丸元氣漸復但自弛調攝不能全愈

寓意草曰舊鄉治父母張受先先生久患穿腸痔漏氣血大爲所耗有薦以吾鄉黃生善數割者先生神其術一切內治之藥並取決焉不肖昌雅重先生文章道德之身昔居瀛海時會令門人往候脈息私商善後之策大意謂先生久用漏卮一旦平成精氣內榮自可百年無患然新造之區尚未堅固則有浸淫之虞臟氣久虛腸蓄易滯則有轉注之虞清氣久陷既服甘溫升舉矣然漏下已多陰血暗耗恐毗於陽水穀易混既用養臟厚腸矣然潤劑過多脾氣易溜恐毗於陰且漏孔原通精孔精稍溢出勢必旁滲則牽精當如象虎厚味最足濡脾味稍不節勢必走泄則生陰無取傷陰蓋人身脾氣每喜燥而惡濕先生漏孔已完敗濁下行者無路可出必轉滲於脾濕固

倍之是宜補脾之陽勿傷脾之陰以復健運之常而收和平之益云云及至妻中應召往診指下輕取鼓動有力重按若覺微細是陽未見不足陰則大傷矣先生每進補陰之藥則夜臥甚寧腸胃亦稀以致痛醫妄引槐角地榆治腸風下血之法治之亦不覺其誤其實漏病乃精衰之病蓋攝精之時氣留則精止氣動則精泄大凡強力入房者氣每衝激而出故精隨之橫決四射不盡歸孔道而注多溢於精管之外久久漸成漏管今漏管雖去而肉中之空隙則存填竅補髓非此等藥力所能勝也不肖姑不言其非但於藥方中去槐角地榆等而加鹿角霜一味所謂惟有其龍頂上珠能補玉堂閣下缺者是也况羣陰之藥最能潤下不有以砥之則腸中之水更澀聚可虞耶然此特徵露一斑耳瘍醫不解已沮為不可用因思吾鄉一治漏者潰管生肌外更有二神方先以九藥半斤服之令人陽道驟痿俟管中肉滿管外緻密後以九藥半斤服之令人陽道復興雖宜於少未必宜於老然用意亦大奇矣不肖纔欲填補竅隙而黃生沮之豈未聞此人此法乎

外科正宗曰一男子患痔六年每遇酒色勞役痔則發腫堅硬疼苦十餘日方得稍可彼欲斷其根以枯痔散上至七日外其痔漸黑外有裂縫至十六日痔枯脫落孔若雞心以生肌散逐日用之內服養血健脾藥而愈

一男子痔患瘰癧腫痛大便結燥脈數有力以內疏黃連湯二服便行痛止又以四物湯加芩連枳殼天花粉數劑而腫消更以臟連丸一料而不復發

一男子患痔凡遇勞苦發腫作痛以枳殼湯薰洗內服防風秦艽湯數服腫痛頓減令彼常洗前湯每月五六次內與六味地黃丸加黃蘗知母服之不發

一男子好飲多慾內痔虛墜下血以四物湯加芩連升麻葛根數服虛墜乃止又以當歸補李仁湯二劑痔腫亦消更服臟連丸九月餘便血亦止又月餘兼節酒色不發

一男子患痔十餘年頭已穿潰未及通腸每發疼苦以三品一條鎗插至七日痔變黑色瘡邊漸漸裂縫至十五日脫落以鳳凰膏搽至半月口斂而平

一男子怯弱內痔便血面色痿黃自服涼血止血藥不應診之脾脈虛而無力此中氣不能統血以補中益氣湯十餘服精神頓倍便血亦少又以加味四君子湯兼前湯間服月餘不發大抵此證所致之由不同當究其因治之如元氣有餘形黑氣盛先養而後紫血更兼脈實有力者此屬有餘法當涼血止血藥應自效至若形體瘦弱面色痿黃先鮮血而後糞更兼脈虛無力者此屬不足豈可反用涼藥止之致傷脾胃此證若不溫中健脾升舉中氣其血不得歸原故藥難效傷其根本也

一男子患腎癰四五日始生疼痛至晚作寒六脈浮而帶數以人參敗毒散二劑寒熱頓退疼痛稍止彼值公務相關欲出乃用針點入患頂五六分流出紫血用蠟酥條插入膏蓋以活血散瘀湯二服次日流出紫血隨便可行更服托裏藥五六服而安

一男子患腎癰六七七日熾痛發熱口乾便燥以托裏消毒散加花粉大黃二服便通渴止仍用前湯加前

針山甲數服而膿潰又以十全大補湯半月而斂

一男子患腎癰堅硬不潰此先寒涼之過也以十全大補湯加皂針蒼朮丹皮四劑堅硬漸軟又以透膜散二服膿熟針之以前湯倍參芪歸朮月餘而斂

一男子暑月患腎癰自為內毒外用老鴉草搗爛敷之每日積飲凉水十餘碗如此三日瘡毒內陷患上平塌冰冷口噤不言六脈沉細如絲辭不可治至夜而死

一人冬月患腎癰外用四黃散凉水調傳內服敗毒京藥毒亦內陷煩躁口乾鼻掀氣急患上平塌原頭存一空孔無水無膿予曰瘡毒已陷定不可治復請別醫俱曰無事予曰腎居小腹之後肌肉頑厚毒既到此必須內托為膿潰後最易收斂今已內外寒涼毒既內入豈能再出衆醫強投內消解毒定除除煩之藥終至不應半月而死

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第二百三十一卷目錄

醫部彙考二百十一

皮門

黃帝素問 金匱要略 六節藏象論 經脈別論 五藏生成篇 皮部論

靈樞經 素問 五藏篇 本神篇 逆氣篇 經脈篇 九宮八風篇

扁鵲難經 皮聚 皮膚榮

張機金匱要略 不仁 甲錯

王叔和脈訣 癰疽 瘰癧

孫思邈千金方 瘡黃

朱肱活人書 瘡在皮膚 瘡在骨髓 瘡在皮膚 瘡在骨髓

劉完素六書 瘡疥 瘡癩 瘡疥

李杲十書 皮膚 瘡癩 瘡疥

朱震亨心法 瘡癩 瘡疥

虞博醫學正傳 瘡癩 瘡疥

戴思恭證治要訣 瘡癩 瘡疥

樓英醫學綱目 皮部 瘡癩 瘡疥

龔信古今醫鑑 瘡癩 瘡疥

張三錫醫學準繩六要 瘡癩 瘡疥

徐春甫古今醫統 瘡癩 瘡疥

王肯堂證治準繩 瘡癩 瘡疥

陳士鐸石室秘錄 瘡癩 瘡疥

方脈經 瘡癩 瘡疥

風飲 瘡癩 瘡疥

黃帝素問 金匱要略 六節藏象論 經脈別論 五藏生成篇 皮部論

單方

鍼灸

導引

醫案

藝術典第二百三十一卷

醫部彙考二百十一

皮門

黃帝素問

金匱真言論

西方白色入通於肺開竅於鼻藏精於肺故病在肩其味辛其類金其畜馬其穀稻其應四時上為太白星是以知病之在皮毛也其音商其數九其臭腥

肺主皮毛故病在皮毛

六節藏象論

肺者氣之本魄之處也其華在毛其充在皮為陽中之太陰通於秋氣

肺主氣而藏魄故為氣之本魄之處也肺主皮毛故華在毛充在皮也臟真居高而屬陰故為陽中之太陰而通於秋氣秋主肺也

五臟生成篇

肺之合皮也其榮毛也其主心也多食苦則皮槁而毛拔

診要經終論

太陰終者腹脹閉不得息善噫善嘔則逆逆則面赤不逆則上下不通不通則面黑皮毛焦而終矣

足太陰脈入腹屬脾故為腹脹手太陰脈上膈屬肺而主呼吸故為不得息脹滿則升降難不得息則氣道滯故為噫為嘔嘔則氣逆於上故為面赤不逆則否塞於中故為上下不通脾氣敗則無以制水故黑色見於面肺氣敗則治節不行故皮毛焦

經脈別論

脈氣流經經氣歸於肺肺朝百脈輸精於皮毛

脈氣者水穀之精氣而行於經脈中也言人胃之穀氣先淫氣於脈百脈之經氣總歸於大經經氣歸於肺是以百脈之氣皆朝會於肺也肺合皮毛故復輪精於皮毛

痹論

黃帝問曰痹之安生岐伯對曰風寒濕三氣雜至合而為痹也以秋遇此者為皮痹故骨痹不已復感於邪內舍於腎筋痹不已復感於邪內舍於肝脈痹不已復感於邪內舍於心肌痹不已復感於邪內舍於脾皮痹不已復感於邪內舍於肺所謂痹者各以其時重感於風寒濕之氣也

肺主氣氣主表故合於皮傷寒論曰寸口脈緩而遲緩則陽氣長其聲商毛髮長毛附於皮氣長則毛榮多食苦是火味太過而傷肺則皮槁而毛落矣

診要經終論

太陰終者腹脹閉不得息善噫善嘔則逆逆則面赤不逆則上下不通不通則面黑皮毛焦而終矣

足太陰脈入腹屬脾故為腹脹手太陰脈上膈屬肺而主呼吸故為不得息脹滿則升降難不得息則氣道滯故為噫為嘔嘔則氣逆於上故為面赤不逆則否塞於中故為上下不通脾氣敗則無以制水故黑色見於面肺氣敗則治節不行故皮毛焦

經脈別論

脈氣流經經氣歸於肺肺朝百脈輸精於皮毛

脈氣者水穀之精氣而行於經脈中也言人胃之穀氣先淫氣於脈百脈之經氣總歸於大經經氣歸於肺是以百脈之氣皆朝會於肺也肺合皮毛故復輪精於皮毛

痹論

黃帝問曰痹之安生岐伯對曰風寒濕三氣雜至合而為痹也以秋遇此者為皮痹故骨痹不已復感於邪內舍於腎筋痹不已復感於邪內舍於肝脈痹不已復感於邪內舍於心肌痹不已復感於邪內舍於脾皮痹不已復感於邪內舍於肺所謂痹者各以其時重感於風寒濕之氣也

痹者閉也邪閉而為痛也言風寒濕三氣錯雜

而至相合而為癰蓋皮肉筋骨內合於五臟五臟之氣外合於四時始病在外之有形復傷在內之五氣外內形氣相合而邪舍於內矣

帝曰癰其時有死者或疼久者或易已者其故何也岐伯曰其入臟者死其留連筋骨間者疼久其留皮膚間者易已

夫風寒濕氣中其氣其氣實則邪不動藏若神氣消亡則癰聚在藏而死其留連筋骨間而不內舍於其合者疼久其留皮膚間者隨氣而易散若中其金則內通五臟兼之陰氣不藏則邪直入於藏而為不治之死證矣

帝曰善癰或痛或不痛或不仁或寒或熱或燥或濕其故何也岐伯曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者病久入深榮衛之行滯經絡時疎故不通皮膚不營故為不仁

不仁不知痛癢也寒氣勝者為痛癰故痛者寒氣多也病久入深者久而不去將內舍於其合也邪病久則榮衛之道傷而行滯邪入深則不癰閉於形身而經絡時疎故不痛也榮衛行滯則不能營養於皮膚故為不仁

帝曰夫癰之為病不痛何也岐伯曰癰在於骨則重在於脈則血凝而不流在於筋則屈不伸在於肉則不仁在於皮則寒故具此五者則不痛也

骨有骨氣脈有脈氣筋有筋氣肌有肌氣皮有皮氣皆五臟之氣而外合於形身如病形而不傷其氣則止見骨癰之身重脈癰之血凝不行筋癰之屈而不伸肉癰之肌肉不仁皮癰之皮毛寒冷

故具此五者之形證而不痛也

皮部論

黃帝問曰余聞皮有分部脈有經紀筋有結絡皆有度量其所主病各異別其分部左右上下陰陽所在病之終始願聞其道岐伯曰對曰欲知皮部以經脈為紀者諸經皆然陽明之陽名曰害蜚上下同法視其部中有浮絡者皆陽明之絡也其色多青則痛多黑則癰黃赤則熱多白則寒五色皆見則寒熱也絡盛則入客於經陽主外陰主內少陽之陽名曰梲持上下同法視其部中有浮絡者皆少陽之絡也絡盛則入客於經陰主內陽主外以滲於內諸經皆然太陽之陽名曰闕庭上下同法視其部中有浮絡者皆太陽之絡也絡盛則入客於經少陰之陰名曰樞窗上下同法視其部中有浮絡者皆少陰之絡也絡盛則入客於經其入經也從陽部注於經其出者從陰內注於骨心主之陰名曰害肩上下同法視其部中有浮絡者皆心主之絡也絡盛則入客於經太陰之陰名曰關蠡上下同法視其部中有浮絡者皆太陰之絡也絡盛則入客於經凡十二經絡脈者皮之部也是故百病之始生也必先於皮毛邪中之則腠理開則入客於絡脈留而不去傳入於經留而不去傳入於腑處於腸胃邪之始入於皮也汙然起毫毛開腠理其入於絡也則絡脈盛色變其入客於經也則感虛乃陷下其留於筋骨之間寒多則筋攣骨痛熱多則筋弛骨消肉隤腠理破毛直而取帝曰夫子言皮之十二部其生病皆何如岐伯曰皮者脈之部也邪客於皮則腠理開則邪入客於絡脈

絡脈滿則注於經脈經脈滿則入舍於臟腑也故皮者有分部不與而生大病也帝曰善

此章論十二經之絡脈分絡於皮膚之間病之始生必先於皮毛入客於絡脈隨皮部所循之脈而傳入於經入舍於所主之臟腑如不入於絡則留於筋骨之間而為筋攣骨痛也

四時刺逆從論

少陰有餘病皮癢癢疹不足病肺癰瘡則病肺風疔瘡則病積澀血

肺主皮毛毛脈合精於皮膚之間是以少陰之為皮癢肺癰也疔瘡則病在氣也澀血則病在血也秋氣在皮膚秋者天氣始收腠理閉塞皮膚引急

五常政大論

太陽司天寒氣下臨心氣上從而火且明土遁涸水豐衍寒客至沉陰化濕氣變物水飲內積中滿不食皮膚肉苛筋脈不利甚則附腫身後癰

太陽司天則太陰濕土在泉故土乃潤穡積蓄癰癰也水飲中滿皮膚肉苛皆水濕之為病也身後癰者癰發於背也

至真要大論

歲少陰在泉熱淫所勝則焰浮川澤陰處反明民病腹中常鳴氣上衝胃喘不能久立寒熱皮膚痛目瞑齒痛頸腫惡寒發熱如瘧少腹中痛腹大熱蟲不藏少陰在泉卯酉歲也少陰君火生於水中故焰浮川澤少陰標陰而本火故陰處反明腹中常鳴者火氣奔動也氣上衝胃者火氣炎上也喘不能久立寒熱皮膚痛者火淫肺金也目瞑者熱甚陰

虛畏陽光也齒痛顫腫熱乘陽明也發熱如瘧者少陰標本之氣病也熱在下焦則少腹中痛熱在中焦則腹大也

少陰司天熱淫所勝悌熱至火行其政民病胃中煩熱噤乾右肱滿皮膚痛寒熱欬喘

少陰司天于午歲也蓋少陰之火發於陰中故為悌熱少陰太陽陰中有陽陽中有陰陰陽相從標本互換是以火熱甚而大雨至水寒極而運火炎民病胃中煩熱噤乾右肱滿皮膚痛肺受火熱而津液不生也

少陽司天火淫所勝則溫氣流行金政不平民病頭痛發熱惡寒而寒熱上皮膚痛色變黃赤傳而為水身面附腫腹滿仰息世注赤白瘡瘍欬唾血煩心胃中熱甚則軌衄病本於肺天府絕死不治

少陽司天寅申歲也火淫所勝故金政不平少陽之火在天為暑故民病頭痛寒熱瘧熱上皮膚痛色變黃赤火上淫於肺也肺者太陰皆積水也傳為水者逼其金水外溢故為腫滿之水病也仰息肺氣逆而不得偃息也世注赤白瘡瘍唾血煩心火熱盛也軌衄甚而及於肺此火淫勝金故病本於肺天府肺脈在腋下三寸動脈應手肺氣已絕故死不治

太陽之勝凝凜且至非時水冰羽乃後化痔瘡發寒厥入胃則內生心痛陰中乃癰隱曲不利互引陰股筋肉拘苛血脈凝泣絡滿色變或為血泄皮膚舌腫腹滿食減

太陽寒水氣勝故凝凜且至非時水冰者勝氣

在於歲半以前是以羽蟲後化也靈樞經曰足太陽是主筋所生病者為痔瘡者太陽寒熱之邪也厥逆而入於胃者水侮土也胃絡上通於心故心痛也陰中乃癰是以隱曲不利而互引陰股足太陽主筋故筋肉拘苛也血脈凝泣絡滿色變或為血泄邪入於經也皮膚否腫者太陽之氣主表也腹滿食減者水氣乘脾也

少陰之復燥熱內作煩躁軌噤少腹絞痛火見熇熇熇燥分注時止氣動於左上行於右欬皮膚痛暴瘡心痛鬱冒不知人乃酒漸惡寒振慄譫妄寒已而熱渴而欲飲少氣骨疼膈膈不便外為浮腫噦噦

軌噤噤煥然上乘於肺也少腹絞痛少陰之陰氣發於下也火見熇熇君火之氣發於上也噤燥火熇金也夫陰寒在腹則注泄得火氣則注止少陰標本並發故時注時止也氣動於左者君火之氣發於左腎之水中上行於右者肺腎上下相交腎為本而肺為末也火淫肺金則欬而皮膚痛金主聲故暴瘡也心痛者火氣自傷也鬱冒不知人者寒熱之氣亂於上也酒漸振慄者陰陽相搏也寒已而熱者少陰之陰寒從火化而為熱也是以渴而欲飲少氣骨疼蓋火盛則少氣熱盛則骨疼也噦者小腸之氣不通逆氣上走心而為噦也

疏五過論

始富後貧雖不傷邪皮焦筋屈痿瘳為瘳

始富後貧則傷其志意志意者所以御精神收魂魄適寒溫和喜怒者也故榮衛調志意和則筋骨健強肢理緻密故傷其志意則精神不能內

守外為皮焦筋骨瘳瘳之病靈樞經

壽夭剛柔篇

形與氣相任則壽不相任則夭皮與肉相果則壽不相果則夭血氣經絡勝形則壽不勝形則夭

形謂皮肉筋骨人之形氣天命所生皮膚緩者天道之元亨也是以緩則壽而急則夭

本神篇

肺喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人皮華焦毛瘳色夭死於夏

喜樂心之情也如肺因喜樂無極則傷肺臟之魄魄傷則狂狂者意不存意者心之發蓋喜樂無極則神亦憚散而不存矣肺主皮毛故人皮華焦

決氣篇

上焦開發宣五穀味熏膚充身澤毛若霧露之溉是謂氣穀入氣滿淖淖注於骨骨屬屈伸洩澤補益腦髓皮膚潤澤是謂液

上焦氣宣發五穀之精微充膚熱潤澤皮毛若霧露之溉是謂氣穀入氣滿淖淖注於骨使骨

屬屈伸洩澤從髓空而補益腦髓皮膚潤澤是謂液

脹論

三焦脹者氣滿於皮膚中輕然而不堅

五變篇

黃帝曰人之善病消瘵者何以候之少俞答曰五臟皆柔弱者善病消瘵此人皮膚薄而目堅固以深者長衝直揚其心剛剛則多怒怒則氣上逆胃中蓄積