



贵州

民族常用天然药物

GUIZHOU MINZU CHANGYONG TIANRAN YAOWU

(第二卷)

主编◎罗迎春 孙庆文



贵州出版集团

GUIZHOU PUBLISHING GROUP

贵州科技出版社

GUIZHOU MINZU CHANGYONG TIANRAN YAOWU

贵州



民族常用天然药物 (第二卷)

主编：罗迎春 孙庆文



贵州出版集团

GUIZHOU PUBLISHING GROUP

贵州科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

贵州民族常用天然药物 (第二卷) / 罗迎春, 孙庆文主编.
—贵阳: 贵州科技出版社, 2013.4
ISBN 978-7-5532-0090-3

I. ①贵… II. ①罗…②孙… III. ①少数民族—民族医学—
生药学—贵州省—图集 IV. ①R29-64 ②R93-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第070129号

出版发行	贵州出版集团 贵州科技出版社
地 址	贵阳市中华北路289号 (邮政编码: 550004)
网 址	http://www.gzstph.com http://www.gzkj.com.cn
经 销	全国各地新华书店
印 刷	福建彩色印刷有限公司
版 次	2013年4月第1版
印 次	2013年4月第1次
字 数	500千字
印 张	17
开 本	889 mm × 1 194 mm 1 / 16
印 数	1 000册
书 号	ISBN 978-7-5532-0090-3
定 价	98.00元

编辑委员会

主任委员：吴建民 吴晓黎

副主任委员：邓永汉 郑亚玉

主 编：罗迎春 孙庆文

副 主 编：张敬杰 王悦云 王华南

编 写 人 员：（按姓氏笔画排序）

丁 宁 万明香 万 琦 马四补 王华南

王 波 王悦云 刘亚华 齐维娜 孙庆文

杨玉涛 杨相波 杨理明 吴成忠 邹 娟

张敬杰 罗迎春 胡 军 赵俊华 赵能武

徐文芬 徐 丽 黄仕清 黄 静 魏升华

摄 影：孙庆文

编 写 单 位：贵 阳 中 医 学 院

贵州省民族事务委员会

前言

PREFACE

《贵州民族常用天然药物》由贵阳中医学院和贵州省民族事务委员会共同组织编撰，历时近8年时间。其间，编者跋山涉水，深入崇山峻岭、深沟峡谷的少数民族居住地区进行走访调查、收集资料、采集标本及拍摄照片，可谓历经艰辛。

本书较为系统地介绍了贵州苗族、布依族、仡佬族、侗族和水族常用的天然药物，全书收载天然药物品种477个（包括“附注”中的代用或混用品种），其中第一卷收载243个，第二卷收载234个，两卷共附图片1 200余幅。书中内容包括各药物的汉族通用名称和常用别名、各民族常用名称、来源、原动植物（矿物）形态、生境及分布、入药部位、采收加工、化学成分、功能主治、用法用量、药方选录，并在附注中说明其资源状况和开发前景等。

本书内容丰富，资料翔实，图文并茂，图片精美，既有科学性和实用性，又兼顾了艺术性，可满足不同层次读者的需求。本书的另一个特点是将贵州5个不同民族的常用天然药物集于一书中，方便读者比较、学习和了解这些民族药物及其使用的情况。

贵州的地理位置和气候条件十分适宜动植物的生存繁衍，药用动植物资源尤为丰富。当前，贵州中药产业和民族医药产业蓬勃发展，已成为贵州经济的特色支柱产业。本书的编撰出版，对研究、开发和利用贵州丰富的民族药物资源，弘扬和传承宝贵的民族医药文化，以及促进民族医药产业的发展具有深远意义。

本书在编著和出版的过程中，得到何顺志教授的悉心指导，以及潘炉台教授、周汉华教授、王世清教授、董立莎教授、江维克教授、杨成华研究员的大力支持和帮助，另外，杨青亮、游延宇、罗川、温迪、秦巍巍、陈俊龙、曹会群、黄明喆等同学参与了部分工作，在此一并谨致谢忱！

本书从开始收集资料到图书出版，虽历经数年，但仍有一些不尽如人意之处，不妥和错误的地方，敬请广大读者批评指正。

编者

2012年12月

目录

CONTENTS

马鞭草·····	(1)	牛蒡·····	(34)
马齿苋·····	(2)	牛耳朵·····	(36)
马兜铃·····	(3)	牛皮消·····	(37)
马兰·····	(4)	牛至·····	(38)
马蓝·····	(6)	女贞·····	(39)
马桑·····	(7)	糯米团·····	(41)
马蹄金·····	(8)	披针新月蕨·····	(42)
马尾松·····	(9)	枇杷·····	(43)
麦冬·····	(10)	瓶尔小草·····	(45)
芒萁·····	(11)	蒲公英·····	(46)
猫儿屎·····	(13)	七叶一枝花·····	(48)
毛大丁草·····	(14)	漆姑草·····	(49)
毛茛·····	(15)	芥菜·····	(50)
毛花猕猴桃·····	(16)	千里光·····	(51)
毛血藤·····	(17)	茜草·····	(52)
茅膏菜·····	(18)	青葙叶·····	(54)
猕猴桃·····	(19)	青牛胆·····	(55)
米槁·····	(21)	青藤·····	(57)
密蒙花·····	(22)	青葙·····	(58)
魔芋·····	(23)	忍冬·····	(59)
木防己·····	(24)	茸毛木蓝·····	(61)
木芙蓉·····	(25)	榕树·····	(62)
木蝴蝶·····	(27)	柔毛路边青·····	(63)
木槿·····	(28)	三白草·····	(65)
南天竹·····	(29)	三裂蛇葡萄·····	(66)
南五味子·····	(31)	三叶木通·····	(67)
尼泊尔老鹳草·····	(32)	三叶委陵菜·····	(69)
尼泊尔酸模·····	(33)	桑·····	(70)

莎草····· (72)	天胡荽····· (122)
山鸡椒····· (73)	天葵····· (123)
山莓····· (74)	天麻····· (124)
杉木····· (76)	天南星····· (126)
扇叶铁线蕨····· (77)	铁海棠····· (127)
商陆····· (78)	铁苋菜····· (129)
少棘蜈蚣····· (80)	铁线蕨····· (130)
蛇菰····· (81)	通脱木····· (131)
蛇含委陵菜····· (82)	头花蓼····· (132)
蛇莲····· (83)	土荆芥····· (133)
蛇莓····· (84)	土圉儿····· (134)
蛇足石杉····· (86)	土牛膝····· (135)
射干····· (87)	土人参····· (137)
深裂竹根七····· (89)	菟丝子····· (138)
肾蕨····· (90)	脱皮马勃····· (140)
十大功劳····· (92)	椭圆叶花锚····· (141)
石菖蒲····· (93)	万年青····· (142)
石膏····· (95)	万寿竹····· (144)
石胡荽····· (96)	委陵菜····· (145)
石榴····· (97)	卫矛····· (146)
石南藤····· (99)	蚊母草····· (148)
石松····· (100)	乌柏····· (149)
石蒜····· (101)	乌梢蛇····· (150)
柿····· (103)	乌头····· (151)
绶草····· (104)	无花果····· (153)
蜀葵····· (105)	吴茱萸····· (154)
薯蓣····· (106)	梧桐····· (155)
薯蓣····· (107)	五加····· (157)
水蓼····· (109)	五岭细辛····· (158)
水牛····· (110)	西南杠柳····· (160)
水芹····· (111)	豨莶····· (161)
水蜈蚣····· (112)	喜马拉雅旌节花····· (163)
水烛····· (113)	狭叶落地梅····· (164)
苏铁····· (114)	夏枯草····· (165)
算盘子····· (116)	仙茅····· (166)
绥阳雪里见····· (117)	香椿····· (167)
桃····· (119)	香花崖豆藤····· (169)
天冬····· (120)	香樟····· (170)

响叶杨·····	(172)	玉簪·····	(210)
小根蒜·····	(173)	鸢尾·····	(211)
小花清风藤·····	(174)	元宝草·····	(213)
小鱼眼草·····	(175)	圆叶牵牛·····	(214)
心叶兔儿风·····	(176)	云南独蒜兰·····	(215)
杏·····	(177)	云南勾儿茶·····	(216)
杏叶茴芹·····	(178)	云南蓍·····	(217)
徐长卿·····	(179)	云实·····	(218)
续随子·····	(180)	皂荚·····	(220)
雪胆·····	(182)	柘·····	(221)
血水草·····	(183)	蜘蛛香·····	(222)
鸭跖草·····	(184)	枳椇·····	(224)
崖爬藤·····	(185)	中华常春藤·····	(225)
烟管茛苕·····	(187)	中华栝楼·····	(226)
烟管头草·····	(188)	中华秋海棠·····	(228)
芫荽·····	(189)	朱砂根·····	(229)
盐肤木·····	(190)	珠芽艾麻·····	(231)
艳山姜·····	(192)	竹叶青·····	(232)
杨梅·····	(193)	苎麻·····	(233)
野葛·····	(194)	柱果铁线莲·····	(235)
野菊·····	(196)	梓木·····	(236)
野山楂·····	(197)	紫草·····	(237)
野鸦椿·····	(198)	紫花地丁·····	(238)
叶下珠·····	(200)	紫金牛·····	(239)
一枝黄花·····	(201)	紫茉莉·····	(240)
薏苡·····	(202)	紫萁·····	(241)
阴地蕨·····	(204)	紫苏·····	(243)
银杏·····	(205)	紫珠·····	(244)
油茶·····	(207)	棕榈·····	(245)
有齿鞘柄木·····	(208)	索引·····	(247)
余甘子·····	(209)	参考文献·····	(260)

马鞭草

【民族名称】苗族：Reib jangl nbeat 锐江摆。布依族：kwe³³ za²⁴ jian³⁵ 棵那样。仡佬族：niao¹³ ta³¹ pi³⁵ 尿打蔽。侗族：Nyangt piudt 娘囚。水族：²ma¹ ηau² 骂偶。

【别名】马鞭梢。

【来源】马鞭草科马鞭草属植物马鞭草 *Verbena officinalis* L。

【植物形态】多年生草本，高 30~120cm。茎四方形。叶片卵圆形至倒卵形或长圆状披针形，长 2~8cm，宽 1~5cm，基生叶的边缘通常有粗锯齿和缺刻，茎生叶多数 3 深裂，裂片边缘有不整齐锯齿。穗状花序顶生和腋生，细弱。花小，无柄，最初密集，结果时疏离。苞片稍短于花萼，具硬毛。花萼长约 2mm，有硬毛，有 5 脉，脉间凹陷处质薄而色淡。花冠淡紫色至蓝色，长 4~8mm，外面有微毛，裂片 5 枚。雄蕊 4 枚，着生于花冠管的中部，花丝短。子房无毛。果长圆形，长约 2mm，外果皮薄，成熟时 4 瓣裂。花期 6~8 月，果期 7~10 月。

【生境及分布】生于海拔 700~2 900m 的田边、山坡、路边或村寨旁。贵州各地均有分布。

【入药部位】全草。

【采收加工】夏季花期采收，除去泥土，晒干。

【化学成分】含马鞭草苷（verbenalin）、羽扇豆醇（lupeol）、β-谷甾醇（β-sitosterol）、熊果酸（ursolic acid）、桃叶珊瑚苷（aucubin）、蒿黄素（artemetin）等。



【功能主治】清热解毒，活血通经，利水消肿，截疟。主治感冒发热，咽喉肿痛，湿热黄疸，水肿，小便不利，痢疾，血瘀经闭，痛经，跌打损伤，痈肿疮毒，疟疾等。

【用法用量】内服：水煎服，15~30g，鲜品 30~60g；或入丸、散。外用：适量，捣烂敷患处；或水煎洗。孕妇慎服。

【药方选录】

1. 治腹痛：马鞭草 15g，水煎服。（苗族）
 2. 治筋骨疼痛：马鞭草 20g，捣烂敷患处。（苗族）
 3. 治胃出血：马鞭草、仙鹤草（龙芽草）、大乌泡各 50g，水煎当茶饮。（布依族）
 4. 治痔疮：马鞭草、紫花地丁、仙鹤草（龙芽草）、夏枯草各 20g，水煎服。（仡佬族）
 5. 治打摆子（疟疾）：马鞭草、大青叶、十大功劳、芦根、麦冬、青蒿（黄花蒿）各适量，水煎服。（侗族）
 6. 治空洞型肺结核：马鞭草、仙鹤草（龙芽草）、益母草、柏子仁各 15g，水煎服。（水族）
- 【附注】该物种在贵州分布广，产量及蕴藏量大，可大量开发利用。



马齿苋

【民族名称】苗族：Reib xand mel 锐先脉。布依族：nə²⁴tin²⁴kai³⁵ 那定皆。仡佬族：niao¹³loŋ⁵³sə⁵⁵ 尿龙晒。侗族：Mal nguedc 骂忿。

【别名】马齿菜、马齿苋。

【来源】马齿苋科马齿苋属植物马齿苋 *Portulaca oleracea* L.

【植物形态】一年生草本，全株无毛。茎平卧或斜升，伏地铺散，多分枝，淡绿色或带暗红色。叶互生，有时近对生，叶片扁平，肥厚，倒卵形，长 1~3cm，宽 0.6~1.5cm，顶端圆钝或平截，基部楔形。花无梗，直径 4~5mm，常 3~5 朵簇生枝端，午时盛开。萼片 2 枚，对生，绿色，盔形，左右压扁，长约 4mm，顶端急尖，背部具龙骨状凸起，基部合生。花瓣 5 枚，稀 4 枚，黄色，倒卵形，长 3~5mm，顶端微凹，基部合生。雄蕊通常 8 枚，或更多，长约 12mm，花药黄色。花柱比雄蕊稍长。蒴果卵球形，长约 5mm，盖裂。种子细小，多数，黑褐色，有光泽。花期 5~8 月，果期 6~9 月。

【生境及分布】生于田野路边或庭园废墟等向阳处。贵州各地均有分布。

【入药部位】全草。

【采收加工】8~9 月采收，洗净，鲜用或晒干。

【化学成分】含去甲肾上腺素（noradrenaline）、多巴（dopa）、甜菜苷（betanin）、草酸（oxalic acid）等。

【功能主治】清热解毒，凉血止痢，除湿



通淋。主治热毒泻痢，热淋，崩漏，赤白带下，痔血，疮疡痈疖，湿癣，肺结核等。

【用法用量】内服：水煎服，10~15g，鲜品 30~60g；或绞汁服。外用：适量，捣烂敷患处；或水煎洗患处。脾虚便溏者及孕妇慎服。

【药方选录】

1. 治小儿腹泻：鲜马齿苋 20g，水煎服。（苗族）
2. 治痢疾：马齿苋适量，大蒜 100g，水煎服。（布依族）
3. 治肺结核：马齿苋、白及、银花藤各适量，研细，与糯米同煮稀饭，常服。（仡佬族）

【附注】该物种在贵州分布较广，产量及蕴藏量较大，可开发利用。



马兜铃

【民族名称】苗族：Jab mangb qangb 加蒙枪。布依族：kau²⁴ka:u³³xo:m²⁴ 告高翁。仡佬族：si⁵⁵tai⁵⁵qan³⁵ 细代刚。侗族：Jaol sul dangl 教素荡。

【别名】青木香、天仙藤、青藤香。

【来源】马兜铃科马兜铃属植物马兜铃 *Aristolochia debilis* Sieb. et Zucc.。

【植物形态】草质藤本。根圆柱形，直径 3~15mm。茎柔弱，无毛，暗紫色或绿色，有腐肉味。叶纸质，卵状三角形、长圆状卵形或戟形，长 3~6cm，基部宽 1.5~3.5cm，顶端钝圆或短渐尖，基部心形，两侧裂片圆形。花单生或 2 朵聚生于叶腋，花被长 3~5.5cm，基部膨大呈球形，向上收狭成一长管，管口扩大呈漏斗状，黄绿色，口部有紫斑。蒴果近球形，长约 6cm，直径约 4cm，具 6 棱，成熟时黄绿色，由基部向上沿室间 6 瓣开裂。花期 7~8 月，果期 9~10 月。

【生境及分布】生于路边、山谷、沟边阴湿处或山坡灌丛中。贵州各地均有分布。

【入药部位】根、果实。

【采收加工】根：10~11 月茎叶枯萎时采挖，除去须根、泥土，晒干。果实：秋季果实成熟时采收，晒干。

【化学成分】根含马兜铃酸（aristolochic acid）、粉防己碱（tetrandrine）等。





【功能主治】根：行气止痛，解毒消肿，平肝降压。主治胸胁脘腹疼痛，疝气痛，肠炎，下痢腹痛，咳嗽痰喘，蛇虫咬伤，皮肤瘙痒，高血压病。果实：清肺降气，止咳平喘，清泄大肠。主治肺热咳嗽，痰壅气促，肺虚久咳，肠热痔血，痔疮肿痛，水肿。

【用法用量】内服：水煎服，用量 3~9g；或入丸、散。虚寒咳喘及脾虚便溏者慎服。所含马兜铃酸可能引起急性肾功能衰竭，避免大剂量使用。

【药方选录】

- 1. 治白痢、鼾病、胃气痛：马兜铃根 5g，水煎服。（苗族）
- 2. 治消化不良引起的腹胀：马兜铃根 5g，蜘蛛香 3g，隔山消 5g，水煎服。（苗族）
- 3. 治眼翳：马兜铃根、木姜子、伸筋草（石松）各适量，水煎取煎液熏眼。（布依族）
- 4. 治胃痛：马兜铃根 4g，研末，用冷开水送服。（仡佬族）
- 5. 治毒蛇咬伤：马兜铃根、一支箭（瓶尔小草）各适量，水煎服。（侗族）
- 6. 治急性胃炎：马兜铃根、蜘蛛香各适量，水煎服。（侗族）

【附注】该物种在贵州分布广，但产量及蕴藏量较小，可人工栽培利用。

马兰

【民族名称】苗族：Reib max lanx dand 锐马兰单。布依族：pak³⁵tsin²⁴pa²⁴ 把信罢。仡佬族：a³⁵nao⁵³se³⁵ 阿脑细。侗族：Mal langx 骂聂。水族：ma¹tsu⁶ 骂主。

【别名】鱼鳅串。

【来源】菊科马兰属植物马兰 *Kalimeris indica* (L.) Sch.-Bip.。

【植物形态】茎直立，高 30~70cm，多分枝。基部叶在花期枯萎，茎部叶倒披针形或倒卵状矩圆形，长 3~10cm，宽 0.8~2cm，顶端钝或尖，基部渐狭成具翅的长柄，边缘从中部以上具有尖齿或有羽状裂



片，上部叶小，全缘，基部急狭无柄。头状花序单生于枝端并排列成疏伞房状。总苞半球形，径6~9mm，长4~5mm。总苞片2~3层，覆瓦状排列。舌状花1层，15~20个，浅紫色。管状花长约3.5mm，被短密毛。瘦果倒卵状矩圆形，长1.5~2mm，宽约1mm。冠毛长0.1~0.8mm，易脱落。花期5~9月，果期8~10月。

【生境及分布】生于路边、田野、耕地或山坡上。贵州各地均有分布。

【入药部位】全草。

【采收加工】夏、秋季采收，鲜用或晒干。


【功能主治】凉血止血，清热利湿，解毒消肿。主治吐血，血痢，黄疸，水肿，感冒咳嗽，咽痛喉痹，小儿疳积等。

【用法用量】内服：水煎服，10~30g，鲜品30~60g；或捣烂取汁服。外用：适量，捣烂敷患处；或水煎熏洗患处。孕妇慎服。

【药方选录】

1. 治热毒引起的脓肿：马兰 15g，白及 10g，捣烂与甜酒混匀敷患处。（苗族）
2. 治腮腺炎：鲜马兰 10g，捣烂敷患处。（苗族）
3. 治小儿隔食（消化不良）：马兰适量，捣烂，与淘米水共服。（布依族）
4. 治小儿中毒性消化不良：马兰、三颗针（豪猪刺）、地榆各适量，水煎服。（仡佬族）
5. 治腰腿痛：马兰、徐长卿各适量，泡酒服。（侗族）
6. 治流感：马兰 15g，水煎服。（水族）

【附注】该物种在贵州分布较广，产量及蕴藏量较大，可大量开发利用。



马蓝

【民族名称】苗族：Reib max lanx dand 锐马兰单。

【别名】南板蓝根。

【来源】爵床科马蓝属植物马蓝 *Strobilanthes cusia* (Nees) O. Kuntze。

【植物形态】草本。茎稍木质化，高可达1m，通常成对分枝，幼嫩部分和花序均被锈色、鳞片状毛，纸质，椭圆形或卵形，长10~20cm，宽4~9cm，顶端短渐尖，基部楔形，边缘有稍粗的锯齿，两面无毛，干时黑色，侧脉每边各约8条。叶柄长1.5~2cm。穗状花序长10~30cm。苞片对生，长1.5~2.5cm。花冠漏斗形，淡紫色，5裂，裂片短阔。雄蕊4枚，2强，着生于花冠筒的上方。子房上位，花柱细长。蒴果长2~2.2cm，无毛；种子卵形，长3.5mm。花期11月。



【生境及分布】生于海拔800~1000m的山坡林下阴湿处。在贵州分布于石阡、从江、镇宁、安龙、兴仁、册亨、兴义、荔波、独山、凤冈、赫章等地，野生或栽培。

【入药部位】根茎。

【采收加工】秋季采收，洗净，晒干。

【化学成分】含蒽醌类及 β -谷甾醇等。


【功能主治】清热解毒，凉血。主治风热感冒，咽喉肿痛，流脑，肺炎，疱疹，目赤肿痛等。

【用法用量】内服：水煎服，10~15g，研末服1.5~6g；或入丸剂。外用：适量，干撒或调敷患处。脾胃虚寒者禁服。

【药方选录】

1. 治热毒引起的脓肿：马蓝15g，白及10g，捣烂与甜酒混匀敷患处。(苗族)
2. 治腮腺炎：鲜马蓝适量，捣烂敷患处。(苗族)
3. 治感冒发热：马蓝、马鞭草各15g，水煎服。

【附注】该物种在贵州分布较广，产量及蕴藏量较大，可大量开发利用。



马桑

【民族名称】苗族：Ndui nieax rans 都岩染。布依族：kwe³³tsiet³⁵ 棵谢。侗族：Meix demh saoh 美登超。水族：mai⁴sa:i² 梅晒。

【别名】马桑泡、马桑柴。

【来源】马桑科马桑属植物马桑 *Coriaria sinica* Maxim.。

【植物形态】灌木。小枝四棱形或成四狭翅，幼枝疏被微柔毛，常带紫色，老枝紫褐色，具显著圆形突起的皮孔。叶对生，纸质至薄革质，椭圆形或阔椭圆形，长 2.5~8cm，宽 4~5cm，先端急尖，基部圆形，全缘。叶短柄，长 2~3mm，疏被毛，紫色。花序生于二年生的枝条上，雄花序先叶开放，长 1.5~2.5cm，多花密集，序轴被腺柔毛，雄蕊 10 枚。雌花序与叶同出，长 4~6cm，序轴被腺状微柔毛。果球形，果期花瓣肉质增大包于果外，成熟时由红色变紫黑色，直径 4~6mm。种子卵状长圆形。



【生境及分布】生于山坡灌木丛中。贵州各地均有分布。

【入药部位】根、叶。

【采收加工】根：秋、冬季采挖，洗净，晒干。叶：夏季采收，晒干或鲜用。

【化学成分】果实含马桑毒素（coriamyrtin）、羟基马桑毒素（tutin）等。

【功能主治】根：祛风除湿，清热解毒。主治风湿麻木，痈疮肿毒，风火牙痛，痞块，瘰癧，痔疮等。叶：清热解毒，消肿止痛，杀虫。主治疥癣，黄水疮，烫火伤，跌打损伤等。



【用法用量】外用：适量，捣烂敷患处；或水煎洗；或研末敷患处。本品有毒，小儿、孕妇、体弱者禁用。

【药方选录】

1. 治疥癬：马桑叶适量，研末，用醋调搽患处。（苗族）
2. 治干疮（疥疮）：马桑叶适量，水煎，煎液加盐少许，外洗患处。（布依族）
3. 治神经分裂症：马桑树上的寄生、鸡矢藤、何首乌、吉祥草、魔芋各适量，水煎服。（侗族）
4. 治黄水疮：鲜马桑叶适量，捣烂取汁搽患处。（水族）

【附注】该物种在贵州分布广，产量及蕴藏量较大，可大量开发利用。



马蹄金

【民族名称】苗族：Reib minl zheit 锐咪等。布依族：no³⁵ce:n³¹ze¹¹ 罗寻热。侗族：Dongl sinc dinl max 铜钱钉马。

【别名】黄疸草、小马蹄草、小金钱草。

【来源】旋花科马蹄金属植物马蹄金 *Dichondra micrantha* Urban。


【植物形态】多年生匍匐小草本。茎细长，被灰色短柔毛，节上生根。叶肾形至圆形，直径4~25mm，先端宽圆形或微缺，基部阔心形，叶面微被毛，背面被贴生短柔毛，全缘。具长的叶柄，叶柄长3~5cm。花单生叶腋，花柄短于叶柄，丝状。萼片倒卵状长圆形至匙形，钝，长2~3mm，背面及边缘被毛。花冠钟状，较短至稍长于萼，黄色，深5裂，裂片长圆状披针形，无毛。雄蕊5枚，着生于花冠两裂片间弯缺处，花丝短，等长。子房被疏柔毛，2室，具4枚胚珠，花柱2枚，柱头头状。蒴果近球形，小，短于花萼，直径约1.5mm，膜质。种子黄色至褐色，无毛。

【生境及分布】生于海拔800~1200m的山坡、草地、田边或路旁。贵州大部分地区有分布。

【入药部位】全草。

【采收加工】全年均可采收，鲜用或洗净晒干。

【功能主治】清热，利湿，解毒。主治黄疸，痢疾，水肿，跌打损伤，疮疹肿毒，毒蛇咬伤等。



【用法用量】内服：水煎服，15~30g。外用：适量，鲜品捣烂敷患处。

【药方选录】

1. 治尿路结石：马蹄金 15g，金钱草（过路黄）30g，车前草 25g，白茅根 20g，水煎服。（苗族）
2. 治不育：马蹄金 15g，鸡蛋 1 个，水煎服。（布依族）
3. 治急性黄疸型肝炎：马蹄金、鲜天胡荽全草各 30g，猪瘦肉 200g，加水炖服，吃肉喝汤。

【附注】该物种在贵州分布广，但产量及蕴藏量较小。

马尾松

【民族名称】苗族：Ndut xoub mangl 都秀盲。布依族：?bae²⁴tcia²⁴ 莽桔。侗族：Av meix sangc begs 架美松柏。水族：qui¹mai⁴so³ 贵梅梭。

【别名】青松、山松。

【来源】松科松属植物马尾松 *Pinus massoniana* Lamb.。

【植物形态】乔木，高达 45m，树冠宽塔形或伞形。针叶 2 针一束，稀 3 针一束，长 12~20cm，细柔，微扭曲。叶鞘初呈褐色，后渐变成灰黑色，宿存。雄球花聚生于新枝下部苞腋，穗状，长 6~15cm。雌球花单生或 2~4 个聚生于新枝顶端，一年生小球果圆球形或卵圆形，径约 2cm，褐色或紫褐色，上部珠鳞的鳞脐具向上直立的短刺，下部珠鳞的鳞脐平钝无刺。球果卵圆形或圆锥状卵圆形，长 4~7cm，直径 2.5~4cm。花期 4~5 月，球果第 2 年 10~12 月成熟。

【生境及分布】生于山坡林地。贵州各地均有分布。

【入药部位】嫩枝、叶、花粉、枝干结节（松节）。

