

护士执业资格考试必备参考书

2014

护士执业资格考试 一本通试题集

主编 / 石 平 刘 云

累计销售超过10万册

- 新大纲 新考点
- 海量习题 考前自测

军医社护考

畅销书



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

2014 护士执业资格考试

一本通试题集

2014 HUSHI ZHIYE ZIGE KAOSHI YIBENTONG SHITIJI

主 编	石 平	刘 云					
副 主 编	(以姓氏笔画为序)						
	仲继红	任 冰	刘亚红	刘凌昕	祁 静	余红梅	
	季爱华	周曼颖	胡林峰	诸葛海鸿	曹清心		
编 委	(以姓氏笔画为序)						
	丁 杰	丁 珂	卜 凡	万艳慧	王 慧	王 璟	
	王艺辉	王立群	王青尔	王艳侠	王慧娟	王 梅	
	邓海浪	石 平	叶秀芹	王田付	王红利	韦 敏	
	仲继红	任 冰	刘亚红	刘春蕊	刘彦含	朱晓宇	
	刘凌昕	汤士芳	祁 静	孙洋	孙晓燕	刘 义	
	苏 寒	苏晓芹	杜文娟	李 锋	李 婷	苏 霞	
	李志鹏	李家扬	李 婷	李君旭	吴炜炜	吴 妮	
	吴婷婷	何 戎	何 露	余红梅	余恒丰	吴 妮	
	沐玮玮	张 云	张 青	陈 伟	陈 宇	汪 杰	
	林 勇	杭 太	罗 松	季 爱	周 荣	范 曼	
	郑 露	郑 娟	居雪婷	胡 蝶	胡 峰	胡 瑞	
	柯尊乾	钟 健	段立晖	晋 美	贾丽菲	顾 辛	
	顾红培	徐 敏	徐 辉	徐丹丹	贾 菲	高 燕	
	郭 婷	郭亚辉	唐成忠	徐 葛	黄小燕	高 飞	
	曹 罡	曹清心	崔文静	董 震	黄 婷	黄 琴	
	景 影	储 兰	鲁 立	曾 繁	路 艺	臧 季	
	薛阳阳						
主编单位	南京军区南京总医院						



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

2014 护士执业资格考试一本通试题集/石平,刘云主编. —北京:人民军医出版社,2013. 11
ISBN 978-7-5091-7059-5

I. ①2… II. ①石…②刘… III. ①护士—资格考试—习题集 IV. ①R192.6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 256636 号

策划编辑:郭伟疆 崔玲和 文字编辑:王 英 陈 鹏 责任审读:黄栩兵

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927290;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927300—8031

网址:[www. pmmp. com. cn](http://www.pmmp.com.cn)

印、装:京南印刷厂

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:43.5 字数:2041 千字

版、印次:2013 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

印数:00001—12000

定价:100.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

前 言

自 2011 年度起,护士执业资格考试由原来的四个科目(基础知识、相关专业知识、专业知识、专业实践能力)改为专业实务和实践能力两个科目,一次考试通过两个科目(专业实务、实践能力)为考试成绩合格。①专业实务:以理解、记忆知识为主,包括内、外、妇、儿的病因,临床表现、检查、治疗措施等;管理、伦理、法规、人际沟通有关规定及理论。②实践能力:包括知识的实际运用;基础护理的内容;内、外、妇、儿科疾病的诊断,护理问题,护理措施,健康教育等;管理、伦理、法规、人际沟通的实际运用。考试题型全部采用客观选择题形式。为帮助广大考生更好地复习迎考,我们组织有关人员,以最新护士执业资格考试大纲为依据,以规划教材为基础,编写了这本《2014 护士执业资格考试一本通试题集》。

本书 2002 年初版,根据国家人事部、卫生部关于护士执业考试与护理专业技术资格考试并轨的精神,以及近几年考试反馈信息的积累,在原版的基础上,先后修订了 9 次,为广大考生复习应考发挥了重要作用。2007 年版增加了护士执业考试历年真题易错 100 题解析。2008 年版增加了历年考试考点总览。最新版“一本通试题集”按照《考试大纲》的章节排序,遵循科学、严谨、客观、规范的命题要求,依照新护考的考试大纲和考试方案精神编写。考试模拟临床情景,着重考察考生的护理专业知识和临床操作能力,题型全面,题量丰富,以方便考前自测。

同时,本书附有“模拟实战习题”,考生在复习的同时可把这部分试题作为航标,因为此部分试题能反映历年考试命题思路和考试方向,只要掌握了这些考点,就会有意想不到的收获。

由于时间仓促和水平有限,不当之处请各位同仁及师生批评指正。

石 平

南京军区南京总医院

2013 年 10 月

目 录

第1章 基础护理知识和技能	1	四、X型题	199
一、A1型题	1	第7章 妊娠、分娩和产褥期疾病病人	
二、A2型题	34	的护理	200
三、A3型题	43	一、A1型题	200
四、B型题	50	二、A2型题	226
五、X型题	53	三、A3/A4型题	236
第2章 循环系统疾病病人的护理	58	四、B型题	244
一、A1型题	58	五、X型题	246
二、A2型题	78	第8章 新生儿和新生儿疾病的护理 ...	248
三、A3/A4型题	93	一、A1型题	248
四、B型题	103	二、A2型题	257
五、X型题	103	三、A3/A4型题	262
第3章 消化系统疾病病人的护理	105	四、B型题	265
一、A1型题	105	五、X型题	265
二、A2型题	122	第9章 泌尿生殖系统疾病病人	
三、A3/A4型题	135	的护理	267
四、B型题	144	一、A1型题	267
五、X型题	146	二、A2型题	284
第4章 呼吸系统疾病病人的护理	149	三、A3/A4型题	299
一、A1型题	149	四、B型题	304
二、A2型题	158	五、X型题	305
三、A3/A4型题	174	第10章 精神障碍病人的护理	307
四、B型题	181	一、A1型题	307
五、X型题	181	二、A2型题	309
第5章 传染病病人的护理	183	三、A3/A4型题	314
一、A1型题	183	第11章 损伤、中毒病人的护理	317
二、A2型题	192	一、A1型题	317
三、A3/A4型题	194	二、A2型题	334
四、B型题	195	三、A3/A4型题	346
五、X型题	196	四、B型题	358
第6章 皮肤及皮下组织疾病病人		五、X型题	359
的护理	197	第12章 肌肉骨骼系统和结缔组织	
一、A1型题	197	疾病病人的护理	361
二、A2型题	198	一、A1型题	361
三、A3/A4型题	198	二、A2型题	368

三、A3/A4 型题	373	三、A3/A4 型题	491
四、B 型题	378	四、B 型题	492
五、X 型题	378	五、X 型题	492
第 13 章 肿瘤病人的护理	379	第 18 章 中医基础知识	494
一、A1 型题	379	一、A1 型题	494
二、A2 型题	394	二、A3/A4 型题	495
三、A3/A4 型题	405	第 19 章 法规与护理管理	497
四、B 型题	415	一、A1 型题	497
五、X 型题	416	二、A2 型题	498
第 14 章 血液、造血器官及免疫疾病		三、A3/A4 型题	501
病人的护理	417	第 20 章 护理伦理	504
一、A1 型题	417	一、A1 型题	504
二、A2 型题	425	二、A2 型题	508
三、A3/A4 型题	430	第 21 章 人际沟通	510
四、B 型题	435	一、A1 型题	510
五、X 型题	435	二、A2 型题	514
第 15 章 内分泌、营养及代谢疾病		三、A3/A4 型题	515
病人的护理	436	附录一 实战模拟习题一	516
一、A1 型题	436	第一节 基础护理学	516
二、A2 型题	443	第二节 内科护理学	539
三、A3/A4 型题	447	第三节 外科护理学	558
四、B 型题	450	第四节 妇产科护理学	575
五、X 型题	451	第五节 儿科护理学	588
第 16 章 神经系统疾病病人的护理	453	附录二 实战模拟习题二	600
一、A1 型题	453	基础知识	600
二、A2 型题	468	相关专业知识	615
三、A3/A4 型题	476	专业知识	635
四、B 型题	480	专业实践能力	651
五、X 型题	481	附录三 实战模拟习题三	670
第 17 章 生命发展保健	482	专业实务	670
一、A1 型题	482	实践能力	679
二、A2 型题	490		

第1章 基础护理知识和技能

一、A1型题

1. 下列患者资料中属于主观资料的是

- A. 颈项强直
- B. 头晕、麻木、乏力
- C. 体温 39℃
- D. 黄疸、发绀
- E. 呼吸困难

2. 护理诊断与医疗诊断区别描述错误的是

- A. 护理诊断是个体对健康问题的反映,随病人的变化而变化
- B. 职责范围相同
- C. 医疗诊断在病程中保持不变
- D. 两者的决策者不同
- E. 护理诊断的预期结果是由护理负责的

3. 护理记录单书写可采用PIO格式,I表示

- A. 病人的健康问题
- B. 收集的患者资料
- C. 制定的护理措施
- D. 护理后的效果
- E. 预期目标

4. 门诊护士不应做的是

- A. 预检分诊
- B. 安排候诊和就诊
- C. 开展健康教育
- D. 护送患者至病区
- E. 严格消毒隔离制度

5. 急救物品“五”定中错误的是

- A. 定期消毒灭菌
- B. 定数量品种
- C. 定人管理
- D. 定期检查维修
- E. 定期清理更换

6. 白天病区较理想的声音强度应维持在

- A. 40~60dB
- B. 35~40dB
- C. 20~35dB
- D. 50~60dB
- E. 55~75dB

7. 病室冬季温度为

- A. 18~20℃
- B. 20~22℃
- C. 16~18℃
- D. 22~24℃
- E. 20~24℃

8. 在治疗性环境中,工作人员应做到“四轻”

- A. 说话轻,跑步轻,操作轻,关门轻
- B. 说话轻,开门轻,操作轻,走路轻
- C. 说话轻,走路轻,操作轻,关门轻
- D. 谈话轻,走路轻,操作轻,关门轻
- E. 说话轻,走路轻,动作轻,关门轻

9. 室内湿度过低时,人体会

- A. 神经系统受到抑制
- B. 尿量增多
- C. 呼吸道黏膜干燥、咽痛、口渴
- D. 闷热、不适
- E. 患者感到烦躁

10. 特别护理的适应对象错误的是

- A. 严重创伤
- B. 器官移植
- C. 大面积烧伤
- D. 早产儿

E. 复杂疑难的大手术

11. 平车搬运法正确的是

- A. 平车头端与床尾呈钝角
- B. 平车尾端与床尾呈钝角
- C. 平车头端与床头呈锐角
- D. 平车尾端与床头呈锐角
- E. 平车头端与床头呈钝角

12. 三人搬运法正确的是

- A. 甲托病人头、颈、肩部,乙托腰和臀部,丙托腘窝和小腿
- B. 甲托病人头、肩及背部,乙托腰和臀部,丙托双腿
- C. 甲托病人头、颈、肩及背部,乙托腰部,丙托臀部及小腿
- D. 甲托病人头、颈、肩及背部,乙托腰和臀部,丙托腘窝和小腿
- E. 甲托病人头、颈及背部,乙托腰和臀部,丙托腘窝和小腿

13. 适用于颈、腰椎骨折的搬运方法是

- A. 轮椅搬运法
- B. 单人搬运法
- C. 两人搬运法
- D. 三人搬运法
- E. 四人搬运法

14. 下列哪项不属于入院程序

- A. 办理入院手续
- B. 健康评估
- C. 实施卫生处置
- D. 准备病床单位
- E. 护送患者入病区

15. 新入院患者有虱虮者在进行卫生处置时,首先应

- A. 沐浴
- B. 更衣
- C. 剪指甲
- D. 理发
- E. 灭虱虮

16. 患者出院前的健康指导不包括

- A. 家庭支持
- B. 用药
- C. 饮食
- D. 功能锻炼
- E. 定期复查

17. 铺麻醉床的目的是

- A. 便于接收和护理麻醉手术后的病人
- B. 准备接收新病人
- C. 保持病室整洁美观
- D. 供暂离床活动的病人使用
- E. 保持病床整洁

18. 去枕仰卧位的适用范围

- A. 呼吸困难患者
- B. 急性左心衰竭的患者
- C. 休克患者
- D. 全身麻醉未清醒患者
- E. 急性肺水肿患者

19. 支气管哮喘发作时应采取的卧位是

- A. 去枕仰卧位
- B. 半坐卧位
- C. 中凹卧位
- D. 侧卧位
- E. 端坐位

20. 头低足高位适用范围错误的是

- A. 颈椎骨折进行颅骨牵引

- B. 十二指肠引流
- C. 肺分泌物引流
- D. 产妇胎膜早破
- E. 骨盆骨折牵引

21. 影响舒适的因素是

- A. 身体, 社会, 心理, 家人
- B. 身体, 社会, 心理, 环境
- C. 社会, 心理, 家人, 生物
- D. 生物, 家庭, 心理, 身体
- E. 身体, 社会, 生物, 心理

22. 患者自己无能力变换体位, 卧于他人安置的体位

是指

- A. 主动卧位
- B. 被迫卧位
- C. 被动卧位
- D. 稳定性卧位
- E. 不稳定性卧位

23. 床单位处理中错误的是

- A. 病床污被服, 送洗衣房处理
- B. 床垫、床褥、棉胎等紫外线照射消毒或日光下暴晒 4h
- C. 病床及床旁桌椅用消毒溶液擦拭
- D. 病室开窗通风
- E. 铺备用床, 准备迎接新病人

24. 去枕仰卧位适用于椎管麻醉或腰椎麻醉术后多长时间

时间

- A. 4~6h
- B. 6~10h
- C. 8h
- D. 2h
- E. 6~8h

25. 中凹卧位的要求

- A. 病人头胸抬高 $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$, 下肢抬高 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- B. 病人头胸抬高 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$, 下肢抬高 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- C. 病人头胸抬高 $10^{\circ} \sim 30^{\circ}$, 下肢抬高 $25^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- D. 病人头胸抬高 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$, 下肢抬高 $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$
- E. 病人头胸抬高 $25^{\circ} \sim 30^{\circ}$, 下肢抬高 $10^{\circ} \sim 30^{\circ}$

26. 膝胸位适用于

- A. 产妇分娩
- B. 会阴部位检查、治疗
- C. 矫正胎位不正
- D. 妊娠时胎膜早破
- E. 胸、腹、盆腔手术后

27. 宽绷带主要用于

- A. 固定肩部
- B. 固定手腕及踝部
- C. 固定膝部
- D. 固定上臂
- E. 固定臀部

28. 使用约束带松解的时间为

- A. 每 4 小时松解 1 次
- B. 每 3 小时松解 1 次
- C. 每 2 小时松解 1 次
- D. 每小时松解 1 次
- E. 每 5 小时松解 1 次

29. 使用约束带需观察局部颜色, 一般为

- A. 10~20min
- B. 15min
- C. 10~30min
- D. 20~30min
- E. 30~60min

30. 不是医院内感染的主要原因是

- A. 管理制度不健全
- B. 环境污染严重
- C. 抗生素的广泛运用
- D. 未严格执行消毒隔离制度

E. 病人入院前已被感染

31. 凡士林适用的灭菌方法是

- A. 燃烧法
- B. 干烤法
- C. 煮沸消毒法
- D. 压力蒸汽灭菌法
- E. 光照消毒法

32. 压力蒸汽灭菌法不适用于

- A. 滑石粉
- B. 剪刀
- C. 导尿管
- D. 玻璃试管
- E. 纱布

33. 煮沸消毒时提高沸点需在水中加入

- A. 氢氧化钠
- B. 亚硝酸钠
- C. 氯化钠
- D. 碳酸氢钠
- E. 硫酸镁

34. 煮沸消毒如中途加入物品, 需如何计时

- A. 从物品加入开始计时
- B. 不需要重新计时
- C. 需等再次水沸后开始计时
- D. 等再次水沸后 2min 开始计时
- E. 物品加入后 2min 开始计时

35. 预真空压力蒸汽灭菌器物品的体积不大于

- A. $30\text{cm} \times 30\text{cm} \times 50\text{cm}$
- B. $30\text{cm} \times 30\text{cm} \times 25\text{cm}$
- C. $25\text{cm} \times 25\text{cm} \times 30\text{cm}$
- D. $30\text{cm} \times 30\text{cm} \times 30\text{cm}$
- E. $50\text{cm} \times 50\text{cm} \times 30\text{cm}$

36. 紫外线杀菌作用最强的波段是

- A. 150~200nm
- B. 200~250nm
- C. 250~270nm
- D. 220~240nm
- E. 250~300nm

37. 棉布包装的消毒包灭菌后其有效期在室温 25°C 以下

湿度低于 60% 为

- A. 7~10d
- B. 1 周内
- C. 2 周内
- D. 14d
- E. 4d

38. 无菌溶液一经打开, 其使用时间最长不超过

- A. 10h
- B. 24h
- C. 4h
- D. 12h
- E. 2h

39. 为保证紫外线灯的消毒效果, 一般多长时间用乙醇棉

球擦拭 1 次

- A. 每日
- B. 7d
- C. 2 周
- D. 1 个月
- E. 半年

40. 煮沸消毒时间一般为

- A. 水开后 3~5min
- B. 水开后 5~15min
- C. 水开后 15~30min
- D. 水开后 30min 以上
- E. 10~15min

41. 医院感染按其病原体的来源可分为

- A. 内源性和外源性
- B. 医源性和自身感染
- C. 可预防性和不可预防性
- D. 传染性和非传染性
- E. 血源性和非血源性

42. 对化学消毒剂抵抗力较强的是

- A. 结核杆菌
- B. 芽孢

- C. 细菌繁殖体 D. 大肠埃希菌
E. 铜绿假单胞菌

43. 空气消毒效果的监测,采样时间应在消毒处理后,无人走动的情况下,静止多长时间采样

- A. 5min B. 10min
C. 15min D. 20min
E. 25min

44. 高度危险性医疗器材是指能够进入人体的

- A. 血管 B. 黏膜
C. 胃肠道 D. 人体表面
E. 口腔

45. 中度危险性医疗器材是指能够进入人体的

- A. 无菌组织 B. 黏膜
C. 胃肠道 D. 人体表面
E. 无菌器官

46. 用于预真空压力蒸汽灭菌的器械包,其重量不得超过

- A. 5kg B. 10kg
C. 6kg D. 4kg
E. 7kg

47. 能有效去除物品上有机的清洗剂是

- A. 三效热源灭活剂 B. 含氯消毒液
C. 75%乙醇 D. 酶清洗剂
E. 家用洗洁精

48. 能够产生芽孢的细菌是

- A. 破伤风梭菌 B. 铜绿假单胞菌
C. 大肠埃希菌 D. 结核杆菌
E. 金黄色葡萄球菌

49. 紫外线灯消毒从灯亮多长时间后计时

- A. 5~10min B. 10~15min
C. 5~15min D. 4~6min
E. 5~7min

50. 紫外线用于空气消毒时,30W 紫外线灯管安装要求

- A. 1支/20m² B. 1支/30m²
C. 1支/10m² D. 1支/15m²
E. 1支/25m²

51. 无菌操作前多长时间停止清扫等工作,减少走动

- A. 15min B. 20min
C. 半小时 D. 45min
E. 1h

52. 无菌持物钳浸泡于消毒液中,消毒液液面需浸没轴节以上多少

- A. 1~2cm B. 2~3cm
C. 3~4cm D. 4~5cm
E. 5~6cm

53. 消毒是指

- A. 杀灭所有的微生物 B. 杀灭病原微生物
C. 杀死芽孢 D. 减少细菌
E. 减少污染

54. 最有效的物理灭菌法是

- A. 日光暴晒法 B. 煮沸消毒法
C. 紫外线照射法 D. 高压蒸汽灭菌法
E. 燃烧法

55. 最简单、迅速、彻底的灭菌方法是

- A. 干烤法 B. 煮沸法
C. 光照消毒法 D. 浸泡法
E. 燃烧法

56. 防止交叉感染最重要的措施是

- A. 无菌物品应放清洁、干燥、固定处
B. 无菌物品在空气中不得暴露过久
C. 无菌物品疑有或已有污染时不可再用
D. 一套无菌物品仅供一位病人使用
E. 无菌物品与非无菌物品须分别放置

57. 光照消毒法对何种微生物杀灭作用最强

- A. 杆菌 B. 球菌
C. 真菌 D. 霉菌
E. 芽孢

58. 依靠强大的氧化作用,达到杀灭芽孢和病毒的消毒剂是

- A. 过氧乙酸 B. 戊二醛
C. 环氧乙烷 D. 苯扎溴铵
E. 碘伏

59. 属于物理消毒方法的是

- A. 浸泡法 B. 光照消毒法
C. 擦拭法 D. 喷雾法
E. 熏蒸法

60. 属于化学消毒法的是

- A. 燃烧法 B. 湿热消毒法
C. 环氧乙烷灭菌法 D. 微波消毒灭菌法
E. 压力蒸汽灭菌法

61. 属于灭菌剂的是

- A. 含氯消毒剂 B. 过氧乙酸
C. 过氧化氢 D. 碘酊
E. 乙醇

62. 乙醇浓度超过多少,消毒效果会降低

- A. 75% B. 80%
C. 85% D. 90%
E. 95%

63. 属于中效消毒剂的是

- A. 戊二醛 B. 37%~40%甲醛
C. 氯己定 D. 碘伏
E. 过氧乙酸

64. 能杀灭肝炎病毒的含氯消毒剂有效浓度是

- A. 0.02% B. 0.05%
C. 0.1% D. 0.2%
E. 0.5%

65. 下列哪一组传染病可安置在同一病室

- A. 霍乱、伤寒 B. 肺结核、百日咳
C. 伤寒、甲型肝炎 D. 破伤风、坏疽
E. 乙脑、流脑

66. 接触隔离的适应对象是

- A. 肺结核、流脑 B. 伤寒、痢疾
C. 乙肝、艾滋病 D. 破伤风、气性坏疽
E. 霍乱、鼠疫

67. 严密隔离的适应对象是

- A. 肺结核、流脑 B. 伤寒、痢疾
C. 乙肝、艾滋病 D. 破伤风、气性坏疽

E. 霍乱、鼠疫

68. 床边隔离适用于

- A. 细菌性痢疾患者
- B. 乙脑患者
- C. 霍乱患者
- D. 乙肝患者
- E. 斑疹伤寒患者

69. 下列哪个区域是传染区的清洁区

- A. 病房
- B. 病区内走廊
- C. 厕所
- D. 值班室
- E. 化验室

70. 消毒隔离原则中错误的是

- A. 接触病人或污染物品后必须消毒双手
- B. 病室每日进行空气消毒
- C. 病室门前悬挂隔离标志
- D. 进入隔离区按要求戴口罩、帽子、穿隔离衣
- E. 每日晨间及晚间护理后,用消毒液擦拭床、床旁桌椅

71. 以下关于半污染区的隔离要求正确的是

- A. 半污染区内不得挂隔离衣
- B. 患者通过走廊时不得接触墙面
- C. 患者的物品不得放入半污染区
- D. 医务人员只有脱去隔离衣后方能进入半污染区
- E. 患者洗手间属于半污染区

72. 取用避污纸的方法错误的是

- A. 用后丢入生活垃圾桶
- B. 从页面抓取
- C. 不可掀开撕取
- D. 集中焚烧处理
- E. 注意保持清洁以防交叉感染

73. 下列哪种隔离患者应住单间

- A. 呼吸道隔离患者
- B. 消化道隔离患者
- C. 接触隔离患者
- D. 昆虫隔离患者
- E. 保护性隔离患者

74. 下列哪项不需要无菌操作

- A. 抽取药液
- B. 消毒皮肤
- C. 选择注射部位
- D. 进针抽回血
- E. 注射毕拔针

75. 严重烧伤患者需采取

- A. 严密隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 接触隔离
- D. 保护性隔离
- E. 消化道隔离

76. 下列不符合无菌操作原则的是

- A. 环境要清洁
- B. 无菌物品与非无菌物品须分别放置
- C. 操作者衣帽整洁
- D. 一套无菌物品可供多人使用
- E. 手臂不可跨越无菌区

77. 放置无菌持物钳的正确方法是

- A. 钳端向下闭合
- B. 钳端向下张开
- C. 钳端向上闭合
- D. 钳端向上张开
- E. 钳端平行

78. 取用无菌溶液时,错误的方法是

- A. 手不可触及瓶口及瓶塞内面
- B. 倒出后未使用及时倒回瓶中
- C. 已开启的溶液瓶内溶液,可保存 24h
- D. 不可将物品伸入无菌溶液瓶内蘸取溶液
- E. 倒后立即塞好瓶塞,以防污染

79. 戴、脱无菌手套时,错误的是

- A. 戴手套时,防止手套外触及任何非无菌物品
- B. 手套如有破损,立即更换
- C. 未戴手套的手不可触及手套内面
- D. 戴好手套的手始终保持在腰部以上水平
- E. 勿使手套污染面接触到皮肤

80. 取无菌溶液时,下列哪项是不必要的

- A. 认真核对瓶签
- B. 检查瓶口有无松动
- C. 检查瓶身有无裂纹
- D. 检查溶液有无沉淀、浑浊或变色
- E. 有无配伍禁忌

81. 传染病区内正确使用隔离衣的方法是

- A. 半污染区,清洁面朝内
- B. 污染区,清洁面朝外
- C. 送消毒时,清洁面朝外
- D. 先扣袖扣,再扣领扣
- E. 消毒双手后再解袖扣

82. 穿隔离衣时,手何时被污染

- A. 系袖扣时
- B. 取隔离衣时
- C. 穿隔离衣时
- D. 系领扣时
- E. 系腰带时

83. 口腔护理的目的中错误的是

- A. 保持口腔清洁、湿润
- B. 保持牙齿健康、美观
- C. 使病人舒适
- D. 防止口臭,增加食欲
- E. 观察口腔黏膜、舌苔变化

84. 常用漱口溶液错误的是

- A. 0.9%氯化钠溶液
- B. 0.05%呋喃西林溶液
- C. 1%~3%过氧化氢溶液
- D. 2%~3%硼酸溶液
- E. 1%~4%碳酸氢钠溶液

85. 常用漱口溶液的作用正确的是

- A. 0.9%氯化钠溶液:消除口臭
- B. 复方硼砂溶液(朵贝尔溶液):预防感染
- C. 1%~3%过氧化氢溶液:抗菌、防臭
- D. 1%~4%碳酸氢钠溶液:清洁口腔
- E. 0.1%醋酸溶液:抑菌作用

86. 有关口腔护理目的的描述,不正确的是

- A. 清洁口腔
- B. 祛除口臭
- C. 清除口腔内的一切细菌
- D. 观察口腔黏膜
- E. 预防疾病

87. 1%~3%过氧化氢溶液用于口腔护理的作用是

- A. 抗菌防臭
- B. 抑菌
- C. 除臭
- D. 清洁口腔
- E. 广谱抗菌

88. 为昏迷患者做口腔护理不必准备的是

- A. 液状石蜡
- B. 吸水管
- C. 治疗碗
- D. 压舌板
- E. 弯止血管

89. 患者的活动义齿取下后,应放于

- A. 70%乙醇
- B. 冷开水
- C. 温开水
- D. 生理盐水

E. 呋喃西林溶液

90. 床上洗头的热水温度

- A. 35~38℃
- B. 40℃
- C. 30~32℃
- D. 40~45℃
- E. 45~50℃

91. 配制百部溶液时所需乙醇的浓度为

- A. 30%
- B. 50%
- C. 60%
- D. 70%
- E. 90%

92. 消灭头虱的目的

- A. 保持美观
- B. 保护头发
- C. 预防疾病传播
- D. 保护头皮
- E. 去除头屑

93. 适宜盆浴的患者是

- A. 严重心脏病
- B. 胃癌术后 5d
- C. 严重创伤
- D. 极度衰弱者
- E. 妊娠 7 个月

94. 床上擦浴的室温为

- A. 18~20℃
- B. 20~22℃
- C. 24~25℃
- D. 26~28℃
- E. 20~24℃

95. 下列哪项不是晨间护理的内容

- A. 协助病人排便
- B. 更换床单
- C. 口腔护理
- D. 会阴冲洗
- E. 皮肤护理

96. 产生压疮的主要原因

- A. 由于压迫造成的局部组织缺血、缺氧
- B. 营养不良
- C. 潮湿
- D. 年老、体弱
- E. 矫形器械的衬垫不当

97. 有关炎性浸润期的叙述不正确的是

- A. 静脉回流受阻
- B. 有脓性分泌物
- C. 皮肤呈紫色
- D. 患者有痛感
- E. 可出现水疱

98. 截瘫患者长时间仰卧,最易产生压疮的部位

- A. 枕部
- B. 足跟部
- C. 肩胛部
- D. 肘部
- E. 骶尾部

99. 压疮的好发部位不包括

- A. 坐位好发于坐骨结节
- B. 俯卧位好发于腹部
- C. 侧卧位好发于肘部
- D. 仰卧位好发于骶尾部
- E. 头高足低为好发于足跟部

100. 安静状态下热量主要来源于

- A. 胃肠
- B. 肝脏
- C. 心脏
- D. 肾脏
- E. 肺脏

101. 缺氧时,患者可出现

- A. 皮肤出血点
- B. 皮肤弹性差
- C. 皮肤黄染
- D. 口唇、四肢末梢发绀
- E. 皮肤出现皮疹

102. 丘脑下部有病变时可出现

- A. 血压异常
- B. 内分泌失调

C. 水、电解质紊乱

D. 呼吸不规则

E. 体温失调

103. 发热常见的病因是

- A. 感染
- B. 无菌坏死组织的吸收
- C. 恶性肿瘤
- D. 变态反应性疾病
- E. 体温调节中枢功能失常

104. 高热患者退热期提示可能发生虚脱的症状是

- A. 皮肤苍白、寒战
- B. 头晕、出汗、疲倦
- C. 脉细数、四肢湿冷、出汗
- D. 脉搏、呼吸减慢,出汗
- E. 脉速、面部潮红、头晕

105. 败血症的常见热型是

- A. 间歇热
- B. 稽留热
- C. 不规则热
- D. 弛张热
- E. 双峰热

106. 发热无一定规律,且持续时间不定是指

- A. 弛张热
- B. 稽留热
- C. 不规则热
- D. 间歇热
- E. 双峰热

107. 不会引起体温过低的因素是

- A. 早产儿
- B. 晕厥
- C. 败血症
- D. 药物中毒
- E. 濒死状态

108. 体温过低的护理措施错误的是

- A. 维持室温在 20~22℃
- B. 给予毛毯、棉被、电热毯,添加衣服,防止体温散失
- C. 给予热饮,提高机体体温
- D. 生命体征观察
- E. 持续监测体温的变化

109. 可在口腔测量体温的患者是

- A. 婴幼儿
- B. 昏迷
- C. 大面积烧伤
- D. 口鼻手术
- E. 呼吸困难

110. 下列哪种情况测量口腔温度不妥

- A. 面部冷湿敷 30min 后
- B. 呼吸困难
- C. 饭后 30min
- D. 截瘫患者
- E. 痰管喂食者

111. 物理降温 30min 测得的体温记录在降温前的同一纵格内的符号是

- A. 红点红虚线
- B. 红圈红虚线
- C. 蓝点蓝虚线
- D. 蓝圈蓝虚线
- E. 蓝圈红虚线

112. 测量肛温时,将肛表插入肛门的深度为

- A. 1~2cm
- B. 2~3cm
- C. 3~4cm
- D. 4~5cm
- E. 5~6cm

113. 测量口腔温度时,患者不慎咬破体温计,吞下水银后应立即

- A. 催吐或洗胃
- B. 服解毒药物
- C. 大量补液,冲洗毒物
- D. 嘱患者安静,密切观察病情

E. 口服蛋清或牛奶

114. 退热期的特点是

- A. 散热大于产热
- B. 产热大于散热
- C. 产热和散热趋于平衡
- D. 散热增加而产热趋于正常
- E. 产热和散热在较高水平上平衡

115. 流行性感常表现为

- A. 稽留热
- B. 弛张热
- C. 间歇热
- D. 不规则热
- E. 波浪热

116. 发热时脉率增快是由于

- A. 机体代谢率减低
- B. 机体代谢率增高
- C. 心排血量减低
- D. 心肌收缩率增强
- E. 心肌收缩率减弱

117. 交替脉多见于

- A. 心房纤颤
- B. 甲状腺功能亢进
- C. 高血压心脏病
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 大出血

118. 属于节律异常的脉搏见于

- A. 速脉
- B. 绀脉
- C. 滑脉
- D. 洪脉
- E. 奇脉

119. 脉搏短绌可见于

- A. 房室传导阻滞
- B. 心室纤颤
- C. 心房纤颤
- D. 窦性心律失常
- E. 阵发性心动过速

120. 测量脉搏的首选部位是

- A. 颞动脉
- B. 足背动脉
- C. 颈动脉
- D. 肱动脉
- E. 桡动脉

121. 观察病情时,遇到下列哪种患者须两人同时分别测

量心率和脉搏

- A. 心房纤颤
- B. 心动过速
- C. 心动过缓
- D. 心律失常
- E. 阵发性心动过速

122. 脉率变化与下列相符的是

- A. 女性比男性稍慢
- B. 儿童脉率较快
- C. 洋地黄类药物使脉率加快
- D. 咖啡使脉率减慢
- E. 身材细高者比矮壮者的脉率快

123. 呼吸由浅慢逐渐变为深快,再由深快变浅慢,呼吸暂

停后,周而复始是

- A. 深度呼吸
- B. 浅快呼吸
- C. 潮式呼吸
- D. 间断呼吸
- E. 蝉鸣样呼吸

124. 蝉鸣样呼吸见于

- A. 昏迷病人
- B. 脑膜炎病人
- C. 巴比妥药物中毒病人
- D. 喉头水肿
- E. 尿毒症病人

125. 代谢性酸中毒患者的呼吸异常表现

- A. 吸气性呼吸困难
- B. 呼气性呼吸困难

C. 间断呼吸

D. 呼吸深大而规则

E. 呼吸浅表而不规则

126. 测量血压时袖带缠得过松可使血压

- A. 偏低
- B. 偏高
- C. 无影响
- D. 压差增大
- E. 压差减少

127. 有关测量血压的注意事项中错误的是

- A. 血压计定期检查
- B. 放气不可太慢
- C. 手臂位置与心脏同一水平
- D. 听不清楚立即重测
- E. 长期测量者应做到四定

128. 幼儿测血压用成年人袖带,其测量的数值

- A. 偏高
- B. 脉压大
- C. 无影响
- D. 脉压小
- E. 偏低

129. 颅内压降低引起的头痛的机制是

- A. 牵张颅内静脉窦
- B. 脑部充血
- C. 脑部缺氧
- D. 脑膜炎
- E. 脑细胞缺氧

130. 水银不足,测出的血压值

- A. 偏高
- B. 偏低
- C. 无影响
- D. 脉压大
- E. 脉压小

131. 氧气筒内氧气勿用尽,压力表至少要保留

- A. 0.05kg/cm²
- B. 2kg/cm²
- C. 3kg/cm²
- D. 4kg/cm²
- E. 5kg/cm²

132. 减压器可将氧气筒内压力减至

- A. 1~2kg/cm²
- B. 2~3kg/cm²
- C. 3~4kg/cm²
- D. 4~5kg/cm²
- E. 5~6kg/cm²

133. 当氧气浓度高于多少,持续超过 24h,可能发生氧

中毒

- A. 50%
- B. 40%
- C. 60%
- D. 70%
- E. 80%

134. 单侧鼻导管给氧导管插入长度

- A. 鼻尖到耳垂的 2/3
- B. 鼻尖到耳垂的 1/3
- C. 鼻尖到胸骨的 1/3
- D. 鼻尖到胸骨的 2/3
- E. 鼻尖到胸骨

135. 氧浓度为 45%,每分钟的氧流量为

- A. 3L
- B. 4L
- C. 5L
- D. 6L
- E. 7L

136. 对于 II 型呼吸衰竭病人应给予低浓度、低流量给氧,氧流量为

- A. 1~2L/min
- B. 2~3L/min
- C. 3~4L/min
- D. 4~5L/min
- E. 5~6L/min

137. 鼻导管给氧的操作错误的是

- A. 检查氧气装置有无漏气
- B. 防火、防油

- C. 先开总关,再开流量表开关
D. 先关闭总开关,再取下鼻导管
E. 调节流量,再插入鼻导管

138. 润滑鼻导管用

- A. 液状石蜡 B. 肥皂水
C. 凡士林 D. 乙醇
E. 冷开水

139. 用电动吸器吸痰,每次吸痰时间是

- A. 不超过 5s B. 不超过 10s
C. 不超过 15s D. 不超过 20s
E. 不超过 25s

140. 电动吸器连续使用时间不宜超过

- A. 1h B. 2h
C. 3h D. 4h
E. 5h

141. 加压给氧适用于

- A. 急性肺水肿 B. 慢性心源性心脏病
C. 哮喘严重者 D. 巴比妥药物中毒
E. 颅脑损伤

142. 基本饮食不包括

- A. 普通饮食 B. 软质饮食
C. 半流质饮食 D. 要素饮食
E. 流质饮食

143. 属于治疗性饮食的是

- A. 普通饮食 B. 低盐饮食
C. 吸碘试验饮食 D. 隐血试验饮食
E. 流质饮食

144. 低盐饮食要求每天摄入食盐少于

- A. 0.5g B. 1g
C. 1.5g D. 2g
E. 2.5g

145. 急性肾炎患者适用的饮食

- A. 低蛋白饮食 B. 低脂饮食
C. 高纤维饮食 D. 低盐饮食
E. 高热能饮食

146. 属于脂溶性维生素的是

- A. 维生素 A B. 维生素 C
C. 维生素 B₁ D. 维生素 B₂
E. 叶酸

147. 促进钙质吸收的维生素是

- A. 维生素 C B. 维生素 D
C. 维生素 E D. 维生素 K
E. 叶酸

148. 禁用鼻饲法的是

- A. 昏迷 B. 拒绝进食者
C. 早产儿 D. 不能张口者
E. 食管静脉曲张

149. 昏迷患者插胃管时,应采取

- A. 坐位 B. 左侧卧位
C. 右侧卧位 D. 半坐卧位
E. 去枕仰卧位

150. 成年人插胃管的长度是

- A. 15~25cm B. 25~35cm

- C. 35~45cm D. 45~55cm
E. 55~65cm

151. 应用热疗的目的下列哪项正确

- A. 促进浅表炎症消退和局限
B. 抑制炎症扩散
C. 减轻局部充血或出血
D. 传导发散体内的热
E. 提高痛觉神经的兴奋性

152. 为达到保暖、解痉、镇痛的目的,应选用

- A. 湿热敷 B. 温水浴
C. 热水坐浴 D. 热水袋
E. 红外线照射

153. 下列病人使用热水袋时,水温可以为 60~70℃ 的是

- A. 昏迷病人 B. 瘫痪病人
C. 婴幼儿病人 D. 老年病人
E. 腹泻病人

154. 使用热水袋时哪项操作不正确

- A. 测量水温
B. 灌水至 1/3~1/2 满
C. 热水袋用布套套好后再使用
D. 拧紧盖子前排尽空气
E. 昏迷病人使用热水袋水温应为 70℃

155. 何种情况不宜采用热水坐浴疗法

- A. 痔疮手术后 B. 肛门部充血
C. 外阴炎症 D. 肛门周围炎症
E. 女性月经期

156. 使用红外线烤灯时,错误的操作是

- A. 对病人的情况进行评估
B. 暴露治疗部位
C. 灯距为 20~30cm
D. 时间为 20~30min
E. 注意观察病人反应

157. 对伤口局部进行湿敷时,应注意

- A. 防止弄湿床单
B. 皮肤局部及周边涂凡士林
C. 水温要适度
D. 严格进行无菌操作
E. 及时更换敷料

158. 下列哪种病人不宜用冷疗

- A. 早期局部软组织损伤的病人
B. 牙痛的病人
C. 高热的病人
D. 慢性炎症的病人
E. 中暑病人

159. 关于冷疗的应用不正确的是

- A. 减轻疼痛 B. 减轻深部组织的充血
C. 降温 D. 控制炎症扩散
E. 减少脑细胞耗氧量

160. 为高热病人进行乙醇擦浴时,不正确的做法是

- A. 乙醇的浓度是 25%~35%
B. 置冰袋于病人足下
C. 擦浴时禁拭前胸、腹部、后颈
D. 擦浴后半小时内测体温

E. 擦浴中应注意观察病人的全身情况

161. 乙醇擦浴时,禁止擦拭的部位是

- A. 头部和四肢
- B. 手掌和肘窝
- C. 腋窝和腹股沟
- D. 前胸和腹部
- E. 两侧肾区

162. 为病人进行冷热疗法时,关于温度的说法正确的是

- A. 麻醉未清醒的病人热水袋温度应为 50~60℃
- B. 湿热敷时水温应为 60~70℃
- C. 温水坐浴时水温应为 50~60℃
- D. 温水擦浴时水温应为 32~34℃
- E. 局部浸泡时水温应为 50℃

163. 肝性脑病人灌肠时禁用肥皂水的原因是

- A. 可发生碱中毒
- B. 可发生腹胀
- C. 可发生肠穿孔
- D. 可增加氨的吸收
- E. 可导致水中毒

164. 尿失禁病人的护理措施下列哪项是错误的

- A. 可采用接尿器或尿壶接尿
- B. 对长期失禁病人可给予留置导尿管
- C. 嘱病人少饮水以减少尿量
- D. 注意皮肤护理
- E. 指导病人锻炼盆底肌肉

165. 少尿是指

- A. 24h 尿量<50ml
- B. 24h 尿量<100ml
- C. 24h 尿量<200ml
- D. 24h 尿量<300ml
- E. 24h 尿量<400ml

166. 为男性病人插导尿管时,将阴茎提起与腹壁呈 60° 的目的是

- A. 使尿道口扩张,以利尿管插入
- B. 使尿道狭窄消失,以利尿管插入
- C. 使耻骨下弯消失,以利尿管插入
- D. 使耻骨前弯消失,以利尿管插入
- E. 使尿道膜部狭窄扩张,以利尿管插入

167. 下列留置导尿管的护理,不正确的是

- A. 每日定时更换尿液引流袋
- B. 集尿袋不得超过膀胱高度
- C. 鼓励病人多饮水
- D. 发现尿液浑浊,沉淀,应及时拔尿管
- E. 防止引流管受压、扭曲

168. 如长期留置导尿管的病人出现尿液浑浊、沉淀或结晶,应采取的护理措施

- A. 给予抗生素
- B. 清洁尿道口
- C. 进行膀胱冲洗
- D. 热敷下腹部
- E. 更换导尿管

169. 休克病人留置导尿管最主要的目的是

- A. 引流尿液,促进有毒物质排出
- B. 定时测量尿量及比重,了解肾血流灌注情况
- C. 避免尿潴留
- D. 便于留取尿标本做细菌培养
- E. 保持床单位清洁干燥

170. 欲行盆腔手术的病人留置导尿管的目的是

- A. 排空膀胱,避免术中误伤
- B. 避免尿潴留
- C. 定时测量尿量及比重,了解肾血流灌注情况

D. 避免尿失禁

E. 便于留取尿标本做细菌培养

171. 下列病人导尿后不留置导尿管的是

- A. 昏迷病人尿失禁
- B. 盆腔手术前
- C. 瘫痪病人伴有尿潴留
- D. 会阴部损伤
- E. 测量膀胱压力

172. 下列哪项对尿失禁的描述是正确的

- A. 咳嗽时,有少量尿液不自主溢出是假性尿失禁
- B. 咳嗽时,有少量尿液不自主溢出是充盈性尿失禁
- C. 咳嗽时,有少量尿液不自主溢出是压力性尿失禁
- D. 咳嗽时,有少量尿液不自主溢出是真性尿失禁
- E. 当膀胱内尿液充盈到一定程度时不溢出少量尿液是压力性尿失禁

173. 糖尿病酮症酸中毒病人的尿液

- A. 有氨臭味
- B. 有恶臭味
- C. 呈乳白色
- D. 有烂苹果气味
- E. 呈酱油色

174. 无尿是指

- A. 24h 尿量<400ml
- B. 24h 尿量<200ml
- C. 24h 尿量<100ml
- D. 每小时尿量<17ml
- E. 24h 尿量<50ml

175. 下列对排便异常的描述错误的是

- A. 肠套叠病人可有果酱样便
- B. 痢疾病人粪便为脓血便
- C. 痔疮病人排便后有鲜血滴出
- D. 上消化道出血病人粪便为柏油样便
- E. 胆道完全梗阻病人粪便呈暗黑色

176. 柏油样便常见于

- A. 下消化道出血患者
- B. 痔疮患者
- C. 肠梗阻患者
- D. 霍乱患者
- E. 上消化道出血患者

177. 下列哪种疾病患者粪便为白陶土色

- A. 霍乱
- B. 完全肠梗阻
- C. 肠套叠
- D. 完全胆道梗阻
- E. 痢疾

178. 下列预防便秘的措施哪项不正确

- A. 适当食用油脂类食物
- B. 定期服用缓泻药
- C. 建立规律的排便习惯
- D. 适当运动,卧床病人可进行床上活动
- E. 多饮水

179. 下列有关灌肠的注意事项描述错误的是

- A. 急腹症、消化道出血、妊娠等禁忌灌肠
- B. 对顽固性失眠者可予保留灌肠进行镇静、催眠
- C. 中暑病人可用 4℃ 生理盐水进行大量不保留灌肠
- D. 肝性脑病人禁用肥皂水灌肠
- E. 伤寒病人灌肠液量不得超过 100ml

180. 阿米巴痢疾病人行保留灌肠时应采用的部位是

- A. 俯卧位
- B. 膝胸卧位
- C. 左侧卧位
- D. 右侧卧位
- E. 仰卧位

181. 保留灌肠常用的“1,2,3”溶液是指

- A. 50%硫酸镁 30ml,甘油 30ml、温开水 30ml

- B. 50%硫酸镁 30ml,甘油 60ml、温开水 90ml
- C. 50%硫酸镁 20ml,甘油 40ml、温开水 60ml
- D. 50%硫酸镁 10ml,甘油 20ml、温开水 30ml
- E. 50%硫酸镁 60ml,甘油 60ml、温开水 60ml

182. 行保留灌肠时,灌肠筒内液面距肛门

- A. 不超过 50cm
- B. 不超过 45cm
- C. 不超过 40cm
- D. 30~40cm
- E. 不超过 30cm

183. 下列哪种情况不是大量不保留灌肠的适应证

- A. 为急腹症病人术前做肠道准备
- B. 为结肠癌手术病人行肠道准备
- C. 为高热病人降温
- D. 为分娩者做肠道准备
- E. 为便秘者软化、清除粪便

184. 下列哪种情况可实施大量不保留灌肠

- A. 急性心肌梗死
- B. 急腹症
- C. 妊娠早期
- D. 消化道出血
- E. 高热病人降温

185. 行肛管排气法,肛管插入直肠的深度及保留肛管时间应为

- A. 7~10cm,不超过 15min
- B. 10~15cm,不超过 15min
- C. 10~15cm,不超过 20min
- D. 15~20cm,不超过 20min
- E. 15~20cm,不超过 30min

186. 男性尿道的狭窄部位是

- A. 耻骨上弯、耻骨前弯
- B. 尿道外口、尿道内口
- C. 尿道内口、膜部、尿道外口
- D. 耻骨上弯、耻骨前弯、耻骨后弯
- E. 耻骨上弯、耻骨前弯、尿道外口

187. 多尿是指

- A. 24h 尿量超过 1 500ml
- B. 24h 尿量超过 2 000ml
- C. 24h 尿量超过 2 500ml
- D. 24h 尿量超过 3 000ml
- E. 24h 尿量超过 3 500ml

188. 血红蛋白尿的颜色是

- A. 浅黄色
- B. 深黄色
- C. 黄褐色
- D. 红色
- E. 酱油色

189. 对尿潴留的病人护理哪项是错误的

- A. 热敷下腹部
- B. 协助病人采取适当的体位
- C. 听流水声
- D. 用温水冲洗外阴
- E. 口服利尿药

190. 检查 17-羟类固醇的尿标本应使用何种防腐剂

- A. 甲苯
- B. 甲醛
- C. 浓盐酸
- D. 浓硫酸
- E. 甲醇

191. 留 24h 尿标本时加入甲醛的作用是

- A. 固定尿中有机成分
- B. 防止尿液中的激素被氧化
- C. 防止尿液产生浑浊

D. 防止尿液被污染变质

E. 保持尿液中的化学成分不变

192. 做 17-羟类固醇检查时,24h 尿标本中加入浓盐酸的目的是

- A. 固定尿中有机成分
- B. 防止尿液中的激素被氧化
- C. 防止尿液产生浑浊
- D. 防止尿液被污染变质
- E. 保持尿液中的化学成分不变

193. 做尿糖定量检查时,尿标本中应加入

- A. 浓盐酸
- B. 甲醛
- C. 甲苯
- D. 稀盐酸
- E. 甲醇

194. 药物保管原则错误的是

- A. 保持药柜整洁
- B. 药瓶上应有明显标签
- C. 麻醉药要放在易取处
- D. 内服药、外用药应分类保管
- E. 专人负责,定期检查

195. 易氧化和遇光变质的药物是

- A. 乙醇、过氧乙酸
- B. 维生素、氨茶碱
- C. 糖衣片、干酵母
- D. 胎盘球蛋白、疫苗
- E. 乙醚、环氧乙酸

196. 下列必须放在冰箱内保存的药物是

- A. 盐酸肾上腺素
- B. 乙醚
- C. 糖衣片
- D. 疫苗
- E. 维生素

197. 剧毒药的保管方法是

- A. 专人保管,定期检查
- B. 单独存放,注明有效期
- C. 定期领取,按量使用
- D. 加锁保管,列入交班内容
- E. 放冰箱内保存

198. 药瓶上的标签规定哪项是错的

- A. 内服药——蓝色边
- B. 外用药——红色边
- C. 剧毒药——黑色边
- D. 药名应用中文,不可用外文
- E. 瓶签上要标明药名、浓度和剂量

199. 药疗原则中,下述哪项是错的

- A. 根据医嘱给药
- B. 严格执行“三查”“七对”制度
- C. 备好的药物须及时分发
- D. 给药时间、剂量、浓度要正确
- E. 对药物过敏者,必须做过敏试验

200. 下列哪一种给药途径发挥药效最快

- A. 舌下含化
- B. 雾化吸入
- C. 静脉注射
- D. 直肠灌注
- E. 口服

201. 每周 2 次的外文缩写是

- A. qd
- B. qid
- C. bid
- D. tid
- E. biw

202. 即刻的外文缩写是

- A. st
- B. qtt
- C. ac
- D. pc
- E. H

203. 临睡前外文缩写是

- A. qh
- B. hs
- C. am
- D. pm
- E. qn

204. 发口服药时,如果病人不在应将药

- A. 取回保管并交班
- B. 放在床旁桌上
- C. 交给同室病人保管
- D. 放在床旁桌的抽屉里
- E. 包好同下次药一起发

205. 备口服药的方法,下列哪项是错误的

- A. 查对服药本和小药卡
- B. 按床号、姓名、时间排序
- C. 按药名、浓度、剂量备药
- D. 先备水剂,后备固体药
- E. 备完药重新查对1次

206. 指导病人服止咳糖浆正确方法是

- A. 服药后要漱口
- B. 不宜饮水
- C. 应多喝水
- D. 饭前服
- E. 饭后服

207. 刺激食欲的健胃药适宜的服药时间是

- A. am
- B. pm
- C. ac
- D. pc
- E. hs

208. 下列哪类药在服用前要测心率

- A. 氨茶碱
- B. 泼尼松
- C. 利舍平
- D. 洋地黄
- E. 地西洋(安定)

209. 发口服药时,下列哪项不妥

- A. 配好的药再查对1次
- B. 按时发药,视病人服下再离开
- C. 病人提出疑问应重新核对
- D. 胃肠减压者研碎药溶解后从管内注入
- E. 药杯收回消毒处理

210. 备药时须将药研碎、溶解后再给予的病人是

- A. 甲状腺功能亢进病人
- B. 呕吐病人
- C. 高热病人
- D. 上消化道出血病人
- E. 鼻饲病人

211. 雾化吸入治疗的目的不包括

- A. 治疗呼吸道炎症
- B. 解除支气管痉挛
- C. 帮助祛痰
- D. 预防心力衰竭
- E. 治疗肺癌

212. 超声雾化吸入常用稀化痰液的药物是

- A. 庆大霉素
- B. 糜蛋白酶
- C. 氨茶碱
- D. 地塞米松
- E. 沙丁胺醇

213. 超声波雾化器发生超声波声能的部件是

- A. 超声波发生器
- B. 雾化罐
- C. 晶体换能器
- D. 透声膜
- E. 螺纹管

214. 超声雾化罐内放入药液稀释至

- A. 2.5ml
- B. 6~10ml
- C. 10~20ml
- D. 20~30ml

E. 30~50ml

215. 超声波雾化器的特点不包括

- A. 利用高频电能输出雾滴
- B. 雾滴小而均匀
- C. 雾量大小可调节
- D. 气雾温暖
- E. 药液可吸到终末支气管

216. 超声雾化吸入的操作,正确的是

- A. 水槽内加冷水,浸透声膜
- B. 雾化罐内放药液100ml
- C. 接通电源调定时间30min
- D. 水槽内水温超过100℃更换冷水
- E. 雾化罐内药少时应关机,从盖上小孔内注入

217. 超声雾化罐,螺纹管和口含嘴用后浸泡的消毒液和时间为

- A. 75%乙醇,30min
- B. 1%碘酊,15min
- C. 0.5%含氯石灰澄清液,10min
- D. 0.5%过氧乙酸,30min
- E. 0.1%苯扎溴铵,60min

218. 在使用超声雾化吸入治疗中,下述错误的是

- A. 使用前检查机器性能
- B. 机器和雾化罐型号要一致
- C. 晶体换能器轻拿轻放
- D. 水槽和雾化罐中应加温水
- E. 需连续使用时,应间歇30min

219. 氧气雾化吸入时,其氧流量调至

- A. 0.5L/min
- B. 1~2L/min
- C. 2~4L/min
- D. 4.5L/min
- E. 6~8L/min

220. 氧气雾化吸入时,持雾化器的手指动作正确的是

- A. 吸气时按住出气口
- B. 呼气时按住出气口
- C. 吸气时松开进气口
- D. 呼气时松开进气口
- E. 呼气、吸气时均按住出气口

221. 氧气雾化吸入的药液应选用的稀释液及量是

- A. 生理盐水,2ml
- B. 蒸馏水,5ml
- C. 5%葡萄糖,5ml
- D. 5%糖盐水,10ml
- E. 冷开水,2ml

222. 氧气雾化吸入法原理是利用

- A. 负压作用
- B. 正压作用
- C. 虹吸作用
- D. 空吸作用
- E. 高速气流作用

223. 氧气雾化吸入法的注意事项,错误的是

- A. 雾化器内的药液必须浸没弯管的底部
- B. 湿化瓶内要放清水
- C. 指导病人做深吸气动作
- D. 指导病人呼吸时手指配合
- E. 操作时严禁有人在旁吸烟

224. 下列哪一项不符合注射原则

- A. 注射前护士必须洗手,戴口罩
- B. 做好“三查”“七对”
- C. 选择合适的部位,防止损伤神经和血管
- D. 注射部位消毒范围大于5cm

E. 注射时进针推药要快,拔针慢

225. 注射部位皮肤消毒的方法

- A. 从左至右涂擦 5cm 以上
- B. 从外向中心旋转涂擦 5cm 以上
- C. 从中心向外旋转涂擦直径 5cm 以上
- D. 从上至下涂擦 5cm 以上
- E. 从近侧向远侧涂擦 5cm 以上

226. 何项不符合无痛注射法

- A. 与病人沟通,分散注意力
- B. 取合适体位,使肌肉松弛
- C. 进针快,减轻疼痛
- D. 对刺激性强的药物针头要粗长
- E. 先注射刺激性强的药

227. 从安瓿中吸取药液的操作哪项是错的

- A. 核对检查
- B. 消毒瓶颈,锯瓶颈再消毒,折断
- C. 针头斜面放入安瓿内的液面下,吸药
- D. 吸药时手握住活塞
- E. 药液抽吸不余,不漏,不污染

228. 从密封瓶内吸取药液,哪项操作步骤是错的

- A. 查对
- B. 除去铝盖中心部分,消毒待干
- C. 注入所需药液等量空气
- D. 倒转瓶及注射器使针头在液面上
- E. 吸取药液至所需量,固定针栓拔针

229. 无菌注射器及针头手可接触的部位是

- A. 针尖,乳头
- B. 针梗,活塞
- C. 针栓,空筒
- D. 活塞,针栓
- E. 乳头,活塞

230. 药物过敏试验常用皮肤消毒剂为

- A. 70%乙醇
- B. 2%碘酊
- C. 0.1%苯扎溴铵
- D. 2%戊二醛
- E. 1%过氧乙酸

231. 注射时防止差错事故发生的钥匙是

- A. 严格掌握无菌操作原则
- B. 选择合适的注射部位
- C. 选择合适的注射器和针头
- D. 坚持“三查”“七对”
- E. 注意药物配伍禁忌

232. 皮下注射,下述何项错误

- A. 药量少于 1ml
- B. 注射部位要常规消毒
- C. 持针时,右手食指固定针栓
- D. 针头与皮肤呈 50°刺入
- E. 抽吸无回血,方可推药

233. 下列哪类药不宜做皮下注射

- A. 菌苗
- B. 局麻药
- C. 细胞色素 C 试验液
- D. 胰岛素
- E. 疫苗

234. 上臂肌肉注射的部位是

- A. 上臂肩峰上 2~3 横指
- B. 上臂肩峰下 2~3 横指
- C. 上臂三角肌下缘

D. 上臂三角肌下 2~3 横指

E. 肘关节以上均可

235. 臀大肌注射时,应避免刺伤

- A. 臀部动脉
- B. 臀部静脉
- C. 坐骨神经
- D. 臀部淋巴
- E. 骨膜

236. 肌肉注射,哪项步骤是错的

- A. 查对,抽取药液
- B. 常规消毒皮肤
- C. 绷紧皮肤,垂直进针
- D. 抽无回血,快速注药
- E. 拔针后,轻压进针点

237. 下列哪项操作,不需碘酊消毒皮肤

- A. 皮下注射
- B. 静脉抽血
- C. 肌肉注射
- D. 静脉注射
- E. 皮内注射

238. 肌肉注射时,为使臀部肌肉放松,应采取的姿势为

- A. 侧卧位,下腿稍弯,上腿稍伸直
- B. 俯卧位,足尖分开,足跟相对
- C. 仰卧位,足尖分开,足跟相对
- D. 坐位,身体前倾
- E. 站立位,两脚并拢

239. 以连线法取臀大肌注射的定位法是

- A. 髂前上棘与脊柱连线外 1/3 处
- B. 髂嵴与脊柱连线外 1/3 处
- C. 髂前上棘与尾骨连线外上 1/3 处
- D. 髂嵴与尾骨连线外 1/3 处
- E. 髂前上棘与骶骨连线外 1/3 处

240. 股外侧肌注射适用于

- A. 大剂量注射
- B. 多次注射
- C. 小剂量注射
- D. 少次注射
- E. 混合剂注射

241. 2 岁以下的婴幼儿肌肉注射时最好选用

- A. 臀大肌
- B. 臀中肌、臀小肌
- C. 前臂外侧肌
- D. 股外侧肌
- E. 上臂三角肌

242. 股静脉穿刺的部位在股三角区的

- A. 股动脉内侧 0.5cm
- B. 股动脉外侧 0.5cm
- C. 股神经内侧 0.5cm
- D. 股神经外侧 0.5cm
- E. 股动脉与股神经之间

243. 禁忌静脉推注的药物是

- A. 氨茶碱
- B. 10%氯化钾
- C. 50%葡萄糖
- D. 30%泛影葡胺
- E. 10%葡萄糖酸钙

244. 股静脉注射完毕,拔针后应做到

- A. 用棉球轻轻按压针眼
- B. 针眼再次用 2%碘酊消毒
- C. 用无菌纱布加压止血 3~5min
- D. 用消毒棉签按压片刻
- E. 用乙醇棉球按压针眼,并让病人屈腿

245. 忌做青霉素过敏试验的病人是

- A. 首次用青霉素者
- B. 停药 3d
- C. 使用中更换批号
- D. 已知病人有青霉素过敏史者