

卷四

婦人方下凡四類

補益

月水不通

癥瘕

赤白帶下崩中漏下

月水不調

卷五

少小嬰孺方九類

論說

序例

方劑

擇乳母法

初生出腹

驚癇

客忤

小兒傷寒

欬嗽

癖結脹滿霍亂

癰疽瘰癧

雜病

孫真人備急千金要方卷四

長洲張璐路玉衍義
南沙席世臣鄧客校

婦人方下凡四類

補益第十八論一首 方十四首

論曰凡婦人欲求美色肥白罕比年至七十與少不殊者勿服紫石英令人色黑當服鍾乳澤蘭丸也
柏子仁圓 治婦人五勞七傷羸瘦削面無顏色飲食減少貌失光澤及產後斷緒無子能久服令人

肥白補益方

柏子仁 黃耆 乾薑

鍾乳

白石英

蜀椒

杜仲 當歸

甘草

芎藭

各四十厚朴

桂心 桔梗 赤石脂

茯苓

五味子

白木

細辛

獨活

人參

石斛

白芷

芍藥

澤蘭

各二兩

燕莢

乾地黄

烏頭

牛膝

防風

各三

右三十味

為末蜜和

酒服

二十丸

如梧子

不知加至三十丸

秦丸

各半兩

兩并治產後半身枯痺

產後半身枯痺

產後半身枯痺

產後半身枯痺

產後半身枯痺

產後半身枯痺

產後半身枯痺

產後半身枯痺

衍義

千金立方之義

專以方下所主之證為主

此方主治總以羸冷二字為之綱旨

故用鍾乳紫白

石英赤石脂為峻溫藏氣之專藥

較大小五石澤蘭丸中所用石藥祇少禹糧石膏較小五石澤蘭丸祇

少陽起石石膏蓋禹餘糧專主腹中雷鳴陽起石專主冷勞虛損小五石中以有礬石大五石中以有龍

骨故用石膏以清解二藥之滯滯此方專主羸冷羸之與勞輕重懸殊既無藉於斂滯亦無庸於清解

其立方本意全在崩中經漏崩中經漏係衝脉所主衝脉附肝而行原非脾腎之病故無藉禹糧陽起

石也石性重著故須薑棗辛烏等雄悍以發之然用溫補必兼辛散而厚朴為疏通裏氣之要藥如局

方消風散既用人參助風之勢又以厚朴疏裏氣之壅不出此方之成則耳然用厚朴之義有二一輔

白木健運中氣一統蕪蕪清理濁帶以婦人經行時風入胞門而患濁帶者多故用防風藥本白芷獨

活等風藥協力祛之所謂治病必求其本也所以大小五石澤蘭丸大小五石澤蘭丸三石澤蘭丸鍾乳澤

蘭丸增損澤蘭丸澤蘭散諸方無不用等味為補中寓瀉之法諸方之下雖不言濁帶而崩淋漏下無

不起於濁帶也且防風能助黃耆白朮甘草固密腠理兼有芎藭杜仲地黃芍藥從蓉五味人參滋補氣血胡慮面頰之不光澤也其用柏子仁桔梗石斛澤蘭者取其清潤以制諸藥之燥烈而獨以柏子仁名方者以其能達心色保護君主也其桔梗開提肺氣石斛專司清胃不使熱藥之性上干肺胃也觀大小五石復以澤蘭名方者為其專於調經故總不出等味為石藥之監制耳前云服紫石英令人色黑當服鍾乳澤蘭丸以紫石英性專溫血血溫色必緇黑此方原以鍾乳澤蘭益氣調經為主雖有紫石英不專溫血故服之令人肥白也

大五石澤蘭圓 治婦人風虛寒中腹內雷鳴緩急風頭痛寒熱月經不調繞臍惻惻痛或心腹痛堅害飲食手足冷多夢身體痺痛營衛不和虛弱不能動及產後虛損並宜服方 鍾乳 禹餘糧 紫石

英甘草 黃耆名二兩半 石膏 白石英 蜀椒 乾薑名二兩 澤瀉一兩六銖 當歸 桂心 芎藭 厚朴 柏

子仁 乾地黃 細辛 茯苓 五味子 龍骨各半 石斛 遠志 人參 續斷 白朮 防風

鳥頭各三錢
山茱萸
紫苑各一兩
白芷
藁本
蕪荑各十錢
右三十二味為末蜜丸梧子大酒服二十

九加至三十九千金翼有陽起石二兩

小五石澤蘭圓 治婦人勞令虛損飲食減少面無光色腹中冷痛經候不調呼吸少氣無力補益溫中

方 鍾乳 紫石英 礬石各一兩半 白石英 赤石脂 當歸 甘草各四兩 石膏 陽起石 乾薑各

兩澤蘭二兩
六銖從容
龍骨
桂心各二兩半
白朮
芍藥
厚朴
人參
蜀椒
山茱萸各三銖
柏子仁

右二十三味為末蜜和丸如梧子大酒服二十九加至三十九日三

大五石澤蘭圖專主風虛寒中以寒積子藏繞臍惻惻痛非諸辛燥石藥不能溫之風入胞門

而腹內雷鳴非防芷等風藥不能透之與柏子仁丸之大端不殊丹方一味白芷為都梁丸總取祛風

之義此方即於柏子仁丸中除去石脂諸味配入禹餘糧等以實脾收津為務非若柏子仁丸杜風固

經之比按赤脂禹糧仲景治下焦利不止並用作湯專於固脫攻之本經赤石脂主女子崩中漏下禹

餘糧治咳逆寒熱大五石方下原有寒熱等證用禹餘糧最為合宜小五方下全無風證故去烏頭細辛防風芫芷等藥但加陽起石石脂等味專行固脫扶陽故所加之味尤為必需 上方皆鍾乳與木並用專取相對激其成功拘於繩墨者不可與言至巧也

增損澤蘭圓

治產後百病理血氣補虛勞方

澤蘭

甘草

當歸

芫蕒

附子

乾薑

白

木

白芷

桂心

細辛

防風

人參

牛膝

柏子仁

乾地黄

石斛

厚朴

藁本

蕪荑

麥門冬

右二十味

為末

蜜丸

如梧子大

空心酒下

十五丸

至二十九

行義

增損者增附子門冬牛膝損諸石龍骨等鎮固重膈也方下所主本經原無藉於等味產後厥陰用事風藥良不可缺但不必烏頭之峻攻而易附子溫經為常用門冬者即金匱溫經湯之成法產後以清理惡露為主一切固瀉咸為切禁故用牛膝之類潤下佐澤蘭為引導也

大補益當歸圓

治產後虛羸不足胸中少氣腹中拘急痠痛或引腰背痛或所下過多血不止虛極之氣晝夜不得眠及崩中面目脫色唇乾口燥亦治男子傷絕或從高墮下內有所傷藏虛吐血及金瘡

傷犯皮肉方

當歸

芫蕒

續斷

乾薑

阿膠

附子

白朮

吳茱萸

芍藥

附子

白芷

續斷

桂心

乾地黄

右十三味

為末

蜜和丸

如梧子大

酒服二十丸

日二夜一

不知加至五十丸

若有

真蒲黃加一升絕妙

白芷圓

治產後所下過多及崩中傷損虛竭少氣面目脫色腹中痛方 白芷 附子 乾地黄 續斷

乾薑

當歸

阿膠

附子

右七味

為末

蜜丸

如梧子大

酒服二十丸

日四

五服

無當歸芫蕒

續斷

代入蒲黃一兩無續斷太劇根代

行義

大補益當歸圓與前三卷中大補中當歸湯相類專主產後崩中不止即於增損澤蘭圓中又

行增損損去澤蘭柏仁人參冬斛半防朴藁本牛膝蕪荑加入阿膠茱萸芍藥續斷專力溫經得溫則

流行無滯正得補而行止有常縱有墮墜損傷究可藉以溫散可無積滯之虞矣至白芷圓主治相類

而損之又損并去地黃芩桂甘木芍藥僅存七味藥愈損而功愈增百鍊精金其斯之謂歟

紫石英柏子仁圓 治女子遇冬天時行溫風至春夏病熱頭痛熱毒風虛百脉沉重下赤白不思飲食

而頭眩心悸酸慚恍惚不能起居方 紫石英 柏子仁各三兩 烏頭 桂心 當歸 山茱萸 澤瀉

芍藥 石斛 遠志 寄生 茯苓 乾薑 甘草各二兩 蜀椒 杜衡一作杜仲 玄胡各一兩 細辛一兩 右

十八味為末蜜和丸如梧子酒服二十九漸加至三十九日三服 一方用牡蠣一兩

行義 檢先哲方如參尊宿公案非心心相印何以體此此方治女子遇冬天時行溫風至春夏病熱

頭痛熱毒風虛等證而所用諸藥渾是溫養血氣之味天冬時溫風久伏至春夏而發溫熱頭痛豈辛

溫助火重者補虛之品所可治乎逆推病情惟熱毒風虛四字為致病之大綱惟其虛故風得久藏而

化毒熱惟其虛故陽不統陰而下赤白雖証見發熱頭痛殊非溫病通身壯熱煩渴頭痛之比方下原

云溫風風為木邪同氣相感必入厥陰所以頭眩心悸風主運動故也况明言百脉沉重而下赤白不

思飲食不能起居種種皆陽氣不足不能統攝陰津而致下脫是不得不從事辛溫填補血氣為務也

因考諸本經言杜衡治溫風中入腦戶頭痛涕淚柏子仁益氣除風熱辛夷治頭痛腦頭芎藭治中

風入腦頭痛寒痺暈參經旨總主冬時溫風入藉於腦之患常見婦人產後起居不慎而頭痛風腦痛

雖蒸蒸發熱却大畏虛風雖當夏月尚喜重綿裹護斯非熱毒風虛之一驗乎其用石斛澤瀉寄生者

一以清胃進食一以利水導熱一以飭理赤白也若不達斯義以為此方主治春夏溫熱與貧新救療

不殊殊失千金立方之真矣

鍾乳澤蘭圓 治婦人久虛羸瘦弱甚肢體煩痛臍下結冷不能食面目瘀黑憂志不樂百病方 鍾乳

三澤蘭各二兩 防風四兩 人參 柏子仁 麥門冬 乾地黄 石膏 石斛各半 芎藭 甘草 白

芷 牛膝 山茱萸 薯蕷 當歸 藁本各三兩 細辛 桂心各一兩 蕪荑各半 艾葉十八 右二十一味

為末蜜丸如梧子酒服二十九加至四十九日二服

〔衍義〕 此方專主臍下結冷肢體煩熱故用鍾乳桂心艾葉峻溫其下石膏石斛麥冬分清其上其餘諸味各隨所主總以補下治本清上治標為務也

大澤蘭圓 治婦人虛損及中風餘病疝瘕陰中冷痛或頭風入腦寒痺筋攣緩急血閉無子面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉或胃中冷逆胸中嘔不止及泄痢淋瀝或五臟六腑寒熱不調心下痞急邪氣欬逆或漏下赤白陰中腫痛胸脇支滿或身體皮膚中澀如麻豆若瘰癧瘰結氣或四肢拘攣風行周身骨節疼痛目眩無所見或上氣惡寒灑淅如瘧或喉痺鼻鼽風癩癰疾或月水不通魂魄不定飲食無味并產後內衄無所不治服之自令人有子方 澤蘭_{二兩} 藁本_{二兩} 當歸_{二兩} 甘草_{一兩} 石英_{二兩} 芎藭_{二兩} 乾地黄_{二兩} 柏子仁_{二兩} 五味子_{二兩} 桂心_{二兩} 石斛_{二兩} 白朮_{二兩} 白芷_{二兩} 茯苓_{二兩} 厚朴_{二兩} 防風_{二兩} 薯蕷_{二兩} 茯苓_{二兩} 乾薑_{二兩} 禹餘糧_{二兩} 細辛_{二兩} 卷柏_{二兩} 蜀椒_{二兩} 人參_{二兩} 杜仲_{二兩} 牛膝_{二兩} 蛇牀子_{二兩} 續斷_{二兩} 艾葉_{二兩} 蕪荑_{二兩} 赤石脂_{二兩} 石膏_{二兩} 右三十二味為末蜜和丸如梧子大酒服二十丸至四十丸久赤白痢去乾地黄石膏麥門冬柏子仁加太麥藥陳麴龍骨阿膠黃連各一兩半有鍾乳加三兩良〇一方有枳實十八銖麥冬二兩半

小澤蘭圓 治產後虛羸勞冷身體羸瘦方 澤蘭_{二兩} 當歸_{二兩} 甘草_{一兩} 芎藭_{二兩} 柏子仁_{二兩} 防風_{二兩}

茯苓_{二兩} 白芷_{二兩} 蜀椒_{二兩} 藁本_{二兩} 細辛_{二兩} 白朮_{二兩} 桂心_{二兩} 蕪荑_{二兩} 人參_{二兩} 食茱萸_{二兩} 厚朴_{二兩} 石膏_{二兩}

右十八味為末蜜和丸如梧子大酒服二十丸日三服稍加至四十丸無疾者依此方春秋二時常服一劑甚良有病虛羸黃瘦者服如前〇一方無茯苓石膏有芍藥乾薑

〔衍義〕 方以澤蘭命名原為調經而設以調經必須風藥補虛必須溫味所以大澤蘭圓借治方下諸證咸為合宜惟治鼻鼽喉痺難以概論鼻鼽雖屬風寒客於頭腦鬱遏既久乃從火化所以氣塞不通

者雖鬱熱非假辛之溫散不能通達喉痺多屬龍火鬱發最暴大禁辛溫祇暴寒卒犯少陰而喉痛聲啞不腫不渴一證非溫不克然用熱破陰仍須鹹寒治標則卷柏又為必須至人臨證洞若觀火諒

無不辨寒熱之理于金處方如主帥統師大則大用小則小用其大澤蘭圓通治一切虛冷藥品不得不繫 小澤蘭圓專主產後羸瘦無藉三石蛇牀等重劑但進食朱熹一味振發參朮芎藭之力以助澤蘭葶本治產後虛羸綽有餘裕矣

紫石英天門冬圓 治風冷在于宮有子常墮落或始為婦便患心痛仍成心疾月水都未嘗來服之肥

充令人有子方 紫石英 天門冬 禹餘糧略三 蕪荑 烏頭 茯苓 桂心 甘草 五味子

柏子仁 石斛 人參 澤蘭 遠志 杜仲略二 蜀椒 卷柏 寄生 石南 雲母 當歸 烏

賊骨略一 右二十二味為末蜜丸如梧子酒服二十九日二服加至四十九

衍義 紫石英柏子仁丸主風寒襲於腦戶而化毒熱故用細辛辛夷以搜腦戶之虛風柏仁杜蘅以

清顛頂之毒熱此以風寒襲入胞門而墮胎息故用石南雲母以溫子藏之沉寒卷柏烏賊以清血室

之瘀熱則諸溫補各司其職而臟腑安和衝任無滯心腹之疾自愈也

三石澤蘭圓 治風虛不足通血脉補寒冷方 鍾乳 白石英略四 紫石英 防風 葶本 伏神各

兩六 澤蘭二兩 黃芪 石斛 石膏略二 甘草 當歸 芎藭略一 白木 桂心 人參 乾薑

獨活 乾地黃略一 白芷 桔梗 細辛 柏子仁 五味子 蜀椒 黃芩 茯苓 芍藥 秦光

防葵略一 厚朴 蕪荑略十 右三十二味為末蜜丸如梧子酒服二十九加至三十九日二三服

衍義 增損澤蘭圓即大小澤蘭圓之稍變三石澤蘭圓即大小五石澤蘭圓之稍變以其專主風虛

血脉不通故於大五石中除去餘糧龍骨小五石中除去礬石石脂等瀉固之藥專藉防葵以通血脉

與大小五石同源異流

大平胃澤蘭圓 治男子女人五勞七傷諸不足定志意除煩滿手足虛冷羸瘦及月水往來不調體不

能動等方 澤蘭 細辛 黃耆 鍾乳略三 柏子仁 乾地黃略二 大黃 前胡 遠志 紫石英

略二 芎藭 白朮 蜀椒略一 白芷 丹參 枳實略一 芍藥 桔梗 秦光 沙參 桂心 厚

朴 石斛 苦參 人參 麥門冬 乾薑各一 附子一枚 吳茱萸 麥藥各五 陳廼一 棗五十枚 右

三十二味為末蜜丸梧子大酒服二十九加至三十九令人肥健一本無乾薑 有當歸三兩

衍義 不讀金匱方無以知千金之法源不讀千金方何以廣金匱之變法此以大平胃名方則知專

平胃中陳氣也而方中一派峻補之藥與柏子仁圓大小五石澤蘭圓三石澤蘭圓等方大都彷彿惟

麴蘖枳朴大黃平胃之品為承氣之正治其間補瀉雜陳寒熱互用良難體會其旨三復求之始知其

為金匱著預丸之變方中中秦光前胡細辛白芷即著預丸中柴胡防風杏仁白欬開發風氣之變法

澤蘭柏子仁門冬沙參即著預丸中門冬桔梗清潤腸氣之變法麴蘖大黃即著預丸中法麴大豆黃芩

疏通裏氣之變法椒薑黃附協濟參芪白木生乾地黃即著預丸中乾薑桂枝協濟四君四物溫理血

氣之變法較著預丸藥雖異而理一揆且配合不可思議參芪得桂附則補而不壅桂附得芍地則溫

而不烈麴蘖大黃得參芪木桂附則泄而不利尤為補中寓瀉之良法不特為著預丸之變方又為大

黃蘗蟲丸之變法觀方下主治恰與大黃蘗蟲丸相類彼以內有乾血故蘗蘗乾漆為專藥此以胃有

陳氣則麴蘖大黃為必需况人參助木石英輔乳較柏子仁丸等方之反激愈甚立法愈奇何怪當世

醫師目賭金匱千金諸方而為目眩也達權之士但當精研其旨必不固守其方期可法千金之妙用

亦何妨適俗之變通也

澤蘭散 治產後風虛方 澤蘭分五 禹餘糧 防風 石膏 白芷 乾地黃 赤石脂 肉蓯蓉 鹿

茸 芎藭各八 梔本 蜀椒 白木 柏子仁各五 桂心 甘草 當歸 乾薑各六 蕪荑 細辛

厚朴各四 人參各三 右二十二味為末治下篩酒服方寸匕日三

衍義 男子以煖腎為補益婦人以調經為補益而經漏多主中虛故棗本細辛防風白芷為本藥然

經漏每挾淤滯則澤蘭芎藭厚朴蕪荑尤為必需所以柏子仁圓等一十三方大都相類惟固脫則兼

龍骨礬石開結則兼防葵杜蘅壯火則兼石南雲母清熱則兼卷柏柏仁更一佐使而所主各司其任

矣此主產後風虛乃取鹿茸血氣所鍾之味配入劑中與大巖蜜鹿茸散蒲黃散等方藥雖繁簡不侔而溫補之功用彷彿其用鹿茸者與大補益當歸圓中阿膠同義其方中禹餘糧防風澤蘭最多而人參反少於蕪荑細辛厚朴者不過借以鼓發鹿茸地黃輩血藥之性原非用以益氣也孰謂錙銖可

月水不通第十九方三十三首

乾薑圓 治婦人寒熱羸瘦酸消怠惰胸中支滿肩背脊重痛腹裏堅滿積聚或痛不可忍引腰小腹

四肢煩疼手足厥逆寒至肘膝或煩滿手足虛熱意欲投水中百節盡痛心下常苦懸痛時寒時熱惡心涎唾喜出每覺酸酸甜苦之物身體或如雞皮月經不通大小便苦難食不生肌方 乾薑 芍藥

茯苓 消石 杏仁 水蛭 蠱蟲 桃仁 蟻蠶 柴胡 麝蟲 芍藥 人參 大黃 蜀

椒 當歸 右十六味為末蜜丸梧子大空心飲下三九不知加至十九九 金翼以療婦人 痼結脇助下疾

行義 夫溝渠壅塞則水道不通血脈阻滯則經矣閉絕婦人經閉不行非中有乾血何致積久不通

觀千金此門諸方縱有寒熱交錯緩急輕重不同一皆破血為務乾姜丸雖本玉函抵當丸兼金匱下瘀血湯大黃廔蟲丸等法而藥味兼護且用蜜丸而所服甚少藥雖峻猛而用法最緩廔蟲蟻蠶攻血之專劑濟以消黃椒薑和以芍歸芍藥佐以桃杏柴苓使廔蟲等味得寒熱五擊之威助以人參壯諸藥力續續循搜為破除乾血之良法蓋久伏之瘀在人身中與元氣混成一片雖急攻之不能速去故宜峻藥緩攻法克有濟所以治乾血之方用丸居多間用酒煎以行經絡湯則藉為前導繼之以丸可也

桃仁湯 治婦人月水不通方 桃仁 朴硝 牡丹 射干 土瓜根 黃芩 芍藥 大黃 柴

胡酪 牛膝 桂心 水蛭 廔蟲 右十三味咬咀以水九升煮取二升半去滓分三服

又方 桃仁 當歸 土瓜根 大黃 水蛭 廔蟲 芒硝 牛膝 麻子仁 桂心 右

十味咬咀以水九升煮取三升半去滓內硝令烊分為三服 附後無當歸麻子仁用牡丹射干黃

芒硝湯 治同前 芒硝 丹砂末 當歸 芍藥 土瓜根 水蛭酩二 大黃酩三 桃仁升 右八味啖
咀以水九升煮取三升去滓內丹砂芒硝分三服

行義 桃仁湯前後二方咸本之於抵當湯其間蝨蛭硝黃桃仁桂心牛膝土瓜根等味皆同而前方又出肘後原其用柴胡黃芩之意必是乾血內逆熱蒸於上故用少陽經藥兼射干降而泄之牡丹芍藥不特和營兼滋乾血使之得潤而可漸通也其後方用當歸滋燥即前方牡丹芍藥和營之意用麻仁潤下即前方射干降泄之意以無蒸熱故不用少陽經藥也 其芒硝湯一方藥止八味乃抵當湯丸之三土瓜根散之二桃仁湯中之七獨以丹砂一味鎮攝心主使血各歸其鄉不致竄入科囊復為瘀積既敗之血隨硝黃水蛭桃仁引之下泄與桃仁湯前後並馳無分優劣

硝石湯 治血瘕月水留瘀血大不通下病散堅血方 硝石 附子 蝨酩二 大黃 細辛 乾薑 黃芩酩一 芍藥 土瓜根 丹參 代赭 蟪酩二 大棗 樹桃仁升 牛膝升 朴硝酩四 右十六味啖
咀以酒五升水九升漬藥一宿明旦煎取四升去滓下朴硝硝石烱盡分四服相去如炊頃去病後食

黃鴨羹勿見風

行義 方中芒硝硝石並用一治五臟積熱一逐六腑積聚大黃附子並用一治固結沉寒一泄閉滯積氣則蝨蟪蟪得振破堅散血之功也

乾漆湯 治月水不通小腹堅痛不得近方 乾漆 歲麋 芍藥 細辛 附子 甘草酩一 當歸

桂心 芒硝 黃芩酩二 大黃酩三 吳茱萸升 右十二味啖咀以清酒一斗浸一宿煮取三升去滓內

硝烱盡分三服相去如一炊頃

治月經不通心腹痛絞欲死通血止痛方 當歸 大黃 芍藥酩三 吳茱萸 乾地黄 乾薑 芍藥

蝨蟲 水蛭酩二 細辛 甘草 桂心酩一 梔子升 桃仁升 右十四味啖咀以水一斗五升煮取

五升分五服 一本有牛膝麻仁各三兩

行義 乾漆灰破血之猛帥濟以桂附硝黃交通寒熱縱久伏之血可無負隅之悍益以歸芍歲澁資其潤澤可無堅乾之戚其細辛茱萸黃芩各隨寒熱之佐使耳 于乾漆湯中除去漆灰芒硝黃芩吳茱萸歲澁易入蝨蛭桃杏乾薑梔子芫薺地黃等味總不外乎攻血之旨一以堅痛不移故用乾漆堅韌之物以磨礪之一以絞痛攻擊是須蝨蛭蠕動之物以剝蝕之兩不移易之定法桃仁湯之變方也

前胡牡丹湯 治婦人盛實有熱在腹月經瘀閉不通及勞熱熱病後或因月經來得熱不通方 前胡牡丹 元參 桃仁 黃芩 射干 旋覆花 括婁根 甘草 芍藥 茯苓 大黃 枳實 各兩 右十三味咬咀以水一斗煮取三升分三服

黃芩牡丹湯 治女人從小至大月經未嘗來顏色萎黃氣力衰少飲食無味方 黃芩 牡丹 桃仁 枳實 芍藥 射干 海藻 大黃 蝨蛭 蟪蟪 水蛭 各五兩 右十三

行義 二方一因婦人所稟偏於熱勝及病後餘熱流於血室而致不月故用前胡旋覆下熱氣而散餘邪黃芩元參以化無形之氣枳實大黃以導有形之熱丹皮芍藥桃仁以潤燥安營射干括婁茯苓甘草以降氣利膈氣血交通當無慮於月事之阻滯矣一以女子月素未通或鬱熱內戕而致血結不行故用黃芩丹皮以化熱枳實大黃以導滯芍藥桃仁以和營射干瞿麥海藻以降逆蝨蛭蟪蟪以破血也其前胡牡丹湯本全匱旋覆花湯專祛子藏風氣以無乾血故無藉於蝨蛭黃芩牡丹湯本之抵當以無風氣餘熱故無取於茱萸其用海藻瞿麥與括婁茯苓無異總輔射干以建開痰利水之勳耳

牡丹圓 治婦人女子諸病後月經閉絕不通及從小來不通并新產後瘀血不消服諸湯利血後餘痰未平宜服之取平復方 牡丹 芍藥 元參 桃仁 當歸 桂心 蝨蛭 水蛭 各五兩 蟪蟪 二兩 右十二味為末蜜和丸如梧子大酒下十五丸加至二十九丸血盛者作散服方七腹中當轉如沸血自化成水去如小便赤少除桂心用地膚子一兩

瞿麥 芫薺 海藻 各一 右十二味為末蜜和丸如梧子大酒下十五丸加至二十九丸血盛者作散服方七腹中當轉如沸血自化成水去如小便赤少除桂心用地膚子一兩

衍義 此以黃芩牡丹湯小變其法湯以急瀉故用大黃丸以緩攻故用桂心總藉蠱螭蟻蟪之力也
血盛者作散服服後血化成水而下即除桂心而用地膚清熱利水水即血之所化無限活法惟在詳
見證之緩急耳

乾地黃當歸圓

治月水不通或一月再來或隔月不至或多或少或淋瀝不斷或來而腰腹刺痛不可

忍四體噓吸不欲食心腹堅痛有青黃黑色水下或如清水不欲行動舉體沉重惟思眠臥欲食酸物
虛乏黃瘦方 乾地黃_兩當歸_兩甘草_兩牛膝_兩芍藥_兩乾薑_兩澤蘭_兩人參_兩牡丹_兩參_兩

蜀椒

白芷

黃芩

桑耳

桂心

各一

盧蟲

四十

芍藥

乾薑

澤蘭

人參

牡丹

各一

兩

參

各一

兩

丹

參

右二十一味為末蜜丸如梧子每日空心酒下十五丸漸加至三十丸以知為度

衍義

月經雖常不通而有時暫來有時復阻且見腹痛下青黃水明是乾血內滯欲成崩漏之兆故

立方不離四物調經為主參入蠱蟻桃仁以破滯血椒薑桂心以開結積黃芩桑耳以通旺氣人參以
助藥力其餘諸味散血調經之佐也

治月經不通方

取葶藶一升為末蜜丸如彈子大綿裹內陰中入三寸每丸一宿易之有汗出止

衍義

破血之藥頗多獨取葶藶為導專行破積利水水去則血隨之而化矣

乾漆圓

治月經不通百病不瘥方

乾漆

土灰根

射干

芍藥

各一

兩

牡丹

牛膝

黃芩

桂心

各一

兩

丹

參

吳茱萸

大黃

柴胡

各一

兩

桃仁

蟄甲

各二

盧蟲

蟻蟪

各四

枝

水蛭

蠱蟲

各七

枝

大麻仁

合亂髮

雞

子

各一

枚

蒼蘭子

合

右二十味

為末

以蜜和為丸

每日酒下十五丸

如梧子

大漸加至三十丸

日三仍用

後浸酒服前丸藥

衍義

方下但言月經不通百病不瘥並未明言所見何病詳方中所用破血之味不待言矣其用柴

胡蠱甲必有日晡寒熱也用麻仁土灰根者必是津液固結也用射干蒼蘭者必是上氣浮腫也用吳
桂苓連者必因本寒標熱也其餘牡丹芍藥牛膝桃仁輩皆乾漆蠱螭之輔助也百病不瘥漸成勞瘵

勞瘵之根不出乾血如上等味雖有兼治然無一不為瘀血起見也

浸酒方 大麻子 蒼蘭子 桃仁 桂心 竈屋始煤各四兩 土灰根 射干各六兩 牛膝各八兩 右八味咬

咀以清酒三斗絹袋盛藥浸五宿以一盞下前丸藥甚良或單服之亦好

衍義 前乾漆圓羣隊破血曲盡百病不瘥之機而此復取方中七味加始煤之輕浮散火浸酒服丸

兩相維輔並用單用未為不可

當歸圓 治女人臍下癥結刺痛如蟲所嚙及如錐刀所刺或赤白帶下十二疾腰背疼痛月水或在月

前或在月後方 當歸 葶藶 附子 吳茱萸 大黃各二兩 黃芩 桂心 乾薑 牡丹 芎藭各

兩 細辛 秦椒 柴胡 厚朴各六兩 牡蒙各一兩 甘草各一兩 蟲蟲 水蛭各五枚 右十八味為末蜜丸

如梧子空心酒下十五丸日再有胎勿服之○又方 治腰腹痛月水不通利方 當歸 芎藭各四

兩 蟲蟲 烏頭 丹參 乾漆各一兩 人參 牡礪 土灰根 水蛭各二兩 桃仁各五十枚 右十一味為末以

白蜜丸如梧子大酒下三九日三服

衍義 當歸丸前後兩方雖皆主治血結而有愆期闊絕之不同前方專主癥結故取用桂附椒薑吳

茱萸辛熱破結即兼蟲蛭葶藶大黃予以病之出路用牡蒙細辛柴胡黃芩者為帶下赤白而設以帶

下多緣風木也 後方專主閉絕不通故備用乾漆桃仁蟲蠶苦鹽逐血即兼人參烏頭戮力破除其

用人參用大黃各有立見不得草草放過

蟹甲圓 治女人小腹中積聚大如七八寸盤面上下周流痛不可忍手足苦冷欬噫腥臭兩脇熱如火

炙玉門冷如風吹經水不通或在月前或在月後服之一月便瘥有孕此是河內太守魏夫人方 蟹

甲 桂心各半兩 蜂房 辟元參 蜀椒 細辛 人參 苦參 丹參 沙參 吳茱萸各十兩 蟲蟲 水

蛭 乾薑 牡丹 附子 皂莢 當歸 芍藥 甘草 防葵各一兩 蟻螬各二十枚 蟲蟲 大黃各六兩 鐵

右二十四味為末蜜丸如梧子大酒下七九日三稍加之以知為度

行義

鼈甲入肝為癥瘕瘧癘要藥有散血消積之功滋陰清熱之効無苦寒傷中之虞峻攻耗氣之患

夫癥瘕結塊婦人居多以經行時不慎起居血留成積者十常四五故千金往往用之此丸當分作五
分看蝨蛭虻蟪大黃為小腹中積聚如盤而設乾血內著非苦寒不能逐之使下鼈甲苦沙元參為兩
脇熱如火炙而設癖積旺氣非滋陰不能化之使解椒辛皂莢防葵蜂房為上下周流痛不可忍而設
風毒攻注非搜逐不能開之使泄薑桂萸附為玉門冷如風吹而設寒結固疾非辛烈不能破之使散
甘草人參二丹歸芍為手足苦冷欬噫腥臭而設傷殘之餘非溫理血氣不能培之使和人但知鼈甲
苦沙元參為滋陰水熱之用不知本體所主無一不為消堅散積之專藥至於防葵利血脈蜂房滌痰
垢皆破敵之先鋒金匱鼈甲煎丸用之婦人小腹如扇用附子湯亦金匱法非千金不能得其肯綮也
又方 治婦人因產後虛冷堅結積在腹內月經往來不時苦腹脹滿繞臍下痛引腰背手足煩或冷熱
心悶致不欲食方 鼈甲 乾薑 赤石脂 丹參 禹餘糧 當歸 白芷一作白朮 乾地黃各一兩
代赭 甘草 鹿茸 烏賊骨 殭蠶各十銖 桂心 細辛 蜀椒 附子各一 右十七味為末蜜和
丸如梧子大空心酒下五丸加至十丸

衍義

此方治產後虛冷是須溫補為宜雖有結滯滿痛而月事仍得往來與癥瘕固結不同故但取

烏賊骨鼈甲緩散瘀積可無藉於蝨蛭苦參等味也殭蠶白芷緩祛內風輔以椒辛可無藉於防葵蜂
房等味也桂附乾薑專破冷結可無藉于吳茱萸也鹿茸溫養營血佐以歸地丹甘功力甚于人參也
石脂禹糧代赭填補其空原無固結可無礙于止瀉也一以破結為先一以溫補為務二方可比例而
論哉

禹餘糧圓

治婦人產後積冷堅癖方 禹餘糧 烏賊骨 吳茱萸 桂心 蜀椒各二銖 當歸 白木

細辛 乾地黃 人參 芍藥 芎藭 前胡各一兩 乾薑三銖 礬石六銖 白薇 紫苑 黃芩各十銖 廬蟲

兩 右十九味為末蜜和丸如梧子大空心酒下若飲二十九日仍不知則加之

〔衍義〕

此與驚甲丸第二方主治相類彼用白芷此用白薇彼用殭蠶此用前胡彼用石脂此用礞石

彼用丹參此用紫苑彼用白朮此用甘草彼用驚甲此用麝蟲彼用鹿茸此用人參藥雖變易而功用

彷彿惟彼用附子以助鹿茸薑桂之雄此用黃芩分椒薑細辛之悍涇渭攸分於此稍異

壯蒙圓 治婦人產後十二癥病帶下無子皆是冷風寒氣或產後未滿百日胞胎惡血未盡便利于懸

圖上及久坐濕寒入胞裏結在小腹牢痛為之積聚小如雞子大者如拳按之跳手隱隱然或如蟲嚙

或如針刺氣時搶心兩脇支滿不能食飲食不消化上下通流或守胃管痛連玉門背膈逆短氣汗

出小腹苦寒胞中創紋引陰痛小便自出子門不正令人無子腰膝疼痛四肢沉重淫躍一身盡腫乍

來乍去大便不利小便淋瀝或月經不通或下如腐肉青黃赤白黑等如豆汁夢想不祥方一名紫

蒙厚朴 硝石 前胡 乾薑 麝蟲 牡丹 蜀椒 黃芩 桔梗 茯苓 細辛 葶藶 人參

芎藭 吳茱萸 桂心各八銖 大黃二兩 附子一兩六銖 當歸半兩 右二十味為末蜜和更搗萬杵丸如梧

子大空心酒服二丸日三服知則加之至五六丸下青白黃赤如魚子者病根出矣

〔衍義〕 方下主治最繁總不出冷風寒氣四字為致病之綱所以首推壯蒙前胡專祛胞門風氣餘皆

因病變證之治法與前當歸丸二方參看其義自明

治月經不通結成癥瘕如石腹大骨立宜此破血下癥方 大黃 硝石各六兩 巴豆 蜀椒各一 代赭

柴胡熬變水蛭 丹參熬令紫色 土瓜根各三兩 乾漆 芎藭 乾薑 麝蟲 茯苓各二兩 右十四味為末

巴豆別研蜜和丸如梧子空心酒服二丸不知加至五丸日再服針金翼無柴胡水

〔衍義〕 癥結日久而致腹大骨立審無風氣崩帶別証夾雜但須專力破癥癥散則精自回形自復而

柴胡用熬欲其內疎肝氣無取外散之意惟氣虛不勝攻伐者未可輕試

大蠱蟲圓 治月經不通五七年或腫滿氣逆腹脹癥瘕痛宜服此數有神驗方 蠱蟲四百 躑躅升 乾地

海藻各五兩 水蛭二百枚 芒硝兩人參半 葶藶各五兩 十九味為末蜜丸梧子大每日空心酒下七丸不知加

之日三服

衍義 癥結歲久月閉不通非師金匱之法無以措指方中蝨蟲水蛭蟪蟪乾漆桃仁芍藥地黃黃芩等味大黃蝨蟲丸中藥也其外牡蒙土瓜根牛膝牡丹專破瘀積之癥葶藶海藻芒硝專破血化之水參苓桂心專扶正氣而行藥力也

桂心酒 治月經不通結成癥瘕方 桂心 牡丹 芍藥 牛膝 乾漆 土瓜根 牡蒙略四兩 吳茱

萸升大黃兩黃芩 乾薑略二兩 蝨蟲二百枚 蟪蟪 水蛭各七枚 亂髮灰 細辛略一兩 蠶蠶五寸大

麻仁 龜突墨半兩 乾地黃六兩 虎杖根 蟹甲略五兩 蒼蘭子半兩 右二十四味咬咀以酒四斗分兩甕浸

之七日併一甕攪令調和分作四甕初服二合日二加至三四合

虎杖煎 治腹內積聚虛脹雷鳴四肢沉重月經不通亦治丈夫病方 取高地虎杖根細剉二斛以水

二石五斗煮取一大斗半去滓澄濾令淨取好醇酒五升和煎令如餲每服一合消息為度不知則加

之○又方治月經不通結癥腹大如甕短氣欲死方 虎杖根百斤去頭去 土瓜根 牛膝各取汁

右三味咬咀以水一斛浸虎杖根一宿明旦煎取二斗內土瓜牛膝汁攪令調和煎令如餲每以酒服

一合日再夜一宿血當下若病去止服

桃仁煎 治帶下經閉不通方 桃仁 蝨蟲各一升 朴硝五兩 大黃六兩 右四味為末別治桃仁以醇苦酒

四升內銅器中炭火煎至二升下大黃桃仁蝨蟲等攪勿住手當欲可丸下朴硝更攪勿住手良久出

之可丸乃止取一丸如雞子黃投酒中頂一宿勿食服之至晡時下如大豆汁或如雞肝凝血癥瘕子

或如膏此是病下也

治月經不通甚極閉塞方 牛膝一斤 麻子三升 土瓜根三升 桃仁三升 右四味咬咀以好酒一斗五升浸

五宿一服五合漸加至一升日三能多益佳

治產後風冷留血不去傳結月水閉塞方 桃仁 麻子仁各一 蒼蘭子升 右三味咬咀以好酒三斗五宿每服五合日三稍加至一升

〔衍義〕 破血以酒捷以湯丸而所用之味與湯丸無異惟虎杖根竈突墨為散血利水之專藥其虎杖煎虎杖土灰根牛膝酒桃仁煎牛膝麻子土灰根仁酒桃仁麻子蒼蘭子酒等方皆桂心酒中一鱗片甲耳

治月經不通臍下堅結大如杯盤發熱往來下痢羸瘦此為血瘕若生肉瘕不可為也療之方 生地黃三斤 乾漆一斤 右二味以漆末內地黃汁中微火煎令可丸每服酒下如梧子大三丸不知加

之常以食後服

〔衍義〕 生地黃得乾漆灰則寒而不滯乾漆灰得生地黃則威而不猛真破瘕之專藥但須審元氣可任者用之

五京湯 治婦人腹中積聚九痛七害及腰中冷引小腹害食得冷便下方 乾薑 蜀椒各三 附子二

吳茱萸升 當歸 狼毒 黃芩 牡蠣各二 右八味為末蜜和丸如梧子初服三九日二加至十丸

此出京氏五君故名五京久患冷困者當服之

〔衍義〕 此於金匱九痛丸中除去人參巴豆二味乃加蜀椒以下氣當歸以和血牡蠣以消堅黃芩以泄滿蓋痛欲速療積宜緩追故用當歸黃芩以緩狼毒附子之急也

雞鳴紫圓 治婦人癥瘕積聚方 皂莢一分 藜蘆 甘草 礬石 烏啄 杏仁 乾薑 桂心 巴豆

各二 前胡 人參各四 代赭五 阿膠六 大黃八 右十四味為末蜜丸如梧子雞鳴時服一丸日益一

丸至五丸止仍從一起下白者風也赤者癥瘕也青微黃者心腹病

〔衍義〕 皂莢藜蘆涌吐頑痰之首藥烏啄巴豆溫破堅積之猛藥人參大黃補中寓瀉之聖藥識此精

義餘可例推矣