

最新修订版 2013

全国护士执业资格考试 习题精选与 答案解析

主 编 方东萍

副主编 胡 荣 肖惠敏

- 权威专家编写
- 学考紧密衔接
- 备考实用高效



人民卫生出版社

2013

全国护士执业资格考试

习题精选与答案解析

主 编 方东萍

副主编 胡 荣 肖惠敏

编 者 (以姓氏笔画为序)

王小燕 王玉琴 方东萍 庄嘉元 刘 敦 肖惠敏
吴炜炜 邱萍萍 宋继红 张 旋 张玉萍 陈云雪
陈玲玲 陈艳清 陈起燕 林 婷 林天安 林迎春
林晓云 罗 利 郑婉玲 胡 荣 胡蓉芳 骆惠玉
高 骥

 **人卫医学网** 考试 读人卫考试书 上人卫医学网
exam.ipmph.com

赠60元
使用赠卡购买网站课程,可抵扣60元现金。

真情回馈,多重好礼!

免费送教材
购买通关班课程,免费获得人卫版考试指导(或应试指南),数量有限,先买先得!

玩游戏赢大奖
进入网站游戏页面,课程、试卷、图书、电子产品,各类精彩大奖送不停!

用户名: **TM497034** 密码: **885313**

使用方法:
1. 登录人卫医学网考试频道(exam.ipmph.com);
2. 输入用户名、密码→登录后进入“我的学堂”学习;
3. 进入游戏页面,每张赠卡有一次游戏机会,可赢取丰富奖品;
4. 使用用户名登录并购买辅助教材;
5. 此卡有效期至2013年

客服电话:4006-300-567

 **人民卫生出版社**
REIJI H. MEDICAL PUBLISHING HOUSE
“先天下而享”

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

2013 全国护士执业资格考试习题精选与答案解析/
方东萍主编. —北京:人民卫生出版社, 2012. 12

ISBN 978-7-117-16640-9

I. ①2… II. ①方… III. ①护士-资格考试-题解
IV. ①R192. 6-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 264240 号

人卫社官网	www.pmph.com	出版物查询, 在线购书
人卫医学网	www.ipmph.com	医学考试辅导, 医学数 据库服务, 医学教育资 源, 大众健康资讯

版权所有, 侵权必究!

本书本印次内有 4 种防伪标志, 请注意识别。欢迎致
电、来函查询真伪、举报盗版。电话: 010-59787491
E-mail: WQ@pmph.com

2013 全国护士执业资格考试 习题精选与答案解析

主 编: 方东萍

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph @ pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

010-59787586 010-59787592

印 刷: 三河市宏达印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 23

字 数: 559 千字

版 次: 2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-16640-9/R · 16641

定 价: 45.00 元

(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)

主编:方东萍,主任护师,福建医科大学护理学院教授,福建医科大学附属第一医院护理部主任,福建省护理学会副理事长,福建省护理质控中心副主任。长期从事护理管理及临床、教学、科研工作,具有丰富的实践经验。获省级以上护理科技进步奖 8 项,主持及参与科研项目 13 项,在国家级、省级刊物上发表研究论文 28 篇。主编 2012 年全国执业护士辅导丛书 3 本,现担任《中国护理管理》、《中华现代护理杂志》等编委。

副主编:胡荣,医学博士,福建医科大学护理学院副教授,院长助理。长期从事护理教育及老年护理研究工作。获国家实用新型专利 2 项;在国内权威刊物以第一作者及通讯作者发表研究论文 28 篇(其中 SCI 收录 2 篇);获省级以上各类教学科研成果奖 7 项。主持过省厅级课题 5 项;参与国家自然科学基金课题 1 项,国家级教改课题 2 项。副主编全国统编教材及执业护士辅导丛书 5 本,参编全国护理本、专科统编教材 10 本。

副主编:肖惠敏,护理哲学博士,福建医科大学护理学院副教授,副院长,福建省护理学会理事、教育专业委员会副主任,福建省女科技工作者协会理事,福建省青年学术委员会委员。长期从事护理教育、姑息护理及老年护理的研究工作。获得国家级、省级科研、教学成果奖 11 项;在国内权威刊物上以第一作者发表学术论文 17 篇。主持省厅级科研课题 5 项;参与中英国际合作课题 1 项,国家级教改课题 2 项。主编国际护士执业水平(ISPN)考试专业英语词汇手册 1 本,副主编全国统编教材 1 本,参编全国护理本、专科统编教材 8 本。

出版说明

全国护士执业资格考试是为贯彻国家人事部、卫生部《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》等相关文件精神,于2001年开始正式实施的。通过考试取得的资格代表了相应级别技术职务要求的水平与能力,作为单位聘任相应技术职务的必要依据。

本套图书2002年—2010年连续出版了9年。为考生顺利通过考试提供了高效能帮助,得到社会、考生和市场的广泛认可,是一套科学、权威、实用的考试辅导书。

自2011年,国家颁布了新版护士执业资格考试大纲,对考试进行了重新设计,考试发生了深刻变化。为了适应新的考试要求和变化,人民卫生出版社组织权威教学专家和考试专家对本套图书进行了修订。2012年正式出版。

2013年,为了进一步提高本套图书的考试实用性,再次对图书进行了大篇幅的修订,对图书的形式进行了新设计,以帮助读者更好的使用本套图书。

本套图书包括4种:

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. 全国护士执业资格考试 | 考点精编 |
| 2. 全国护士执业资格考试 | 习题精选与答案解析 |
| 3. 全国护士执业资格考试 | 模拟试卷与解析 |
| 4. 全国护士执业资格考试 | 分科备考与综合提高 |

考点精编——按照大纲要求和考试要求,整合考点,突出重点,提高复习效率。

整合考点—重要考点标注—必考内容提醒

习题精选与答案解析——按照考试的命题要求精选习题,强调广覆盖,重应用,总题量达2300多道。专家依据临床情景对每道习题进行了精心推敲,力求专注考点。更为重要的是,习题设计和命题思路接近全真试题,并对答案进行了精确解析。

精选考点—题点对应—衔接真题

模拟试卷与解析——结合考试精神,专注“以临床任务为导向,以基本技能为核心”设计5套全真模拟试卷。题型、题量、分布、难易与考试情景相同。每道习题列举解析。

自测工具—模拟练习—提高成绩

分科备考与综合提高——依据大纲要求,将内容分解到各个单独学科,方便复习。内容设计包括优选习题、思路解析、归纳提高、全真模拟四个相互衔接的部分,是使用友好的复习工具。

单科复习—综合思维—逐步提高

本套图书特点：

内容科学、权威；复习性和实用性强

权威的教育专家和考试专家是保证本套图书复习效能的根本所在。

品种全面，相互补充

本套图书提供了科学的复习组合品种，考生可以综合使用，全面复习。也可以单独使用，选择复习。

学考无缝衔接

图书设计依据考试，内容选择依据考试，学考无缝衔接。

使用过程若有问题，请通过 hushizige666@163.com 反馈给专家。

人民卫生出版社考试用书编辑中心

2012 年 11 月 20 日

目 录

第一篇 专业实务

第一章 基础护理学	1
第二章 法规与护理管理	78
第三章 护理伦理	86
第四章 人际沟通	92

第二篇 实践能力

第一章 循环系统疾病患者的护理	97
第二章 消化系统疾病患者的护理	116
第三章 呼吸系统疾病患者的护理	150
第四章 传染病患者的护理	167
第五章 皮肤和皮下组织疾病患者的护理	177
第六章 妊娠、分娩和产褥期疾病患者的护理	181
第七章 新生儿与新生儿疾病患者的护理	215
第八章 泌尿生殖系统疾病患者的护理	223
第九章 精神障碍疾病患者的护理	247
第十章 损伤及中毒患者的护理	257
第十一章 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病患者的护理	277
第十二章 肿瘤患者的护理	286
第十三章 血液、造血器官及免疫疾病患者的护理	317
第十四章 内分泌、营养及代谢疾病患者的护理	323
第十五章 神经系统疾病患者的护理	337
第十六章 生命发展保健	354

第一篇 专业实务

第一章 基础护理学

一、A1型题(以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案)

1. 护士与患者语言交往的有效性主要取决于
A. 护士真诚的态度和恰当的语言
B. 护士的爱心和满足患者的需求
C. 护士对患者的同情心和责任心
D. 护士对患者的理解和慎言守密
E. 患者对护士的信任和愉快心情
2. 护士必须尊重患者的隐私权,下列情况需保密的是
A. 先天畸形、传染病、恐惧
B. 神经衰弱、失眠症、焦虑
C. 生理缺陷、精神病、性病
D. 遗传疾病、神经病、感染
E. 身心疾病、抑郁症、厌食
3. 护理操作中的解释用语包括
A. 操作前鼓励、操作中解释和操作后感谢
B. 操作前指导、操作中鼓励和操作后嘱咐
C. 操作前解释、操作中指导和操作后嘱咐
D. 操作前安慰、操作中嘱咐和操作后解释
E. 操作前嘱咐、操作中安慰和操作后指导
- * 4. 下列哪项不属于护士的仪表美
A. 自然和谐的仪容
B. 和蔼可亲的态度
C. 简洁大方的妆饰
D. 训练有素的举止
E. 开拓创新的精神
5. 医院按分级管理划分可分为
A. 三等三级
B. 三级九等
C. 三等九级
D. 三等十级
E. 三级十等
- * 6. 直接向一定人口的社区提供医疗卫生服务的医院是
A. 一级医院
B. 二级医院
C. 三级医院
D. 专科医院
E. 企业医院
7. 下列哪项不属于门诊健康教育的形式
A. 板报
B. 讲座
C. 录像
D. 发放宣传册
E. 健康体检
8. 下述疾病中,门诊应首先安排入院的是
A. 衣原体肺炎
B. 急性肾炎
C. 晚期胃癌
D. 急性胃肠炎
E. 严重颅脑损伤

- * 9. 急救物品应做到“五定”，其中哪项不正确
- 定数量品种
 - 定点安置
 - 定期消毒灭菌
 - 定班保管
 - 定期检查维修
10. 急救物品的合格率应保持在
- 90%以上
 - 95%以上
 - 97%以上
 - 99%以上
 - 100%
11. 关于维持病区的整洁，以下哪项是错误的
- 保持护理单元的整洁
 - 定时清除排泄物
 - 保持患者的清洁
 - 及时处理污染敷料
 - 工作人员仪表端庄
- * 12. 护理程序是科学地确认问题和解决问题的
- 工作前提
 - 工作方法
 - 工作基础
 - 工作方针
 - 工作条件
13. 组成护理程序工作框架的理论是
- 系统论
 - 需要论
 - 解决问题论
 - 信息论
 - 交流论
- * 14. 护理程序各步骤的排列顺序是
- 评估、诊断、计划、实施、评价
 - 评估、计划、诊断、实施、评价
 - 诊断、评估、计划、实施、评价
 - 评价、实施、诊断、计划、评估
 - 诊断、计划、评估、实施、评价
15. 有关收集资料的描述，下列哪项是错误的
- 收集资料是护理程序的第一步
 - 收集资料为作出护理诊断提供依据
 - 收集资料是由护士来完成的
 - 收集资料是在患者刚入院时进行的
 - 收集资料应准确、全面
16. 下列属于患者客观资料的是
- 头痛
 - 乏力
 - 恶心
 - 入睡困难
 - 高热
- * 17. 下列不属于主观资料的是
- 头痛、头晕
 - 咽部充血、体温 38.1℃
 - 脸色潮红、全身不适
 - 咽部干燥、流涕
 - 呼吸急促、发冷
18. 以下哪项不属于护理计划实施的过程
- 将所计划护理活动加以组织，任务落实
 - 执行医嘱
 - 解答服务对象的咨询
 - 继续收集资料
 - 所有工作均由护士独立完成
19. 办理住院手续的依据是
- 门诊病例
 - 单位证明
 - 住院证
 - 医保卡
 - 转院证明
- * 20. 护送患者入病区时不妥的操作是
- 不能行走的患者用轮椅护送
 - 危重患者用平车护送
 - 根据患者病情安置合适卧位
 - 护送途中注意安全和保暖
 - 严格控制输液并停止给氧
21. 有关一级护理的内容，以下哪项不妥
- 专人 24 小时护理
 - 制订护理计划

- C. 严格执行各项诊疗措施
D. 做好基础护理
E. 满足患者身心需要
22. 下列哪项不属于二级护理的适用对象
- A. 大手术后病情稳定者
B. 生活基本能自理者
C. 年老体弱者
D. 慢性病不宜多活动者
E. 幼儿
23. 病历保存的部门是
- A. 医务科
B. 护理部
C. 病案室
D. 社保中心
E. 患者自管
24. 一人搬运患者时,平车与床的位置是
- A. 平行紧靠
B. 平车头端与床头成锐角
C. 平车头端与床尾成锐角
D. 平车头端与床头成钝角
E. 平车头端与床尾成钝角
25. 单人搬运法适合下列哪种情况
- A. 体重较重者
B. 小儿患者或体重较轻者
C. 腰椎骨折者
D. 颈椎骨折者
E. 颅脑损伤者
26. 侧卧位适用于
- A. 全身麻醉未清醒者
B. 腹部检查
C. 导尿时
D. 休克患者
E. 肛门检查时
- * 27. 腰穿后 6 小时内去枕平卧位的目的是
- A. 预防颅内压升高
B. 预防颅内压降低
C. 预防脑缺血
D. 预防脑部感染
E. 有利于脑部血液循环
- * 28. 为减轻患者疼痛,以下做法错误的是
- A. 端坐位可减轻呼吸困难
B. 半坐卧位可减轻腹部手术后伤口疼痛
C. 俯卧位可减轻臀部伤口疼痛
D. 中凹位可减轻腹部伤口疼痛
E. 去枕仰卧位可预防腰椎腔穿刺后因颅内压降低而引起的头痛
29. 用于限制患者坐起的约束方法是
- A. 约束手腕
B. 约束踝部
C. 固定肩部
D. 固定一侧肢体
E. 固定双膝
30. 下列哪项不属于护士帮助患者翻身侧卧的目的
- A. 满足家属的需要
B. 预防压疮
C. 预防坠积性肺炎
D. 使患者舒适
E. 满足护理的需要
31. 颅脑术后患者头部只能卧于健侧,主要是为了
- A. 减轻疼痛
B. 减少伤口的压力
C. 防止脑疝形成
D. 防止呕吐
E. 便于观察伤口情况
- * 32. 不需使用保护具的患者是
- A. 意识不清者
B. 视力障碍者
C. 高热躁动者
D. 输液时的婴儿
E. 谵妄者
33. 中凹卧位需将床头及床尾抬起的角度分别为
- A. $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$, $30^{\circ} \sim 35^{\circ}$
B. $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$, $30^{\circ} \sim 35^{\circ}$
C. $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$, $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$
D. $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$, $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$
E. $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$, $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$

34. 医院感染主要发生于
 - A. 门诊患者
 - B. 探视者
 - C. 陪护家属
 - D. 住院患者
 - E. 医务人员
- * 35. 下列哪项不属于 WHO 提出的有效控制医院感染的措施
 - A. 消毒和灭菌效果监测
 - B. 无菌技术
 - C. 隔离
 - D. 清洁
 - E. 微创技术的应用
36. 煮沸灭菌时,为了使沸点提高到 105°C ,应加入
 - A. 碳酸氢钾
 - B. 碳酸氢钠
 - C. 碳酸钙
 - D. 亚硝酸钠
 - E. 乳酸钠
- * 37. 关于 2% 碘酐的使用的说法,正确的是
 - A. 是高效消毒剂
 - B. 刺激性弱
 - C. 常用于注射部位、创面等周围皮肤消毒
 - D. 可浸泡金属器械
 - E. 对碘过敏者消毒后可用 75% 乙醇脱碘
- * 38. 下列消毒剂中属于高效消毒剂的是
 - A. 高浓度含氯消毒剂
 - B. 聚维酮碘
 - C. 75% 乙醇
 - D. 氯己定
 - E. 碘酐
39. 以下哪种化学消毒剂能杀灭芽胞
 - A. 过氧乙酸
 - B. 乙醇
 - C. 碘酐
 - D. 聚维酮碘
 - E. 氯己定
40. 高压蒸汽灭菌微生物测试法使用的菌片是
 - A. 表皮葡萄球菌
 - B. 金黄色葡萄球菌
 - C. 大肠杆菌
 - D. 嗜热脂肪杆菌芽胞
 - E. 链球菌
- * 41. 下列不符合无菌技术操作原则的是
 - A. 无菌包须有标记和消毒日期
 - B. 无菌操作时手臂位于腰部水平以上
 - C. 无菌物品与非无菌物品分别放置
 - D. 无菌持物钳可夹取所有无菌物品
 - E. 一份无菌物品供一位患者使用一次
42. 护士在以下哪些情况下需在洗手后再消毒
 - A. 脱无菌手套后
 - B. 离开普通病房前
 - C. 为乙肝患者导尿前
 - D. 为糖尿病患者静脉注射后
 - E. 处理破伤风患者伤口后
43. 下列应执行严密隔离的疾病是
 - A. 乙型脑炎
 - B. 传染性肝炎
 - C. 霍乱
 - D. 肺结核
 - E. 破伤风
44. 以下符合一般消毒隔离要求的是
 - A. 隔离病室门口应挂“谢绝探望”标志
 - B. 工作人员进入隔离区域视情况戴工作帽、口罩,穿隔离衣
 - C. 患者的衣物、票证须经消毒处理后才能交家属带回
 - D. 病室及空气应每周消毒一次
 - E. 患者的排泄物应送出病区统一处理
45. 下列哪项不属于口腔护理的目的
 - A. 保持口腔清洁
 - B. 预防口腔感染
 - C. 增进食欲
 - D. 观察口腔内的变化,提供病情变化信息

- E. 去除牙结石
46. 卧床患者使用气垫褥、水褥的目的是
- 减少皮肤的摩擦刺激
 - 降低骨突出处所受的压力
 - 固定体位
 - 安全防护
 - 防止坠床
47. 压疮淤血红润期的特点是
- 局部皮肤出现红、肿、热、痛
 - 皮下产生硬结
 - 表皮有水疱
 - 浅层组织感染
 - 局部组织坏死
48. 因疾病长期仰卧位的患者,压疮最易发生在
- 髌部
 - 背部
 - 腹部
 - 头部
 - 骶尾部
49. 体温调节中枢位于
- 延髓上部
 - 小脑蝶部
 - 脊髓颈段
 - 大脑枕叶
 - 下丘脑
50. 下列关于体温生理性变化的叙述哪项不正确
- 清晨 2~6 时体温最低
 - 午后 13~18 时体温最高
 - 昼夜体温变动范围不超过 0.2°C
 - 与人体活动有关
 - 与机体代谢的相应周期变化有关
51. 患者退热期体温下降时因大量出汗易出现
- 低温
 - 虚脱
 - 皮肤潮红
 - 呼吸加快
 - 畏寒
- * 52. 适宜在口腔测量体温的患者是
- 昏迷者
 - 患儿
 - 口鼻手术患者
 - 呼吸困难者
 - 肛门手术患者
53. 下列为高热患者实施的护理措施哪项不妥
- 密切观察病情变化
 - 测体温每天 2 次
 - 冰袋冷敷头部
 - 口腔护理每天 2~3 次
 - 鼓励多饮水
54. 当从听诊器中听到第一声搏动时,袖带内压力
- 等于心脏收缩压
 - 大于心脏收缩压
 - 小于心脏收缩压
 - 等于心脏舒张压
 - 小于心脏舒张压
- * 55. 可使血压测量值偏高的因素是
- 肢体位置过高
 - 袖带过紧
 - 袖带过宽
 - 袖带过松
 - 在高热环境中
56. 医院普通饮食的原则是
- 食用易消化无刺激性食物
 - 饮食以软烂为主
 - 饮食以少量多餐为主
 - 膳食纤维含量少
 - 只能短期使用
57. 普通饮食的适用范围是
- 手术后恢复期的患者
 - 急性消化道疾病患者
 - 发热、体弱的老年患者
 - 病情严重、吞咽困难的患者
 - 消化功能正常的患者
- * 58. 不适宜高热量饮食的病种是
- 甲亢
 - 高热

- C. 烧伤
D. 产妇
E. 糖尿病
59. 无盐低钠饮食者早餐应禁忌
A. 大米粥
B. 油条
C. 牛奶
D. 豆浆
E. 鸡蛋
60. 鼻饲操作中错误的方法是
A. 每次鼻饲量不超过 200ml
B. 鼻饲前检查胃管是否在胃内
C. 长期鼻饲者应每周行口腔护理一次
D. 鼻饲液注完后注入少量温开水冲管
E. 拔管至咽喉部时应快速拔出
61. 下列饮食中属于治疗饮食的是
A. 普通饮食
B. 高脂肪饮食
C. 低蛋白饮食
D. 忌碘饮食
E. 半流质饮食
62. 半流质饮食要求每日蛋白质摄入量控制在
A. 70~90g
B. 60~80g
C. 50~70g
D. 40~60g
E. 40~50g
- * 63. 以下不需记录出入液量的患者是
A. 70%烧伤
B. 肾功能衰竭
C. 脑梗死
D. 失血性休克
E. 肝硬化腹水
64. 下列哪项不属于热疗的目的
A. 促进炎症的消散和局限
B. 减轻深部组织充血
C. 解除疼痛
D. 减轻出血
E. 保暖
65. 腹部禁用冷是为了防止
A. 体温骤降
B. 心率减慢
C. 心律失常
D. 冻伤
E. 引起腹泻
66. 冷疗控制炎症扩散的机制是
A. 增强白细胞的吞噬功能
B. 降低细菌的活力
C. 降低神经的兴奋性
D. 溶解坏死组织
E. 增强免疫功能
- * 67. 不宜热水坐浴的患者是
A. 痔疮手术后
B. 肛门部充血
C. 外阴部炎症
D. 肛裂感染
E. 急性盆腔炎
68. 在伤口部位进行热敷时为保护皮肤应特别注意
A. 在床单上铺橡胶单
B. 伤口皮肤周边涂凡士林
C. 保持合适水温
D. 掌握无菌技术
E. 及时更换敷料
69. 禁用冷疗的患者是
A. 烫伤
B. 牙痛
C. 慢性炎症
D. 鼻出血
E. 中暑
70. 乙醇拭浴禁忌擦拭的部位是
A. 腋窝
B. 背部
C. 腹股沟
D. 后颈部
E. 足背
- * 71. 使用冰帽,患者肛温低于 30℃会导致
A. 意识不清
B. 心室颤动
C. 组织水肿

- D. 呼吸困难
E. 血压低
- * 72. 膀胱炎时,新鲜尿液有
- A. 烂苹果味
B. 氨臭味
C. 腥味
D. 大蒜味
E. 苦味
73. 正常尿液颜色呈
- A. 鲜红色
B. 酱油色
C. 乳白色
D. 黄褐色
E. 淡黄色
74. 下列关于尿液透明度的描述错误的是
- A. 正常新鲜的尿液清澈透明
B. 正常新鲜尿液排出后放置一段时间可出现混浊
C. 正常新鲜尿液混浊后经加热会重新变澄清
D. 泌尿系统感染的尿液新鲜时即呈混浊状
E. 蛋白尿的尿液呈混浊状
75. 下列哪项不属于大量不保留灌肠的目的
- A. 解除便秘
B. 高热患者降温
C. 肠道手术前准备
D. 分娩前准备
E. 治疗肠道感染
- * 76. 小量不保留灌肠适用于
- A. 镇静催眠
B. 肠道感染
C. 消化道出血
D. 降温
E. 为年老体弱者减轻便秘
- * 77. 下列关于影响排尿活动的因素表述正确的是
- A. 焦虑时可出现尿频但不会出现排尿困难
B. 手术后患者常出现尿失禁
C. 老年人因膀胱张力差,易出现尿频症状
D. 咖啡、茶、酒类和含盐饮料可有利尿作用
E. 冬季寒冷,外周血管收缩,使尿量减少
78. 下列哪种患者不适合选用 0.1%~0.2% 肥皂液灌肠
- A. 高热
B. 便秘
C. 心力衰竭
D. 肝性脑病
E. 肾炎
79. 为女患者导尿操作,下列哪项是错误的
- A. 患者取仰卧屈膝位
B. 脱下近侧裤腿盖到对侧腿上
C. 初次消毒外阴顺序是由外向内、自上而下
D. 第二次消毒顺序由内向外、自上而下
E. 导尿管插入尿道 4~6cm
80. 上消化道出血患者粪便呈
- A. 黄褐色
B. 果酱样
C. 柏油样
D. 陶土色
E. 水样
81. 剧毒品及麻醉药的最主要保管原则是
- A. 药名用中、英文对照
B. 加锁登记并认真交班
C. 装密封瓶中保存
D. 置于阴凉处存放
E. 与内服药分别放置
- * 82. 不属于“三查八对”内容的是
- A. 床号、姓名
B. 药名、浓度、剂量
C. 方法、时间
D. 操作前、操作中、操作后查
E. 检查用药后反应
83. 下列外文缩写的中文译意,哪项是错误的
- A. qod—隔日 1 次

- B. hs—每晚 1 次
C. qd—每日 1 次
D. qid—每日 4 次
E. biw—每周 2 次
84. 取药、配药方法,下列哪项是**错误**的
A. 取固体药用药匙
B. 先配固体,再配水剂
C. 药液不足 1ml 用滴管吸取
D. 两种药液可置同一药杯内
E. 油剂药液应倒入盛少量温开水杯中
85. 发药时,若患者提出疑问应采取的措施
A. 报告医生
B. 报告护士长
C. 考虑不用
D. 先发给患者再说
E. 重新核对,确认无误后给药
- * 86. 服用强心苷类药物患者,若每分钟心率少于多少则应停药
A. 40 次
B. 50 次
C. 60 次
D. 70 次
E. 80 次
87. 对牙齿有腐蚀作用的药物宜
A. 饭前服用
B. 饭后服用
C. 服后多饮水
D. 用吸管吸
E. 服后不宜立即饮水
88. 可将高频电能转化为超声波声能的装置是
A. 超声波发生器
B. 雾化罐过滤器
C. 雾化罐透声膜
D. 晶体换能器
E. 胶体换能器
- * 89. 下列**不属于**超声波雾化器工作特点的是
A. 雾滴小而均匀
B. 药液随呼吸可到达终末支气管及肺泡
C. 雾化液温暖、舒适
D. 雾量的大小可以调节
E. 用氧量少,节约资源
90. 静脉输液和输血使液体进入体内的原理是利用
A. 负压
B. 虹吸
C. 液体静压
D. 正压
E. 空吸
91. 颈外静脉穿刺的正确部位是
A. 下颌角与锁骨上缘中点连线的上 1/3 处
B. 下颌角与锁骨上缘中点连线的上 1/2 处
C. 下颌角与锁骨上缘中点连线的下 1/3 处
D. 下颌角与锁骨下缘中点连线的上 1/3 处
E. 下颌角与锁骨下缘中点连线的下 1/3 处
92. 输液引起肺水肿的典型症状是
A. 发绀、胸闷
B. 心悸、烦躁不安
C. 胸闷、咳嗽
D. 面色苍白、血压下降
E. 呼吸困难、咳粉红色痰
93. 大量输注库存血后要防止发生
A. 酸中毒和高血钾
B. 酸中毒和低血钾
C. 碱中毒和高血钾
D. 碱中毒和低血钾
E. 低血钾和低血钠
- * 94. 下列哪项**不是**输液所致的过敏反应的原因
A. 患者为过敏体质
B. 输入的血液中含有致敏物质
C. 患者已经多次输血
D. 短时间内输入大量血液
E. 供血者献血前服用了可致敏的物质
95. 颈外静脉插管输液,进针角度为 45° ,进

- 入皮肤后改为
- 15°
 - 25°
 - 30°
 - 45°
 - 90°
- * 96. 对需要长期静脉输液的成年患者,一般先选择的静脉是哪个部位的
- 肘部
 - 头皮
 - 手背
 - 颈外
 - 锁骨下
97. 采用静脉留置针输液主要目的是
- 测量中心静脉压
 - 防止静脉痉挛
 - 防止空气栓塞
 - 灵活变换输液种类及数量
 - 减少穿刺次数,保护静脉
98. 护士在为患者输液过程中,因操作不当导致气体进入血液循环,引起空气栓塞,该护士的行为属于
- 在紧急情况下为抢救患者生命而采取紧急护理措施造成不良后果的
 - 无过错输液造成不良后果的
 - 违反规章制度
 - 不可避免的
 - 违反操作制度
99. 以下属于等渗电解质溶液的是
- 5%葡萄糖
 - 11.2%乳酸钠
 - 10%葡萄糖
 - 5%葡萄糖氯化钠
 - 5%碳酸氢钠
100. 空气栓塞导致死亡的原因是空气进入并阻塞哪条血管
- 肺静脉
 - 肺动脉
 - 上腔静脉
 - 下腔静脉
 - 主动脉
101. 护士为肺水肿患者采取加压吸氧的主要目的是
- 降低动脉血氧分压
 - 降低肺泡内泡沫的表面张力
 - 使肺泡内压力增高
 - 降低肺泡表面张力
 - 增加肺泡毛细血管渗出液的产生
102. 采用直接输血法输血 100ml,需加 3.8%枸橼酸钠溶液
- 5ml
 - 10ml
 - 15ml
 - 20ml
 - 25ml
103. 输血过程中发生溶血反应,初期的典型症状是
- 四肢麻木,腰背剧痛
 - 黄疸
 - 血红蛋白尿
 - 高热
 - 呼吸急促
- * 104. 发生溶血反应后,为增加血红蛋白在尿中的溶解度,常用
- 枸橼酸钠
 - 氯化钠
 - 碳酸氢钠
 - 乳酸钠
 - 葡萄糖酸钙
- * 105. 输液过程中引起静脉痉挛的原因是
- 输液速度过快
 - 液体注入皮下组织
 - 针头阻塞
 - 患者肢体抬举过高
 - 输入的药液温度过低
106. 静脉输液导致发热反应的常见原因是输入液体
- 量过多
 - 速度过快
 - 温度过低

- D. 时间过长
E. 制剂不纯
- * 107. 为血液病患者输血时,最适用的血制品是
A. 新鲜血
B. 库存血
C. 纤维蛋白原
D. 新鲜血浆
E. 冰冻血浆
108. 静脉输液时,墨菲滴管内的液面自行下降,原因可能是
A. 输液瓶挂得太高
B. 输液速度过快
C. 头皮针或留置针脱出
D. 患者肢体摆放不当
E. 滴管或滴管以下导管有漏气
109. 头皮静脉的特点是
A. 外观呈浅红色
B. 管壁薄易被压瘪
C. 易滑动
D. 回血时呈冲击状
E. 推药时阻力大
110. 血小板制备后,必须在多长时间内输注
A. 4 小时
B. 6 小时
C. 8 小时
D. 12 小时
E. 24 小时
111. 关于库存血的保存时间,以下哪项是正确的
A. 在 2℃ 冰箱中冷藏,2~3 周
B. 在 2℃ 冰箱中冷藏,4~8 周
C. 在 4℃ 冰箱中冷藏,2~3 周
D. 在 4℃ 冰箱中冷藏,4~8 周
E. 在 35℃ 环境中放,4~8 周
112. 有关标本采集的描述,下列哪项是错误的
A. 按医嘱执行
B. 护士填写检验申请单
C. 标本采集后,应及时送检
D. 容器外贴上标签
E. 采集量和时间要正确
113. 防止血标本溶血的方法,下列哪项是错误的
A. 选用干燥无菌注射器
B. 注射器采血后带针头沿管壁注入试管
C. 勿将泡沫注入试管
D. 避免过度震荡血标本
E. 标本立即送检
114. 同时抽取几个项目的血标本,一般注入容器的顺序是
A. 先血培养瓶,再干燥试管,最后抗凝管
B. 先血培养瓶,再抗凝管,最后干燥试管
C. 先干燥试管,再抗凝管,最后血培养瓶
D. 先抗凝管,再血培养瓶,最后干燥试管
E. 先抗凝管,再干燥试管,最后血培养瓶
- * 115. 尿常规检查需何时留取尿标本
A. 饭前半小时
B. 晨起第一次尿
C. 连续收集 12 小时尿
D. 连续收集 24 小时尿
E. 随时收集尿液
116. 留取中段尿的正确方法是
A. 尿量不宜太多,3ml 即可
B. 尿内勿混有消毒液
C. 女性患者须取坐位
D. 必须留取晨起第一次尿
E. 用干燥试管留取尿液
117. 采集痰常规标本前,应用的漱口液是
A. 呋喃西林
B. 碳酸氢钠
C. 醋酸溶液
D. 复方硼砂含漱液
E. 清水
118. 在采集粪便标本检查阿米巴原虫前,要