

2013

国家执业医师资格考试



播种生活，收获习惯
播种性格，收获命运

播种习惯，收获性格

——总主编 颐恒

总主编 颐 恒
主 编 郭雅卿 胡美丽 顾奋翔

颐 恒®

临床助理医师 历年考点解析

(上 册)



第四军医大学出版社

图并附在(目)录

国家执业医师资格考试

临床助理医师历年考点解析

(上册)

总主编	顾恒		
主 编	郭雅卿	胡美丽	顾奋翔
副主编	白 珍	张亚敏	李海燕
编 者	顾恒	郭雅卿	胡美丽
	顾奋翔	白 珍	张亚敏
	李海燕	乜庆荣	贾铁钢
	李雪莉	王 宇	李少春
	王 炜	赵晓春	

临床助理医师历年考点解析(上册)



长沙卫生职业学院图书馆



CW0068521

第四军医大学出版社·西安

图书在版编目(CIP)数据

临床助理医师历年考点解析(上、下册)/郭雅卿,胡美丽,顾奋翔主编. —西安:第四军医大学出版社,2013.1

(国家执业医师资格考试)

ISBN 978-7-5662-0297-0

I. ①临… II. ①郭… ②胡… ③顾… III. ①临床医学-医师-资格考试-自学参考资料 IV. ①R4

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第299851号

临床助理医师历年考点解析(上、下册)

- 主 编 郭雅卿 胡美丽 顾奋翔
责任编辑 朱德强
执行编辑 童 彧
出版发行 第四军医大学出版社
地 址 西安市长乐西路17号(邮编:710032)
电 话 029-84776765
传 真 029-84776764
网 址 <http://press.fmmu.sn.cn>
印 刷 陕西天意印务有限责任公司
版 次 2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷
开 本 850×1168 1/16
印 张 41.5
字 数 1320千字
书 号 ISBN 978-7-5662-0297-0/R·1152
定 价 76.00元

版权所有 盗版必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

目 录

上 册 考题纵览

磨刀不误砍柴工——顾恒老师答考生问	(3)
2013 年临床助理医师资格考试复习前评估测试卷	(6)
第一部分 基础医学	(31)
第一篇 生理学	(31)
第二篇 生物化学	(42)
第三篇 病理学	(54)
第四篇 药理学	(64)
第五篇 卫生法规	(73)
第六篇 医学心理学	(87)
第七篇 医学伦理学	(95)
第二部分 预防医学	(103)
第三部分 临床医学	(112)
预备篇 症状与体征	(112)
第一篇 呼吸系统	(118)
第二篇 心血管系统	(139)
第三篇 消化系统	(161)
第四篇 泌尿系统(含男性生殖系统)	(194)
第五篇 女性生殖系统	(209)
第六篇 血液系统	(242)
第七篇 内分泌系统	(251)
第八篇 神经系统疾病	(263)
第九篇 精神疾病	(274)
第十篇 运动系统	(286)
第十一篇 儿科学	(307)
第十二篇 传染病学与性传播疾病	(349)
第十三篇 其他	(359)
第十四篇 外科总论	(365)

下 册 考 点 精 讲

第一部分 基础医学	(387)
第一篇 生理学	(387)
第二篇 生物化学	(396)
第三篇 病理学	(403)
第四篇 药理学	(412)
第五篇 卫生法规	(422)
第六篇 医学心理学	(430)
第七篇 医学伦理学	(434)
第二部分 预防医学	(438)
第三部分 临床医学	(443)
预备篇 症状与体征	(443)
第一篇 呼吸系统	(448)
第二篇 心血管系统	(467)
第三篇 消化系统	(483)
第四篇 泌尿系统(含男性生殖系统)	(502)
第五篇 女性生殖系统	(513)
第六篇 血液系统	(543)
第七篇 内分泌系统	(549)
第八篇 神经系统疾病	(558)
第九篇 精神疾病	(564)
第十篇 运动系统	(571)
第十一篇 儿科学	(594)
第十二篇 传染病学与性传播疾病	(627)
第十三篇 其他	(634)
第十四篇 外科总论	(638)

上 册

考题纵览

磨刀不误砍柴工

——颐恒老师答考生问

几年来,本人有幸到全国多个省市授课,也和众多的考生成了朋友,正是他们,为我们提供了最得力的帮助。其实很多考生之所以连续考多年总是差几分,并非不用功,说穿了就是方法不对路,做了很多无用功。结合近几年的教学体会,在此解答各位的共性问题,也作为本书的开篇!

1. 听说 2013 年要更换新的考试大纲,新大纲将对考生以后的复习有何影响?

答:2009 年大纲实施 3 年来,发现存在诸多问题,及时予以更新,目的就是适应新的形势变化。有关新大纲的变化,网校将在 2013 年元旦后专门制作一段视频进行讲解,请广大考生登录颐恒老师医考讲坛官方网站(www.yihenglaoshi.com)公告栏板块或笔试资源板块,收看本人亲自讲授,为 2013 年考试复习指明航向。

2. 对于 2012 年考题,有人说难,有人说容易,老师如何看待考题的变化?

答:近年的考题和早年比,的确变化很大,表现在以下几个方面:

(1)命题方向和理念的转变。2012 年考题基本可以代表以后的命题走向,但考题越来越灵活是所有考生的共识。所以多数考生反映难度大,除极小部分偏题、超纲题外,还体现在另外两个方面:一是考题灵活,死记硬背的考题少;二是逆向思维题和描述性考题增多。给考生的感觉是备选答案迷惑性强,有把握答对的题很少,因此有“大部分都是蒙的”之类的感慨,就毫不奇怪了。

(2)历年考点重复率接近 80%,新增考核知识点比例增加。通俗地说,就是平时大家都认为的重点内容,如肺炎临床表现、胃溃疡手术方式、心肌梗死心电图表现等不再出现,转而考肺炎的 X 线表现、胃溃疡的手术后并发症、心肌梗死用药等。平时不注意的内容出题增多,不单指传染、精神、妇产科、儿科等小科目,也包括那些很偏、冷的知识点出现大量考题。有 20% 的考题是大家没有复习到的陌生考点。这就是很多考生反映考题偏、难的根源。

(3)历年考题换汤不换药,推陈出新。我们来看一道 2012 年考题和 2006 年考题:

【考题举例 1】(2012 考题/第一单元)

男,30 岁。饥饿性上腹痛 2 年,进食后可缓解。胃镜检查:十二指肠溃疡愈合期,快速尿素酶试验阳性。最有效的治疗方案是

A. 奥美拉唑 + 枸橼酸铋钾 + 克拉霉素

B. 法莫替丁 + 阿莫西林 + 克拉霉素

C. 西咪替丁 + 克拉霉素 + 左氧氟沙星

D. 奥美拉唑 + 硫糖铝

E. 奥美拉唑 + 阿莫西林 + 替硝唑

【考题举例 2】(2005 考题/第二单元)

对于初次诊断活动期胃溃疡,下列治疗中最适合的是

A. 联合应用两种黏膜保护剂

B. 促动力剂 + H_2 受体拮抗剂

C. 质子泵抑制剂 + 黏膜保护剂

D. 质子泵抑制剂 + 两种抗生素

E. 抗酸剂

对于十二指肠溃疡的治疗,以 PPI 或胶体铋为基础加上两种抗生素的三联治疗方案是临床中最常用的方案。两道考题几乎没有差异,从而说明考题万变不离其宗,历年重要的考核知识仍然是命题的核心,只要把知识真正掌握了,考试过关并非难事。但指望画重点、玩技巧,甚至背答案,无异于刻舟求剑。

(4)知其然并知其所以然。基础课程越来越重要,再来看一道2012年考题:

【考题举例3】(2012考题/第二单元)

女,59岁。因高热、腹泻静脉点滴庆大霉素治疗,5天后出现恶心、呕吐,伴少尿。查血白细胞总数及分类正常,尿比重1.010,蛋白(+),红细胞0~2/HP,白细胞3~5/HP。血肌酐 $320\mu\text{mol/L}$,尿素氮 17mmol/L ,尿钠 100mmol/L 。该患者肾衰竭最可能的原因是

A. 急性肾小管坏死

B. 急性间质性肾炎

C. 急进性肾小球肾炎

D. 肾前性氮质血症

E. 急性肾小球肾炎

答对这道题必须掌握肾小管和肾小球疾病的不同机制。这就是很多考生反映2012的考题:“题目真是玩人,题干那么长,不问诊断、治疗,绕半天问病理生理!”

3. 备战2013,如何才能取到好的效果?

答:做任何事情要取得成功,必须有周密的计划、辛勤的汗水,其次才是适当的方法和老师的指导。尤其是学习方法指导尤为重要,为此,我们教学团队编写了《医考讲坛》,详细介绍了有关内容,随本书配赠,也可以到网校官方网站下载(www.yihenglaoshi.com)。同时还建议广大考生登录我们网校,听听“导学”再下手复习,效果会大有不同。“磨刀不误砍柴功”。

4. 有关复习资料版本实在太多,该如何选择?

答:资料包括大纲、技能教材(含光盘)、笔试教材(指南或讲义)、同步习题、历年真题、模拟试卷等六个板块,且都不可缺少。由于目前市面上相关复习资料多如牛毛,犹如雾里看花一般。每年被复习资料误导者数不胜数。其实选择方法很简单,谁的话都不要去听,把你看到的辅导书一字摊开,选择自己最熟悉的一个病种,对比开来看,合适自己的就是最好的。比如笔试教材,我们为什么会推荐《综合笔试辅导讲义》,道理很简单,和其他指导/指南比,此书图文并茂,考题举例等内容会让你看完以后,不再对其他辅导书有兴趣。还比如习题,无论什么练习题(包括真题和模拟试卷),一定要选择带详尽解析的那种。

5. 考前辅导班到底有多大意义?

答:先看看我们网校2012年学员的考后体会——“通过这次考试我感受最深的一句话就是‘不听老师话,不知要再考几年’。因为一看到试卷我就感觉出来,老师把考点几乎都讲到了。尤其是冲刺课件,老师的话真是字字如金啊!看考题就有体会了。只要稍微努力点,按老师的要求去做,过关真的不难!”

目前来说,考前辅导有面授和网络视频两种形式。我们教学团队建议参加网络课程教学。因为面授课堂一般不会超过80课时(10天),而网络教学往往达到200课时以上。从这个角度说,参加网络课堂教学效果要好一些;至于现场气氛,不排除个别辅导机构为了迎合考生的需要,搞那种花架子教学,但不会有实质的收获。经过数年的磨合和积累,我们网络课堂已经在还原课堂实景方面做了有益的尝试,建议大家登录www.yihenglaoshi.com,听听老师们的讲课,自然就能体会到知识的魅力!

6. 2013年版《历年考点解析》与上一年比,有哪些变化?

答:本书从2008版开始就强调:大家千万不要指望原题的重复。不听劝告的考生因此而吃了大亏,甚至把失败的责任归结到辅导书上——“考到的原题太少、太少了!”。因此非常有必要说明2013版本的修订情况。

第一,开卷篇的“复习前评估测试卷”,如果你参加过2012年考试,做此评估卷自然会有重回考场的体会。

第二,删除了新大纲不再考核及部分失去再考核价值的试题,如违反《药品管理法》的医务人员由哪个部门来处罚、脊柱损伤的搬运方法等。

第三,按照新的命题思路重新修改考题,补充了大纲新增部分的试题,如心肺复苏按压与吹气的比例、原发性不孕的年限、霍奇金淋巴瘤的化疗首选方案等。特别是按照新版教材更新了答案,比如:

【考题举例 4】

男,20 岁。重症感染患者,每天上午 10 点出现寒战、高热,已连续 6 天。疑有全身性感染菌血症,应做血培养。最佳抽血时间应在

A. 发生寒战发热时

B. 预计发生寒战及发热前

【正确答案】

C. 寒战后体温升至最高时

D. 体温正常后 1 小时

E. 体温正常后半小时

本题为 2012 和 2005 年真题,如果按照旧版教材选 B,而新版教材的观点是 A。

第四,解析考题绝非传统的就答案解释答案,而是把考点、命题动向和答题思维过程全面结合起来。书中的示意图、表格和“考点提示”是帮助考生记忆的良方。

答案解析

考点提示:血培养。血培养是诊断菌血症、败血症、感染性心内膜炎等的重要方法。抽血时间应在寒战、高热、体温升至最高时。

答案解析:血培养。血培养是诊断菌血症、败血症、感染性心内膜炎等的重要方法。抽血时间应在寒战、高热、体温升至最高时。

1. 关于血培养,正确的是
 - A. 血培养是诊断菌血症、败血症、感染性心内膜炎等的重要方法
 - B. 抽血时间应在寒战、高热、体温升至最高时
 - C. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 1 小时
 - D. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 2 小时
 - E. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 3 小时
2. 关于血培养,错误的是
 - A. 血培养是诊断菌血症、败血症、感染性心内膜炎等的重要方法
 - B. 抽血时间应在寒战、高热、体温升至最高时
 - C. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 1 小时
 - D. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 2 小时
 - E. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 3 小时
3. 关于血培养,正确的是
 - A. 血培养是诊断菌血症、败血症、感染性心内膜炎等的重要方法
 - B. 抽血时间应在寒战、高热、体温升至最高时
 - C. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 1 小时
 - D. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 2 小时
 - E. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 3 小时
4. 关于血培养,错误的是
 - A. 血培养是诊断菌血症、败血症、感染性心内膜炎等的重要方法
 - B. 抽血时间应在寒战、高热、体温升至最高时
 - C. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 1 小时
 - D. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 2 小时
 - E. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 3 小时
5. 关于血培养,正确的是
 - A. 血培养是诊断菌血症、败血症、感染性心内膜炎等的重要方法
 - B. 抽血时间应在寒战、高热、体温升至最高时
 - C. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 1 小时
 - D. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 2 小时
 - E. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 3 小时
6. 关于血培养,错误的是
 - A. 血培养是诊断菌血症、败血症、感染性心内膜炎等的重要方法
 - B. 抽血时间应在寒战、高热、体温升至最高时
 - C. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 1 小时
 - D. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 2 小时
 - E. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 3 小时
7. 关于血培养,正确的是
 - A. 血培养是诊断菌血症、败血症、感染性心内膜炎等的重要方法
 - B. 抽血时间应在寒战、高热、体温升至最高时
 - C. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 1 小时
 - D. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 2 小时
 - E. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 3 小时
8. 关于血培养,错误的是
 - A. 血培养是诊断菌血症、败血症、感染性心内膜炎等的重要方法
 - B. 抽血时间应在寒战、高热、体温升至最高时
 - C. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 1 小时
 - D. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 2 小时
 - E. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 3 小时
9. 关于血培养,正确的是
 - A. 血培养是诊断菌血症、败血症、感染性心内膜炎等的重要方法
 - B. 抽血时间应在寒战、高热、体温升至最高时
 - C. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 1 小时
 - D. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 2 小时
 - E. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 3 小时
10. 关于血培养,错误的是
 - A. 血培养是诊断菌血症、败血症、感染性心内膜炎等的重要方法
 - B. 抽血时间应在寒战、高热、体温升至最高时
 - C. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 1 小时
 - D. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 2 小时
 - E. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 3 小时

1. 关于血培养,正确的是
 - A. 血培养是诊断菌血症、败血症、感染性心内膜炎等的重要方法
 - B. 抽血时间应在寒战、高热、体温升至最高时
 - C. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 1 小时
 - D. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 2 小时
 - E. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 3 小时
2. 关于血培养,错误的是
 - A. 血培养是诊断菌血症、败血症、感染性心内膜炎等的重要方法
 - B. 抽血时间应在寒战、高热、体温升至最高时
 - C. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 1 小时
 - D. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 2 小时
 - E. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 3 小时
3. 关于血培养,正确的是
 - A. 血培养是诊断菌血症、败血症、感染性心内膜炎等的重要方法
 - B. 抽血时间应在寒战、高热、体温升至最高时
 - C. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 1 小时
 - D. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 2 小时
 - E. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 3 小时
4. 关于血培养,错误的是
 - A. 血培养是诊断菌血症、败血症、感染性心内膜炎等的重要方法
 - B. 抽血时间应在寒战、高热、体温升至最高时
 - C. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 1 小时
 - D. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 2 小时
 - E. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 3 小时
5. 关于血培养,正确的是
 - A. 血培养是诊断菌血症、败血症、感染性心内膜炎等的重要方法
 - B. 抽血时间应在寒战、高热、体温升至最高时
 - C. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 1 小时
 - D. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 2 小时
 - E. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 3 小时
6. 关于血培养,错误的是
 - A. 血培养是诊断菌血症、败血症、感染性心内膜炎等的重要方法
 - B. 抽血时间应在寒战、高热、体温升至最高时
 - C. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 1 小时
 - D. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 2 小时
 - E. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 3 小时
7. 关于血培养,正确的是
 - A. 血培养是诊断菌血症、败血症、感染性心内膜炎等的重要方法
 - B. 抽血时间应在寒战、高热、体温升至最高时
 - C. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 1 小时
 - D. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 2 小时
 - E. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 3 小时
8. 关于血培养,错误的是
 - A. 血培养是诊断菌血症、败血症、感染性心内膜炎等的重要方法
 - B. 抽血时间应在寒战、高热、体温升至最高时
 - C. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 1 小时
 - D. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 2 小时
 - E. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 3 小时
9. 关于血培养,正确的是
 - A. 血培养是诊断菌血症、败血症、感染性心内膜炎等的重要方法
 - B. 抽血时间应在寒战、高热、体温升至最高时
 - C. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 1 小时
 - D. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 2 小时
 - E. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 3 小时
10. 关于血培养,错误的是
 - A. 血培养是诊断菌血症、败血症、感染性心内膜炎等的重要方法
 - B. 抽血时间应在寒战、高热、体温升至最高时
 - C. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 1 小时
 - D. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 2 小时
 - E. 抽血时间应在寒战、高热、体温正常后 3 小时

2013 年临床助理医师资格考试复习前评估测试卷

【答题要求】

1. 建议实际测试时间不得少于 240 分钟,也不能超过 300 分钟。
2. 坚持按考试要求测试,不可边翻书边做题。
3. 做完全部考题后再核对答案。

第一单元

A1 型选择题(1~70 题)

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 含稀有碱基最多的核酸分子是
 - A. rRNA
 - B. cDNA
 - C. DNA
 - D. mRNA
 - E. tRNA
2. 关于随机抽样,正确的说法是
 - A. 抽样时,总体中相邻个体都一定不能抽中
 - B. 研究者在抽样时应精心挑选个体,以使样本更能代表总体
 - C. 抽样时,应使得总体中的每个个体都有相等的机会被抽中
 - D. 样本的代表性与抽样的样本量无关
 - E. 样本的代表性就是随意抽取个体
3. 尖锐湿疣好发的常见部位是
 - A. 喉头
 - B. 外阴部
 - C. 肛门周围
 - D. 阴道
 - E. 宫颈
4. 卵巢囊肿最常见的并发症是
 - A. 感染
 - B. 出血
 - C. 破裂
 - D. 蒂扭转
 - E. 坏死
5. 妊娠期循环血量开始增多和达到高峰的时期是
 - A. 妊娠第 6~8 周、妊娠第 32~34 周
 - B. 妊娠第 2~4 周、妊娠第 28~30 周
 - C. 妊娠第 14~16 周、妊娠第 36~38 周
 - D. 妊娠第 10~12 周、妊娠第 34~36 周
 - E. 妊娠第 18~20 周、妊娠第 38~40 周
6. 儿童运动功能发育规律是
 - A. 手到臂,腿到脚
 - B. 先抓物,后握物
 - C. 先抬头,后坐立行
 - D. 先倒退,后前进
 - E. 先下蹲,后弯腰
7. 能检测出乙肝处于复制期的检查是
 - A. HBsAg
 - B. HBeAg
 - C. HBe
 - D. HBc
 - E. HBsAg
8. 妊娠滋养细胞肿瘤不包括
 - A. 胎盘部分滋养细胞肿瘤
 - B. 侵蚀性葡萄胎
 - C. 葡萄胎
 - D. 上皮样滋养细胞肿瘤
 - E. 绒癌
9. 不直接参与肽链合成过程的物质是
 - A. mRNA
 - B. tRNA
 - C. snRNA
 - D. rRNA
 - E. 核蛋白体

10. 临床试验中的双盲法是指
 - A. 观察者与被观察者均不知道分组情况和接受的治疗措施
 - B. 两组研究对象互不熟悉
 - C. 治疗组服用研究药物, 对照组服用安慰剂
 - D. 观察者与被观察者均不知道安慰剂的性质
 - E. 观察者与被观察者均不知道研究药物的性质
11. 实施临床预防服务的原则不包括
 - A. 重视危险因素的收集
 - B. 医患双方共同决策
 - C. 以健康咨询与教育为先导
 - D. 及时实施手术
 - E. 合理选择健康筛检的内容
12. 医师应当履行的法定义务是
 - A. 参加专业培训
 - B. 出具医学证明文件
 - C. 努力专研业务
 - D. 参加行业协会
 - E. 从事学术交流
13. 下列为含有 B 族维生素的辅酶, 除外的是
 - A. 磷酸吡哆醛
 - B. 辅酶 A
 - C. 细胞色素 B
 - D. 四氢叶酸
 - E. 硫胺素焦磷酸
14. 通过对某个社区所有居民进行高血压检测结果分析可得出的结论是
 - A. 高血压的发病率
 - B. 高血压的家族续发率
 - C. 高血压的罹患率
 - D. 高血压的病死率
 - E. 高血压的患病率
15. DNA 和 RNA 共有的成分是
 - A. D 核糖
 - B. D-2-脱氧核糖
 - C. 鸟嘌呤
 - D. 尿嘧啶
 - E. 胸腺嘧啶
16. 维系蛋白质二级结构的化学键是
 - A. 疏水键
 - B. 氢键
 - C. 盐键
 - D. 范德华力
 - E. 肽键
17. 糖原分解的限速酶是
 - A. 己糖激酶
 - B. 磷酸化酶
 - C. 异柠檬酸脱氢酶
 - D. 6-磷酸葡萄糖脱氢酶
 - E. 丙酮酸羧化酶
18. 遗传密码的简并性是指
 - A. 甲硫氨酸密码子可作为起始密码
 - B. 所有生物都可使用同一密码子
 - C. 密码子与反密码子之间不能严格配对
 - D. 几种密码子可代表同一氨基酸
 - E. 一个密码子可代表多个氨基酸
19. 反映医患技术关系的是
 - A. 道德关系
 - B. 价值关系
 - C. 法律关系
 - D. 诊治关系
 - E. 利益关系
20. 为了反映某地区 10 年来男性肺癌患者死亡平均年龄分布规律, 可采用
 - A. 直方图
 - B. 普通线图
 - C. 半对数线图
 - D. 直条图
 - E. 复式直条图
21. 胆汁酸合成的限速酶是
 - A. 1 α -羟化酶
 - B. 12 α -羟化酶
 - C. HMG-CoA 还原酶
 - D. HMG-CoA 合酶
 - E. 7 α -羟化酶
22. 能使肾上腺素升压作用翻转为降压作用的药物是
 - A. 普萘洛尔
 - B. 酚妥拉明
 - C. 硝苯地平
 - D. 卡托普利
 - E. 新斯的明
23. 幽门梗阻时禁用下列哪类药物
 - A. 抗胆碱能药
 - B. 胶体次枸橼酸铋
 - C. H₂受体拮抗剂
 - D. 酸泵抑制剂
 - E. 抗菌药物
24. 关于地西洋的药理作用, 正确的是
 - A. 无明显的抗焦虑作用
 - B. 对快波睡眠影响小
 - C. 具有外周性肌松作用
 - D. 可用于全身麻醉

- E. 安全范围较小
25. 关于感觉的叙述,不正确的是
- 客观事物是感觉的源泉
 - 感觉剥夺会对心理活动造成一定影响
 - 任何刺激都会引起相应的感觉
 - 感觉不能反映事物的整体属性
 - 感觉是认知的初级阶段
26. 抑制胃壁细胞 $H^+ - K^+ - ATP$ 酶活性的药物是
- 奥美拉唑
 - 氯苯那敏
 - 呋塞米
 - 雷尼替丁
 - 特布他林
27. 胰岛素的药理作用不包括
- 加速葡萄糖氧化
 - 抑制脂肪分解
 - 促进蛋白质合成
 - 促进糖原增生
 - 促进 K^+ 进入细胞
28. 不符合细菌性阴道病的是
- 阴道分泌物呈鱼腥味改变,性交后加重
 - 线索细胞阳性
 - 均质、稀薄、白色阴道分泌物
 - 碱性冲洗液阴道冲洗
 - 首选甲硝唑、克林霉素等治疗
29. 毛果芸香碱引起瞳孔缩小的机制是
- 激动瞳孔括约肌的 M 受体
 - 阻断瞳孔括约肌的 M 受体
 - 激动睫状肌的 M 受体
 - 阻断睫状肌的 M 受体
 - 激动括约肌和睫状肌的 M 受体
30. 心指数等于
- 心率 $\times$ 每搏输出量/体表面积
 - 每搏输出量 $\times$ 体表面积
 - 每搏输出量/体表面积
 - 心输出量 $\times$ 体表面积
 - 心率 $\times$ 每搏心输出量 $\times$ 体表面积
31. AB 血型人的红细胞膜上和血清中分别含有
- A、B 凝集原和抗 A、抗 B 凝集素
 - B 凝集原和抗 B 凝集素
 - A 凝集原和抗 B 凝集素
 - B 凝集原和抗 A 凝集素
 - A、B 凝集原,不含抗 A、抗 B 凝集素
32. 呼吸频率加倍,潮气量减半时,将使
- 每分通气量增加
 - 每分通气量减少
 - 肺泡通气量增加
 - 肺泡通气量减少
 - 肺泡通气量不变
33. 能抑制胃排空的因素是
- 臂内神经丛反射
 - 进入胃内的食物
 - 组胺
 - 迷走 - 迷走神经反射
 - 胃 - 肠反射
34. 心肌细胞有效不应期相当于
- 收缩期
 - 舒张期
 - 收缩期 + 舒张期
 - 收缩期 + 舒张早期
 - 舒张晚期
35. 静脉回心血量增多时,可引起
- 心室后负荷减小
 - 心室舒张期延长
 - 心室前负荷增加
 - 心室充盈期缩短
 - 中心静脉压降低
36. 抑制性突触后电位是
- 去极化局部电位
 - 超极化局部电位
 - 具有全或无特性
 - 突触后膜 Na^+ 通透性增加所致
 - 突触前膜递质释放减少所致
37. 细胞膜上的泵、通道和载体的共同点是
- 转运脂溶性物质
 - 均消耗能量
 - 均是化学门控
 - 均是电压门控
 - 转运小分子物质或离子
38. 剧烈运动(交感神经兴奋)时少尿的主要原因是
- 肾小球毛细血管血压增高
 - ADH 分泌增多
 - 肾小动脉收缩,肾血流量减少
 - 醛固酮分泌增多
 - 醛固酮分泌减少
39. 炎症反应的中心环节是
- 细胞渗出
 - 免疫反应
 - 血管反应
 - 吞噬作用
 - 组织增生

40. 原发性肾小球疾病的病理分型不包括
 - A. 轻微肾小球病变
 - B. 局灶性节段性病变
 - C. 肾病综合征
 - D. 膜性肾病
 - E. 增生性肾炎
41. 苯妥英钠抗癫痫作用的主要机制是
 - A. 抑制病灶本身异常放电
 - B. 对中枢神经系统普遍抑制
 - C. 抑制脊髓神经元
 - D. 具有肌肉松弛作用
 - E. 稳定神经细胞膜
42. 阿托品抗休克的主要机制是
 - A. 加快心率, 增加心排出量
 - B. 扩张肾血管, 改善肾功能
 - C. 扩张血管, 改善微循环
 - D. 兴奋中枢, 提高机体功能
 - E. 收缩血管, 升高血压
43. 一般情况下, 女性一生中发育成熟并排出卵子数为
 - A. <100
 - B. 500~700
 - C. >800
 - D. 100~300
 - E. 300~500
44. 下列对放射性治疗低度敏感的肿瘤是
 - A. 骨肉瘤
 - B. 肺癌
 - C. 多发性骨髓瘤
 - D. 乳腺癌
 - E. 鼻咽癌
45. 休克的根本病因是
 - A. 血压下降
 - B. 中心静脉压下降
 - C. 心排出量下降
 - D. 有效循环血量下降
 - E. 微循环障碍
46. 疏松结缔组织的弥漫性化脓性炎是
 - A. 蜂窝织炎
 - B. 纤维素性炎
 - C. 浆液性炎
 - D. 卡他性炎
 - E. 脓肿
47. 短暂性脑缺血发作的临床表现是
 - A. 血压突然升高, 短暂意识不清, 抽搐
 - B. 眩晕、呕吐、耳鸣持续数日
 - C. 发作性神经系统功能障碍, 24 小时内完全恢复
 - D. 昏迷、清醒、再昏迷
 - E. 一侧轻偏瘫, 历时数日渐恢复
48. 产褥期的临床表现与处理错误的是
 - A. 产后 10 小时, 体温 37.9℃ —— 观察
 - B. 产后 4 小时, 尿潴留 —— 诱导排尿
 - C. 产后 3 天, 会阴伤口化脓 —— 拆线扩创
 - D. 产后 7 天, 下腹痛 —— 镇痛药止痛
 - E. 产后 1 天, 会阴水肿 —— 红外线照射
49. III 度胎盘早剥的并发症不包括
 - A. 子宫胎盘卒中
 - B. 凝血功能障碍
 - C. 子宫破裂
 - D. 产后出血
 - E. 急性肾衰竭
50. 胎儿能否衔接入盆的关键径线是
 - A. 坐骨棘间径
 - B. 入口前后径
 - C. 坐骨结节径
 - D. 入口横径
 - E. 中骨盆前后径
51. 下列哪项不是孕激素的生理作用
 - A. 使子宫内膜由增生期转变为分泌期
 - B. 使宫颈黏液黏稠, 拉丝度降低
 - C. 排卵后使基础体温上升 0.3℃~0.5℃
 - D. 对下丘脑有负反馈作用
 - E. 促进钠、水潴留
52. 药物避孕的机制不包括
 - A. 抑制排卵
 - B. 增加宫颈黏液黏稠度
 - C. 使内膜增生不良
 - D. 抑制精子获能
 - E. 阻止精子与卵子结合
53. 滋养细胞肿瘤最常见的转移部位是
 - A. 肺
 - B. 阴道
 - C. 肾
 - D. 肝
 - E. 脑
54. 对于出血坏死性胰腺炎最具诊断价值的实验室检测指标是
 - A. 血清淀粉酶升高
 - B. 血清胆红素升高
 - C. 血糖降低
 - D. 血钙降低
 - E. 血镁降低

55. 加强腹股沟管前壁的疝修补方法是
- Bassini 法
 - Halsted 法
 - Ferguson 法
 - McVay 法
 - Shouldice 法
56. 小儿重症肺炎合并循环系统治疗不包括
- 吸氧
 - 利尿
 - 镇静
 - 糖皮质激素
 - 强心
57. 卵巢动脉来自
- 腹主动脉
 - 髂总动脉
 - 髂内动脉
 - 髂外动脉
 - 肾动脉
58. 脐带血管组成包括
- 一条动脉、两条静脉
 - 一条静脉、两条动脉
 - 一条静脉、一条动脉
 - 两条动脉、两条静脉
 - 两条动脉
58. 短时间记忆容量一般为
- 5 ± 2
 - 7 ± 2
 - 9 ± 2
 - 6 ± 2
 - 8 ± 2
59. 主要用于室性心律失常的药物是
- 地高辛
 - 普萘洛尔
 - 利多卡因
 - 维拉帕米
 - 奎尼丁
60. 通过内心信念来实现的道德评价是
- 患者评价
 - 群众评价
 - 领导评价
 - 自我评价
 - 同行评价
61. 药品成分含量与国家药品标准不符合的是
- 新药
 - 假药
 - 劣药
 - 常规药品
 - 特药
62. 处理不协调性子宫收缩乏力的首选措施应是
- 静脉补充能量
 - 温肥皂水灌肠
 - 行人工破膜
 - 肌内注射哌替啶
 - 静脉滴注缩宫素
63. 为预防小儿风湿复发,对不伴心脏炎的应用长效青霉素的使用时间至少为
- 5 年
 - 7 年
 - 3 年
 - 1 年
 - 半年
64. 怀疑支气管扩张而胸片大致正常,首选检查是
- 支气管碘油造影
 - 纤维支气管镜
 - 高分辨 CT
 - 增强 CT
 - MRI
65. 动脉导管未闭时不会出现的改变是
- 左室增大
 - 右房增大
 - 右室增大
 - 肺动脉凸出
 - 左心房增大
66. 帽状腱膜下血肿不能吸收者,首选治疗方法是
- 切开止血
 - 应用止血药
 - 加压包扎,促进血肿吸收
 - 穿刺引流
 - 穿刺抽液
67. 哪一项不是动力性泌尿系梗阻的常见原因
- 腰麻和肛管直肠术后
 - 中枢和周围神经系统疾病
 - 前列腺增生
 - 阿托品服用
 - 低血钾、高热等
68. 烧伤 3~7 天,脱屑愈合,无瘢痕,短期有色素沉着,说明烧伤仅及
- 全皮层
 - 表皮全层
 - 皮下层
 - 表皮生发层

E. 真皮层

69. 心肺复苏时心脏按压的次数为每分钟至少

- A. 100 次
- B. 140 次
- C. 80 次
- D. 120 次

E. 90 次

70. 运输内源性胆固醇至肝外的脂蛋白是

- A. HDL
- B. VLDL
- C. LDL
- D. CM
- E. IDL

A2 型选择题 (71 ~ 109 题)

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

71. 1 岁患儿腹泻并重度脱水,体重 10kg,该患儿第 1 天补液总量应为

- A. 1100 ~ 1400ml
- B. 1500 ~ 1800ml
- C. 1900 ~ 2100ml
- D. 2200 ~ 2400ml
- E. 700 ~ 1000ml

72. 从 2002 年 11 月到 2003 年 7 月 31 日,新发传染病 SARS 波及 29 个国家和地区,全球累计发病 8098 例,死亡 774 例。该期 SARS 病死率为

- A. 全确诊和疑似患者中该病死亡者的比例
- B. 全部确诊患者中该病死亡者的比例
- C. SARS 死亡病例占同期暴露人口数的比例
- D. SARS 死亡病例占同期总人口数的比例
- E. SARS 死亡病例占同期平均人口数的比例

73. 女,54 岁,绝经一年,不规则阴道出血伴浆液血性白带 1 月余。妇科检查:阴道内无异常,宫颈光滑,子宫体略大,质软,双附件正常。此患者最可能的诊断是

- A. 更年期功能失调性子宫出血
- B. 子宫颈癌
- C. 子宫内膜癌
- D. 子宫肌瘤
- E. 输卵管癌

74. 女,3 个月,吐奶溢奶,体重正常,3.5kg,发育正常,腹部 B 超无异常,该患儿可能为

- A. 胃贲门肌力增高
- B. 幽门括约肌紧张性增高
- C. 胃平滑肌完善
- D. 贲门发育成熟
- E. 胃的容量大

75. 男,67 岁,已发生过脑卒中,但仍然抽烟,医生劝其戒烟以预防再发脑卒中。请问这属于

- A. 第一级预防
- B. 第二级预防
- C. 早期干预
- D. 原生级预防
- E. 第三级预防

76. 某地为了了解某城市糖尿病的流行情况拟进行一次普查,要说明调查结果可用

- A. 感染率
- B. 罹患率
- C. 累积发病率
- D. 患病率
- E. 发病率

77. 8 个月婴儿,因腹泻脱水,测血钠 135mmol/L,最适宜补充累积丢失的液体是

- A. 0.9% 氯化钠溶液
- B. 2 份生理盐水、1 份 14% 碳酸氢钠
- C. 2 份生理盐水、3 份 5% 葡萄糖、1 份 14% 碳酸氢钠
- D. 4 份生理盐水、3 份 5% 葡萄糖、2 份 14% 碳酸氢钠
- E. 1 份生理盐水、4 份 5% 葡萄糖并含 10% 氯化钾

78. 为探讨孕妇感染风疹病毒对胎儿的影响,研究者选择了 100 例确诊有风疹病毒感染史的孕妇,同时选择了同期同医院确诊无风疹病毒感染史的孕妇,然后追踪两组孕妇的胎儿出生的情况,这种研究方法是

- A. 队列研究
- B. 临床试验
- C. 现况调查
- D. 病例对照研究
- E. 以上都不是

79. 男,4 岁,猩红热感染后患儿,出现蛋白尿、血尿,经治疗恢复上学的指征是

- A. 肉眼血尿消失
B. 血压正常
C. 尿阿迪氏计数正常
D. 血沉正常
E. 水肿消退
80. 对某大学学生心理健康状况调查,首先对学生编号,随机抽取尾号为2的学生填写调查表,约对1/10的学生进行调查,这种抽样方法属于
A. 多级抽样
B. 分层抽样
C. 系统抽样
D. 整群抽样
E. 单纯随机抽样
81. 初孕,26岁,孕39周,临产7小时,宫口开全1小时。枕左前位,胎头+3,胎心率100次/分,羊水混,棕黄色。首先处理的措施是
A. 立即剖宫产
B. 腹部加压
C. 产前助产
D. 前列腺素促产
E. 静滴缩宫素
82. 男,40岁,被车轮碾压5小时,查体:P 120次/分, BP 90/60mmHg。股骨干开放性骨折,双下肢多处皮肤撕脱伤,急救过程中密切注意的电解质表现是
A. 低钾血症
B. 高钾血症
C. 低钠血症
D. 高钠血症
E. 高钙血症
83. 女,38岁,常从事编织工作,右中指疼痛,屈伸活动受限。右中指掌指关节处可触及硬结,屈伸时有弹响,最可能的诊断是
A. 骨软骨瘤
B. 化脓性关节炎
C. 狭窄性腱鞘炎
D. 慢性骨髓炎
E. 骨巨细胞瘤
84. 女,58岁,反复胸前区疼痛,常在休息或清晨时发作,持续时间一般为20~30分钟,含服硝酸甘油10分钟可缓解。疼痛发作时,心电图胸前导联ST段抬高,疾病缓解后ST段恢复至等电位线,运动负荷试验阴性,其诊断为
A. 初发型心绞痛
B. 卧位型心绞痛
C. 稳定型心绞痛
D. 变异型心绞痛
E. 恶化型心绞痛
85. 男,35岁,因粘连性肠梗阻行粘连松解手术后5天,一直无肛门排气,患者腹胀,全身感乏力。查体:体温正常,腹部无明显压痛,听诊无肠鸣音。白细胞 $8 \times 10^9/L$,腹部透视可见小的气液平面。最可能的诊断是
A. 粘连性肠梗阻
B. 腹腔出血并感染
C. 肠穿孔并腹膜炎
D. 呼吸性碱中毒
E. 术后低钾血症
86. 男,67岁,20分钟前呕咖啡色液1次,量约300ml,伴上腹不适。否认肝脏病史。一个月来口服阿司匹林。查体:P 84次/分, BP 130/70mmHg,腹软,剑突下轻压痛,肝脾肋下未触及。最重要的处理措施是
A. 口服胃黏膜保护剂
B. 口服阿托品
C. 急诊胃镜下止血
D. 静脉点滴止血剂
E. 口服止血剂
87. 男,40岁,因十二指肠溃疡穿孔8小时急症行胃大部切除,术后6天起出现体温升高,呈弛张热,已持续3天,伴有下腹坠痛、里急后重,排黏液样稀便。最可能的诊断是
A. 肠间隙脓肿
B. 膈下脓肿
C. 盆腔脓肿
D. 急性肠炎
E. 肛周脓肿
88. 初产妇,26岁,妊娠42周,规律宫缩10小时。估计胎儿体重3500g,枕左前位,胎头高浮,胎心率166次/分。骨盆不小,宫口开大2cm,尿雌激素/肌酐比值为7。恰当的分娩方式应是
A. 静脉滴注缩宫素加速产程
B. 等待宫口开全行产钳术助娩
C. 等待宫口开全行胎头吸引术助娩
D. 左侧卧位,吸氧,静注10%葡萄糖液
E. 尽快行剖宫产术
89. 男,35岁,车祸致头部外伤25小时,具体受伤机制不详。受伤当时意识不清5分钟,醒后感觉轻微头痛。伤后20小时头痛加重,伴恶心、呕吐,右侧肢体活动障碍。首先考虑为
A. 左侧脑内血肿
B. 脑挫伤
C. 外伤性蛛网膜下腔出血