




火尾太阳鸟  
• FIRE-TAILED SUNBIRD



褐头凤鹛  
• TAIWAN YUHINA




金背歌鸲  
• FIRETHROAT

# 中国鸟类图鉴 下卷

## FIELD GUIDE TO THE BIRDS OF CHINA

主编:曲志刚

雀形目	> 莺科	幽鹛科
	鹟科	鳞胸鹟科
	鹡鹑科	相思鸟科
	噪鹛科	绣眼鸟科
	和平鸟科	戴菊科
	鹡鹑科	鸚科
	旋壁雀科	棕鸟科
	鹡鹑科	鹡鹑科
	河乌科	叶鹀科
	啄花鸟科	太阳鸟科
	麻雀科	岩鹳科
	鹡鹑科	燕雀科
	铁爪鹀科	



暗红朱雀  
• PINK-RUMPED ROSEFINCH



火尾绿鹛  
• FIRE-TAILED MYZORNIS



蓝冠噪鹛  
• BLUE-CROWNED LAUGHINGTHRUSH



蓝大鸫  
• GRANDALA

海峡出版发行集团 | 鹭溪书局

# 中国 鸟类 图鉴

FIELD GUIDE  
TO THE BIRDS  
OF CHINA

主编:曲利明



海峡出版发行集团  
HAIYUAN PUBLISHING AND DISTRIBUTION GROUP  
海峡书局  
HAIYUAN BOOKS

图书在版编目(CIP)数据

中国鸟类图鉴：全3册 / 曲利明主编. — 福州：海峡书局，2013.1

ISBN 978-7-80691-804-3

I. ①中… II. ①曲… III. ①鸟类—中国—图集  
IV. ①Q959.708-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第299692号

主 编：曲利明

副主编/撰稿：刘阳、闻丞、危骞、雷进宇

责任编辑：廖飞琴、欧阳丽敏、陈婧、李舒洁、薛瑜婷

设 计：黄舒培

封面设计：黄硕燊

## 中国鸟类图鉴（全3册）

---

出版发行：海峡出版发行集团 海峡书局

地 址：福州市东水路76号出版中心12层

网 址：[www.hcsy.net.cn](http://www.hcsy.net.cn)

邮 编：350001

印 刷：深圳市国际彩印有限公司

开 本：889毫米×1194毫米 1/16

印 张：120

图 文：1916码

版 次：2013年1月第1版

印 次：2013年1月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-80691-804-3

---

定 价：2800.00元（全套）



## 棕头幽鹛

Puff-throated Babbler

体长：15-18厘米 居留类型：留鸟

特征描述：体型略小、上体橄榄褐色而腹部色浅的鹛。头顶栗棕色，具宽而显著的棕白色眉纹，颈、喉白色，其余下体皮黄白色，胸和两胁具黑色纵纹。

虹膜褐色；上喙黑色，下喙黄色；脚肉黄色。

生态习性：栖息于海拔1800米以下的低山森林和林缘灌丛与竹林中。

分布：中国见于云南。国外见于喜马拉雅山脉、斯里兰卡、中南半岛、马来半岛。



云南/宋晔



云南瑞丽/廖晓东




棕头幽鹛是云南南部中低海拔区内天然林下层的常见鸟种，常结小群取食于地面/云南瑞丽/廖晓东



## 白腹幽鹛

Spot-throated Babbler

体长：14厘米  
居留类型：留鸟




广西弄岗国家级自然保护区/陈锋

**特征描述：**体型略小的黄褐色幽鹛。雌雄羽色相似，通体黄褐色，脸偏灰色，颈、喉乳白色，具不明显的褐色纵纹，下腹中央白色。

虹膜红褐色；喙角质褐色，下喙肉色；脚粉褐色。

**生态习性：**多单独活动于中高海拔的阔叶林、针叶林的林缘灌丛和竹林中，活泼但怯生，常隐匿于植被中下层，觅食于地面和灌丛。

**分布：**中国见于西藏东南部和云南西南部。国外分布于喜马拉雅山脉中段和东段、印度东北部、缅甸，南至中南半岛。



广西弄岗国家级自然保护区/陈锋



## 台湾斑胸钩嘴鹛

Black-necklaced Scimitar Babbler

体长：23厘米

居留类型：留鸟

**特征描述：**身体较长的红褐色钩嘴鹛。头灰褐色，脸灰色，前额栗色，上体及尾红褐色，颊、喉及胸腹部白色，前胸具黑色点斑形成纵纹，两胁深灰色，臀羽栗色。似斑胸钩嘴鹛，但背部颜色更偏棕红色，两胁深灰色少染棕色。

**虹膜黄色；喙角质褐色；脚角质灰色。**

**生态习性：**见于中低海拔常绿阔叶林及林下灌丛和竹林中，常隐匿于地面，翻捡腐叶下的食物，跳跃前行。

**分布：**中国鸟类特有种，仅分布于台湾岛。



台湾/杨桢淇



台湾/陈世明





台湾/杨楨淇



台湾/吴崇汉



## 华南斑胸钩嘴鹛

Grey-sided Scimitar Babbler


体长：23厘米  
居留类型：留鸟

**特征描述：**身体较长的红褐色钩嘴鹛。头顶及尾棕褐色，前额和脸颊锈红色，眼先白色，上体红褐色，咽喉灰白色，前胸具黑色点斑连成的纵纹，下腹及两胁灰色。似斑胸钩嘴鹛，但下体为灰色，两胁少染棕色。

虹膜淡黄白色；喙粉褐色；脚角质褐色。

**生态习性：**多单独或集小群活动于中低海拔山地森林中，也见于丘陵灌丛、草丛和园林中，隐匿而怯人，常能听到其翻捡落叶的声音。过去作为斑胸钩嘴鹛 *Pomatorhinus erythrocnemis* 甚至是锈脸钩嘴鹛 *Pomatorhinus erythrogenys* 的亚种，现多数观点认为其为独立种。

**分布：**中国鸟类特有种，分布于安徽、湖南、江西、浙江、福建以及广东、广西等省区。



江西九连山/田穗兴



福建永泰/郑建平





江西井冈山/林剑声



## 棕颈钩嘴鹟

Streak-breasted Scimitar Babbler

体长：16-19厘米 居留类型：留鸟

特征描述：体型中等、喙细长而下弯的鹟。具显著的白色眉纹和黑色贯眼纹，后颈栗红色，喉白色，胸具纵纹。虹膜褐色；上喙黑色，下喙黄色；脚铅褐色。

生态习性：栖息于低山和平原地带的阔叶林、次生林、竹林和灌丛中，也出入于村寨附近的茶园、果园、路旁丛林和农田地灌木丛间。


分布：中国分布于西藏、西南、华南、东南、海南岛。国外分布于喜马拉雅山脉、中南半岛北部。



江西鹰潭/曲利明




四川唐家河国家级自然保护区/黄徐



广西/杨华





江西鹰潭/曲利明



## 台湾棕颈钩嘴鹟

Taiwan Scimitar Babbler

体长：16-19厘米 居留类型：留鸟

特征描述：似棕颈钩嘴鹟。头顶深灰褐色，后颈棕红色，形成宽阔的领环，背橄榄褐色，喉、胸白色，胸具粗大的椭圆形斑，两胁和腹栗棕色，腹杂有白色。

虹膜褐色；上喙黑色，下喙黄色；脚铅褐色。

生态习性：同棕颈钩嘴鹟。

分布：中国鸟类特有种，仅分布于台湾岛。



台湾/陈世明





台湾/吴崇汉



棕颈钩嘴鹛和斑胸钩嘴鹛通常均结群活动/台湾/许莉菁



## 棕头钩嘴鹟

Red-billed Scimitar Babbler

体长：23厘米


居留类型：留鸟

**特征描述：**中等体型的棕褐色钩嘴鹟。头顶至上体棕褐色，具粗白色眉纹和黑色眼罩，颈喉至整个下体纯白色或染皮黄色，两胁染褐色。

**虹膜**黑褐色；**喙**亮橘红色，长而下弯；**脚**粉褐色至角质褐色。

**生态习性：**单独或成对栖息于中等海拔的常绿阔叶林和竹林下，觅食于灌丛和植被中下层，活泼而易发现。

**分布：**中国见于西藏东南部以及云南西部和南部。国外分布于印度东北部至中南半岛。



云南/田穗兴



云南/田穗兴



## 红嘴钩嘴鹛

Coral-billed Scimitar Babbler

体长：22厘米  
居留类型：留鸟




西藏山南/李锦昌

**特征描述：**中等体型的棕褐色钩嘴鹛。头顶棕褐色或黑色，具白色眉纹，眉纹上方具黑色边，有黑色脸罩，上体棕褐色至橄榄褐色，颈、喉纯白色，下体深棕色或浅皮黄色。

**虹膜**黑褐色；**喙**橘粉色，长而略下弯；**脚**角质灰色。

**生态习性：**栖息于中低海拔常绿阔叶林和灌丛中，性活泼而怯生，多单独或成对活动，少与其他鹛类混群。

**分布：**中国见于西藏东南部以及云南西部、南部和东南部。国外分布于喜马拉雅山脉东段、印度东北部至中南半岛北部。



红嘴钩嘴鹛也光顾开花的米团花，取食花蜜/云南铜壁关/陈亮



## 剑嘴鹟


Slender-billed Scimitar Babbler

体长：21-22厘米 居留类型：留鸟


特征描述：体型略小色深、喙极细长而下弯的鹟。头青石灰色，具窄长的白色眉纹，喉偏白色，上体棕褐色，下体锈红色。虹膜红褐色；喙黑色；脚暗灰色。

生态习性：栖息于低山丘陵地带的常绿阔叶林、次生林和竹林中，也活动于人工林和针叶林中。


分布：中国见于云南、西藏。国外分布于喜马拉雅山脉、缅甸、越南。



西藏山南/李锦昌



云南保山/董磊



云南保山/董磊



## 长嘴鹟鹛

Long-billed Wren Babbler


体长：13厘米  
居留类型：留鸟

特征描述：体型略小的黄褐色鹟鹛。喙型似钩嘴鹟而易与其他鹟鹛区分。通体褐色而具黄褐色纵纹，头具黑色贯眼纹和下颊纹，额、喉皮黄色，两翼和尾橄榄褐色。


虹膜黑褐色；喙角质黑色，长且略下弯；脚粉褐色至角质褐色。

生态习性：多单独活动于中低海拔近水的常绿阔叶林、竹林及灌丛中，觅食于地面。

分布：中国见于西藏东南部，云南西部和西北部。国外分布于喜马拉雅山脉东段、缅甸北部。



西藏山南/李锦昌



西藏山南/李锦昌