

新药手册 XIN YAO SHOU MU  
97 NOHS

湖南 省 药 学 会 编  
湖南省医药科技开发咨询服务有限公司

# 新药手册

第二辑

纯中药制剂 独家生产  
抗乙肝病毒新药—松之泰胶囊  
治慢性结肠炎新药—小建中冲剂

中国·长沙市泰宝制药有限公司

公司地址：长沙市韶山路137号(410004)  
电话：0731—5583352、9034043

# 新药手册

(第二辑)



湖南省医药科技咨询服务公司编  
1997年11月

## 前　　言

为传递新药信息,我公司曾编辑了新药手册“第一辑”赠送给有关单位,颇受欢迎,但因篇幅有限,许多新药尤其中成药未收载,为此,希望我们能编第二辑。在这种情况下,我们新药手册“第二辑”便这样与读者见面了。

本书共收载新药 109 种,其中西药 73 种,中成药 36 种,按药理作用排列,每个药品收载项目有:

药名:中文、外文名,以商品名为主,辅以通用名

制剂:主要是指剂型、规格。

【作·】包括作用机理、作用特点、药动学数据、适应症

【用·】包括用法、用量、疗程及两个疗程之间隔时间

【副·】指不良反应、毒副作用。

【注·】指注意事项

【相·】指药物相互作用。

表明生产厂家及经销公司的目的是便于有关医院购买。由于价格经常变动,因此所标价格,仅供参考。本书在编写过程中,得到了多家厂家和公司的支持,在此深表感谢。

由于编者水平有限,错误之处,在所难免,望不吝指正。

编者

1997 年 10 月于长沙

## 人册单位和品种

华瑞制药有限公司	脂肪乳	格利福斯
长沙泰宝制药有限公司	松之泰	小建中
海南曼克星制药厂	天可	
意大利罗马福斯卡玛生化制药 公司	泰特注射液	
湖南宏生堂制药有限公司	灵芝胶囊	
东北制药总厂	磷霉素钠	
中国浙江康莱特药业有限公司	康莱特注射液	
山西金晶药业有限公司	岩舒注射液	
安徽淮北金蟾药业总公司	华蟾素注射液	
瑞士雪兰诺药厂	思增注射液	施他宁注射液
海南东威医药有限公司	益母草颗粒剂	
北京韩美药品有限公司	妈咪爱散剂	
江西东风药业股份有限公司	东青胶囊	
成都地奥制药有限公司	黄芪注射液	脂必妥
常州医药工业联合经营公司	释炎达	
山西同振药业公司	安洛欣	佳尔钠
湖南正太药业有限公司	凯尔丁	尿炎清
广西桂西制药厂	妇血康	
海王制药有限公司	金博瑞	博宁 金典
武汉滨湖制药厂	芦氟沙星	盐酸左布诺洛尔
江苏武进制药厂	吡硫霉净霜	
山东烟台绿州制药有限公司	$\beta$ -七叶皂甙钠	
华北制药集团有限责任公司	洛伐他丁	田可

哈尔滨格拉雷药业公司	塞宁
珠海金沙(湖南)制药有限公司	中理脂康 调经活血片 接骨七厘片
沈阳山之内制药公司	哈乐 佩尔地平
哈尔滨一洲制药有限公司	一洲清开灵
深圳卫武光明生物制品厂	狄克施
浙江亚东制药公司	孕康口服液
贵州丽康制药公司	益丝春
骜马药业公司	生血宝、胃祥宁、四磨汤
香港荣伟贸易公司	卡力
杭州中美华东制药有限公司	赛斯平、百令胶囊
西南药业股份有限公司	美菲康
北京诺华制药有限公司	善得定 来适可
深圳南方制药厂	参麦注射液 参附注射液
先灵葆雅公司	艾洛松 力确兴 先力腾 开瑞坦
億丽企业有限公司	美舒宁
四川抗菌素工业研究所	明竹欣
美国礼来公司	稳可信 爱希 协良行
中国中医研究院中汇制药公司	中汇川黄液 中汇糖脉康
湖南药业销售公司	安心酮
法国罗纳普·朗克乐安公司	波丽玛朗
海南碧凯药业公司	保妇康 曼舒林
默克里昂制药公司	格华止 康可 必来循宁
广州嘉禾制药厂	安中片 康尔心
杭州桐君制药厂	洛美沙星

上海克隆生物高技术有限公司	注射用重组干扰素 - $\gamma$
三九集团九天制药厂	曼普特
山东北方制药股份有限公司	银屑冲剂
扬子江药业集团	胃苏冲剂 黄芪精
德国百克顿药厂	压宁定 爱宝疗
瑞士素高大药厂	素高捷疗口腔膏
香港美加康医药保健公司	大佛水 大佛喉露
中美史克制药有限公司	百多邦 瑞得
西安杨森制药有限公司	维思通 复方达克宁霜
云南省生物制药厂	灯盏花注射液
重庆药友制药有限公司	勃乐斯
深圳市万泽医药有限公司	盐酸米诺环素
杭州澳医保灵药业有限公司	生保灵胶囊
杭州默沙东制药有限公司	科素亚
浙江永宁制药厂	胆乐胶囊
湖南省医药公司二分公司	康尼 田参氨基酸 活性维生素 D <sub>3</sub> 降纤酶
	托米伦 肠胃康 脑乐欣
	特素 红宝太圣胶囊
	注射用头孢西丁钠 世福素
杭州民生药业集团公司	西艾克 兰百幸 吉洛特

# 目 录

## 一、抗微生物感染药物

安洛欣(1) 先力腾(2) 注射用头孢西丁钠(4) 世福素(5) 托米伦(6) 力确兴(8) 米诺环素(10) 康尼(12) 稳可信(13) 磷霉素(16) 洛美沙星(18) 芦氟沙星(20) 卡力(21) 明竹欣(22) 佳尔钠(23)

## 二、镇痛及解热镇痛药

美菲康(25) 东青(27) 塞宁(28) 美舒宁(29) 瑞得(31) 清开灵(32) 接骨七厘片(34)

## 三、精神及神经科用药

降纤酶(35) 协良行(36) 维思通(37) 金博瑞(39) 脑乐欣(41) 吉洛特(42) 灯盏花注射液(42)

## 四、心血管系统药物

罗华宁(44) 来适可(46) 佩尔地平(47) 科素亚(50) 必来循宁(52) 压宁定(53) 康可(55) 安心酮(57) 勃乐斯(58) 参麦(60) 参附(63) 黄芪(65) 康尔心(66) 脂必妥(66) 中理脂康(67)

## 五、泌尿系统药物

尿炎清(69) 哈乐(70)

## 六、呼吸系统药物

曼普特(72)

## 七、消化系统药物

兰百幸(74) 爱希(76) 妈咪爱(78) 胃苏冲剂(78)  
胃祥宁(79) 四磨汤(80) 安中片(81) 小建中冲剂(81)  
松之泰(82) 胆乐(83) 肠胃康(84)

## 八、血液系统药物

生血宝(85)

## 九、激素、内分泌及有关药物

善得定(86) 施他宁(87) 思增(89) 格华止(90) 中  
汇糖脉康(92) 金典(93) 天可(94) 活性维生素 D<sub>3</sub>(95)

## 十、妇产科用药物

妇血康(97) 孕康(98) 益母草颗粒剂(98) 调经活血  
片(99) 曼舒林(100) 爱宝疗(101) 保妇康栓(102)

## 十一、免疫系统药物

赛斯平(104) 田可(106) 注射用重组干扰素 - γ(108)  
黄芪精(110) 中汇川黄液(111) 红宝太圣胶囊(111)  
田参氨基酸(112)

## **十二、抗肿瘤及辅助药物**

康莱得(114) 特素(115) 西艾克(117) 岩舒(118)  
华蟾素注射液(119) 博宁(120)

## **十三、抗过敏药物**

开瑞坦(122) 波丽玛朗(123)

## **十四、营养药物**

英脱利匹特(125) 格利福斯(127) 灵芝(128) 百令  
胶囊(129) 生保灵(130)

## **十五、解毒及戒毒药**

泰特(132) 凯尔丁(133)

## **十六、外用药**

百多邦(135) 复方达克宁(136) 艾洛松(137) 素高  
捷疗口腔膏(138) 大佛水(139) 大佛喉露(140) 倍它洛  
尔(142) 狄克施(143) 益丝春(144) 吡硫霉净霜(145)

## **十七、其他**

释炎达(147)  $\beta$ -七叶皂甙钠(149) 银屑冲剂(150)

# 一、抗微生物感染药物

## 安洛欣(氨氯青霉素钠)

Ampiclox, Ampicloxacillin, vicillin-s,  
Rectocillin

**【制剂】** 粉针剂, 1.0g/瓶(氨苄青霉素钠和邻氯青霉素钠各 0.5g)

**【作·】** 本品具有氨苄青霉素和邻氯青霉素两者的优点, 即对革兰氏阳性菌和阴性菌有广谱杀灭作用, 又对耐青霉素的金黄色葡萄球菌有效。该药可抑制细菌细胞粘肽合成, 造成细胞壁破损, 使细菌解体死亡, 两药混合具有明显的特点: 邻氯青霉素与  $\beta$ -内酰胺酶结合, 但不被其破坏, 对酶形成了抑制, 消耗了  $\beta$ -内酰胺酶, 保护了氨苄青霉素, 使其不被破坏。邻氯青霉素作为抗金葡菌感染的一线药物, 使本品能有效控制金葡菌感染。本品在体内分布广, 在胆汁中浓度高于血中数倍, 透过脑膜能力低, 但脑膜发炎时, 脑内可达有效治疗浓度, 有效血药浓度时间长。

适用于:

1. 伤寒、淋病及致病菌尚未查明前即需进行治疗的严重感染症: 如呼吸道感染, 消化道感染, 胆道感染、泌尿道感染。

2. 对能产生青霉素酶的金葡菌引起的严重混合感染病症如: 肺炎、脑膜炎、化脓性关节炎、肠道感染、肝脓肿、尿路感染、中耳炎等。

3. 不明致病菌所致的严重败血症、心内膜炎、骨髓炎、胸膜炎、肺化脓症、支气管扩张、肺结核二次感染等。

4. 预防术后及大面积灼伤后感染等。

5. 预防新生儿感染。

**【用·】** 本品可肌注或静脉滴注，临用前加灭菌注射用水适量溶解。轻度感染每日2g，分1—2次肌注，中度感染每日3—4g，分2—3次静脉滴注，重症感染每日5—8g分2—4次静脉滴注，小儿用量按40mg/公斤/日分次给药。静脉滴注本品可与各种输液配伍，但如与含葡萄糖输液配伍，宜于较快速度下滴注，半小时滴完，以免药效降低。

**【注·】** 使用本品前，应按青霉素同样方法做皮试，用药过敏反应，请按青霉素过敏处理。

**【生产厂家】** 山西同振药业有限公司

**【经销公司】** 湖南省医药公司一分公司

**【参考价格】** (零售价): 31.80元/1g/支

## 先力腾(头孢布烯)

Cedax, ceftibuten

**【制剂】** 胶囊剂, 200mg/粒, 400mg/粒

干混悬剂, 7.5g/30ml

**【作·】** 先力腾(头孢布烯)是一半合成的第三代口服头孢菌素类抗生素，如大多数 $\beta$ -内酰胺类抗生素，本品的杀菌活性来自对细菌细胞壁合成的抑制。由于它特有的化学结构，头孢布烯对 $\beta$ -内酰胺酶具有高度稳定性，许多能产生 $\beta$ -内酰胺酶的微生物能抗青霉素或其他头孢菌素类抗生素，但可被“先力腾”所抑制。

本品适用于上呼吸道感染；下呼吸道感染，包括急性支气

管炎,慢性支气管炎的急性发作,肺炎;单纯及复杂的上下泌尿道感染;淋病;中耳炎;及胃肠道感染和由下述一个或多个病原菌所致的感染:化脓性链球菌,肺炎链球菌,流感嗜血杆菌,副流感嗜血杆菌,卡他莫拉氏菌,大肠杆菌,克雷白氏杆菌类(包括肺炎杆菌和催产杆菌),吲哚阳性变形杆菌(包括普通变形杆菌)以及其他变形杆菌族,沙门氏菌,志贺氏菌。布鲁斯菌,荼瑟氏菌,小肠结肠耶氏菌,摩根氏菌,沙雷氏菌。

【用·】 口服,治疗期 5-10 天。

成人:推荐剂量为一日一次 400mg,对于肺炎患者推荐剂量为每 12 小时 200mg。

儿童:推荐用口服混悬剂的剂量为 9mg/公斤/日(最高一日 400mg)对于肺炎及急性细菌性肠炎每日总剂量可分二次服用,即每 12 小时一次,每次 4.5mg/公斤体重,体重超过 45 公斤或大于 10 岁的儿童可服成人剂量。

【副·】 最常见的不良反应是胃肠道反应,包括恶心,腹泻,头痛,一般都是轻度的,暂时的,发生率是极低的,病人能很好的耐受。

【注·】 对肾功能显著不全患者以及进行透析的患者本品给药量需要调节。用于六个月以下婴儿的安全性和药效尚未肯定,对孕妇或分娩哺乳期病人头孢布烯尚未进行充分的对照研究,本品在乳母乳汁中尚未能检测出来

【相·】 目前尚未见“先力腾”有明显的药物相互作用报道。

【生产厂家】 美国先灵葆雅制药有限公司

【经销公司】 湖南省医药公司进出口部,三分公司

【参考价格】 (零售价):200 元/200mg×6 片/盒

# 注射用头孢西丁钠

Cefoxitin Sodium For Injection

【制剂】 针剂, 1g/支

【作·】 本品属第二代头孢菌素, 具有第二代头孢菌素之共性, 具有以下特点:

1、抗菌谱广, 尤其对厌氧菌作用强。

2、对  $\beta$ -内酰胺酶高度稳定。

临床用于治疗  $G^+$ 、 $G^-$  需氧菌和厌氧菌引起的多种感染, 如: 上下呼吸道感染、泌尿道感染、腹膜炎、败血症、妇科感染、骨、关节软组织感染、心内膜炎等。

【用·】 成人轻型感染: 1—2g/次, 每 6h 或 8h 一次肌注或静脉滴注。

中度至重度感染: 2—3g/次, 每 8h 一次静脉滴注, 严重感染酌情增加。

儿童: 20—40mg/kg, 每 8h 一次。

【副·】 偶见变态反应(如皮疹等)、腹泻、恶心、呕吐、ALP 升高, 白细胞减少、血小板减少、贫血等。停药后自行消失。

【注·】 对青霉素过敏、头孢类抗生素过敏、肾功能损害及有胃肠疾病者慎用。

【生产厂家】 海南海药实业股份有限公司海口市制药厂

【经销公司】 湖南省医药公司二分公司

【参考价格】 (零售价): 82.80 元/1g/支

## 世福素(头孢克肟)

Cefspan, Cefixime, CFIX

【制剂】 胶囊剂, 100mg/粒

【作·】 本品为第三代头孢类口服抗生素, 具有以下特点:

- 1、抗菌谱广, 抗菌活性强。
- 2、对  $\beta$ -内酰胺酶极为稳定。
- 3、半衰期长, 一天两次, 使用方便。
- 4、耐受性好, 安全性高。
- 5、血药浓度不受饮食影响。

正常成人 1 次空腹口服 50、100、200mg(效价)时, 约经 4 小时获最高血药浓度, 分别为 0.69、1.13、1.95ug/ml, 血清中浓度半衰期 3.2—3.7 小时, 主要由肾排泄。

临床用于敏感细菌引起的呼吸道感染, 泌尿道感染, 耳鼻喉感染、胆道感染等。但不宜用于绿脓杆菌感染。

【用·】 口服, 成人和体重 30kg 以上的小儿, 一次口服 50—100mg, 一日 2 次。但可根据年龄、体重、症状适量增减, 对重症或认为效果不充分的病例, 一次可口服 200mg, 一日 2 次。

- 【副·】
- 1、偶有休克和中毒性表皮坏死。
  - 2、过敏症: 皮疹、荨麻疹、红斑、搔痒、发烧、浮肿等。
  - 3、偶有黄疸: S-GOT、S-GPT、ALP 上升, 颗粒球减少, 嗜酸性白细胞增多、血小板减少、BUN 升高等。
  - 3、伪膜性大肠炎、时有呕吐、腹泻、腹痛、胃部烧灼感、恶心、腹部膨满感、便秘。

- 4、呼吸道症状。
- 5、菌群失调、偶有口腔炎、念珠菌症。
- 6、维生素 B、维生素 K 缺乏症及其他。  
【注·】
  - 1、过敏体质、家族过敏史患者，高度肾损害患者慎用。
  - 2、妊娠及新生儿、早产儿的安全性尚未确立，要权衡利弊。
  - 3、对不能很好进食、或非经口摄取营养者、高龄者、恶质等患者，因有出现维生素 K 缺乏症的状况，要进行严密的临床观察。
  - 4、除尿糖试验之试纸法外，再用 Benedict 试药、Fching 试药及 Clinitest 检查尿糖时，可出现假阳性，另外，使用本品可能出现直接血清抗球蛋白试验阳性，应注意。

【生产厂家】 广州白云山制药厂

【经销公司】 湖南省医药公司二分公司

【参考价格】 (零售价): 77 元/0.1g×6 粒/盒

128 元/0.1g×10 粒/盒

## 托米伦(头孢特仑新戊酯片)

Tomiron, Cefteram Pivoxil Tablets.

【制剂】 片剂，50mg/片

【作·】 本品为第三代头孢类抗生素，具有以下特点：

- 1、抗菌谱广。
- 2、对  $\beta$ -内酰胺酶稳定。
- 3、对 G<sup>+</sup> 菌敏感。

健康成人饭后口服 300mg, 3 小时达峰浓度(2.9ug/ml),  $t_{1/2}$  为 0.9 小时, 分布广泛, 大部分从尿排泄, 部分以活性形式经胆汁排泄。

临床用于呼吸系统、泌尿系统、妇产科、耳鼻喉科感染及并发感染、交叉感染等。

【用·】 口服。

咽喉炎、扁桃体炎、急性支气管炎、肾盂肾炎、膀胱炎、子宫附件炎、子宫内膜炎、子宫内感染、巴多林氏腺炎、巴多林氏腺肿时: 成人 150—300mg/日, 分 3 次饭后服用。

慢性支气管炎、弥漫性细支气管炎、支气管扩张(感染时)、慢性呼吸道疾患并发感染、肺炎、中耳炎、副鼻窦炎、淋菌性尿道炎、齿周组织炎、齿冠周围炎、颞炎时: 成人 300—600mg/日, 分 3 次饭后服用。用药剂量可根据年龄及症状适当增减、或遵医嘱。

【副·】 1、消化道症状: 呕吐、胃腹部不适、稀便等。

2、偶有肾毒性发生。

3、头痛、眩晕。

4、过敏症状: 荨麻疹。

5、有时可见 S-GOT、S-GPT、碱性磷酸酶、LDH 等值上升。

【注·】 1、严重肾功能障碍、过敏体质、孕妇慎用。

2、对本药或头孢类抗生素过敏者慎用。

3、高龄患者一般生理机能低下, 应减量使用。

【生产厂家】 海南海药实业股份有限公司海口市制药厂

【经销公司】 湖南省医药公司二分公司

【参考价格】 (零售价): 89.80 元/50mg × 10 片/盒

# 力确兴(奈替米星,乙基西梭霉素)

Netromycin, Netilmicin sulfate

【制剂】 注射剂 100mg/支

【作·】 本品属于氨基糖甙类,是一种快速的杀菌性抗生素,主要抑制敏感细菌的正常蛋白质合成。低浓度的力确兴即对多种病原菌有抗菌作用,主要对大肠肝菌、克雷白杆菌、肠杆菌、沙雷菌属、变形杆菌属、包括奇异变形杆菌,摩根氏变形杆菌,雷特格氏变形杆菌,普通变形杆菌和绿脓杆菌等,亦对产青霉素酶和不产青霉素酶的葡萄球菌包括甲氧西林耐药葡萄球菌均有效。并对其它氨基糖甙类抗生素耐药的许多菌株仍然敏感。本品对第八对颅神经的损害比其它氨基糖甙类抗生素要轻,但血药浓度不能超过 16mcg/ml。血清谷底药物浓度应在 3mcg/ml 或更低。适用于菌血症,败血症(包括新生儿败血症),严重的呼吸感染,肾脏和泌尿生殖系感染,烧伤、创伤和手术前后的感染,皮肤及软组织感染,胃肠道感染,骨及关节感染,膜腔内感染(包括腹膜炎)。

【用·】 对于肾功能正常的患者

成人:4.0 - 6.0mg/kg/日,分三次每 8 小时 1 次,或分两次每 12 小时 1 次,对于危及生命的感染,剂量可增至 7.5mg/kg/日,且应分三次,每 8 小时一次,一旦临床出观指征,剂量通常在 48 小时之内应立即减至 6.0mg/kg/日或更低。

儿童:6.0 - 7.5mg/kg/日(2.0 - 2.5mg/kg/日,每 8 小时一次),婴儿和超过一周的新生儿:7.5 - 9.0mg/kg/日(2.5 - 3.0mg/kg,每 8 小时一次。)早产儿或足月刚满一周或不到