

本草備要

二附三

增訂本草備要目錄

二卷

牡丹皮

續斷

骨碎補

益母草

澤蘭蘭草

白薇

艾野艾

延胡索

紅花

胭脂

薷

紫葳

葳

凌霄花

木薊

三七又二

地榆

蠶黃

翁梔

蘭茹

菴蓎子

欒金

薑黃片子

莪朮

荆三稜

白茅根

金

蘼根

芎根

皮

薑黃根

實

角蒿

芭蕉根

大黃

萸

黃連

胡黃連

苦參

知母

龍胆草

熏草

大青

牽

防己

漢已

蔓藤

甘遂

大戟

商陸

葶花

葶花

澤漆

常山

蜀漆

藜蘆

木通

通草

澤瀉

車前子

車前

瞿麥

扁蓄

天仙籐 地厚葉 石韋凡草 海金沙 茵陳 香薷香 青蒿

附子鳥頭 天雄 烏附尖 側子 草烏頭射 白附子 破故紙 肉蓯蓉 玃陽

巴戟天 胡盧 仙茅 淫羊藿 蛇床子 兔絲子 覆盆子

藜蘆沙苑 藜蘆 刺藜 藜 使君子 菡萏子 砂仁 白豆蔻 肉豆蔻

草薢草薢 刺藜 藜 附子 木香 藿香 茴香大小 八角 甘松香 山柰

良薑紅荳 藜 藜蘆 煙草 金銀花膏 蒲公英 紫花地丁 杜牛膝

鶴虱 山慈根 牛蒡子根 山慈菰 漏蘆 貫眾 射干

續隨子 馬薊根 葉 麻子 白頭翁 玉辰子 玉不留行 冬葵子春

子蜀 白鮮皮 葶藶拔薤 土茯苓赤白 白欬赤欬 胡桐子 旱蓮草膏

寄奴草 馬鞭草 穀精草 青箱子 消子 藜蘆 木鱉子

增訂本草備要卷之二

休寧汪昂初著輯

男汪端其兩

弟汪桓殿武恭訂

姪惟寵子錫

同鄭會慶寶爵訂

姪增仇雲天一同較

草部

牡丹皮
瀉火
而補血



辛甘微寒入手足少陰腎厥陰肝包瀉血中伏火丹

故入血分時珍曰伏火即陰火也陰火即相火也世
人專以黃柏治相火不知丹皮之功更勝故仲景醫
氣丸和血涼血而生血血熱則枯破積血則新血不
用之

生通經脈為吐衄必用之藥血屬陰本靜因相火
所逼故越出上竅治中風五勞驚癇瘧

癰身軟時發時止為癰蒼陰虛血熱風火相搏痰隨火湧所致除煩

本草備要卷之二 牡丹皮 續斷 骨碎補 卷之二

續斷
補肝腎
理筋骨

執癰瘡下胞胎退無汗之骨蒸張元素曰丹皮治無汗之骨蒸地
少陰志不足者足少陰故仲景腎氣丸用丹皮治神志不足者手
也按內經云水之精為志故腎臟志火之精為神故心臟神
紅者八藥肉厚者佳酒拌蒸用其貝母免絲大黃忌蒜胡荽此時珍
白者補赤者利人
所空利宜分別之



苦溫補腎辛溫補肝能宣通血脉而理筋骨主傷中

補不足經疏云味甘故然煖子宮縮小便破瘀血治腰痛胎

漏懷妊胎帶遺精腸風血痢星齋方平胃散一兩川

時痢亦驗癰瘡腫毒又主金瘡折跌以功止痛生肌外科需為上

劑川產良狀如雞脚皮黃皺節節斷者真去向裏硬筋酒浸用地黃

為使

骨碎補

補腎治

折傷

經曰腎

者胃之

開也前

陰利水

後陰利

穀

益母草

一名茺

蔚

通行瘀

血生新

血



苦溫補腎故治耳鳴耳鳴必由腎虛及腎虛久瀉腎煨熟室

心食之腎主二便久瀉多屬腎虛不可專責脾胃也腎主骨故治折傷以功命


傳傷牙痛炒黑為末擦又入厥陰心包能破血止血

處入血行傷故治折傷牙燕下亦良

傷粥和味裏傷處根似薑而扁長去毛用或密拌

入血行傷故治折傷

熬



辛微苦寒入手足厥陰肝心包消水行血去瘀生新調

經解毒瘀血去治血風血運血痛血淋胎產難崩

中帶下帶脉橫於腰間病生於此故名為帶亦屬血

血屬氣氣虛者補中益氣而兼升降血虛者

養血滋陰為經產良藥消疔腫乳癰亦取其散通大小便然辛散之藥

而兼調氣為經產良藥消疔腫乳癰亦取其散通大小便然辛散之藥

瞳子散大者忌服益母子主治畧同調經益精明目血帶病目者則宜之活血

瞳子散大者忌服

益母子主治畧同調經益精明目血帶病目者則宜之活血

順氣逐風氣行則血行行中有補治心煩頭痛血氣血熱之候胎產帶崩令人


有子有補陰之功時珍曰益母根莖花葉實皆可同用若治瘡腫胎產

消水行血則宜並用若治血分風熱明目調經用子為良益母根莖花葉專子行乎則行中有補也產寶濟陰返魂丹小暑端午或六月六日採益母莖葉花實為末密丸治胎產百病近効方搗汁熬膏亦良

忌鐵子微炒用

澤蘭

通行血消水



苦泄熱甘和血辛散鬱香舒脾入足太陰厥陰肝脾通

九竅利關節養血氣長肌肉破宿血調月經消癥瘕

散水腫防已為使治產後血滯腰痛瘀行未盡吐血鼻洪目痛

頭風癰毒撲損補而不滯行而不峻為女科要藥方古

滯蘭九其多時珍曰蘭草澤蘭二類俱生下濕繁莖素枝赤節綠葉

葉對節者細齒但以莖圓節長葉光有岐者為蘭草莖微方節短葉

有毛者為澤蘭嫩時可採音那而佩之楚詞所謂紉秋蘭以為佩是也

朱文公離騷辨證云必花葉俱香燥濕不緣方可刈佩今之蘭惠花雖香而葉無氣質弱易萎不可刈佩矣人呼為香草俗

名孩兒菊夏曰采置髮中則髮不脯浸油塗髮去垢香澤故名澤蘭蘭草走氣分故能利水道除痰

癖殺蠱辟惡而為消渴良藥經曰數食肥甘傳為消渴治之以蘭除陳氣也澤蘭走血分故能

消水腫塗癰毒破瘀除癥而為婦人要藥以為今之山蘭者誤矣防已

為使寇宗奭朱丹溪並以蘭草為山蘭之葉李時珍考眾說以譏之按別本云蘭葉甘寒清肺開胃消痰利水解鬱調經閩產者力勝李

土材云蘭藥稟金水之氣故人肺臟東垣方中嘗用之內經所謂治之以蘭除陳氣者是也余屢驗之李時珍又謂東垣所用乃蘭草也其集

諸家之言曰陳遜齋閑覽云楚騷之蘭或以為都梁香或以為澤蘭或以為猗蘭當以澤蘭為正今之所種如麥門冬者名幽蘭非真蘭也故

陳正齋著盜蘭說以譏之方虛谷謂蘭說言古之蘭草即今之千金草俗名孩兒菊者今之所謂蘭其葉如茅者根名土續斷因花馥郁故得

蘭名楊升菴云世以如蒲骨者為蘭九畹之受誣也久矣又吳草廬有蘭說云蘭為醫經上品有根有莖草之植者也今所謂蘭無枝無莖因

閩產為勝則是建蘭矣

既名幽蘭正合騷經矣

升菴九種多有

朱確啟
陳文燭
作正揚
以辨之

黃山谷稱之世遂謬指爲離騷之蘭寇氏本草溺于流俗反疑舊說爲
非夫醫經爲實用豈可証哉今之蘭果可以利水殺蠱而除痰癰平其
種盛于閩朱子閩人豈不識其土產而辨析若此世俗至今猶以非蘭
爲蘭何以惑之甚也昂按朱子辨蘭援離騷紉佩以爲證竊謂紉佩亦
騷人風致之詞耳如所云飲木蘭之墜露餐秋菊之落英豈眞露可飲
而英可餐乎又云製茱萸以爲衣集芙蓉以爲裳豈眞芙蓉可衣芙蓉
可裳乎宋儒釋經執泥恐未可爲定論也第騷經旣言秋蘭則非春蘭
明矣本經旣言澤蘭則非山蘭明矣是離騷之秋蘭當屬本經之澤蘭
無疑也然離騷不常曰春蘭今秋菊乎不又曰結幽蘭而延佇乎不又
曰疏石蘭以爲芳乎若秋蘭旣屬之澤蘭將所謂春蘭幽蘭石蘭者又
不得爲山蘭當是何等之蘭乎且山蘭爲花中最上之品古今評者列
之梅菊之前今反屈于孩兒菊之下以爲盜襲其名世間至賤之草皆
收入本草獨山蘭清芬佳品攢蕪不錄何其不幸若所之甚也本草殺
蠱之藥良多皆未必有驗至于行水消痰固山蘭之葉力所優爲者也
蓋李時珍陳方吳楊輩皆沉定陳藏器以澤蘭蘭草爲一類二種遂併
騷經而疑之崇澤蘭而黜山蘭遂令蘭草無復有用之者不思若以爲
一類則本經蘭草一條已屬重出何以本經蘭草反列之上品而澤蘭
止爲中品乎况一入氣分一入血分迥然不同也又騷經言蘭者凡五
除木蘭人所共識其餘春蘭秋蘭幽蘭石蘭若皆以爲孩兒菊是不特
二類一種且四種一類矣而以爲九種之受証豈理也哉蓋本經重澤

淫蘭町
哇賤品
幽字何
可當也

白微
瀉血熱

蘭所以別乎山也言蘭草明用葉而不用其花也騷經言秋蘭所以別
平春也言石蘭所以別乎澤也愚謂秋蘭當屬澤蘭而春蘭石蘭定是
山蘭其曰幽蘭則山蘭之別名以其生于深山窮谷故也
寇氏朱氏之論又安可全非也姑附愚說以諮多識之士



苦鹹而寒陽明衝任之藥利陰氣下水氣主中風身

熱之滿忽忽不知人陰虛火旺則內熱生風火氣焚

知血厥汗出過多血少陽氣獨上氣塞不行而厥婦

五錢甘草錢熱淋溫瘡惕惕寒熱酸痛寒熱作則營氣不婦人傷中淋

露血熱千金白微散治胎前產後遺尿不知時白微芍藥等分酒調服

露丹溪曰此即河間所謂熱甚延孔鬱結神無所依不能收禁之意也


延孔女人產虛煩嘔仲景安中益氣竹皮丸用之經疏云古方調經種

弱水也子往往用之益不羣緣于血熱血少而其源起于似牛膝而短

真陰不足陽勝而內熱故營血自枯也益陰清熱則血
自生旺而有子矣須佐以歸地芍藥杜仲從蓉等藥
小泉軟去鬚酒洗用惡大黃大戟山茱萸

艾葉

宜理氣
血燥逐
寒濕



苦辛生溫熟熱純陽之性能回垂絕之元陽通十二

經走三陰太少厥理氣血逐寒濕煖子宮止諸血溫中

開鬱調經安胎胎動腰痛下血膠艾湯良治吐血崩

帶治帶要藥腹痛冷痢霍亂轉筋皆理氣血逐寒濕之效

醋煎外科有用乾艾作湯投白蟻二三錢洗瘡然後敷藥以之灸音火

能透諸經而治百病血熱為病者禁用灸火則氣下行入藥則熱上衝

者以熟艾裝袋肥臍腹甚妙寒濕脚氣亦宜以此夾八襪內陳者良揉搗如綿謂之熟艾灸火用

婦人丸散醋煮搗餅再為末用入茯苓數片同研則易細煎服宜鮮苦酒也香附

為使艾附九調婦人諸病朱時重湯陰艾自明成化來以蘄州艾為勝云灸酒壘一灸使透蒙竿發明並以野艾為真蘄艾雖香實非

艾

澤蘭町
哇賤品
幽字何
可當也
白微
瀉血熱

蘭所以別乎山也言蘭草明用葉而不用其花也騷經言秋蘭所以別
乎春也言石蘭所以別乎澤也愚謂秋蘭當屬澤蘭而春蘭石蘭定是
山蘭其曰幽蘭則山蘭之別名以其生于深山窮谷故也
寇氏朱氏之論又安可全非也姑附愚說以謬多識之士



苦鹹而寒陽明衝任之藥利陰氣下水氣主中風身

熱妄滿忽忽不知人陰虛火旺則內熱生風火氣焚

知血厥人尤多此症宜白微湯曰微當歸各一兩參

五錢甘草錢熱淋温瘡惕寒熱酸痛婦人傷中淋

露血熱于金白微散治胎前產後遺尿不知時白微芍藥等分酒調服

廷孔女人產虛煩仲景安中益氣竹皮丸用之經疏云古方調經種

弱水也子往往用之益不孕緣于血熱血少而其源起于

真陰不足陽勝而內熱故營血自枯也益陰清熱則血
自生旺而有子矣須佐以歸地芍藥杜仲從蓉等藥
小兒軟去鬚酒洗用惡大黃大戟山茱萸

艾葉

宜理氣
血燥逐
寒濕



苦辛生溫熟熱純陽之性能回垂絕之元陽通十二

經走三陰太少厥理氣血逐寒濕煖子宮止諸血溫中

開鬱調經安胎胎動腰痛下血膠艾湯良治吐衄崩

帶治帶腹痛冷痢霍亂轉筋皆理氣血逐寒濕之效殺蛇治癰

醋煎外科有用乾艾作湯投白蟬二三錢洗瘡然後敷藥以之灸火音九

能透諸經而治百病血熱為病者禁用灸火則氣下行八藥則熱上衝不可過劑○丹田氣弱臍腹冷

者以熟艾裝袋肥臍腹甚妙寒濕脚氣亦宜以此夾八襪內陳者良揉搗如綿謂之熟艾灸火用


婦人丸散醋煮搗餅再為末用入茯苓數片同研則易細煎服宜鮮者苦酒也香附

為使艾附九調婦人諸病朱時重湯陰艾自明成化來則以蘄州艾為勝云炙酒燻一灸使透蒙竿發明並以野艾為真蘄艾雖香實非

艾
煙

延胡索

宜活血
利氣



辛苦而溫入手足大陰脾肺厥陰心包經能行血中氣

滯氣中血滯通小便除風痺治氣凝血結上下內外

諸痛遇則不痛癥瘕崩淋月候不調氣血不和因而凝滯不以時至產後

血暈暴血上衝折傷積血疝氣危急為治血利氣第一藥然辛溫走而

不守獨用力迅宜兼補氣血藥通經墜胎血熱氣虛者莖角根如生夏肉黃小而

堅者良酒炒行血醋炒止血生用破血炒用調血

紅花

紅藍花
通行血
潤燥



辛苦甘溫入肺經而破瘀血活血瘀行則血活有熱結於中慕吐紫黑

血者吐出為好吐未盡加桃仁紅花行之大抵解血宜止瘀血宜行潤燥消腫止痛凡

熱血瘀則作腫作痛治經閉便難血運口噤胎死腹中非活血行血不

能言治痘瘡瘡血熱本草不喉痺不通又能入心經生新血須兼補益俗用

染紅併作胭脂胭脂活血解毒痘疔挑破以油胭脂傳之良少用養血多則行血過用能使

血行不止而瘳血生于心色藏于肝属于衝任紅花汗與相類故治血病有產婦血悶而死名監陸氏以紅花數十斤煮湯浸

婦于上而薰之湯冷再加半日而蘇金匱有紅籃花迺云治婦人六十二種風

蕁 通行血



色赤入營氣溫行滯味酸走肝而鹹走血本經八厥

陰血分心包能行血止血能行故能止消瘀通經又能止吐衄尿血消痰

通經酒煎一兩治風痺黃疸疸有五黃疸穀疸酒疸黃汗疸女勞疸此蓋蓄

血發黃不專于濕熱者也女勞疸必屬腎症亦不可以濕熱例治當用四物知相壯其水參木培其氣隨症而加利黑清熱藥崩運撲

損痔瘻瘡癰血少者忌用 根可染絳忌鐵

紫草

瀉血熱 滑腸



甘鹹氣寒入厥陰血分心包涼血活血利九竅通二

便鹹寒治心腹邪氣即熱水腫五疳癰惡瘡益熱

及痘瘡血熱毒盛二便閉澀者

血熱則毒閉得紫草涼之則血行而毒出大便利者忌之

寒小兒脾實者可用脾虛者反能作瀉古方惟用葶取其初瀉者忌用得陽氣以類觸類用發痘瘡今人不達此理一槩用之誤矣

去頭鬚酒洗

凌霄花

一名紫葳

瀉血熱

瀉血熱



甘酸而寒入厥陰血分

心包肝

能去血中伏火破血去

瘀主產乳餘疾崩帶癥瘕腸胃不大

血閉淋悶風痒

血熱生風之症女科多用孕婦忌之

本經云養胎經疏云破血之藥非所宜也肺癰有用之為君藥者

凌霄花為末和密陀僧唾調敷酒難甚驗

簪生花開五辨黃赤有熱不可近鼻聞傷腦

大小薊

瀉涼血



甘溫

大明曰涼

皆能破血下氣行而帶補治吐血衄腸癰女

子赤白沃安胎

涼血之功

小薊力微能破瘀生新保精養

血退熱補虛不能如大薊之消癰毒

丹溪曰小薊治下焦結熱血淋

本草綱目

茜草

紫草

凌霄花

夫小薊

卷二六

本事方一人冷氣入陰囊腫滿疼痛煎大薊汗服立瘥

兩薊相似花如髻大薊至高而葉皺小

薊莖低而葉不皺皆用根

三七亦名

山漆 瀉散瘀 定痛



甘苦微溫散血定痛治吐血衄血血痢血崩目赤癰

腫醋磨金即散已破者為未滲之為金瘡杖瘡要藥杖時先服一二此藥近時始出軍

中特之從廣西山洞來者零似白芨地黃有節味微甘頗似人參以末

摻猪血中血化為水者真近出一種葉似菊艾而勁厚有岐尖莖有赤瘰癧稜夏秋開黃花蓋如金絲盤紐可愛而氣不

香根大如牛蒡味甘苦易繁衍云是三七治金瘡折傷血病甚効與南中來者不同

地榆

清止血



苦酸微寒性沉而瀉本草未嘗言瀉然能收八下焦

除血熱治吐血崩中血虛腸風而見也血瘀者為藏