

御纂醫宗金鑑

外科

卷十一至卷十六

三里發生膝眼下三寸初生如生眼其色青黑左右皆同

脛部

三里發



三里發圖

痛其色青黑潰出紫血次出稀膿內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

腓腓發生腿肚正中左右皆同

腓腓發



腓腓發圖

腓腓發在小腿肚憎寒煩躁積熱成癰腫痛潰膿血吉漫腫平塌清水凶註此證發于腓腓即小腿肚也由腎水不足膀胱積熱凝結而成古方云不治若嫩赤高腫疼痛潰出正膿而兼血者吉為順或漫腫平塌紫暗瘡痛

潰出清水者凶為逆初服仙方活命飲潰服八珍湯氣血虛者服十全大補湯下虛者桂附地黄丸補之外治法

同癰疽潰瘍門

仙方活命飲見腫瘍門

八珍湯

十全大補湯

俱見潰瘍門

桂附地黄丸

見面部類瘍

黃 鰕 癰 圖

黃鰕癰生腿肚裡側長數寸紅腫形如泥鰕左右皆同



黃鰕癰 黃鰕癰生腿肚旁疼痛硬腫若鰕長肝脾濕熱微紅色順出稠膿逆聚聚註此證生在小腿肚裏側疼痛硬腫長有數寸形如泥鰕其色微紅由肝脾二經濕熱凝結而成應期潰破出稠膿者為順若出污水敗漿者屬逆初服五香流氣

散其次內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

五香流氣散 金銀花二

小茴香

僵蠶炒

羌活

獨活

連翹心

括葉仁各一兩五錢

藿香錢

丁香錢

木香

沉香

甘草各一錢

分為十劑水煎隨病上下服

方五香流氣治黃鰕流注結核也能療丁木茴沉燿霍草銀花羌獨翹括葉

青 蛇 毒 圖

青蛇毒生腿肚之下長二三寸結腫紫塊頭尖尾細左右皆同



青蛇毒

青蛇毒生腿肚下形長三寸紫塊燿腎與膀胱濕熱結急鉞蛇頭血出良註此證又名青蛇便生于小腿肚之下形長二三寸結腫紫塊燿硬憎寒壯熱大痛不食由腎經素虛膀胱濕熱下注而成蛇頭向下者毒輕而淺急刺蛇頭一半寸出紫黑血隨針孔搽拔疔散外敷離宮錠內服仙方活命飲加黃蘗牛膝水亦亦有蛇頭向上者毒深而惡急刺蛇頭一二寸出紫黑血鉞孔用白降丹細條插入五六分外貼巴膏餘腫敷太乙紫金錠內服參茸再保安毒減

退次服仙方活命散調和之若毒入腹嘔吐腹脹神昏脉躁俱為逆證
 拔疔散見齒部
 離宮錠
 仙方活命飲
 麥靈丹俱見腫瘍門
 白降丹
 巴膏
 太乙紫金錠俱見

接骨發圖



接骨發生腰骨之下足後跟相接處如胡桃腫物打槓槓於脊高

湯潰瘍門

遲則膿毒傷筋筋脉既傷腿缺踵行踵行者不能全足踐地惟恃足指着力而行也始終內外治法俱按癰疽腫

附陰疽圖



附陰疽生肉踝之上三寸紅腫如雞卵左右皆同

附陰疽

附陰疽發內踝上初起如紅粟日增疼堅硬赤腫漸如卵三陰交會濕熱凝註此證生于內踝骨之上三寸初如紅粟疼痛日增堅硬赤腫漸如雞卵係三陰交會濕熱積聚而成始終內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門但三陰交係純陰

之穴收斂遲緩調養不可不慎

內踝疽 外踝疽 跖疽 圖



外踝疽

二疽堅硬
漫腫不紅

內跖疽

內跖疽 外跖疽

內外跖疽濕寒成血滯氣滯阻于三經陽外側三陰裏初用宣通蒜灸靈註此二證生兩足跖

近腕之處在內跖者名走緩又名鞋帶疽在外跖者名脚湯毒蓋內跖骨屬三陰經脉絡也外跖骨屬三陽經脉絡也俱由濕寒下注血滯氣

阻而成其堅硬漫腫皮色不變時時隱痛難于行立者初服瘡科流氣飲加牛膝木瓜防己以宣通之外用蒜片灸法以消之發三陰經者服內託黃芪湯發三陽經者服內託羌活湯若虛弱欲作膿跳痛無時者俱服十全大

補湯外敷烏龍膏其腫潰治法俱按癰疽腫瘍瘡門

瘡科流氣飲見背部瘡注發

內託黃芪湯見服部附骨疽

內託羌活湯見醫部上馬癰

十全大補湯見瘡門

烏龍膏觀

門

穿跖疽 圖



穿跖疽係裏外跖骨通腫不紅

穿跖疽

穿跖疽由脾濕寒裏發串外跖骨間有頭屬陽陰關腫潰出清水發疾纏註此證由脾經濕寒

下注血滯氣阻而成先從裏跖骨發起串及外跖致令裏外通腫以有頭為陽易破若惟悶腫無頭為陰難潰其證初起寒熱往來有紅暈兼

有熱也宜服荊防敗毒散皮色不變者服萬靈丹其餘腫潰治法俱同內外二跖疽若潰出清水或投方不應纏

綿日久者必成廢疾難治

荆防敗毒散

見頭部

萬靈丹

見腫

濕毒流注圖



瓜藤纏條遠腫而生

濕毒流注生腫骨二個者是也
一證初如牛眼次則漫腫色紫者輕黑者重左右皆同

肌肉為病也初覺急服防風通聖散加木瓜牛膝防已蒼朮消之若腿脛至晚發熱者宜服當歸拈痛湯加牛膝
外治初搽三妙散腫痛全消換搽輕粉散斂之即效若繞脛而發即名瓜藤纏結核數枚日久腫痛腐爛不已亦
屬濕熱下注而成治法同前

輕粉散

輕粉一錢五分

黃丹

黃蘗

密陀僧

高末茶

乳香

各三錢

麝香

五錢

用葱熱湯洗患處再搽此藥

防風通聖散

見頭部

當歸拈痛湯

見腹中

三妙散

見腹中

濕毒流疽

附瓜藤纏

濕毒流疽腿脛生頂如牛眼漫腫形紫輕黑重膿水潰寒濕暑熱在腰凝註此證生于腿脛流行不定或發一二處瘡頂形似牛眼根脚漫腫輕則色紫重則色黑潰破膿水浸漬好肉破爛日久不斂由暴風疾雨寒濕暑火侵在腠理而

腎氣遊風圖

腎氣遊風生於腿脛腫堂如雲片



腎氣遊風

腎氣遊風腿肚生紅腫如雲火烘疼證由腎火蘊于內膀胱氣滯外受風註此證多生于腎虛之人腿肚紅腫形如雲片遊走不定痛如火烘由腎火內蘊外受風邪膀胱氣滯而成也初服紫蘊流氣飲次服檳榔丸外用豆腐調研黃蘊

末貼敷之甚效

紫蘇流氣飲

紫蘇

黃蘊

木瓜

檳榔

香附

陳皮

川芎

厚朴

白芷

蒼朮

烏藥

荊芥

防風

甘草

濁活

枳殼

等分

薑三片

棗一枚

水煎服

方歌紫蘇流氣蘊底柳香附陳芎厚芷蒼烏藥荊防甘獨枳腎氣遊風服最昌

檳榔丸

檳榔

枳殼

各二兩

木瓜

五錢

木香

一兩

大黃

四兩

共研細末

煉蜜為丸

大每服三十九空心白滾湯送下黃酒送下亦可

方歌檳榔枳殼木瓜痛木香大黃煉蜜丸腎氣遊風紅腫痛空心水送自然痊

圖 瘡 腫

腫瘡生兩腿脛之裏外廉膏



腫瘡

腫瘡當分內外廉外廉易治內難痊外屬三陽濕熱結內屬三陰虛熱纏法宜搜風除濕熱外貼三香夾紙錢註此證生在兩脛內外廉骨外廉屬足三陽經濕熱結聚早治易于見效內廉屬三陰有濕兼血分虛熱而成更兼廉骨皮肉

澆薄難得見效極其綿纏初發先癢後痛紅腫成片破津紫水新起宜貼三香膏色紫貼夾紙膏日久瘡色紫黑貼解毒紫金膏又年久頑腫瘡皮烏黑下陷臭穢不堪者用蜈蚣錢法去風毒化瘀腐益貼黃蠟膏漸效初服黃耆九日久者服四生丸下元虛冷者宜虎潛丸常服甚效但腿脛在至陰之下生瘡者當戒勞動發物其證可愈否則難痊

三香膏 輕粉 乳香 松香各等分

以葱湯洗淨患處將藥紙有鍼孔一面對瘡貼之三日一換

方三香輕粉乳松香研末油調紙內藏葱湯洗患方貼藥初起腫瘡用此良

夾紙膏 黃丹炒 輕粉 兒茶 沒藥 雄黃 血竭 五倍子炒 銀硃 枯礬各等

共為末量瘡大小剪油紙二張夾藥于內紙周圍用麪糊粘住紙上用鍼刺孔先將瘡口用葱椒煎湯洗淨拭

乾然後貼上以帛縛之三日一洗再換新藥貼之

方夾紙膏貼腫瘡破黃丹輕粉兒茶沒雄黃竭倍銀硃礬油紙夾貼腐可脫

解毒紫金膏 明淨松香 皂礬各一助 共研極細末香油調稠先用葱艾甘草煎湯洗淨患處再搽此

藥油紙蓋住以輒布紮緊三日一換此藥又治楊梅結毒腐爛作臭膿水淋漓用之甚效

方解毒紫金藤瘡爛明淨松香皂礬殿二味研末香油調葱艾草湯先洗患

蜈蚣錢 蜈蚣

甘草

獨活

白芷各一

桐油二兩將藥煎滾先以米泔水洗淨腫瘡水和白麩

作團圍住瘡之四面勿令洩氣將腿放平以茶匙挑油漸漸乘熱加滿待油溫取下已後風毒自散腐肉漸脫其功甚速

方蜈蚣錢治久腫瘡皮黑下陷臭難當桐油煎草獨活並白麩團瘡油燙強

黃蠟膏

血竭

赤石脂

龍骨各三錢

共為細末香油一兩入血餘栗子大一團煤枯去滓再入黃

蠟一兩白膠香三錢溶化盡離火下血竭等末攪勻候冷磁罐盛之用時攪作薄片貼瘡上絹帛縛定三日後翻過貼之

方黃蠟血餘竭白膠石脂龍骨入油調蜈蚣錢後此膏蓋肌肉能生痛自消

黃耆九

黃耆

川烏頭

赤小豆

蒺藜

地龍

川棟子

茴香

防風

烏藥

右為細末酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服十五丸空心溫酒送下鹽湯亦可婦

人用醋煎滾候溫送下

方黃耆九治腫瘡起川烏赤豆共蒺藜地龍川棟茴香炒防風烏藥酒糊宜

四生九

地龍

白附子

僵蠶

草烏

五靈脂

右為細末米糊為丸如梧桐

子大每服三四十九食前茶酒任下

方四生腫瘡久纏綿骨節多疼舉動難地龍白附僵蠶炒草烏靈脂米糊九

虎潛丸

敗龜板

知母

黃蘗

熟地

牛膝

白芍

陳皮

瑣陽酒

當歸各一兩五錢酒洗

虎脛骨一兩酥炙

共研末羯羊肉酒煮爛搗膏和入藥末內為丸如梧桐子

大每服三錢空心淡鹽湯送下冬月加乾薑二兩

方虎潛丸療筋骨痠下元虛冷精血虧髓版瑣陽膝虎脛知藥均陳熟地歸

鰾漏生於腿肚如濕瘡破爛中有孔數處深如鑕眼兩腿間

鰾漏

鰾漏圖



鰾漏生在腿肚間孔如鑕眼津水綿破類濕瘡濕熱發艾湯薰洗覺瘡痊此證由濕熱而成初起頗類濕瘡生于腿肚癢痛相兼破津黃水綿綿不已其孔深如鑕眼復受寒氣侵入瘡孔以致口寒肌冷法宜艾葉老葱煎湯每日先熏

後洗瘡口發熱覺癢時即貼黃蠟膏收斂而愈

黃蠟膏見瘡瘡

四彎風圖



四彎風生兩腿凹及兩腳彎破如濕瘡

四彎風

四彎風生腿脚彎每月一發最纏綿形如風癬風邪襲擾破成瘡癢難堪此證生在兩腿彎每月一發形如風癬屬風邪襲擾理而成其癢無度搔破津水形如濕癬法宜大麥一升熬湯先黃蘗洗次搽三妙散溲濕殺蟲其癢即止緩

緩取效

三妙散 見腹部
臍癰

風疽生兩腿脛骨曲凹之處紅腫皮損

風疽

風 疽 圖



風疽生脛曲凹中瘡搔皮損津汁膿風邪留于血脈內煩熱昏冒肌腫痛註此證生脛骨間及曲凹之處癢搔皮損津黃汁極其黏濃由風邪留于血脈相搏而成因其根深故有疽名甚則身體煩熱昏冒而肌肉透紅更增腫疼宜服防

風湯外抹青竹大豆油即效

防風湯 防風 附子製

麻黃 蜜炙

白芷

木通

柴胡

當歸 焙

桔梗

甘草 炙

羌活 各五

共為粗末水一鍾半煎八分澄去渣食後服臨卧再用一服如欲出汗俟空頭煎落渣二併

服之後食稀粥生薑食畢被覆卧取汗避風

方歌防風湯療風熱搏留于血脈津汁破附子麻黃芷木通柴胡歸桔甘羌活

青竹大頭油 青竹筒截三尺長徑一寸半筒內裝黑豆一升以穀糠馬糞二物燒火當竹筒中炙之再以磁盆

兩頭接取油汁先以清米泔水和鹽熱洗患處拭乾即塗豆油不過三度即效

歌青竹筒截三尺長徑要寸半黑豆裝穀糠馬糞燒炙筒風疽癢癢油塗良

足發背圖

足發背生足背左右同



足部

足發背

足發背屬膽胃經七情六淫下注成詳別善惡分順逆細辨疽癰定死生註此證一名足跗發凡足背雖行三陽而偏在膽胃二經居多證由七情內鬱或兼六淫外傷而成經云三背不宜

生瘡惟足背多筋多骨肉少皮薄又在至陰之下發瘡疽者升發遲慢所以謂為險候也宜別五善七惡而分順逆發背者大瘡之通名也須當細辨或疽或癰順逆既分則生死定焉初宜服仙方活命飲及隔蒜灸之令瘡速潰餘與腫瘍潰瘍治同

仙方活命飲見腫瘍門

隔蒜灸法見首卷

湧泉疽圖

湧泉疽生足心兩足同



湧泉疽

湧泉疽發在足心腎虛濕滯多屬陰達破潰淺癰可治黑陷為疽命難存註此證生在足心湧泉穴一名足心發又名穿窬天蛇俗名病穿板屬足少陰由腎經虛損兼濕熱下注而成若十四日內即潰膿淺為癰猶可調治初服仙方活

命飲外用神燈照法虛甚膿生邊者十全大補湯潰後兼用桂附地黃丸服之餘治按癰疽腫瘍潰瘍門若黑陷不疼二十一日之內不潰膿者為疽屬陰敗之證難救

仙方活命飲 見腫瘍門

神燈照法 見首卷

十全大補湯 見腫瘍門

桂附地黃丸 見面部類編

脫疽圖

脫疽生足指色黑常有紅暈十指同



脫疽

脫疽多生足指間黃胞如粟黑爛延腎竭血枯五敗證割切仍黑定歸泉註此證多生足指之間手指生者間或有之蓋手足十指乃臟腑枝幹未發疽之先煩躁發熱煩渴日久始發此患初生如粟黃胞一點皮色紫暗猶如煮熟

紅瘰氣侵漫腐爛延開五指相傳甚則攻于脚面痛如湯潑火然其臭氣雖異香難解由膏梁藥酒及房術丹石熱藥以致陽精煽惑淫火猖狂蘊蓄于臟腑消燦陰液而成斯時血死心敗皮死肺敗筋死肝敗肉死脾敗骨死腎敗此五敗證雖遇靈丹亦難獲效初起宜服解毒清生湯外用大麥米煮飯拌芙蓉葉菊葉各五錢貼之止痛消之不應者必施割法須患者情願將死生付於度外遵古法毒在肉則割毒在骨則切然割切之法須宜早施乘其未及延散時用頭髮十餘根緊纏患指本節盡處繞紮十餘轉毋令毒氣攻延好肉隨用蟾酥餅放于初起黃胞頂上加艾灸之至肉枯瘡死為度次日病指盡黑方用利刀尋至本節縫中將患指徐順取下血流不止者用如聖金刀散止之餘腫以離宮錠塗之次日倘有黑氣未盡單用蟾酥餅研末撒之用陀僧膏蓋貼黑氣自退患上生膿兼貼生肌玉紅膏及生肌等藥肌生護骨飲口此為吉兆內宜滋腎水養氣血健脾安神之劑如陰陽二氣丹清神散金液戊土丹俱可服之若內外始終無變證十中可保三四若割切之後復生黑氣過節侵漫好肉疼痛尤甚者屬逆此證初起不痛者宜雌雄霹靂火灸之其餘滋補浸洗等法俱按癰疽腫瘍潰瘍門按諸書論脫疽單生于足大指而別指生者俱名數疽此非確論然脫疽偏生于屬陰經之指者居多屢經如此後

之學者宜詳審焉可也

解毒濟生湯 當歸

遠志心去

川芎

花粉

柴胡

黃芩

犀角鎔

麥冬心去

知母

黃蘗

茯苓

金銀花各一錢

紅花

牛膝

甘草各五錢

水二鍾煎八分入童便一杯食前

服 如生手指間去牛膝加升麻

歌 解毒濟生歸遠為花粉柴胡麥冬知母茯苓紅藤草脫疽初起煩熱攻

如聖金刀散 松香心去

生白礬

枯白礬

各一兩

共研極細末磁罐收貯臨用時撒于患處

歌 如聖金刀散刀傷血流不止撒之良白礬枯礬松香等共研細末罐收藏

陰陽二氣丹

天門冬心去

麥門冬心去

元參

湯泡去粗皮以
上三味各搗膏

五味子炒

人中白生

黃蘗各一兩

甘草生

澤瀉

枯白礬

青黛各三錢

冰片錢

各研細末同天門冬等膏加煉蜜少許再搗

千餘下軟硬得中丸如梧桐子大硃砂為衣每服六十九童便人乳各一鍾空心送下安睡一時

歌 陰陽二氣丹脫疽腎水枯乾燥熱敗天麥元參甘瀉味中白冰礬藥宜

清神散 綠豆粉心去

牛黃分三

甘草節五錢

冰片分五

硃砂錢三

右共為細末每服一錢淡竹葉

燈心煎湯調服

歌 清神散治脫疽發悶亂心煩調服佳豆粉牛黃甘草節研加冰片共硃砂

金匱戊土丹 茯苓

胡黃連

烏梅肉

人中黃

五味子各一兩

硃砂

雄黃

硝石

遠志心去

石菖蒲

各三錢

牛黃

冰片各一錢

各研細末共和一處再研于端午七夕或春秋

二分冬夏二至吉辰在淨室中先將烏梅肉搗膏和入藥末內加煉蜜少許搗千餘下軟硬得中為丸每丸重

一錢金鉗為衣每服一九人乳童便各一酒鍾隨病上下化服修和之時服藥之際忌婦人僧尼孝服雞犬等

見之此藥用蠟封固收藏不洩藥味愈久愈效

歌方 金液戊土茯苓牛黃硃雄硝遠片石菖胡連梅肉中黃味端治脫疽發背瘡

雌雄霹靂火 雌黃

雄黃

丁香 各二

麝香 分

右為細末用數艾茸二錢將藥末搓入艾內作

豌豆大丸安患上灸之毋論瘡痛以肉焦為度如毒已經走散就紅暈盡處排炷灸之痛則至瘡癢則至痛以

瘡紅活為妙

歌方 霹靂火治陰疽方脫疽不疼灸更強雌黃丁麝雄黃末斬艾茸搓藥末良

瘡酥餅 即瘡餅也作餅見片瘡門

離宮錠 見瘡門

陀僧膏

生肌玉紅膏 俱見瘡門

教疽生足指色紅十指同

教疽

教

疽

圖



教疽多生足指疼腫色紅活出血膿血燥精竭無敗色膏梁房勞脾腎經註此證多生于足指而手指亦間有生者由膏梁太過則損脾房勞太過則傷腎脾既損則血生少腎既傷則精必竭更兼濕熱壅盛而成初起黃粟小胞痛如湯

燈火然其色紅活腫無黑暈潰破有膿腐無敗色此屬血脈未死之候然此證雖無敗色亦由臟腑發出未可視為小毒也法宜急服滋陰救燥補血理脾之藥初服解毒濟生湯六味地黃湯潰服人參養榮湯桂附地黃湯外初宜蟬蛭拔毒散塗之將潰貼蟬酥餅兼貼巴膏潰腐之後換塗生肌玉紅膏生肌飲口初終禁用灸法患者宜清心寡慾調理庶免變證

解毒濟生湯 見瘡門

六味地黃湯 見面部

桂附地黃湯 見面部

人參養榮湯

巴膏 見潰瘍門

生肌玉紅膏 見清瘍門

蝌蚪拔毒散 見腫瘍門

蟾酥餅 即端酥丸作餅見疔瘡門

甲疽

甲疽圖



甲疽生足指甲旁肉高突色紅十指同

敷華陀累效散白膏藥蓋貼旁肉消盡即愈

華陀累效散 乳香

硃砂各一

輕粉分五

椒攪核 三枚燒灰存性

黃丹分三

共研細末香油調敷

敷華陀累效散甲黃丹青粉乳硃砂椒攪核燒同研細香油調濃患處搽

白膏藥 見清瘍門

足跟疽生足掌跟紫腫形如兔咬左右同

足跟疽

足跟疽圖



足跟疽生脚掌跟狀如兔咬紫紅嫩陽蹠積熱潰難斂初宜隔蒜灸灸動註此證生足跟俗名脚掌根由臟肺積熱汗出涉水遠行傷筋而成初腫紅紫疼痛潰膿水淋漓狀如兔咬經云兔咬狀如赤豆至骨急治遲則害人蓋謂毒之

深惡也屬足太陽膀胱經穴名申脈即陽蹠脈發源之所又係腎經所過之路瘡口久潰不合陽蹠脈氣不能充

發腎氣由此洩漏以致患者益虛初起宜隔蒜灸之服仙方活命飲加肉桂牛膝潰後宜服補中益氣湯人參養榮湯桂附地黃丸隨證滋補治之餘按癰疽潰瘍門海藏云克蓄久不收斂用鹽湯洗之白朮研末撒之兩日一易謹戒一切勞碌即效

隔蒜灸法

見首卷灸法

仙方活命飲

見腫瘍門

補中益氣湯

人參養榮湯

俱見腫瘍門

桂附地黃丸

見面部類

屬癰生足跗兩旁小如粟粟左右同

屬癰 四淫

屬癰圖



四淫注足跗之前上下其大如癰者同

四淫圖



屬癰勢小足旁生四淫在足上下凝三陰虧損為疽重三陽濕熱發癰輕注靈樞云發於足上下名曰四淫其狀大癰急治之百日死發於足旁名四屬癰其狀不大急治之去其黑者不消輒益不治百日死此二證俱由足三陰經虧損為疽者重若兼足三陽經濕熱下注而成癰者輕若紅腫疼痛潰破有膿腐脫無黑氣浸漫屬濕熱偏盛順證易治若微紅微腫潰出膿水屬陰氣凝結不能化膿險證難治若黑暗漫腫痛不潰膿煩熱作渴小水淋漓為陰敗惡證屬逆四淫無邊沿屬癰類數疽初俱宜仙方活命飲

外宜隔蒜灸以宣壅毒將潰宜服人參養榮湯兼六味地黃丸以滋補之若色暗不痛即用桑柴灸法以行壅滯助陽氣更宜十全大補湯兼桂附地黃丸壯脾滋水治之或可成功若妄用苦寒剋伐之藥多致不救外治法同