

徐泗谿先生十三種

蘭臺軌範卷四

目錄

麻黃加朮湯

防己黃耆湯

麻黃杏仁蠶絲甘草湯

桂枝附子湯

白朮附子湯

甘草附子湯

二妙散以上溫

白虎人參湯

一物瓜蒂湯

香薷飲

十味香薷飲

黃連香薷飲

枇杷散

蟾酥丸

千金丹

又刮痧法以上屬

蠶甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

柴胡去半夏加栝蠆湯

柴胡桂薑湯

蜀漆丸

陵鯉湯

療瘧病醫不能救者方

療瘧常山湯

牡蠣湯

清脾湯

常山飲

烏梅引子

集驗瘧必從四肢始療方

四獸湯以上瘧瘧

桃花湯

白頭翁湯

紫參湯

訶梨勒散

甘草瀉心湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

乾薑黃連黃芩人參湯

赤石脂禹餘糧湯

雄黃丸

柴胡加芒硝湯

瓜蘗散

療熱毒痢血片臍下絞刺痛方

雄黃丸

主赤白痢方

療五疳蒸下痢方

薤白湯

訶梨勒丸以上痢

生鐵洛爲飲

治癰狂百病

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

控涎丹

真宕子散

抱膽丸

琥珀壽星丸

控涎丹

獨效苦丁香散

甘遂散

苦參丸以上痢狂痢

苓桂甘朮湯

甘遂半夏湯

十棗湯

小青龍湯

木防己湯

木防已去石膏加茯苓芒硝湯

澤瀉湯

小半夏湯

小半夏加茯苓湯

葶藶大棗瀉肺湯

桂苓五味甘草湯

苓甘五味薑辛湯

苓甘五味薑辛半夏湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯

苓甘五味加薑辛半夏杏仁大黃湯

厚朴大黃湯

痰飲頭痛往來寒熱方

赤石脂散

前胡丸

范汪大甘遂丸

礬石湯

金珠化痰丸

葛花解酲湯

射干麻黃湯

皂莢丸

厚朴麻黃湯

澤漆湯

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

杏仁煎

十味丸

療上氣方

鯉魚湯

觀音應夢散

補肺阿膠散

清音丸

葶藶丸

蘇子煎

蘇子降氣湯

治久嗽上氣心胸煩熱吐膿血方

以上咳嗽

烏頭桂枝湯

蜘蛛散

大烏頭煎方

洗陰腫核痛

麝香大大戟丸

續生橘核丸

川楝子丸

硃砂圓

蟬脫散

以上諸

蘭臺軌範卷四

吳江徐靈胎洞溪著

濕

金匱

太陽病關節疼痛而煩脈沈而細者此名濕痺濕痺之候小便不利大便反快但當利其小便 濕家之為病一身盡疼發熱身色如薰黃也此黃與黃疸各別 濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則嘔或胸滿小便不利 舌上如胎者以丹田有熱胸上有寒渴欲得飲而不能飲則口燥煩也 濕家下之類上汗出微喘小便利者死若下利不止者亦死 風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗之病不愈者何也蓋發其汗汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微欲出汗者風濕俱去也 濕家病身疼發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞納藥鼻中則愈納鼻之藥金匱未載俟廣求其法以補之亦不過牙烏瓜蒂之類

濕方

麻黃加朮湯金匱

濕家身煩疼可與麻黃加朮湯發其汗為宜慎不可以火攻之

麻黃三兩

桂枝二兩

甘草一兩炙

杏仁七十個

白朮四兩

右五味以水九升先煮麻黃減二升去

上沫納諸藥煮取二升半去滓溫服八覆取微似汗此濕家發汗之主方

防己黃耆湯同上

風濕脈浮身重汗出惡風者此湯主之

防己一兩

甘草半兩炒

白朮七錢半

黃耆一兩一分去蘆

右剉麻豆大每抄五錢匕生薑四片大棗一

枚水盞半煎八分去滓溫服良久再服 喘者加麻黃半兩 胃中不和者加芍藥三分 氣上衝者加桂

枝三分 下有陳寒者加細辛三分 服後當如蟲行皮中從腰下如冰後坐被上又以一被繞腰下溫令

微汗差

麻黃杏仁薤白甘草湯 金匱

病者一身盡疼發熱日晡所劇者名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也

致也

麻黃半兩去節湯泡

甘草一兩炙

薤白仁半兩

杏仁十個去皮尖炒

右剉麻豆大每服四錢水一盞半煮八分去渣溫服

有微汗避風

桂枝附子湯 同上

傷寒八九日風濕相搏身體疼痛不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而澀者桂枝附子湯主之若大便秘小便不利者去桂加白朮湯主之

桂枝四兩去皮

生薑三兩切

附子三枚炮去皮破八片

甘草二兩炙

大棗十二枚擘

右五味以水六升煮取二升去渣分溫

三服

白朮附子湯 同上

白朮二兩

附子一枚半炮去皮

甘草一兩炙

生薑一兩半切

大棗六枚

右五味以水三升煮取一升去渣分溫

三服一服覺身痺半日許再服三服多盡其人如冒狀勿怪卽是朮附並走皮中逐水氣未得除故耳

甘草附子湯 同上

風濕相搏骨節疼痛掣痛不得屈伸近之則痛刺汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者此湯主之

甘草二兩炙

附子二枚炮去皮

白朮二兩

桂枝四兩去皮

右四味以水六升煮取三升去渣溫服一升日三服

初服得微汗則解能食汗出復煩者服五合恐一升多者服六七合爲妙

此風濕而兼寒者

二妙散 丹溪

治筋骨疼痛因濕熱者加有氣加氣藥如血虛加血藥如痛甚以薑汁辣服之

黃柏炒

蒼朮炒去皮

右爲末生薑研沸湯調服如表實氣實者少酒佐之

在表之濕當散之在裏之濕當瀉之諸方之藥不外乎此

黑地黃丸 方見通治

陽

金匱

太陽中喝發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細孔通小便已灑灑然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥者發其汗則惡寒甚加溫針則發熱甚若下之則淋甚

此中喝乃中時行之熱氣與卒然中暑病象如霍亂者不同當別之

喝方

白虎人參湯金匱 太陽中熱者喝是也汗出惡寒身熱而渴此湯主之

知母六兩

石膏一斤碎

甘草二兩

粳米六合

人參三兩

右五味以水一斗煮米熟湯成去渣溫

服一升日三服

熱入裏則外惡寒清裏熱則惡寒自解然亦須詳審有表無裏方為精密凡屬汗出多之病無不惡寒者以其惡寒汗出而誤認為寒用大順散等熱劑則立危矣

一物瓜蒂散同上

太陽中喝身熱疼重而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也

瓜蒂二十個

右剉以水一升煮取五合去渣頓服

此方服之當吐

香薷飲局方

治暑熱乘涼飲冷陽氣為陰邪所遏頭痛發熱惡寒煩躁口渴腹滿吐瀉者

香薷一斤

厚朴薑汁炒

白扁豆炒各半斤

右水煎浸冷服

此治時行暑病之主方其分兩則五錢至一兩止

十味香薷飲

即前方加人參甘草黃耆木瓜陳皮白朮茯苓

黃連香薷飲

即香薷飲加黃連四兩薑汁同炒黃色

枇杷散局方

治中暑伏熱煩渴引嘔逆惡心頭目眩暈

枇杷葉

陳皮

丁香

厚朴各五錢

白茅根

麥冬

木瓜

甘草

各一兩

香茹七錢半

右為末每二錢薑三片煎湯調服溫服亦可如煩躁井水調下小兒三歲以下服五分量大

小加減

蟾酥丸局方

茅朮

雄黃各一兩

辰砂五錢

麝香二錢

丁香

牙皂各三錢

蟾酥五錢

右用火酒化

蟬酥打丸如鳳仙子大辰砂爲衣放舌底化下重者二三丸

千金丹

驗方即人馬平安散

麝香

冰片各二錢

硃砂五錢

雄黃

礞砂

硝各一兩

金箔一百張或加牛黃

右七味爲

末或水服二三分或嗅少許於鼻內

又刮痧法 用薄錢蘸香油刮胸背及臂灣令色紫疹起爲度或用婦多縛髮油繩蘸油刮亦可

紫金錠

蘇合丸

局 麝香正氣散

局 生脈飲

六一散

以上俱見通淋

痰癰

素問

論黃帝問曰夫痰癰皆生於風其畜作有時者何也岐伯曰瘧之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓顙腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴欲冷飲帝曰何氣使然岐伯曰陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽并於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓顙也巨陽虛則腰背項痛三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱外內皆熱則喘而渴故欲冷飲也此皆得之夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外此榮氣之所舍也此令人汗空疎腠理開因得秋氣汗出遇風及得之以浴水氣舍於皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝日行於陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是以日作帝曰其間日作者何也岐伯曰其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日而作也帝曰其作日晏與日早者何氣使然岐伯曰邪氣客於風府循膂而下衛氣一日一夜大會於風府其明日日下一節故其作也晏此先客於脊背也每至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作以此日作稍稍益晏其出於風府日下一節二十五日下至骺骨二十六日入於脊內注於伏膂之內其氣上

行九日出於缺盆之中其氣日高故作日益早其間日發者由邪氣內薄於五臟橫連募原其道遠其氣深其行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間日乃作也帝曰夫子言衛氣每至於風府腠理乃發發則邪氣入入則病作今衛氣日下一節其氣之發也不當風府其日作者奈何岐伯曰此邪氣客於頭項循膂而下者也故虛實不同邪中異所則不得當其風府也故邪中於頭項氣至頭項而病中於背氣至背而病中於腰脊氣至腰脊而病中於手足氣至手足而病衛氣之所在與邪氣相合則病作故風無常府衛氣之所發必開其腠理邪氣之所合則其府也帝曰善夫風之與瘡也相似同類而風獨常在瘡得有時而休者何也岐伯曰風氣留其處故常在瘡內而絡沈以內薄故衛氣應乃作帝曰瘡先寒而後熱者何也岐伯曰夏傷於大暑其汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之水寒藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱病以時作名曰寒瘡帝曰先熱而後寒者何也岐伯曰此先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒亦以時作名曰溫瘡其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘧而論此等極多不獨論瘧為然故學者當以意會也岐伯曰瘡之且發也陰陽之且移也必從四末始也陽已傷陰從之故先其時堅束其處令邪氣不得入陰氣不得出霍候見之在孫絡盛堅而血者皆取之此真往而未得并者也帝曰時有間二日或至數日發或渴或不渴其故何也岐伯曰其間日者邪氣與衛氣客於六腑而有時相失不能相得故休數日乃作也其以秋病者寒甚以冬病者寒不甚以春病者惡風以夏病者多汗瘧脈緩大虛便宜用藥不宜用鍼凡治瘧先發如食頃乃可以治過之則失時也諸瘧而脈不見刺十指間出血血去必已先視身之赤如小豆者盡取之

瘧疾藥當在未來時前服刺瘧之法簡易可學不必習針法皆能之亦治瘧之要訣也

風瘧 素生氣通天論魄汗未盡形弱而氣慄穴胸以閉發為風瘧 又云夏傷於暑秋為瘧瘧二日一發者為

似瘧 素生真要大論帝曰火熱復惡寒發熱如有瘧狀或一日發或間數日發其故何也岐伯曰勝復之氣

會合之時有多少也陰氣多而陽氣少則其發日遠陽氣多而陰氣少則其發日近此勝復相搏盛衰之節瘧

亦同法 確亦同法則非確可知

金匱

師曰瘧脈自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者下之差弦遲者可溫之弦緊者可發汗針灸也浮大者可吐之弦數者風發也以飲食消息止之但熱不寒者邪氣內藏於心外舍分肉之間令人消燄肌肉吐衄 瘧多寒者名曰吐瘧 似當作吐字諸本皆作吐在考

瘧方

鼈甲煎丸 金匱 瘧瘵以月一日發當以十五日愈設不差當月盡解如其不差當云何師曰此結爲瘕瘕名

曰瘧母急治之宜此方

鼈甲 十一分炙

烏扇 三分燒 黃芩 三分

柴胡 六分

鼠婦 三分蝨

乾薑

大黃 各三分 芍藥 五分

桂枝 一分

葶藶 一分蝨

石葶 三分去毛

厚朴 三分

牡丹 五分去心

瞿麥 二分

紫葳 三分

半夏

人參 各一分

廔蟲 五分蝨

阿膠 三分

蜂窠 四分炙

赤消 十二分

蟻蛭 六分蝨

桃仁 二分

右二十三味

爲末取煨薑下灰一斗清酒一斛五斗浸灰候酒盡一半著鼈甲於中煮令泛爛如膠漆統取汁納諸藥煎

爲丸如梧子大空心服七丸日三服

白虎加桂枝湯 金匱

溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節疼煩時吐此湯主之

知母 六兩

甘草 二兩炙

石膏 一斤

粳米 二石

桂枝 三兩去皮

右剉每五錢水一盞半煮取八分去渣

溫服汗出愈

內經以先熱後寒爲溫瘧但熱不寒爲瘧瘵

獨活散 金匱

瘧寒者名曰吐瘧此湯主之 作吐

獨活 洗去土

雲母 二兩日炙

龍骨 各分

右三味杵爲散末發前以漿水服半錢匕 溫瘧加獨活半錢

發時服一錢匕

梨胡去半夏加括蕒湯 金匱 治瘧病發渴者亦治勞瘵

柴胡八兩 人參 黃芩 甘草各三兩 括蕒根四兩 生薑三兩 大棗十二枚 右七味以水

一斗二升煮取六升去滓煎取三升溫服一升日二服

梨胡桂薑湯 同上 治瘧寒多微有熱或但寒不熱

柴胡半斤 桂枝三兩 乾薑二兩 括蕒根四兩 黃芩三兩 牡蠣二兩 甘草二兩 右七味以水

一斗二升煮取六升去滓煎取三升日三服初服微煩復服汗出便愈

蜀漆丸 千金 主瘵瘧連年不差服三七日定差方

蜀漆 知母 白薇 地骨皮 麥門冬去心 升麻各五分 恆山一兩半 石膏二兩 研

香豉一合 萎蕤 烏梅肉 鼈甲 甘草各一兩 右十三味搗篩爲末煉蜜和丸如桐子

大空腹飲服十丸日再加至三三十丸 此方治三日瘵爲宜

陵鯉湯 千金 主瘵疾江南瘴癘方

陵鯉甲四十枚 烏賊魚骨 附子各一兩 恆山三兩 右五味咬咀以酒三升漬一宿未發前稍稍嚙之勿

絕吐之并鹽五心一日斷食過時久乃食 用生藥 擗吐法

瘵瘧病醫不能救者方 千金 外治截瘵法 以繩量病人脚圍繞足跟及五指一匝訖截斷繩取所量繩置

項上著反向背上當繩頭處中脊骨上灸三十壯則定候看復惡寒急灸三十壯則定候至過發一炊久候

之雖饑勿與食盡日此神驗男左女右足

瘵瘧常山湯 外臺 吐法

常山三兩 右一味切以漿水三升浸經一宿煎取一升欲發前頓服之後微吐差止忌生蔥生菜

牡蠣湯 外臺 治吐瘵

牡蠣四兩 麻黃四兩 去節 甘草 蜀漆各二兩 右四味以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升納

諸藥煮取二升溫服一升若吐則勿更服

清脾湯 治熱多陽瘧

青皮 厚朴 柴胡 黃芩 半夏 甘草 茯苓 白朮

草果煨 右九味加薑三片水煎服

常山飲局方 治痰瘧

常山火酒炒 知母 貝母 草果 檳榔各二兩 烏梅三個 右六味加薑棗煎瘧未發

時面東溫服

烏梅引子 療溫瘧勞瘧

烏梅七個 桃柳心各七 葱白七莖 豆豉一合 甘草 柴胡 知母各四兩 大黃三兩 右

八味各細剉以童子小便兩茶碗宿浸明日早煎三三沸去渣頓服差未差更作服三服永差忌海藻松菜

集驗瘧必從四肢始療方 先其時一日頃用細左索繩緊束其手足十指過發時乃解之此即內經之法

四獸湯 易簡 治食瘧諸瘧和胃消痰

半夏 人參 茯苓 白朮 橘紅 草果 生薑 烏梅

大棗 甘草各等分 右以鹽少許淹食頃濕紙厚裹慢火煨香熱每服四錢溫服

小柴胡湯 見傷寒 治瘧之法不外諸方惟三日瘧則煎劑不能取效宜病日用煎方以驅邪餘兩日隨用溫補以

扶元氣又加避風靜養則庶幾矣

痢

素問

通評虛實論帝曰腸澼便血何如岐伯曰身熱則死寒則生帝曰腸澼下白沫何如岐伯曰脈沈則生脈浮則死帝曰腸澼下膿何如岐伯曰脈懸絕則死滑大則生帝曰腸澼之屬身不熱脈不懸絕何如岐伯曰滑大者曰生懸澼者曰死以臟期之 氣厥論腎移熱於脾傳爲虛腸澼死不可治 大奇論腎脈小搏沈爲腸澼下血血溫身熱者死心肝澼亦下血二臟同病者可治其脈小沈澼爲腸澼其身熱者死 太陰陽明論犯賊風虛邪陽受之飲食不節起居不時者陰受之陽受之則入六腑陰受之則入五臟入六腑則身熱不時臥上爲喘呼入五臟則填滿閉塞下爲飧泄久爲腸澼

此俗所謂腸紅病也

金匱

六腑氣絕於外者手足寒上氣脚縮五臟氣絕於內者痢不禁下甚者手足不仁 下痢脈沈弦者下重脈大者爲未止脈微弱數者爲欲自止雖發熱不死 下痢手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死少陰負跌陽者爲順也 下痢有微熱而渴脈弱者令自愈下痢渴者自愈以陽氣復而寒邪去也 下痢脈數有微熱汗出令自愈設脈緊爲未解 下痢脈數而渴者令自愈設不差必清膿血以有熱故也 下痢氣者當利其小便 下痢清穀不可攻其表汗出必脹滿 下痢脈沈而遲其人面少赤身有微熱下痢清穀者必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面帶陽下虛故也 下痢後脈絕手足厥冷晡時脈還手足溫者生不還者死 下痢腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表

以上諸證皆屬陰寒之痢非暑毒之痢也治法大相懸殊

病源

痢而赤白者是熱乘於血血滲於腸內則赤也冷氣入腸搏腸間津液凝滯則白也冷熱相交故赤白相雜重者狀如膿涕而血雜之輕者白膿上有赤脈薄血狀如魚脂腦世謂魚腦痢也 血痢者熱毒折於血入大腸故也 休息痢者胃腕有停飲因痢積久或冷氣或熱氣乘之氣動於飲則飲動而腸虛受之故爲痢也 痢如膏由臟腑虛冷氣入於大腸成痢冷氣積腸又虛滑脂凝如膏也 蠱蛀痢毒氣侵於臟腑如病蠱蛀之家

痢血雜膿瘀黑有片如雞肝與血俱下是也 雜痢謂痢色無定或水穀或膿血或青或黃或赤或白變雜無常或雜色相兼而痢也挾熱則黃赤熱甚則變膿血也冷則白冷甚則青黑皆由飲食不節冷熱不調胃氣虛故變易

痢方

桃花湯 金匱 下痢便膿血者此湯主之

赤石脂 一斤 半剉 乾薑一兩 粳米一升 右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合納赤石

脂末方寸匕日三服若一服愈餘勿服 此治下痢滑脫之痢

白頭翁湯 金匱 熱痢下重者此湯主之

白頭翁 黃連 黃柏 秦皮 各三兩 右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈再服

紫參湯 金匱 下痢肺痛此湯主之

紫參半斤 甘草三兩 右二味以水五升先煮紫參納甘草煮取一升半分溫三服 紫參疑即爛上染紅色者

訶梨勒散 金匱 治氣痢

訶梨勒十枚 右一味爲散粥飲和頓服

甘草瀉心湯 傷寒論 傷寒中風醫反下之其人下痢日數行穀不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔心煩不得

安此湯主之

甘草四兩 黃芩 乾薑各三兩 半夏半升 黃連一兩 大棗十二枚 右六味以水一斗煮取六

升去滓再煎取三升溫服一升日三服 此治上焦不和之痢

黃芩湯 傷寒論 太陽與少陽合病自下痢者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯 若傷寒本自寒下醫復

吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐乾薑黃連黃芩人參湯主之

黃芩三兩

甘草

芍藥各二兩

大棗十二枚

右四味以水一斗煮取三升去渣溫服一升日再夜

一服此熱病之主方

黃芩加半夏生薑湯

傷寒論

即前方加半夏半升生薑三兩煎服法同

乾薑黃連黃芩人參湯

傷寒論

乾薑

黃連

黃芩

人參各三兩

右四味以水六升煮取二升分溫再服傷心湯以下四方皆以黃芩為主而

因證加減此病之正方也

赤石脂禹餘糧湯

傷寒論

傷寒服湯藥下痢不止心下痞硬服瀉心湯已復以他藥下之痢不止醫以理中湯

與之痢益甚理中者理中焦此痢在下焦此湯主之

赤石脂

禹餘糧

碎各一斤

以上二味以水六升煮取二升去渣三服下焦乃大腸之底也

雄黃丸

夷堅甲志云昔虞承相自渠州被召途中冒暑得疾泄瀉連月夢壁間有韻語方一紙讀之數遍其

詞曰毒暑在脾濕氣連脚不泄則痢不痢則瘧癰煉雄黃蒸餅和藥甘草作湯服之安樂別作治療醫家大

錯如方製藥服之遂愈此方治暑毒痢

柴胡加芒硝湯

傷寒論

治傷寒胸滿而嘔日晡所發潮熱已而微痢先以小柴胡解外後以此主之 即柴胡

湯方芒硝二兩

右先煮柴胡湯去渣納芒硝分溫再服不解更作

瓜薤散 治五色痢久不愈者

瓜薤

一個以炭火煨存性蓋地上出火毒

右研細溫酒服盡

療熱毒痢血片臍下絞刺痛方外臺

升麻

地榆

茵草

黃連各六分

犀角四兩

生地八分

梔子

薤白

香豉各二合

右九味水六升煮取一升五合分溫三服日再此血痢之主方

主赤白痢方 外證

黃連二兩 阿膠四片

右二味以酒二升合黃連煎十五沸去渣然後納阿膠令烊溫服三升 此治血痢之病

療五疳蒸下痢方 外證

苦參 青箱

甘草 各三兩 右三味以水四升煮取二升半分三灌即愈凡蒸但服地汁即差 此證治

薤白湯 活人書

傷寒下痢如爛肉汁赤白帶下伏氣腹痛諸熱毒並皆治之

鼓 半斤 綿裹

薤白一把 梔子 七枚大者破之

右剉如麻豆大以水二升半先煮梔子十沸下薤白煎至二升許

下鼓煎取一升二合去渣每服一湯盞

調梨勒丸 局方 治腸胃積寒久痢純白或有青黑日夜無度

肉豆蔻 去皮 木香

乾薑 炮各二兩 縮砂仁 訶梨勒皮 川烏頭 炮去皮 白礬 煨各十 龍骨 洗

赤石脂 各八兩

右為末用粟米飯為丸如梧子大每服二十丸至三十丸溫粟米飲下食前服甚者可倍

加丸數 此溫瀉之劑

葛根湯 葛根黃芩黃連湯

當歸四逆湯

大承氣湯

小承氣湯

四逆散

四逆湯 白通加豬膽汁湯

白通湯

四逆加入參湯

通脈四逆湯

豬膚湯

陽毒升麻湯 以上十三方俱見傷寒門

生薑瀉心湯 見嘔吐門 烏梅丸 方見蟲門 威喜丸 方見通治此方和劑名感應丸

癰狂痢

靈素

靈癰狂篇狂始生先自悲也喜忘苦怒善恐者得之憂饑 狂始發少臥不饑自高賢也自辯智也自尊貴也 善罵晝日夜不休 狂言驚善笑好歌樂妄行不休者得之大恐 狂目妄見耳妄聞善呼者少氣之所生也 癡者多食善見鬼神善笑而不發於外者得之有所大喜

骨癲 靈癲狂篇骨癲疾者顛齒諸膂分肉皆滿而骨居汗出煩惋嘔多沃沫氣下泄不治

筋癲疾 靈癲狂篇筋癲疾者身倦掣急嘔多沃沫氣下泄不治

脈癲疾 靈癲狂篇脈癲疾者暴仆四支之脈皆脹而縱脈滿盡刺之出血嘔多沃沫氣下泄不治

素生氣通天論陰不勝其陽則脈流薄疾并乃狂 宣明五氣論五邪所亂邪入於陽則狂 調經論血并於

陰氣并於陽故爲驚狂 至真要大論諸躁狂越皆屬於火 通評虛實論帝曰癲疾何如岐伯曰脈搏大滑

久自己脈小堅急死不治帝曰癲疾之脈虛實何如岐伯曰虛則可治實則死 陽明脈解篇岐伯曰四逆者

諸陽之本陽盛則四支實實則能登高也帝曰其棄衣而走者何也岐伯曰熱盛於身故棄衣欲走也帝曰其

妄言罵詈不避親疎而歌者何也岐伯曰陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不飲食不飲食故妄走也

陽厥怒狂 素病能論帝曰有病怒狂者此病安生岐伯曰陽氣者因暴折而難決故善怒也病名曰陽厥帝

曰治之奈何岐伯曰奪其食即已使之服以生鐵洛爲飲夫生鐵洛者下氣疾也

胎病 素奇病論帝曰人生而有病癲疾者病名曰何安所得之岐伯曰病名爲胎病此得之在母腹中時其

母有所大驚氣上而不下精氣并居故令子發爲癲疾也

難經

癲疾始發意不樂僵仆直視其脈三部陰陽俱盛是也 重陽者狂重陰者癲

病源

風癲 風癲者由氣血虛邪入於陰經故也又人在胎其母卒大驚精氣并居令子發癲其發則仆地吐涎沫

無所覺是也 此俗名
羊頭癲

五癲 五癲者一曰陽癲發如死人遺尿食頃乃解二曰陰癲初生小時臍瘻未愈數洗浴因此得之三曰風

癲發時眼目相引牽縱反強羊鳴食頃方解四曰濕癲眉頭痛身重坐熱沐頭濕結腦肺未止得之五日馬癲

發作時時反目口噤手足相引身體皆然

鬼魅 凡人有為鬼物所魅則好悲而心自動或心亂如醉狂言驚怖向壁悲啼夢寤喜驚或與鬼神交通病苦乍寒乍熱心腹滿短氣不能飲食此魅之所持也 十歲以上為癩十歲以下為癩大體不外三種風驚食是也

千金

驚癇 癇分心肝脾肺腎腸腸之病及馬牛羊猪犬雞之別其各有所似

癲狂方

生鐵洛為飲素問

生鐵洛即爐冶間鎚落之鐵屑用水研浸可以為飲其屬金其氣寒而重最能墜熱開結平水火之邪故可

以下氣疾除狂怒也凡藥中用鐵精鐵華粉鐵砂鐵銹水之類皆同此意此治怒狂之方以鎮肝為主

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯傷寒論 治傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起臥不安者

即桂枝湯去芍藥加蜀漆三兩洗去腥 龍骨四兩 右七味以水一斗煮取二升先煮蜀漆納諸

藥煮取三升去渣溫服一升 柴胡加龍骨牡蠣湯傷寒論 治傷寒下之驚煩小便不利譫語身重不能轉側此湯主之

柴胡 龍骨 人參 茯苓 鉛丹 黃芩 桂枝各一兩半 半夏二合

大黃二兩 牡蠣二兩生 生薑二兩半 大棗六枚 右十二味以水八升煮取四升納大黃更煮去渣溫

服一升

治癲狂百病千金方

大癲子四升上 以水六升煮令芽生去渣煎取二升空腹頓服或多言語勿怪但使人舉手足服法