

○○第二佰四四方○溫帛熱熨法 治新產乳多脹滿外溢不止

用新白布以極滾水浸透乘熱熨之即不外溢

○○第二佰四四方○開門丹

治臨產交骨不開極應此方必要兒已轉身方可服倘胎中兒尚未轉身切不可用

柞木枝 一兩
當歸 二兩
川弓 一兩
生黨 一兩

煎服即開

○○第二佰四四方○做秘元煎法

治陰虛遺精帶濁脫滑等症男婦大小皆可用之凡屬心脾虛損者皆宜

閩黨 五錢
遠志 八分
芡實 四錢
淮藥 四錢

酒炒

製

炒

炒

棗仁 錢半
茯神 三錢
炙草 一錢
五味 十四粒

錢半

三錢

一錢

十四粒

金嬰子

二錢
去核

煎服

如有微火加苦參錢半○如氣虛者加北蒼三四分每日一劑以愈為度服十劑後再加熟地一兩
大生地酒炒五分

○第二佰四七方○做固陰煎加減法

治陰虛滑滯帶濁遺淋及經水不固並治婦人陰挺以及男婦肝腎不足等症

人參

隨宜○或用黨
參酒炒五錢

熟地

一兩

淮藥

五錢
炒

棗皮

一錢
炒

兔絲子

三錢
炒香

五味

三粒
搗碎

炙草

錢半

用蓮肉四十枚去心煎服○如滑泄不禁者加金嬰子肉三錢文蛤醋炒一兩烏梅貳個○如肝腎
血虛而血不歸經者加土炒當歸三四分○如氣虛下陷者加酒炒升麻一錢

○第貳佰四八方○薰洗木楊湯

治陰中生物名曰陰挺每日薰洗數次○婦科

水楊柳根 五培子 魚腥草 枯凡

金毛狗脊 黃連 以上各用一兩

右爲末分作四劑用有嘴瓦罐煎湯以小竹去節接於罐嘴上引熱氣蒸於陰中或透引挺上俟湯溫仍以湯沃洗之仍服治挺之藥

○○第貳佰四九方○桔壳散 治婦人陰腫者

桔壳八兩切碎煎極熱以舊綢包裹納陰中並將一半用舊綢包裹於陰戶之外乘熱熨之冷又更易數次卽愈勿妄治之

○○第貳佰五十方○薰洗椒菜湯 治婦人陰痒手不能住者

花椒 吳朱干 蛇床子 以上一兩 藜蘆 五兩

陳茶

一兩

炒鹽

貳兩

煎水乘熱薰洗後以硃砂紙燒灰擦雞肝一片入陰中以制其虫更妙勿妄治之

〇〇第貳百五一方〇芍藥蒺藜煎

治男婦通身濕熱瘡疹及下部紅腫熱痛諸瘡等症如神

白蒺藜

壹兩連刺打碎

白芍

二兩

生地

四兩

山枝

炒 兩半

龍膽草

兩半

黃芩

兩半

木通

二兩

澤瀉

二兩

金銀花

三兩

薏米

七兩

茯苓

三兩

空心服

〇〇第貳百五貳方〇蛇退散

治婦人陰中生瘡先用藥水薰後以此散慘之

蛇退

一條存性

枯凡

黃丹

扁蓄

藁本

以上一兩

蛇床子

硫黃

芥穗

以上五錢

共爲細末如瘡中乾用香麻油調搽如瘡溼即將藥末乾摻之倘藥脫又搽日不拘次

〇〇第二百五三方〇神應養真丹

治男婦肝腎虛損四時不正之氣所襲脚膝無力或右癱左癱半身不遂手足頑麻語言蹇澁氣血凝滯遍身疼痛等症〇此方加十倍以蜜和丸每早晚各服五丸亦妙

熟地

一兩

當歸

三小

川弓

二小

兔絲子

三小炒香

白芍

錢半酒炒

姜活

一錢

天麻

錢半

川牛膝

錢半

木瓜

三小

煎服

〇〇第貳佰五四方〇虎骨酒

驅風補血益氣壯筋骨強脚力

眞虎脛骨

一對
洋油酥

川泰

一兩
五升

牛膝

貳兩
孕婦勿用

五加皮

四兩

意米

四兩

固脂

貳兩

熟地

十兩

杜仲

二兩
姜汁炒

浸燒酒

十觔
不要煮

〇〇第貳伯五五方〇椒艾囊

治脚氣

艾葉

八兩

川椒

四兩

草烏

四兩

其爲粗米和勻用粗布包裹足底足脛外用微火烘之使椒艾之氣得行於內或夜臥取包之達旦去之此法極效

〇〇第貳百五六方〇敷脚氣方

治脚氣腫痛不能落地

芥菜子

五升

白止

四錢

研末用姜汁

調敷痛處

〇〇第二五七方〇加味地黃湯

治穿心脚氣不能落地者

熟地

三兩

當歸

七錢

白芍

二錢酒炒

川弓

二錢

三柰

四錢

木瓜

三錢

蘇葉

八分

牛膝

錢半孕婦勿用

陳皮

錢半

杜仲

三錢姜汁炒

煎服

〇〇第二五八方〇雞鳴散

治脚氣第一品藥不問男女皆可服如感風溼流注痛不可忍筋脉攣腫者並宜服之其效如神

檳榔

七枚

橘紅

木瓜

以上一兩

吳干

蘇葉

以上三錢

桔梗

五升

生姜

五升

煎好五更時

分作三次冷服

如冬月嚴寒溫服亦可服後以乾點心壓下至天明後如大便內下黑糞水即腎經所感之寒溼也
早飯宜遲喫使藥力作效此藥並無所忌

〇〇第二五九方〇立效散

治脚氣攻心〇如消腫更效〇及治暴腫

檳榔

七枚

陳皮

八升

蘇葉

七升

吳干

三升開水泡三次去苦汁

木瓜

一兩

生姜

二兩

煎好分作兩次服

〇〇第二六十方〇當歸拈痛湯

治溼熱為病肢節疼痛肩背沉重胸膈不利手足遍身流注疼痛溼熱等症男婦皆宜

姜活

二錢

黃芩

二錢

炙草

半升

茵陳

三錢酒炒

黨參

二錢

升麻

八分

干葛

一兩

苦參

一兩

蒼朮

半兩

防風

一兩

歸身

半兩

焦朮

半兩

知母

一錢

猪苓

一錢

澤瀉

一錢

空心煎服

○○第二佰六一方○防已飲

治溼熱脚氣

焦朮

二錢

防已

錢半

木通

錢半

賓郎

一錢

川弓

錢半

生地

五錢

黃柏

一錢
酒炒

甘草稍

錢半

意米

四錢

犀角

一錢

煎服

如大便實加桃仁八分○如小便澀加牛膝錢半○如發熱加川連八分○內熱甚者加生石膏三錢○有痰加竹瀝羌汁一酒杯兌服

○○第二伯六二方○小續命湯 通治八風五痺痿厥等症○又於六經分別隨症加減用之

生黨參

三錢

麻黃

一錢
去節

黃芩

八分

白芍

一錢

炙甘草

八分

川弓

錢半

防已

二錢

杏仁

二錢
去皮尖

熟附片

二錢

官桂

一錢

防風

錢半

生羌三片紅棗五枚煎服○如春夏加生石膏二錢知母一錢○如秋冬以官桂附片倍用○如精神恍惚加茯苓三錢遠志八分○如骨節煩痛有熱者去附片倍用白芍○如骨間冷痛亦倍用附桂○如小便短澀去附片倍用白芍加竹瀝一酒杯兌入○臟寒下利去防已黃芩加焦朮二朮○如熱利減去附片官桂○如足無力加牛膝二朮娠婦不用○如身痛加秦艽酒炒三錢○如腰痛

加杜仲羌汁炒三分○如失音入杏仁去皮尖三錢○如自汗去麻黃加焦白朮三分

○○第二百六三方○加減檀郎湯 治一切脚痛脚弱名曰壅疾最宜疎通春夏尤為最妙

賓郎

四分

橘紅

三分

蘇葉

三分

炙草

二分

生薑三片煎服○如足痛不已者加木香八分五加皮三四分○如婦人足痛加當歸三分○室女足痛係肝血實滯宜加赤芍貳分○如中滿不食加桔實八分○如吐痰加半夏貳分○如大便不通加生大黃分半○如小便不通加木通二分○如轉筋者加吳茱分半用開水泡去苦汁再用鹽水炒透○如足痛腫者入大腹皮分半木瓜三錢○如足痛而兼熱者入地骨皮三錢

○○第貳佰六四方○姜活導滯湯

治風溼實滯脚氣若係素虛弱者不可用

姜活

三分

獨活

二分

防已

二分

當歸

二分

桔實

半分

生軍

二錢
酒炒

煎服微利即止

不宜
過服

○○第貳佰六五方○桔實大黃湯

治溼滯脚氣體氣強壯而爲實邪者宜之稍虛切不可用勿得孟浪

姜活

錢半

當歸

二錢

桔實

八分

大黃

三錢
酒炒

空心煎服以利爲度

○○第貳佰六六方○初生開口法

春夏秋三季內以甘草一朮泡水用綿帛裹指蘸汁滿拭其口使口中穢物流出然後用核桃肉去淨薄皮搗露取汁和紅糖少許徐徐喂之俟對時再行哺乳○或拭口之後用保赤散貳三分服之再以桃核汁續進亦可○冬季內以生姜湯拭口蓋姜去胃寒通神明可免瀉吐之患此法最妙人所少知也拭口後其法如前○如初生兒甚肥厚面色紅赤唇色紅紫者胎火甚重於拭口之後即用川連一朮甘草五分泡水徐徐喂之亦續進核桃汁兒口中流出白沫愈多愈好免一切之病

○○第貳百六七方○萬應保赤散

此治小兒寒食凝滯急慢驚風痰涎壅甚并撮口臍風及初生拭口後以此調服貳三分可能療諸

病余製此散而濟人甚多無不應驗此分兩係一料之藥如小兒分作三次服初生小兒作五分服如施濟人照原方分兩或十倍二十倍合之重則五分輕者三分

眞牛黃

三厘

川連

五厘

硃砂

三厘

青黛

五厘

上冰片

三厘

珍珠

三厘

生軍

三分

赤金

五分

人中白

三厘

百草霜

五分

蟬腿

七只用銀挖插入香油燈火上燒焦

共乳極細未用鈎藤薄荷各五分前湯調服

〇〇第貳佰六八方〇龍膽湯

治胎驚壯熱臍風撮口

胆草

勾藤

柴胡

王芩

赤芍

桔梗

雲苓

以上五分

大王

一分紙裏浸溼炮熟

煎服

〇〇第二伯六九方〇保生湯

治臍風胎風鎖肚口噤

妨風

七分

桔壳

炒五分

橘紅

四分

伏神

三分

芥穗

三分

遠志

去心四分

桔梗

三分

南星

五分
羌汁製

甘草

二分

燈心五節煎服

〇〇第二伯七十方〇抱龍丸

治風痰壅甚或發熱欬嗽或發驚搐等症

胆草

四兩
九製

天竺黃

一兩

雄王

硃砂

已上
五錢

射香

五分
另研

共爲細末用甘草一觔煮極濃汁和勻搗丸每兩作二十九丸陰晾乾用薄荷湯下此方加牛黃即名

牛黃抱龍丸加琥珀即名琥珀抱龍丸今粵東陳李濟之丸卽此方也

〇〇第二七一方〇牛黃散

治小兒溫熱壯熱或寒熱往來急驚

真牛黃

甘草

以上五錢

柴胡

枝子

酒炒

胆草

酒炒

黃芩

酒炒以上二錢五分

右爲末每服五七分以金銀全薄荷煎湯調服

〇〇第二七二方〇利驚丸

治急驚

天竺黃

二錢

黑牽牛

五錢炒

輕粉

一錢

青黛

一錢

共爲末蜜爲丸如豌豆大每歲一丸用薄荷湯下

〇〇第二七三方〇抑青丸

治肝熱急驚抽搐〇此方加大黃二兩梔仁八錢卽名瀉青丸

姜活一兩 川弓七兩 當歸一兩 妨風一兩 胆草二兩

共爲末蜜丸如茨實子大每服一二丸竹葉五片煎湯入沙糖化下○此丸作煎劑亦可以十分之一用如用大黃梔仁亦以十分一用之○再加熟地五七兩准藥三五兩作煎劑亦可

○○第二七四方○安神鎮驚丸

治小兒驚退後調理安心神養氣血或將驚而預防之此丸已驚將驚先後皆可用

竹黃另研 洋參 南星姜製 伏苓以上五兩 棗仁炒

當歸 麥冬 生地 白芍炒以上各三兩

薄荷 木通 枝子 川連姜汁炒 硃砂另研

牛王另研 煨龍骨以上二兩 青代一兩另研