

活人慈航

外科要訣

外科要訣

臨
鑑
末
下

家藏社診活人慈航外科要訣目錄

脉法

癰疽

久漏瘡

頭部

百會疽

佛頂疽

鬚疽

耳發

腦後發

顳疔

頰瘍

眉心疽

透腦疽

額疽

天疽銳毒

耳根毒

腦線

面發毒

發頭一名汗毒

龍泉疽

侵腦疽

勇疽

耳後疽

玉枕疽

顳瘍顳疽

疔腮一名含腮瘡

眉發

頰癰

骨槽風一名穿腮發

時毒

髮際瘡

羊鬍瘡

油風

白屑風

面遊風

癩頭瘡

軟癬

雀斑

黑痣

鰲黑肝黧一名鰲黑癍

頭風傷目

項部

腦疽

天柱疽

魚尾毒

百脉疽

結喉癰一名猛疽

夾喉癰一名夾疽

上石疽

失榮症

鈕扣風

癰癰

背部

上發背

小中發背
下發背

上搭手

中搭手一名龍疽

下搭手

蓮子發一名大陰疽

蜂窩發

陰陽二氣疽

串疽

酒毒發

連珠發

丹毒發

禽疽

痰注發

黃水癰

腰部

腎俞發

中石疽

纏腰火丹 一名蛇串瘡

胸乳部

甘疽

臈中疽

脾發毒

井疽

蜂窩疽

蠱疽 一名蛇五疽

瘰癧癰

內外吹乳

乳癰乳疽

乳發乳漏

乳中結核

乳勞

乳岩

腹部

幽離

中腕疽

赫疽

衝疽

腹皮癰

腋疽

淵疽

眼部

眼胞菌毒

眼胞癰核

漏睛瘡

鼻部

鼻疽

瘡痔

酒皸鼻

五部

臍癰

緩疽

暗疔

內發丹毒

眼丹

椒瘡粟瘡

目中努肉

鼻疔

鼻痔

少腹疽

腋癰

肋疽

脇癰

鍼眼

皮剝症

鼻蟲瘡

肺風粉刺

黑疔

耳疳

耳衄

耳痔

月蝕瘡

口部

口瘡

驚口瘡

口糜

唇部

唇疔

唇疽

滿唇

唇風

齒部

牙衄

牙宣

鑽牙疳

牙疔

牙癰

走馬牙疳

牙齒痛

齒齲

肩部

肩中疽

膠疽

肩風毒

樂疽

臍部

自肩至肘曰臍

臍癰

魚肚發

肘癰

臂部

自肘至腕曰臂

臂癰

腕癰

穿骨疽

骨蠹疽

手部

手發背

掌心毒

病鰕

手丫發

蛇頭疔

附天蛇毒

蛇疔

蟻螂疔

滴瘡

鷓鴣手風

石榴疽

兌疽

蜈蚣串

虎口疽

調疽

代指

尿尿刺

下部

惡癰

便毒

一名血疔又名便毒

腎囊癰

腎部

鵝口瘡

上馬癰

附下馬癰

痔瘡

股部

附骨疽

附骨疽

伏兔疽

腿遊風

膝部

穿襠發

下疳瘡

腎囊風

坐馬癰

湧泉疽

坐板瘡

股陰疽

環跳疽

附股陽疽

青腿牙疳

騙馬墜

陰虱瘡

婦人陰瘡

腎癰

臍毒

橫痃疽

附陰疽

箕門癰

附肚門癰

膝癰疽

膝眼風

鶴膝風

下石疽

緩疽

委中毒

上水魚

人面瘡

脛部

三里發

腓腓發

黃鰍癰

青蛇毒

接骨發

附陰疽

內踝疽

附外踝疽

穿踝疽

淫毒流注

腎氣遊風

瘰癧

鱧漏

四彎風

風疽

足部

足發背

湧泉疽

脫疽

救疽

甲疽

足跟疽

屬離四淫

臭田螺

牛程癰

土栗

田螺炮

發無定處

疔瘡

多骨疽

療疽 一名蛇瘡

赤白遊風

瘰癧風

枯筋箭

黃水瘡

產後癰疽

痞瘤

貓眼瘡

冷疔

肉刺

流注

結核

楊梅瘡

紫白癰風 即汗斑

丹毒

疥瘡

暑令瘍毒小癰

翻花瘡

浸淫瘡

魚脊瘡

腳氣瘡

癰瘤

痼發

楊梅結毒

白駁風

粟瘡

癬

瘡疽

血風瘡

火赤瘡

骨癭瘡

風疔

漆瘡

股痛

雜症部

杖瘡

一發瘰

人咬傷

竹木刺入肉

蚯蚓傷

嬰兒部

赤遊丹毒

血疔

肌衄一名血箭

瘡口誤入毒水

夾傷

湯火傷

狼虎傷

馬咬

草內蜘蛛毒

升打靈藥

白疔

血瘰

諸瘡生蠅蛆

破傷風

一凍瘡

蛇咬傷

射工傷

蠅虻傷

一名蛇虱

家藏袖珍活人慈航第拾壹卷

信集下

福建汀州府長汀縣監生鄭

諱玉成字紹宗號直方纂輯

邑庠生男汝恭直少

外科要訣

脉法

脉數身無熱內有癰膿脉數應當發熱而反惡寒若有痛

處當發癰脉數不時見當生惡瘡

百效脉法癰疽脉數陽浮沈陰浮數不熱仁惡寒侵若知痛
處急灸或針洪數病進將有膿成滑實緊促發表可禁宜
托裏者脉虛濡遲或芤濇微潰後亦宜長緩易治短散則
危結促代見必死無疑

諸脉浮數當發熱其不發熱而洒淅惡寒若有痛處必發癰

疽脉微而遲弱而數反振發寒當發癰疽脉浮而數身體無熱形嘿嘿胸中微躁不知痛之所在其人必發癰疽

醫宗脉法

癰見疽脉疽見癰脉

癰脉脉宜洪大數若逢

牢短化膿難疽脉最宜沈與弱浮大且散命歸泉

伏脉癰疽伏脉理當明毒閉於經六脉停審症無凶宜穿發氣通脉道自然行

浮脉腫瘍浮脉恐多虛或有風寒在表居潰後脉浮氣外瀉

頻加補劑始相宜

沈脉腫瘍沈脉多毒閉潰後多毒在內存無力須詳毒已陷

遲寒數熱更當分

數脉腫瘍數脉宜熱毒數且兼洪欲作膿潰後數大為病進

膿出洪數治無功

膏脉腫瘍滑脉尚為順初起有痰治痰宜潰後痰多恐氣乏

喘生毒陷死之機

瀉脉腫瘍瀉脉屬毒滯有力為實無力虛潰後脉瀉為傷血
急補氣血莫遲矣

虛實脉腫瘍脉虛宜內托潰後內虛大補甯腫瘍脉實宜消
散潰後如實毒未清

長脉腫瘍長脉為有餘消散之方任所施潰後得之為氣治
候然和暢不須醫

短脉腫瘍短脉元氣虛大加補劑始相宜潰後脉短為虛甚
補之仍短決死期

洪脉腫瘍洪脉陽熱盛宣熱攻毒必有功潰後洪脉毒留內
治之不退自然凶

微脉腫瘍微脉為虛候內托受補始能痊潰後見此雖為順

微細無神作逆觀

脉法

動緊脉腫瘍將發脉動緊乃因毒氣外搏經潰後見之毒內搏此為殘賊症不輕

緩脉腫瘍緩脉何須藥和緩從容最吉祥潰後見之為胃好便和飲食自然康

芤弦脉腫瘍芤脉血原虛潰後見芤理所宜腫瘍弦脉邪作痛潰後而弦邪病脾

牢脉腫瘍牢脉為邪固未作膿時脉見牢已潰見牢邪難已結核癰癰不能消

濡弱脉腫瘍濡弱脉不足扶虛托裏始能痊潰後雖為永病應但無虛候始得安

散脉腫瘍散脉最可愁毒盛氣散不能收潰後見斯亦為逆急投補固或無憂

大細脉腫瘍脉大為順候潰後脉大不相宜腫瘍潰後脉細