

家庭



养花赏花

全书

徐晔春 王华新 龙定健 / 编著



10月10日 晴
星期三



海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

JIATING YANGHUA SHANGHUA QUANSHU

家庭养花赏花

全书

徐晔春 王华新 龙定健 / 编著



海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建科学技术出版社
FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

家庭养花赏花全书 / 徐晔春, 王华新, 龙定健编著. —福州: 福建科学技术出版社, 2012.12

ISBN 978-7-5335-4123-1

I. ①家… II. ①徐… ②王… ③龙… III. ①花卉—观赏园艺 IV. ①S68

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第227761号

- | | |
|------|------------------------|
| 书 名 | 家庭养花赏花全书 |
| 编 著 | 徐晔春 王华新 龙定健 |
| 出版发行 | 海峡出版发行集团
福建科学技术出版社 |
| 社 址 | 福州市东水路76号 (邮编350001) |
| 网 址 | www.fjstp.com |
| 经 销 | 福建新华发行 (集团) 有限责任公司 |
| 印 刷 | 福州德安彩色印刷有限公司 |
| 开 本 | 889毫米×1194毫米 1/32 |
| 印 张 | 7 |
| 图 文 | 224码 |
| 版 次 | 2012年12月第1版 |
| 印 次 | 2012年12月第1次印刷 |
| 书 号 | ISBN 978-7-5335-4123-1 |
| 定 价 | 28.00元 |

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换



目录

养花基础知识

养花常用基质及选配/1
花卉常用繁殖方法/2

花卉的浇水/3
花卉的施肥/4


常见病虫害防治/5

一二年生花卉

醉蝶花/6
欧洲报春/6
一串红唇/7
蓝花鼠尾草/7
一串红/8
银边翠/8
凤仙花/9
旱金莲/9
福禄考/10
蜀葵/10
玫瑰茄/11
锦葵/11
雏菊/12
五色菊/12
金盏菊/13
翠菊/13
矢车菊/14
黄晶菊/14
白晶菊/15

秋英/15
异果菊/16
松果菊/16
勋章菊/17
麦秆菊/17
皇帝菊/18
蓝目菊/18
瓜叶菊/19
黑心菊/19
桂圆菊/20
万寿菊/20
小百日草/21
百日草/21
角堇/22
三色堇/22
地肤/23
月见草/23
美丽月见草/24
洋桔梗/24

飞燕草/25
大花飞燕草/25
半支莲/26
美女樱/26
圆叶节节菜/27
紫水晶/27
指天椒/28
花烟草/28
矮牵牛/29
乳茄/29
香雪球/30
苋/30
鸡冠花/31
千日红/31
百可花/32
蒲包花/32
毛地黄/33
姬金鱼草/33
夏堇/34



毛蕊花/34
花菱草/35

虞美人/35
琉璃苣/36

紫茉莉/36

常绿花卉

天门冬/37
狐尾武竹/37
蜘蛛抱蛋/38
万年青/38
吊兰/39
鹤望兰/39
彩叶草/40
花叶薄荷/40
特丽莎香茶菜/41
紫叶酢浆草/41
新几内亚凤仙/42
非洲凤仙花/42
虎耳草/43
西瓜皮椒草/43
荷叶椒草/44
白脉椒草/44
花叶艳山姜/45
姜荷花/45
姜花/46

红网纹草/46
金球菊/47
银叶菊/47
大吴风草/48
非洲紫罗兰/48
大花马齿苋/49
捕蝇草/49
天竺葵/50
北美瓶子草/50
花叶冷水花/51
竹节秋海棠/51
丽格秋海棠/52
铁十字秋海棠/52
四季秋海棠/53
铁筷子/53
君子兰/54
文殊兰/54
时钟花/55
黄时钟花/55

香石竹/56
白柄粗肋草/56
广东万年青/57
亚莉皇后/57
观音莲/58
红掌/58
花叶芋/59
黛粉叶/59
花叶万年青/60
金钻蔓绿绒/60
春羽/61
白鹤芋/61
金钱树/62
花菖蒲/62
巴西鸢尾/63
猪笼草/63
青苹果竹芋/64
观赏凤梨/64

宿根花卉

红鹿子草/65
萱草/65
大花萱草/66
玉簪/66
紫萼/67
美国薄荷/67
羽扇豆/68
红车轴草/68

宿根福禄考/69
荷兰菊/69
菊花/70
石竹/70
剪秋罗/71
肥皂草/71
瓷玫瑰/72
桔梗/72

流星花/73
半边莲/73
芙蓉葵/74
山桃草/74
欧洲银莲花/75
欧耧斗菜/75
芍药/76
舞春花/76

千屈菜/77
荷包牡丹/77

射干/78
德国鸢尾/78

兰科花卉

建兰/79
蕙兰/79
春兰/80
春剑/80
莲瓣兰/81
墨兰/81
大花蕙兰/82

春石斛/82
秋石斛/83
聚石斛/83
美花石斛/84
金钗石斛/84
球花石斛/85
大花杓兰/85

鹤顶兰/86
卡特兰/86
文心兰/87
杂交蝴蝶兰/87
海南钻喙兰/88
兜兰/88

球根花卉

风信子/89
铁炮百合/89
杂交百合/90
卷丹百合/90
葡萄风信子/91
红花酢浆草/91
宫灯百合/92
郁金香/92
大岩桐/93
大丽花/93

花毛茛/94
大花美人蕉/94
百子莲/95
垂筒花/95
南美水仙/96
网球花/96
朱顶红/97
石蒜/97
红口水仙/98
洋水仙/98


水仙/99
葱兰/99
韭兰/100
小韭兰/100
马蹄莲/101
彩色马蹄莲/101
小苍兰/102
唐菖蒲/102
网脉鸢尾/103
番红花/103

水生花卉

睡莲/104
荷花/104

香菇草/105
芙蓉莲/105

粉绿狐尾藻/106
梭鱼草/106



观赏蕨类

金毛狗/107
银脉凤尾蕨/107
翠云草/108

二歧鹿角蕨/108
肾蕨/109
鸟巢蕨/109

铁线蕨/110
长生铁角蕨/110

多浆花卉

金边龙舌兰/111
芦荟/111
酒瓶兰/112
金边虎尾兰/112
凤尾兰/113
虎刺梅/113
佛肚树/114
心叶冰花/114
鹿角海棠/115
松叶菊/115

生石花/116
火祭/116
石莲花/117
长寿花/117
趣蝶莲/118
褐斑伽蓝/118
子持年华/119
沙漠玫瑰/119
翡翠珠/120
爱之蔓/120

斑叶树马齿苋/121
兜/121
般若/122
山吹/122
狂刺金琥/123
昙花/123
火龙果/124
雪光/124
仙人指/125
蟹爪兰/125

棕榈植物

袖珍椰子/126
散尾葵/126

棕竹/127
多裂棕竹/127

藤本植物

文竹/128
红尾铁苋/128
鸾叶羊蹄甲/129
蝶豆/129
多花紫藤/130
紫藤/130
星果藤/131
黑眼花/131

软枝黄蝉/132
紫蝉花/132
飘香藤/133
金香藤/133
花叶蔓长春/134
毛萼口红花/134
珊瑚藤/135
青蛙藤/135

风铃球兰/136
球兰/136
斑叶心叶球兰/137
棉德岛球兰/137
夜香花/138
蓝花藤/138
红萼龙吐珠/139
艳颊桐/139

龙吐珠/140
金钩吻/140
铁线莲/141
云南黄素馨/141
异叶地锦/142
地锦/142
薜荔/143
麒麟尾/143
红宝石喜林芋/144
龟背竹/144
绿萝/145

合果芋/145
金杯藤/146
黄木香花/146
洋常春藤/147
常春藤/147
西番莲/148
鸡蛋果/148
五爪金龙/149
茛萝/149
槭叶茛萝/150
牵牛/150

圆叶牵牛/151
金银花/151
叶子花/152
凌霄/152
美洲凌霄/153
粉花凌霄/153
紫芸藤/154
蒜香藤/154
炮仗花/155
硬骨凌霄/155

观赏灌木

千年木/156
金黄百合竹/156
蓝雪花/157
羽叶薰衣草/157
迷迭香/158
变叶木/158
一品红/159
花叶木薯/159
金凤花/160
红粉扑花/160
朱缨花/161
锦鸡儿/161
紫荆/162
跳舞草/162
西洋杜鹃/163
石楠杜鹃/163
毛鹃/164
杜鹃/164
海桐/165
红木/165
八仙花/166
圆锥绣球/166

长春花/167
狗牙花/167
夹竹桃/168
玫瑰木/168
银脉爵床/169
虾衣花/169
鸟尾花/170
珊瑚花/170
可爱花/171
金苞花/171
金脉爵床/172
蓝花草/172
红花芦莉草/173
硬枝老鸦嘴/173
红榿木/174
金粟兰/174
金铃花/175
小木槿/175
观赏苘麻/176
木芙蓉/176
扶桑/177
木槿/177

悬铃花/178
蜡梅/178
米兰/179
倒挂金钟/179
结香/180
马利筋/180
气球果/181
杜虹花/181
重瓣臭茉莉/182
蓝蝴蝶/182
五色梅/183
牡丹/183
连翘/184
迎春/184
茉莉花/185
山指甲/185
含笑/186
日本贴梗海棠/186
贴梗海棠/187
金边瑞香/187
火棘/188
现代月季/188

玫瑰/189
黄刺玫/189
棣棠/190
白蟾/190
希茉莉/191
龙船花/191
红纸扇/192
粉萼花/192
六月雪/193
虾仔花/193
鸳鸯茉莉/194
大花鸳鸯茉莉/194
珊瑚豆/195

神秘果/195
红瑞木/196
茶梅/196
黄金榕/197
石榴/197
南美苏铁/198
松红梅/198
孔雀木/199
熊掌木/199
八角金盘/200
小檗/200
南天竹/201
蓝星花/201

炮仗竹/202
石海椒/202
巴西野牡丹/203
接骨木/203
红王子锦带/204
佛手/204
金橘/205
金弹/205
九里香/206
兰屿肉桂/206
黄钟花/207
朱砂根/207

观赏乔木

金心也门铁/208
巴西铁/208
无刺构骨/209
栗豆树/209
吊钟花/210
鸡蛋花/210

瓜栗/211
灰莉/211
白兰花/212
夜合花/212
南洋杉/213
桃花/213

苏铁/214
茶花/214
晃伞枫/215
紫薇/215
菜豆树/216
海南菜豆树/216





养花常用基质及选配

不同的花卉所需基质也不同，因此在栽培养护过程中须根据不同植物进行配制，以满足花卉生长的需求。

(1) 园土 耕地表层熟化的土壤，土质较肥沃，以菜园土为佳。园土干后易板结，一般不单独使用。

(2) 泥炭土 为古代沼泽植物埋藏地下分解不完全而形成的，排水性和透气性良好，保水能力强，是花卉栽培常用的材料。

(3) 腐叶土 由落叶、杂草及菜叶等与土壤分层堆积1~2年腐熟发酵而成。含丰富的有机质，呈弱酸性。山中自然形成的腐叶土常称为山泥，多用于喜酸性土壤的花卉。

(4) 塘泥 池塘或湖泊中的沉积土，有机质含量高。晒干打碎后使用，可单独使用，也可以与其他基质混合使用。

(5) 河沙 质地纯净，通气透水性好，不含肥力，无病菌，可用于调制培养土。常用于扦插繁殖，是栽培多肉植物的重要配料之一。

(6) 木炭块 质轻，是木材经高温烧制而成，无病菌，常用于附生兰栽培。

(7) 石块 质重，排水性好，常用于附生兰栽培。

(8) 陶粒 黏土、粉煤灰、页岩、煤矸石等经高温烧制而成，规格有多种，常用于附生植物栽培或水培。

(9) 树皮块 规格有多种，质量参差不齐，排水性好，有一定的保水保肥作用，常用于兰花栽培。

(10) 兰石 也叫浮石，是由火山喷发所形成的，孔隙大，排水性、保水性、保肥性均较好，常用于兰花、多肉植物栽培。

此外，常用的基质还有砵糠灰、炉灰渣、椰糠、木屑、蕨根等，各地可根据情况就地取材，用于配制花卉所需的营养土。

选配基质时，必须根据花卉的生长习性，以及基质的排水性、透气性、肥力、土壤的酸碱度等进行配制。例如兰花类、多肉植物类要求基质疏松透气，排水性要好，忌积水，可选用腐叶土、陶粒、树皮块等配制而成。



花卉常用繁殖方法

(1) 播种繁殖 播种繁殖也就是实生苗繁殖。通过播种得到的苗株根系发达，寿命长，适应性强，但不易保持原品种的优良特性。

不同种子播种时期不同。北方原产的树木种子秋季果熟后，或秋播或通过沙藏第二年春季播种。有的种子生命力较短，如鹤望兰，则随采随播。大部分草花种子在北方多春播，在南方温度适合，则一年四季均可播种。

(2) 扦插繁殖 扦插繁殖是用植物的营养器官如根、茎、叶插入基质中，使之生根，抽枝长成完整的植株。它的优点是繁殖材料充足、产苗量大、成苗快、开花早，并能保持原品种的优良特性，适于家庭采用。

扦插可分为草本扦插和木本扦插。草本扦插又可分为叶插、嫩枝扦插、叶芽插、根插；木本扦插分为嫩枝扦插和硬枝扦插。扦插时间多在春、夏、秋三季，温室内一年四季均可进行。大部分植株扦插时要求基质湿润及较高的空气湿度，但多浆植物扦插时，基质微润即可，过湿则易腐烂。

(3) 分生繁殖 分生繁殖是植物营养繁殖方法之一，将植株长出的幼植株体，如萌蘖与母株分离另行栽植而成为独立新植物的繁殖方法。分生繁殖是最简单、最可靠的繁殖方法。

落叶花木类分株繁殖最好在休眠期进行，北方多在早春进行，华南地区可在秋季落叶后进行。常绿花木有明显的休眠期，但是不论南方还是北方，在冬季大多停止生长而进入半休眠状态，这时树液流动缓慢，因此多在春初分株。分球多于休眠期或半休眠期时进行，一般花期不要分株。分株时伤口需涂草木灰，以防止球茎腐烂。

(4) 嫁接繁殖 嫁接繁殖用繁殖体（茎、芽、球体）把两种不同植物结合在一起，使之愈合，形成一个独立的新个体，供嫁接用的繁殖体叫“接穗”，而接受接穗的植株叫“砧木”。

嫁接繁殖以春、夏、秋三季较为适合，以春秋为佳。但因花木的种类及嫁接的方法不同而有异，一般的枝接在树液开始流动前进行，芽接宜在夏末秋初接穗腋芽已发育充实时进行为佳。菊花在其生长期均可进行嫁接，仙人掌类植物可周年进行。



花卉的浇水

花卉原产地不同，对水分的需求量也不同。大致上可以把它划分成旱生花卉、中生花卉、湿生花卉和水生花卉4种。

旱生花卉多生于干旱的沙漠或荒漠地带，对水分需求极少，生长期稍湿润即可，休眠期宜干燥，过湿则出现烂根及植株死亡现象。如金琥、新天地、花座球、玉翁等，浇水掌握宁干勿湿的原则，具体来说，土壤基本干透时浇1次透水，不能长期过湿及积水，保持土壤含水量15%~25%。

中生花卉对水分需求中等，不能在过干或过湿的环境中生长，比较适宜生长在湿润的土壤中。这类花卉极多，也是目前栽培最多的植株，如凌霄花、玫瑰、月季、栀子、杜鹃、山茶、米兰、白兰花等。浇水掌握见干见湿的原则，即土壤表面干燥后浇1次透水，注意不要浇拦腰水。

湿生花卉多生于沼泽及湿地，对水分要求较高，适合在潮湿的环境中成长，不耐干旱。这类花卉如大部分蕨类、美人蕉类、芦竹、香菇草等。土壤宜保持潮湿，不可过干或积水。

水生花卉则必须生活于水中，离开水极易导致植株死亡。如睡莲、荷花、王莲、梭鱼草、水葱等。

一般家养花卉的浇水，必须掌握见干见湿的原则。有人喜欢不时往花盆里倒点水，这样造成盆土局部长期处于湿漉漉状态，而有的地方长期处于干燥状态，花卉必然生长不好，甚至导致死亡。家养发财树大多是由于浇水过多引起烂根，最后导致死亡。

浇水，在植株生长的不同时期、不同种类应区别对待。如播种育苗期，如种子细小，宜用浸水法浇水或用细眼喷雾浇水；一些成株的园林树木可用水管浇水；像大岩桐等叶子带有绒毛的，浇水要小水慢浇，不要弄污叶片。但无论如何浇水，最好水温与土壤温度一致，防止温差过大对植株造成生理性伤害。

花卉何时浇水？这主要是通过观察基质的干湿来判断。当然，不同的植物对土壤干湿要求不同，如土壤表面发白，说明进入半干状态，这时可根据植株的种类确定是否浇水。



花卉的施肥

肥料可分为无机肥料、有机肥料两大类。

常见的无机肥料有：氮肥，如尿素、硫酸铵和硝酸铵等，可为植物提供速效氮；磷肥，如过磷酸钙及磷矿粉等，有助于花芽分化，能强化植物的根系，并能增加植物的抗寒性；钾肥，如氯化钾和硫酸钾，可增强植物的抗逆性和抗病力；复合肥种类较多，也是最常用的肥料之一，如磷酸二氢钾、花多多、康普等。有些厂家根据不同花卉的特性，推出了一些花卉专用肥，如观叶植物专用肥、仙人掌类专用肥等，一般施用浓度1000~2000倍；一些附生兰类，如蝴蝶兰，施肥浓度3000~4000倍，可根据说明书使用。

常用的有机肥料有：饼肥类，是用麻酱渣、豆饼、花生饼、棉籽饼、菜籽饼沤制而成，含有大量的氮、磷、钾及微量元素。用罐及瓶沤制时产生的气体可能将罐瓶胀破，因此不能绝对密封，以免发生危险。可在沤肥容器内放几块橘子皮，以减少臭味。沤制时间2~3个月，依温度高低而定。施用时可将上面的清液对水20~30倍后浇灌，清液取出后还可加水继续沤制。鸡鸭粪，是磷肥的重要来源，含氮量也较高，使用前也要堆沤，时间大约2个月。动物内脏，可用堆制方法处理，在室外找一块空地，挖坑埋入土壤中，并加入一些杀虫剂，经几个月后即可成为高效的有机肥。此外，在日常生活中也可搜集沤制有机肥的原料，如残余的菜叶、霉烂的黄豆、花生等均可沤制使用，而且肥效高，制法简单。

花卉的施肥，必须根据不同植物种类、不同生长时期以及不同季节等决定肥料的种类和施肥次数。发财树、富贵树、喜林芋等观叶植物可施以氮为主的肥料，朱顶红、大岩桐、仙客来等球根花卉应多施磷钾肥。一般在苗期及生长期，可施含氮量较高的肥料；在花芽分化及开花期，宜增加磷钾肥的用量，以促进花芽分化及提高植株抗性。春秋季节，花卉生长快，可多施肥；冬季，花卉处于休眠期，一般不施肥。无论什么花卉，施肥忌浓肥、重肥，以薄肥勤施为佳。



常见病虫害防治

花卉病虫害较多，在养护时需注意防治。常见的虫害有蚜虫、粉虱、红蜘蛛、介壳虫、蓟马、叶蝉等，常见的病害有煤烟病、炭疽病、立枯病、锈病、黑斑病、白粉病、猝倒病、软腐病等。

家养花卉使用农药防治病虫害，最好采用低毒农药并严格按说明书使用。喷时将花卉搬出室外喷施，一天后再搬入室内。常用的杀虫剂有毒死蜱、氧乐果、溴氰菊酯、三氯杀螨醇等，常用的杀菌剂有波尔多液、百菌清、多菌灵、甲基硫菌灵、代森锰锌、硫酸链霉素等。

值得注意的是，对于病害，在用药前要分清是真菌病还是细菌病（细菌病往往植株腐烂部分会发出臭味），否则用治细菌病的农药（硫酸链霉素等）治真菌病，或用治真菌病的农药（甲基硫菌灵等）治细菌病，那是没有效果的。如一时无法分清是真菌病还是细菌病，则只好两类药混用，也可选用兼治两类病的商品农药（如花康等）。

因农药对环境有一定的污染，且气味难闻，特别是有小孩及孕妇的家庭不要使用，以防中毒或产生不良影响。也可用植物等制成农药防治病虫害。

①把花椒按重量比1：10加水，煮成5份原液，再加水10倍稀释喷雾，可防治白粉虱、蚜虫。

②取烟叶按重量比1：10加水，浸泡1天，取出滤液浸透盆土，可杀死盆内的蚂蚁；或取滤液加等量水稀释，再加肥皂少许，可防治蚜虫、红蜘蛛、蓟马、叶蝉等。

③取大葱捣烂，按重量加1.5倍的水过滤喷雾，可防治白粉病，也可防治蚜虫。

④将辣椒按重量比1：10加水，煮沸半小时，取滤液喷雾，可防治蚜虫、椿象。

⑤取韭菜捣烂，按重量比1：7加水，然后搅匀取滤液喷雾，可防治锈病，也可防治蚜虫。

⑥把大蒜捣烂，按重量比1：1加水搅匀后过滤，再加3倍水稀释喷雾，可防治白粉病、灰霉病、根腐病，也可防治蚜虫、红蜘蛛等。

Tarenaya hassleriana

醉蝶花

(凤蝶草、紫龙须、西洋白花菜)

种植难度: ★☆☆☆☆

市场价位: ★☆☆☆☆

光照指数: ★★★★★

浇水指数: ★★★★★

施肥指数: ★★★★★



辨识要点:

山柑科白花菜属草本。株高60~100厘米。掌状复叶，小叶，椭圆状披针形或倒披针形。总状花序顶生，花白色到淡紫色，蒴果。花期6~9月，果期末秋初。

行家叮嘱

如植株过高，需设支柱防倒伏。



培养要诀:

播种繁殖，春、夏、秋三季均可。喜阳光充足及温暖的环境，对土壤要求不高，较耐热。生长期控制水分及氮肥的施用量，以防徒长，开花后停止施肥。如盆栽宜选择腐叶土或肥沃的菜园土。



Primula vulgaris

欧洲报春

(德国报春、西洋樱草)

种植难度: ★★★★★

市场价位: ★★★★★

光照指数: ★★★★★

浇水指数: ★★★★★

施肥指数: ★★★★★



辨识要点:

报春花科报春花属一二年生草本。丛生，高约20厘米。叶基生，长椭圆形。伞状花序，花有红色、粉红色、紫色等，花心黄色。花期秋冬。



培养要诀:

播种繁殖，春至秋均可。性喜温暖、湿润及凉爽通风的环境，不耐酷热。生长适温12~18℃。土壤以肥沃、疏松的微酸性壤土为佳。忌偏施氮肥，以防开花减少。花芽分化时，不宜置于高温的地方。

行家叮嘱

定植不要过深过浅。施有机肥时不要污染叶片，以免叶片焦枯。



辨识要点:

唇形科鼠尾草属一年生草本。株高60~90厘米。叶长心形，叶缘有钝锯齿。总状花序，花冠红色。花期春夏，果期秋季。



培养要诀:

春至秋均可播种，种子喜光，播后不覆盖。性喜温暖及阳光充足的环境，生长适温20~28℃。土壤以肥沃的壤土或沙质壤土为佳。定植成活后摘心1次。土壤表面干后可补水，肥料以复合肥为主，可随浇水追施，每月1次。

Salvia coccinea

一串红唇

(朱唇、红花鼠尾草)

种植难度: ★☆☆☆☆

市场价位: ★☆☆☆☆

光照指数: ★★★★★

浇水指数: ★★★★★

施肥指数: ★★★★★



行家叮嘱

花谢后及时将残花剪掉，可促发新的花芽而继续开花。

Salvia farinacea

蓝花鼠尾草

(粉萼鼠尾草)

种植难度: ★☆☆☆☆

市场价位: ★☆☆☆☆

光照指数: ★★★★★

浇水指数: ★★★★★

施肥指数: ★★★★★



辨识要点:

唇形科鼠尾草属一二年生草本。株高30~60厘米。叶对生，长椭圆形。花紫色或白色，具芳香。花期春夏，果期秋季。



培养要诀:

春至秋均可播种。喜温暖及阳光充足的环境，耐热，喜疏松、肥沃的壤土。定植后具3对真叶时摘心1次，保持土壤湿润，土壤表面稍干即可浇水。生长期每半月施肥1次，以复合肥为主。花芽分化时增施磷钾肥。

行家叮嘱

花后及时剪除花枝，促其再次开花。



Salvia splendens

一串红

(墙下红、西洋红)

种植难度: ★☆☆☆☆

市场价位: ★☆☆☆☆

光照指数: ★★★★★

浇水指数: ★★★★★

施肥指数: ★☆☆☆☆



辨识要点:

唇形科鼠尾草属多年生草本，常作一年生栽培。株高50~80厘米。叶对生，卵形。总状花序顶生，小花红色，花冠唇形。花果期5~10月。

行家叮嘱

在开花前温度控制在18~20℃，可形成良好的株形。



培养要诀:

春至秋播种，或扦插繁殖。一串红喜暖好阳，最适生长温度为20~25℃，耐高温，对土壤要求不严。定植后可摘心1~2次，促发侧枝。在生长期应控制水分，以防徒长，开花减少。半个月施1次复合肥，开花前增施磷钾肥，或间施鸡粪等有机肥，效果更佳。



Euphorbia marginata

银边翠

(高山积雪、象牙白)

种植难度: ★☆☆☆☆

市场价位: ★☆☆☆☆

光照指数: ★★★★★

浇水指数: ★★★★★

施肥指数: ★☆☆☆☆



辨识要点:

大戟科大戟属一年生草本。株高50~80厘米。叶卵形至长圆形。枝梢、叶片边缘或叶片大部分为银白色。花小。花期夏季，果期秋季。



培养要诀:

春季播种，1个月即可移栽。性喜温暖及充足阳光，不耐热、不耐寒，有一定的抗旱性。定植成活后，当苗高10~15厘米时摘心1次，可促进分枝。在生长期保持土壤稍干燥，半月随浇水追施1次速效性复合肥或饼肥等有机肥。

行家叮嘱

种子成熟后需随时采收，以防落地。成熟枝条可随时剪切瓶插。全株有毒，勿让小孩接触，以免误食。