

醫宗金鑑

卷四十八至
卷五十二

御纂醫宗金鑑卷四十八

編輯婦科心法要訣

驚悸恍惚證治

茯神散 加味歸脾湯

產後血虛心氣弱驚悸恍惚不安寧養心須用茯神散參耆地芍桂茯神琥珀龍齒歸牛膝憂思歸脾砂齒靈〔註〕產後血虛心氣不守神志怯弱故令驚悸恍惚不寧也宜用茯神散其方乃人參黃耆熟地白芍桂心茯神琥珀龍齒當歸牛膝也若因憂愁思慮傷心脾者宜歸脾湯加砂砂龍齒治之

歸脾湯 方見首卷

妄言見鬼發狂證治

妙香散

產後譫狂見鬼神敗血沖心小調經心虛悶亂妙香散二茯參耆遠志辰甘桂木麝山藥末歸地煎調效如神〔註〕產後敗血沖心狂亂見鬼譫言妄語者宜服小調經散若因心血虛神不守舍而悶亂者則用妙香散即茯苓茯神人參黃耆遠志辰砂甘草桔梗木香麝香山藥爲散以當歸熟地煎湯調服即愈其效如神

虛煩證治

人參當歸湯

產後血虛煩短氣人參當歸湯最良參麥歸芍熟地桂瘀血衝心失笑方去血過多煩躁甚須用當歸補血湯〔註〕產後血虛心煩短氣者宜人參當歸湯即人參麥冬當歸白芍熟地肉桂也若因敗血沖心者宜服失笑散若去血過多煩而躁者乃亡血證也宜當歸補血湯

當歸補血湯

失笑散 方俱見首卷

發渴證治

參麥飲

加味四物湯

竹葉歸耆湯

氣虛津短參麥飲血虛四物粉麥煎渴甚竹葉歸耆效參朮歸耆竹葉甘〔註〕產後氣虛津液不足而渴者宜參麥飲卽人參麥冬五味子也血虛而渴者宜四物湯加花粉麥冬若渴甚不解者用竹葉歸耆湯其方乃人參朮當歸黃耆竹葉甘草煎服也

四物湯

方見首卷

欬嗽證治

旋覆花湯

麥味地黃湯

加味佛手散

產後欬嗽感風寒旋覆花湯荆穗前麻杏半苓赤芍藥五味甘草棗薑煎虛火上炎沖肺嗽麥味六黃滋化源瘀血入肺佛手散加入桃紅杏貝延〔註〕產後欬嗽若因起動太早感冒風寒者用旋覆花湯卽荆芥穗前胡麻黃杏仁半夏茯苓赤芍藥五味子甘草旋覆棗薑也若因陰虛火炎上燔肺金而嗽者宜六味地黃加麥冬五味子名麥味地黃湯滋其化源若因瘀血上沖入肺而嗽者宜佛手散加桃仁紅花杏仁川貝母延胡索破其瘀其嗽自愈

六味地黃湯

佛手散

方俱見首卷

衄血證治

人參澤蘭葉湯

產後口鼻黑而衄胃絕肺敗藥難醫參蘭丹膝生熟地重便多沖萬一希〔註〕產後惡露不下虛火載血上行溢出血竅不循經脈變黑色見於口鼻爲熱極反兼水化故曰胃絕肺敗藥難醫也或用人參澤蘭葉湯卽人參澤蘭葉丹皮牛膝生地熟地煎湯多沖重便飲之間有得生者然亦希冀於萬一者耳

痢證總括

產後痢名產子痢飲食生冷暑寒干裏急後重有餘病日久滑脫不足看赤黃稠黏多是熱清微鴨瀉定屬寒寒熱溫清調補澀虛實新久要詳參〔註〕產後痢者名產子痢多因飲食不調貪食生冷或起居不慎衝寒受暑所致若腹中疝痛裏急後重者屬有餘之證若日久虛寒滑脫者屬不足之證痢色黃赤稠黏多屬於熱清稀澄澈如鴨糞者則屬於寒治之之法熱者清之寒者溫之冷熱不和者調之虛者補之實者瀉之虛實新久之間宜細心詳參也

痢疾證治

槐連四物湯

芍藥湯

真人養藏湯

熱痢槐連四物效冷熱有餘芍藥湯芍藥苓連歸木草枳桂堅橫痛大黃虛寒滑脫參朮桂芍藥訶蔻廣木香甘草粟殼名養藏日久十全大補良〔註〕熱者清之故熱痢宜槐連四物湯即四物湯加槐花黃連以清熱而堅腸也冷熱不和者調之故宜芍藥湯即白芍藥黃芩黃連當歸木香甘草肉桂檳榔堅者倍加檳榔痛加生大黃也若虛寒滑脫則宜溫補而固澀之宜真人養藏湯即人參白朮白芍藥肉桂肉豆蔻訶子木香甘草黨粟殼同煎服也若日久不止氣血大虛宜十全大補湯補之

四物湯

十全大補湯

方俱見首卷

人參敗毒散

香連丸

加味四物湯

有表痢用敗毒散羌獨枳梗共柴前參苓芍草薑葱引暑瀉成痢用香連血滲大腸成血痢四物膠榆餘鯛添〔註〕外感風寒成痢者宜人參敗毒散即羌活獨活枳殼桔梗柴胡前胡人參茯苓川芎甘草薑葱引也若因暑溼致病宜香連丸即黃連木香爲丸也若敗血滲入大腸成血痢者宜四物加阿膠地榆血餘烏鯛魚骨服之

四物湯

方見首卷

瘡疾

加味生化湯

加味二陳湯

藿香正氣湯

產後瘡多因瘀血榮衛不和熱寒兼生生化湯中加柴甲瘀食二陳查朴添外感不正正氣散陳半苓蘇朴甘腹皮桔梗藿香並引加薑棗一同煎〔註〕產後患瘡多因瘀血停留榮衛不和故寒熱往來也宜用生化湯加柴胡鱉甲服之若因瘀飲食積者宜二陳湯加山查厚朴若果外感風寒方可用藿香正氣散治之其方即陳皮半夏茯苓白朮蘇葉厚朴甘草大腹皮桔梗藿香白朮也

二陳湯

方見首卷

蓐勞虛羸總括

產後失調氣血弱風寒外客內停瘀飲食過傷兼勞怒不足之中挾有餘寒熱往來臍腹痛懶食多眠頭暈迷骨蒸盜汗痰嗽喘面黃肌瘦力難支蓐勞先須調脾胃後調榮衛補其虛〔註〕產後氣血兩虛起居不慎風寒外襲瘀血內停更或飲食厚味過傷憂勞忿怒乃不足之中挾有餘之證致生寒熱往來臍腹脹痛懶進飲食喜眠臥起則頭暈昏迷骨蒸潮熱盜汗自汗痰喘咳嗽面色萎黃肌肉削瘦氣力難支名為蓐勞醫治其難凡欲療斯疾者必當先調理其脾胃使飲食強健能勝藥力然後調其榮衛補其虛損始能痊愈

蓐勞虛羸證治

三合散

扶脾益胃但君子穀化精微氣血強能食漸覺精神爽調衛和榮三合良八珍去朮小柴其隨證加減效非常病退虛羸補氣血八珍十全養榮方〔註〕產後蓐勞治後當先扶脾益胃宜六君子湯加減用之使脾胃強壯能食能消則後天水穀之氣化生精微氣血自然壯盛精神自然漸爽然後調其衛氣和其榮血宜三合散即八珍湯去白朮加小柴胡湯乃人參柴胡黃芩半夏甘草也隨證加減治之如寒熱往來臍腹脹痛則去人參黃芩生地

加延胡桃仁如懶食喜睡頭眩則去柴胡加黃耆縮砂陳皮如骨蒸盜汗自汗則去川芎柴胡加鱉甲地骨皮牡蠣如痰喘咳嗽則去人參柴胡加麥冬川貝母百合如面黃肌瘦乏力則去柴胡川芎加黃耆倍用人參臨證消息之服後如諸證已痊惟覺虛羸者則以八珍十全養榮等方培補之

六君子湯

八珍湯

十全大補湯

益氣養榮湯

方俱見首卷

血崩

加味十全大補湯

加味逍遙散

產後亡血更血崩血脫氣陷病非輕十全大補膠升續棗仁山萸薑炭尋若因暴怒傷肝氣逍遙梔地白茅根瘀停少腹多脹痛佛手失笑效如神〔註〕產後陰血已亡更患崩證則是血脫氣陷其病非輕當峻補之宜用十全大補湯加阿膠升麻續斷棗仁山萸炮薑炭以升補其脫陷可也若因暴怒傷肝血妄行者宜逍遙散加黑梔生地白茅根以清之若因內有停瘀者必多小腹脹痛當用佛手散失笑散以補而逐之

十全大補湯

逍遙散

佛手散

失笑散

方俱見首卷

大便祕結

產後去血亡津液胃燥腸枯大便難飲食如常無所苦不須妄下損真元量其虛實通利導血旺津回聽自然〔註〕產後去血過傷其津液多致胃燥腸枯令大便祕結若飲食如常無脹滿之苦者不宜輕下反傷元氣惟宜量其虛實用諸導法待血旺津回便自然順利也

小便淋閉

加味四物湯

產後淋閉腹脹痛熱邪挾血滲胞中四物蒲瞿桃仁膝滑石甘草木香通〔註〕產後熱邪挾瘀血流滲胞中多令小便淋閉宜四物湯加蒲黃瞿麥桃仁牛膝滑石甘草梢木香木通治之

四物湯 方見首卷

小便頻數不禁淋瀝

黃耆當歸散

加味地黃湯

產後小便數且白腎虛不固自遺尿因產傷胞多淋瀝頻數補中益氣宜胞傷黃耆當歸治參耆朮芍草當歸不禁六味加桂附益智蠔蛸補骨脂〔註〕產後氣虛下陷多令小便頻數而色白腎虛不固小便自遺因產時穩婆不慎傷其胞脬多致小便淋瀝氣虛頻數者宜補中益氣湯升舉之傷胞淋瀝者宜黃耆當歸散補之其方卽黃耆當歸人參白朮白芍甘草也引用豬尿胞同煮服腎虛遺尿不禁者宜六味地黃湯加肉桂附子名桂附地黃湯更加益智仁桑螵蛸補骨脂治之

補中益氣湯

六味地黃湯

方俱見首卷

大便出血

加味芩黃四物湯

產後便血大腸熱四物芩連酒炒醫地榆阿膠荆穗炒蜜製升麻檳榔灰脾虛不攝歸脾效氣虛下陷補中宜〔註〕產後大便出血有因大腸經熱者宜芩連四物湯黃芩黃連俱酒炒黑用更加地榆阿膠荆芥穗微炒蜜製升麻棕櫚皮灰治之若因脾虛不能攝血者宜歸脾湯中氣下陷者補中益氣湯

芩連四物湯

歸脾湯

補中益氣湯 方俱見首卷

敗血成癰

加味生化湯

榮氣不從逆肉理敗血留內發癰疽只用生化加連翹銀花甘草乳沒宜切勿敗毒施過劑致令潰腐必難醫〔註〕產後氣血兩虛榮氣不從逆於肉理或敗血留內結成癰疽者只宜用生化湯加連翹金銀花甘草節乳香

沒藥治之切不可用寒涼敗毒之藥恐潰後腐爛必難醫治

產後虛實宜審

震亨產後惟大補從政莫作不足看二說須合形證脈攻補虛實仔細參〔註〕朱震亨云產後氣血兩虛惟宜大補雖有他證以末治之張從政云產後慎不可作諸虛不足治之二說各有偏處當合形證脈三者細參方不致誤

產後門彙方

開骨散

當歸 五錢

龜板 三錢 醋炙研

川芎 二錢

婦人髮 一團

水煎服

奪命散

沒藥

血竭 各等分

以上研爲細末

纔產下便用童便醇酒各半盃煎一兩沸調下二錢良久再服

其惡血自下行便不衝上免生百疾

清魂散

澤蘭葉

人參 各二錢

川芎 五錢

荊芥穗 一兩

甘草 三錢 炙

以上爲末用溫酒熱湯各半盃

調一錢灌之下咽眼卽開氣定卽醒

大巖蜜湯

當歸

熟地

白芍 各二錢

乾薑

肉桂 各一錢

吳茱萸

獨活

遠志 炙

細辛

甘草 各八分 炙

以上水煎服

香桂飲

當歸

肉桂

川芎 各等分

以上爲末酒調服

延胡索散

當歸

赤芍

生蒲黃

桂心

琥珀

紅花

延胡索 各等分

以上好醋浸一宿焙乾爲末每服二錢酒調

趁痛散

當歸

官桂

白朮

黃耆

獨活

牛膝

生薑 各五錢

甘草 炙

薤白 各三錢半

桑寄生 五錢

以上㕮咀每服五錢水煎服

丁香豆蔻散

公丁香

白豆蔻仁

伏龍肝 各等分

以上爲末生薑湯調服

茹橘飲

竹茹

橘紅 各三錢

乾柿 一枚

水薑煎服

參附湯

人參 一兩

附子 五錢

以上作一服薑棗水煎徐徐服

去人參加黃耆名耆附湯

二味參蘇飲

人參 爲一兩末

蘇木 二兩

以上蘇木煎湯沖人參末服

枳朮湯

枳實 二兩 炒

白朮 二兩 炒

水薑煎服

小調中湯

茯苓

當歸

白芍

陳皮 各一錢

白朮 五錢

以上作一劑煎湯服

小調經散

白芍

當歸

沒藥

琥珀

桂心 各一錢

細辛

麝香 各五錢

右爲細末每服五分薑汁溫酒各少許調服

更生散

當歸

生地

川芎

人參 各二錢

荊芥穗 三錢

乾薑 八分

水煎服

當歸六黃湯

當歸

熟地 自製

黃耆 各二錢

生地

黃藥 炒黑

黃芩 炒黑

黃連 各一錢

右水煎服

黃耆湯

黃耆

三錢

牡蠣粉 二錢

白朮 二錢

茯苓 一錢

麥冬 二錢

熟地 三錢

防風 一錢

甘草

七分

以上加浮小麥一合煎服

七珍散

人參

石菖蒲

生地

川芎 各一錢

細辛 一錢

防風

辰砂 各五錢

共爲細末每服一錢薄荷煎湯調服

茯神散

茯苓

去一兩

人參

黃耆 二兩

赤芍

牛膝

琥珀

龍齒 各一錢

生地

五錢

桂心 五錢

當歸 二兩

以上爲細末每服三錢水煎服

妙香散

甘草

五錢

遠志 製去

山藥 薑汁

茯苓

茯神 去木

黃耆 各一錢

人參

桔梗

各五錢

辰砂 三錢

麝香 二錢

木香 一錢

共爲細末每服二錢當歸熟地煎湯調下

參麥飲

人參

麥冬

水煎服

人參當歸湯

人參

當歸

熟地

麥冬

白芍 錢各二

五味子 三分

桂枝 一錢

共剉末水煎服

竹葉歸耆湯

人參

白朮 土炒

當歸

黃耆 錢各二

竹葉 片二十

甘草 五分

共剉末水煎服

旋覆花湯

旋覆花

赤芍藥

荊芥穗

半夏 糶

前胡

甘草 炙

茯苓

五味子

杏仁 去皮尖 炒

麻黃 各等分

以上咬咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚煎至七分去

滓食前溫服有汗不宜用

人參澤蘭葉湯

人參 五錢

澤蘭葉

丹皮

牛膝 錢各二

生地 三錢

熟地 五錢

藕節五枚煎沖

童便服

槐連四物湯

當歸

川芎

赤芍藥

生地

槐花

黃連 錢各一

御米殼 五錢 去蜜炙

共剉末水煎服

芍藥湯

芍藥 炒

當歸

黃連 各半 炒

檳榔

木香

甘草 錢各二 炙

桂 五分 錢

黃芩三錢

真人養藏湯

人參

甘草

人參敗毒散

羌活

茯苓

香連丸

黃連

用連

中益

藿香正氣散

藿香

半夏

三合散

當歸

半夏

黃耆

以上每服半兩水煎如不減加大黃此證又有因中氣虛弱脾氣鬱結者治當審察

白朮

鴛粟殼各八分

獨活

川芎

柴胡

甘草

前胡

枳殼

桔梗

陳皮

厚朴

紫蘇

茯苓

甘草

白朮

黃耆

白芍藥各二錢

肉桂

柴胡

甘草

前胡

枳殼

桔梗

陳皮

厚朴

紫蘇

茯苓

甘草

白朮

黃耆

當歸

白芍

白豆蔻

訶子

枳殼

前胡

桔梗

陳皮

厚朴

紫蘇

茯苓

甘草

白朮

黃耆

當歸

白芍

黃耆

當歸

訶子各一錢

木香

枳殼

前胡

桔梗

陳皮

厚朴

紫蘇

茯苓

甘草

白朮

黃耆

當歸

白芍

黃耆

當歸

木香

枳殼

前胡

桔梗

陳皮

厚朴

紫蘇

茯苓

甘草

白朮

黃耆

當歸

白芍

黃耆

當歸

白芍

水煎服

桂附地黃湯

熟地 四錢

山萸肉

山藥 各二錢

丹皮

澤瀉

茯苓 各一錢
附子 製

肉桂 各一錢

共剉末水煎服

回生丹

錦紋大黃 一觔

蘇木 三兩
打碎用河水

紅花 三兩

炒黃色入好酒四碗

大黑豆 三升

水浸取殼用絹袋盛其汁留用

米醋 九觔

佳陳

將大黃末一觔入淨鍋下米醋三觔文火熬之以長木筯不住手攪之成膏再加醋三觔熬之又加醋三觔次第加畢然後下黑豆汁三碗再熬次下蘇木汁次下紅花汁熬成大黃膏取入瓦盆盛之大黃鍋粬亦鏟下入

後藥同磨

人參

當歸 酒洗

川芎 酒洗

香附 醋炒

延胡索 酒洗

蒼朮 米泔炒

蒲黃 隔紙炒

茯苓

桃仁 各一兩去

川牛膝 五錢

甘草 炙

地榆 酒洗

川羌活

廣橘紅

白芍 各五錢

木瓜 二兩

青皮 各三錢

乳香

沒藥 各二錢

益母草 三兩

木香 四錢

白朮 各三錢

烏藥 二兩

良薑 四錢

馬鞭草 五錢

秋葵子 三錢

熟地 一兩

酒浸九次

三稜 五錢

五靈脂 五錢

醋研細

山萸肉 五錢

熟地 一兩

酒浸九次

以上三十味并

前黑豆殼共剉爲末入石臼內下大黃膏拌勻再下煉熟蜜一觔共搗千杵取起爲丸每丸重二錢七八分靜室陰乾二十餘日不可日曬不可火烘乾後只重一錢有零鎔蠟護之卽蠟丸也用時去蠟殼調服

御纂醫宗金鑑卷四十九

編輯婦科心法要訣

乳證門

乳汁不行證治

加味四物湯

產後血虛乳汁少四物花粉不留行木通豬蹄湯熬服葱白煎湯乳房淋〔註〕產後乳汁不行因去血過多血少不行者宜四物湯加花粉王不留行木通豬蹄熬湯煎藥服外用葱白煎湯時時淋洗乳房以通其氣

湧泉散

氣脈壅塞乳脹痛湧泉散用白丁香王不留行天花粉漏蘆殭蠶豬蹄湯〔註〕產後乳汁不行因瘀血停留氣脈壅滯者其乳必脹痛宜用湧泉散卽白丁香王不留行花粉漏蘆殭蠶豬蹄湯煎服也

乳汁自湧證治

兔懷散 麥芽煎

產後乳汁暴湧出十全大補倍參耆食少乳多欲迴乳兔懷紅花芍膝歸無兒食乳乳欲斷炒麥芽湯頻服宜〔註〕產後乳汁暴湧不止者乃氣血大虛宜十全大補湯倍用人參黃耆若食少乳多欲迴其乳者宜兔懷散卽紅花赤芍牛膝歸尾也若無兒食乳欲斷乳者用麥芽炒熟熬湯作茶飲之

乳證總括

乳房忽然紅腫痛往來寒熱乳癰成乳被兒吹因結核堅硬不通吹乳名初起結核不腫痛年深內潰乳巖形乳頭生瘡名妬乳細長垂痛乳懸稱〔註〕婦人乳房忽然紅腫堅硬疼痛增寒壯熱頭痛者此欲成乳癰也若乳兒之時乳被兒口中氣吹以致乳管不通結核者名曰吹乳更有乳內結核如圍棋子不腫不痛但堅硬不散日久

內潰者謂之乳巖其證甚凶若乳頭生小細瘡痛者爲妬乳若瘀血上攻乳房忽然細小下垂長過於腹此名乳懸惟產後有之

乳癰證治

消毒飲

乳癰初起消毒飲青芷歸柴浙貝宜花粉銀花蠶草節寒熱荆防羌獨添膿成皂刺穿山甲潰後益氣養榮煎〔註〕乳癰乃陽明厥陰二經風熱壅盛初起宜服消毒飲卽青皮白芷當歸柴胡浙貝母花粉金銀花殭蠶甘草節也若兼增寒壯熱者加荆芥防風羌活獨活以解散之若服後不消其膿已成者宜加皂角刺穿山甲以穿發之若潰後氣血虛者宜益氣養榮湯培補之他如潰久膿清不斂又須急服大劑參耆桂附矣

益氣養榮湯

方見前首
卷彙方內

吹乳證治

枯萸散

外敷法

吹乳結核枯萸散乳沒歸甘用酒熬更加皂刺名立效已成膿潰未成消外敷星夏蠶芷刺草烏爲末蜜葱調〔註〕吹乳結核不散者當早消之久則成癰宜用枯萸散卽枯萸實乳香沒藥當歸甘草酒熬服也若服後不散者加皂角刺名立效散膿成者潰未成者消外用南星半夏殭蠶白芷皂角刺草烏爲末用葱汁合蜜調敷

乳巖證治

十六味流氣飲

青皮甘草散

乳巖鬱怒損肝脾流氣飲歸芍參耆芎防蘇芷枳桔草檳榔烏樸桂通隨外熨木香生地餅青皮甘草服無時潰後不愈須培補十全八珍或歸脾〔註〕乳巖之證初起結核如圍棋子大不痛不癢五七年或十餘年從內潰破嵌空玲瓏洞竅深陷有如山巖故名乳巖皆緣抑鬱不舒或性急多怒損傷肝脾所致宜速服十六味流氣飲其

方即當歸白芍人參黃耆川芎防風蘇葉白芷枳殼桔梗甘草檳榔烏藥厚樸官桂木通外以木香生地搗餅以熱器熨之且不時以青皮甘草爲末煎濃薑湯調服戒七情遠葷味解開鬱怒方始能愈若潰後久不愈惟宜培補其氣血或十全大補湯八珍湯歸脾湯選用之

十全大補湯

八珍湯

歸脾湯

方俱見首卷

妬乳乳懸證治

鹿角散

連翹散

妬乳甘草鹿角散雞子黃調炙敷之連翹散防升元芍斂射硝黃甘杏宜瘀血上攻乳懸證芎歸湯飲薰鼻施不應草麻貼頂上乳收即去莫遲遲〔註〕乳頭生瘡謂之妬乳宜鹿角散敷之即鹿角甘草爲末雞子黃調銅器內炙敷之內服連翹散即防風升麻元參白芍白斂射干芒硝大黃甘草杏仁也若產後瘀血上攻兩乳細長下垂過腹者謂之乳懸宜濃煎芎歸湯不時飲之以其餘藥薰鼻則瘀散乳即上升如不上者更以草麻仁搗貼頂心收即去之

芎歸飲

即佛手散方見首卷

乳證門彙方

消毒飲

青皮

白芷

當歸

柴胡

浙貝母

殭蠶

花粉

金銀花

甘草節

各等分

共剉末水煎服

栝蒌散

栝蒌

乳香

沒藥

當歸

甘草

各等分

以上爲末酒煎服

加梟角散名立效

十六味流氣飲

當歸

白芍

人參

黃耆 各二錢

川芎

防風

蘇葉

白芷

枳殼

桔梗 各一錢

甘草

檳榔 各五分

烏藥

厚朴

官桂

木通 各八分

共剉爲末每服五錢水煎服

青皮甘草散

青皮

甘草 各一錢

共爲末煎濃薑湯調服

鹿角散

鹿角

甘草 各等分

共爲末雞子黃調銅器內炙敷之

連翹散

連翹

甘草 各等分

共爲末雞子黃調銅器內炙敷之

防風

元參 各二錢

白斂

芒硝

大黃

射干 各一錢

升麻 五分

白芍 一錢

甘草 五分

杏仁 二十粒

以上剉薑水煎服

加味四物湯

加味

甘草 五分

熟地

川芎

花粉

王不留行 炒

木通 各二錢

當歸

白芍

熟地

川芎

花粉

王不留行 炒

木通 各二錢

以上七味豬蹄熬湯煎服

湧泉散

湧泉

王不留行

花粉

漏蘆 各一錢

用豬蹄湯煎服

白丁香

王不留行

花粉

漏蘆 各一錢

用豬蹄湯煎服

兔懷散

兔懷

王不留行

花粉

漏蘆 各一錢

用豬蹄湯煎服

紅花

赤芍

歸尾

牛膝 各二錢

共剉末水煎服

麥芽煎

麥芽

水煎作茶飲

麥芽 三兩

水煎作茶飲