

徐洄谿先生十三種

序

王叔和傷寒例云今搜採仲景舊論錄其證候診脈聲色對病真方擬防世急則知傷寒論當時已無成書乃叔和之所搜集者雖分定六經而語無詮次陽經中多陰經治法陰經中多陽經治法參錯不一後人各生議論每成一書必前後更易數條互相訾議各是其說愈更愈亂終無定論不知此書非仲景依經立方之書乃救誤之書也其自序云傷天橫之莫救所以尋求古訓博探衆方蓋因誤治之後變證錯雜必無循經現證之理當時著書亦不過隨證立方本無一定之次序也余始亦疑其有錯亂乃探求三十年而後悟其所以然之故於是不類經而類方蓋方之治病有定而病之變遷無定知其一定之治隨其病之千變萬化而應用不爽此從流溯源之法病無遁形矣至於用藥則各有條理解肌發汗攻邪散痞逐水驅寒溫中除熱皆有主方其加減輕重又各有法度不可分毫假借細分之不外十二類每類先定主方卽以同類諸方附焉其方之精思妙用又復一一註明條分而縷悉之隨以論中用此方之證死於方後而更明發其所以然之故使讀者於病情藥性一目顯然不論從何經來從何經去而見證施治與仲景之意無不吻合豈非至便之法乎余纂集成帙之後又復鑽窮者七年而五易其稿乃無遺憾前宋朱肱活人書亦曾彙治法於方後但方不分類而又無所發明故閱之終不得其要領此書之成後之讀傷寒論者庶可以此爲津梁乎

乾隆二十四年小陽月上浣涇溪徐大椿序

傷寒論類方目錄

桂枝湯類一十九方

桂枝湯

桂枝加附子湯

桂枝加桂湯

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝加厚朴杏仁湯

小建中湯

桂枝加芍藥生薑人參湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

桂枝麻者各半湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝二越婢一湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝加葛根湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

麻黃湯類二十六方

麻黃湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

大青龍湯

小青龍湯

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

葛根湯類三三方

葛根湯

葛根黃芩黃連湯

葛根加半夏湯

柴胡湯類四六方

小柴胡湯

大柴胡湯

柴胡加桂枝湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

胡柴桂枝乾薑湯

柴胡加芒硝湯

梔子湯類五七方

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

梔子乾薑湯

梔子厚朴枳實湯

梔子柏皮湯

枳實梔子豉湯

承氣湯類六十二方

傷寒類方

目錄

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

桃仁承氣湯

抵當湯

抵當丸

十棗湯

大陷胸湯

大陷胸丸

小陷胸湯

白散

麻仁丸

瀉心湯類七十一方

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

半夏瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

黃連湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

乾薑黃連黃芩人參湯

旋復代赭石湯

厚朴生薑甘草半夏人參湯

白虎湯類八三方

白虎湯

白虎加人參湯

竹葉石膏湯

五苓湯類九四方

五苓散

猪苓湯

文蛤散

茯苓甘草湯

四逆湯類十一方

四逆湯

四逆加人參湯

通脈四逆湯

通脈四逆加猪膽汁湯

乾薑附子湯

茯苓四逆湯

白通湯

白通加猪膽汁湯

四逆散

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

理中湯類十一方

理中丸

真武湯

附子湯

甘草附子湯

桂枝附子湯

桂枝附子去桂加白朮湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

芍藥甘草附子湯

桂枝人參湯

雜方十二二十二方

赤石脂禹餘糧湯

茵陳蒿湯

黃連阿膠湯

豬膚湯

烏梅丸

豬膽汁方

炙甘草湯

麻黃連軹赤小豆湯

吳茱萸湯

甘草湯

白頭翁湯

燒褌散

以上共一百十三方

甘草乾薑湯

瓜蒂散

半夏散及湯

桔梗湯

牡蠣澤瀉散

芍藥甘草湯

麻黃升麻湯

桃花湯

苦酒湯

蜜煎導方

傷寒論類方

吳江徐大椿靈胎編

桂枝湯類一

桂枝湯一

桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩 生薑三兩 大枣十二枚

桂枝本不能發汗故欲助以熱劑內經云穀入於胃以傳於肺肺主皮毛汗所從出微粥充胃氣以達於肺也觀此可知傷寒不禁食矣

溫覆令一時許遍身發熱微似有汗者益佳不可令如水淋漓病不必除此解肌之法也若如水流

已須臾歎熱稀粥一升餘以助藥力

若一服汗出病瘳停後服不必盡劑若不汗更服依前治又不汗後服小促其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出乃服至二三劑

此一服汗即不再服無汗服至二三劑總以中病為主後世見服藥得效者反令多服無效者即疑藥誤又復易方無往不誤矣

桂枝湯全料集之一劑三分之一謂之一服若一兩今二錢零則一劑之藥除薑棗值一兩六錢零一服不過五錢零矣治傷寒大證分兩不過如此

太陽中風陽浮而陰弱邪則不能護榮故陽浮者熱自後風為陽邪故後熱桂枝之辛以散之陰弱者汗自出芍藥之酸以收之

禁生冷粘滑肉麵五辛酒及臭惡等物

寒漸浙惡風惡風未有不惡寒者但惡寒甚翕翕發熱其熱亦不如鼻鳴乾嘔者三陽相近故略有兼病但不甚耳

桂枝湯主之

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之

此桂枝湯總證

若不上衝者不可與之

此誤下之証誤下而仍上衝則邪氣猶在陽分故仍用桂枝湯發表者不

解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈

此非誤治因風邪微結於太陽之要路則藥方不能流通故刺以解其結蓋邪風太甚不僅在痛而在經刺之以洩經氣風府一穴在項上入髮際一寸大筋內宛宛中督脈傷維之會刺入四分留三呼風池二穴在額後髮際陷者中足少陽陽維之會針入三分留三呼

病外證未解者不可下也

此禁下之為逆欲解外者宜服

病外證未解者不可下也

言雖有當下之證而外証未除

復下之脈浮者不愈浮為在外而反下之故令不愈今脈浮故知在外當須解外則愈宜服

後仍浮則邪不因誤下

而陷入仍在太陽不得因

已汗下而不復用桂枝也

病實自汗出者此為榮氣利榮氣和者外不諧以衛氣不共榮氣和諧故爾

氣不病非調和

傷寒類方

桂枝湯

傷寒類方

桂枝湯

傷寒類方

桂枝湯

傷寒類方

桂枝湯

之和故又 以榮行脈中衛行脈外復發其汗榮衛和則愈宜桂枝湯

申言之 病人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時

而自汗 反止矣 陽諸證不必備而惟發 傷寒不大便六七日

陽諸證不必備而惟發 傷寒不大便六七日 宜下 頭痛有熱者未可與承氣湯

陽諸證不必備而惟發 傷寒不大便六七日 宜下 頭痛有熱者未可與承氣湯

陽諸證不必備而惟發 傷寒不大便六七日 宜下 頭痛有熱者未可與承氣湯

陽諸證不必備而惟發 傷寒不大便六七日 宜下 頭痛有熱者未可與承氣湯

陽諸證不必備而惟發 傷寒不大便六七日 宜下 頭痛有熱者未可與承氣湯

陽諸證不必備而惟發 傷寒不大便六七日 宜下 頭痛有熱者未可與承氣湯

陽諸證不必備而惟發 傷寒不大便六七日 宜下 頭痛有熱者未可與承氣湯

陽諸證不必備而惟發 傷寒不大便六七日 宜下 頭痛有熱者未可與承氣湯

陽諸證不必備而惟發 傷寒不大便六七日 宜下 頭痛有熱者未可與承氣湯

陽諸證不必備而惟發 傷寒不大便六七日 宜下 頭痛有熱者未可與承氣湯

陽諸證不必備而惟發 傷寒不大便六七日 宜下 頭痛有熱者未可與承氣湯

陽諸證不必備而惟發 傷寒不大便六七日 宜下 頭痛有熱者未可與承氣湯

陽諸證不必備而惟發 傷寒不大便六七日 宜下 頭痛有熱者未可與承氣湯

陽諸證不必備而惟發 傷寒不大便六七日 宜下 頭痛有熱者未可與承氣湯

陽諸證不必備而惟發 傷寒不大便六七日 宜下 頭痛有熱者未可與承氣湯

陽諸證不必備而惟發 傷寒不大便六七日 宜下 頭痛有熱者未可與承氣湯

陽諸證不必備而惟發 傷寒不大便六七日 宜下 頭痛有熱者未可與承氣湯

陽諸證不必備而惟發 傷寒不大便六七日 宜下 頭痛有熱者未可與承氣湯

陽諸證不必備而惟發 傷寒不大便六七日 宜下 頭痛有熱者未可與承氣湯

桂枝湯原方加附子 一枚泡去 皮破八片 右六味以水七升煮取三升去渣溫服一升

太陽病發汗遂漏不止 此發汗太過如水流 其人惡風 中風本惡風汗後當愈今 小便難 津液

本急難風仲乃津脫陽虛之象但不至亡陽耳若 桂枝加附子湯主之 桂枝同附子服 桂枝加桂湯 三 桂枝原方加桂二兩即另立

更甚而厥冷惡寒則有陽脫之慮當用四逆湯矣 桂枝加附子湯主之 桂枝同附子服 桂枝加桂湯 三 桂枝原方加桂二兩即另立

桂枝湯原方加桂二兩 右五味以水七升煮取三升去滓溫服一升

燒針令其汗針處被寒復感新寒核起而赤者必發奔豚氣從小腹上衝心者灸其核上各一壯云各一壯與桂枝

加桂湯重加桂枝不特寒且制腎氣又藥味重則能透下凡奔豚證此方可增減用之

桂枝去芍藥湯

桂枝湯原方去芍藥 右四味以水七升煮取三升溫服一升

桂枝去芍藥加附子湯

即前方加附子一枚炮去皮破八片餘依前法

太陽病下之後脈促胸滿者中虛而表邪仍在桂枝去芍藥湯主之太陽之邪未盡故用桂枝下後傷陰不宜更用涼藥若微惡寒者去芍藥方中加附

子湯主之微惡寒則陽亦虛矣故加附子

桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝湯原方加厚朴二兩炙去皮杏仁五十枚右七味以水七升微火煮取三升溫服一升覆取微似汗

喘家作桂枝湯加厚朴杏仁佳別錄厚朴主消痰下氣本經杏仁主喘逆上氣太陽病下之危喘者表未解故也此湯主之前條乃本條之喘因疎而法一

小建中湯

小建中湯

桂枝湯原方加膠飴一升 右六味以水七升煮取三升去滓納飴更上微火消解溫服一升日三服嘔家

不可用建中湯以甜故也

傷寒陽脈濡陰脈弦中宮之陽氣虛則木來乘土故陽濡而陰弦也法當腹中急痛先與小建中湯膠飴大甘以助中宮不差者與小柴胡湯主之治太陰不

愈變而治少陽所以疎土中傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之悸而煩其為虛煩可知故用建中湯以補心脾之氣蓋饒子湯治有熱之虛煩此治無熱之虛煩也

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

桂枝湯原方芍藥生薑各增一兩加人參三兩 右六味以水一斗二升煮取三升去滓溫服一升此以多服為妙取其

味厚入陰也

發汗後身疼痛表未盡宜發汗氣虛不能勝故 桂枝甘草湯九已甚此湯主之用人參凡氣虛而過汗者方可用

桂枝四兩甘草二兩 右二味以水三升煮取一升頓服此以一劑為一服者

發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者此湯主之發汗不誤誤在過多為心之液多則心氣虛二味扶陽補中此乃陽虛之輕者甚而振振欲墜地即用真武湯矣一證而輕重不同用

方通異其義精矣

茯苓桂枝甘草大棗湯十

茯苓半斤桂枝四兩甘草二兩大棗十二枚 右四味以甘爛水一斗以水二斗搗之萬遍取用按甘爛水大約取其動極思靜之意 先煮茯苓尾方中事重之藥法必先

減二升納諸藥煮取三升去渣溫服一升日三服

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚此湯主之心下悸是振胸中之陽臍下悸則因發汗太過上焦乾渴腎水上救故重用茯苓以制腎水桂枝以治奔豚

桂枝麻黃各半湯十一

桂枝一兩十六芍藥生薑甘草麻黃去節各一兩大棗四個杏仁二十四個去皮及雙仁者 右七味以水五升先煮麻黃一

二沸去上沫欲去沫故先煮 納諸藥煮取一升八合減去三之一 去滓溫服六合二云桂枝湯三合麻黃湯三合頓服將息

如上法

太陽病得之八九日過經如瘧狀發熱惡寒熱多寒少邪已漸輕 其人不可嘔非少清便欲自可無裏 一日二三度發非瘧脈

微緩者不浮不大為欲愈也退之藥脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也 此三句申明上文欲愈之故蓋

以養之使胃氣漸充則榮衛自和若更用汗吐下面色反有熱色者未欲解也面有熱色則以其不得小汗出身必痒宜服

微邪已在皮膚中欲自出不得故身痒以此湯取其小汗足矣陽明篇云身痒如蟲行皮中狀者此以久虛故也按此方分兩甚輕計共約六兩合今之秤僅一兩三四錢分三服祇服四錢等乃治邪退後至輕之劑猶勿藥也

桂枝二麻黃一湯十二

桂枝一兩十七芍藥六兩甘草二兩杏仁十六個麻黃十六銖生薑一兩大棗五個右七味以水五升先煮麻黃一二

沸去上沫納諸藥煮取二升去滓溫服一升日再服一本云桂枝湯二升麻黃湯一升合為三升分再服

服桂枝湯大汗出脈洪大者汗雖出而邪未盡與桂枝湯如前法此所謂邪不盡行復如法者也若形如瘧日再發者汗出必解桂枝二麻

黃一湯主之此與桂枝麻黃各半湯意略同但此因大汗出之後故桂枝略重而麻黃略輕

桂枝二越婢一湯十三桂枝湯加麻黃石膏二味

桂枝去皮芍藥甘草麻黃去諸各十八銖大棗四個生薑二兩石羔二十四銖碎綿裹右七味以水五升煮麻黃一二沸去

上沫納諸藥煮取二升去渣服一升附越婢方麻黃六兩甘草二兩石膏十五兩生薑三兩大棗十五個

太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽也不可更汗此無陽與亡不同并與他處之陽虛亦別蓋其人本非壯盛而

桂枝去桂加茯苓白朮湯十四桂枝三兩甘草二兩生薑茯苓白朮各二兩大棗十二個右六味以水八升煮取三升去滓溫服一升小便

利則愈此方專於利小也

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者此湯主之頭痛發熱桂枝證仍在也以其無汗則不宜更用桂枝心下滿則用

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯十五白朮小便利則用茯苓此證乃亡津液而有停飲者也凡方中有加減法皆佐使之藥若去其君藥別另立方名今去桂枝而仍以桂枝為名所不可解殆以此方雖去桂枝而意仍不離乎桂枝也

桂枝湯原方去芍藥加蜀漆三兩洗牡蠣五兩龍骨四兩右七味以水一斗二升先煮蜀漆減二升納諸藥

煮取三升去滓溫服一升

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂以火劫其胸中之陽起臥不安者此湯主之此與少陰證出之亡陽通則蓋少陰之亡陽乃亡陰中之陽故用四逆輩同其陽於腎中今乃以火逼汗

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂

亡其陽中之陽故用安神之品鎮其陽於心中各有至理不可易也去芍藥因陽虛不復助陽也蜀漆去心腹邪積龍骨牡蠣治驚癇氣

桂枝甘草龍骨牡蠣湯十六

桂枝一兩甘草二兩牡蠣二兩龍骨二兩

右四味以水五升煮取二升半去渣溫服八合日三服

脈浮宜以汗解此治脈浮

用灸之誤

治邪無從出因火而盛入內

病從腰以下必重而痺名火逆也火氣在上則陰氣獨

火逆下之又誤

因燒針煩躁者更誤治下之虛其陰燒針又益

桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之鎮其陰氣散其火邪上下同治前

驚狂象故蜀漆不用其體藥大段相同

桂枝加葛根湯十七

此湯成無已本有麻黃非有麻黃則為葛根湯矣

桂枝湯原方加葛根四兩桂枝芍藥各減一兩餘同

右六味以水一斗先煮葛根減二升去上沫納諸藥

煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗不須啜粥

太陽病項背強口反汗出惡風者

凡八仲頸之象邪氣漸深故加葛根

桂枝加葛根湯主之

桂枝如芍藥湯十八

桂枝湯原方芍藥加一倍

右五味以水升煮取三升溫服一升日三服

桂枝加大黃湯十九

此二方俱治太陰證而法不離乎桂枝

桂枝湯原方加大黃一兩芍藥一倍

右六味以水七升煎取三升去滓溫服一升日三服

本太陽病醫反下之誤治因而腹滿時痛屬太陰也

引邪入於太陰故

桂枝加芍藥湯主之

雖見太陰證而陽之證尚未罷故仍用桂枝湯只加芍藥一倍以

飲太陰之證大實痛者此句承上文腹滿時痛言腹滿時痛不過

桂枝加大黃湯主之

此因誤下而見太陰之證大實痛則反成太陰之實邪仍用大黃引之即從太陰出不因誤下而禁下見證施

枝證可加黃芩一分謂之陽旦湯夏至後可加知母半兩石膏一兩或加升麻一分若病人素虛寒者不必加減

麻黃湯類二

麻黃湯一

麻黃三兩桂枝二兩甘草一兩杏仁七十個右四味以水九升先煎麻黃減二升此須多煮取其力事不備去上沫

納諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆微似汗不須噉粥以其易發汗也餘如桂枝將息法活人書云夏至後用麻黃湯量酌知母石燕黃芩蓋麻黃性熱恐有

出之處

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節痛此痛處比桂枝證尤多而惡風無汗而喘者此三證乃肺氣不舒之證麻黃治無汗杏仁仁

以謂之太陽與陽明合病陽明之病榮甚多如身熱不惡寒口苦鼻乾之類但喘而胸滿者不可下病俱在宜麻黃湯上之

經方太陽與陽明合病見一二證即是不必全具也太陽病即上文所指者喘而胸滿者不可下上焦宜麻黃湯上之

喘而胸滿此麻黃證之太陽合陽明也太陽病十日以去經脈浮細而喘者正漸外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯胸滿脇痛

日久邪留少陽但浮者與麻黃湯若果邪在少陽脈必帶弦今但浮則向在太太陽病脈浮發熱身疼痛此乃太陽

陽故與此湯經云諸八九日不解表證仍在表證即上此當發其汗宜麻服藥已微除其人發煩目瞑陽證而不劇者必衄衄乃解

熱甚動血血由肺之清道而出與汗從皮毛而洩同故熱邪亦解所以然者陽氣重故也風鬱固為熱寒鬱亦為熱內麻黃湯主之此

俗語所云紅汗也經云陽明病口燥但欲飲水不欲嘔者此必衄所以然者陽氣重故也風鬱固為熱寒鬱亦為熱內麻黃湯主之此

未衄之前可用麻黃非衄後更用麻黃也脈浮者病在表可發汗宜麻黃湯此脈浮脈浮而數者可發汗宜麻黃湯數為陽傷寒脈

浮緊不發汗治失因致衄者麻黃湯主之前段衄後而解則不必復用麻陽明病脈浮無汗而喘者陽明本大自汗今乃

證矣發汗則愈宜麻黃湯黃黃

麻黃杏仁甘草石膏湯二此即越婢湯加杏仁也

麻黃四兩杏仁五十個甘草二兩石膏半斤碎右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煎取二升

去滓溫服一升

發汗後不可更行桂枝湯既汗不可再汗津液不得重傷汗出而喘尚有留邪在肺無大熱者邪已可與此湯汗出故用石膏發汗後飲水

多者必喘以水灌之亦喘此二句明致喘之所由蓋喘未必皆下後不可更行桂枝湯既下不可復汗若汗出而喘無

大熱者可與此湯

大青龍湯三此合麻黃桂枝越婢三

方為一方而無芍藥

傷寒類方

少陰病始得之反發熱脈沈者湯主之少陰病三字所該者廣必從少陰諸現證細詳審然後反發熱知為少陰之發熱否則何以
為子細辛為少陰溫經之藥夫人知之用麻黃者以其虛熱則邪隨重太易長盡入陰證可引之外達不用桂枝而用麻黃者證桂
枝者其通用亦能溫其故陰經諸藥皆用之麻黃則專於發表今欲散少陰始入之邪非麻黃不可況已有附子足以溫少陰之經矣

麻黃附子甘草湯六

麻黃去節甘草二兩附子一枚

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸此當少煮去上沫納諸藥煮取三升去渣溫服

一升日三服

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以三三三無裏證故微發汗也三陰經雖少陰與太陽為表裏而位最近故論有汗解之理况二三日而無裏證則

其邪未深入此方較麻黃附子細辛少輕以其無裏證也

葛根湯類三

葛根湯一此即桂枝湯加麻黃三兩葛根四兩葛根四兩麻黃三兩芍藥二兩生薑三兩甘草二兩桂枝二兩大棗十二枚

右七味以水一斗先煮麻黃葛根二味主藥先煮

減二升去上沫納諸藥煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗不須啜粥已論餘如桂枝法將息及禁忌

太陽病項背強凡凡無汗惡風葛根湯主之前桂枝加葛根湯一條其現證亦同但彼云反汗出故無麻黃此云無汗故加麻黃也

身大熱大熱乃陽明之證也以太陽將入陽明之經故加此藥陽明證汗出而惡熱今無汗而惡風則未全入陽明故曰太陽病按葛根本草治

葛根黃芩黃連湯二合病全在下利一證上證出蓋風邪入胃則下利矣

葛根半斤甘草二兩黃芩三兩黃連三兩右四味以水八升先煮葛根減二升納諸藥煮取二升去渣分溫再

服

太陽病桂枝證桂枝證即太陽傷風之正病也醫反下之大利遂不止邪下陷則脈促者表未解也促有數意邪猶在外尚未陷入三陰喘而

汗出者此湯主之因表未解故用葛根因喘汗而利故用芩連之苦以洩之堅之連甘草為治痢之主藥

葛根加半夏湯三

太陽與陽明合病不下利前條因下利而知太陽陽明合病今既不下利則合病何從而利則用芍藥治利因其本屬桂枝證而脈促故止加葛根一味以解陽明初入之邪此條乃太陽陽明合病故用葛根湯全方因其但嘔加半夏一味以止嘔隨病立方各有法度

柴胡湯類四

小柴胡湯一

柴胡半斤 黃芩人參 甘草生薑各三兩 半夏半斤 大棗十二枚 右七味以水一斗二升煮取六升去渣再煎此又法取三升溫服一升日三服此湯除大棗共二十八兩較今秤亦五兩六錢零雖分三服已為重劑蓋少陽分於兩陽之間須兼入古聖不但用藥之若胸中煩而不嘔者去半夏人參煩不可用人參加枳實實一個枳實除胸痞此若渴者去半夏即能耗津液加人參合前成四兩半括實根四兩治消若腹中痛者去黃芩苦加芍藥三兩除腹若脇中痞硬去大棗以其能牡蠣四兩別錄云治脇下痞熱若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩利小便若不渴外有微熱者去人參不渴則津液自足加桂枝三兩微熱則邪溫覆取微似汗愈若欬者去人參大棗二味與生薑加乾薑故加五味子子半升乾薑二兩古方治嗽五味乾姜必同用以散寒邪一以飲正氣從無單用五味治嗽之法受入不知用必有害況陽熱勞火用處極多能深求其義則變化心生矣

傷寒五六日正當傳少陽之期中風往來寒熱太陽之寒熱寒時亦熱熱時亦寒胸脇苦滿胸脇為少陽之位默默不欲飲食木邪干土心煩喜嘔水氣上逆或胸中煩加不嘔或渴少陽火邪或腹中痛木剋土或脇下痞硬水氣或心下悸有痰小便不利或不渴有蓄身有微熱太陰或欬者肺有此湯主之少陽所現之證甚多柴胡湯所治之證亦不一加減法具載方末血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食或府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也此條申明所以往來寒熱及不欬食下嘔之故皆因邪氣邪入臟府相牽所致則小柴胡湯主之服柴胡湯已渴者屬陽明也以法治之此必先見少陽之證故用柴胡湯服後而渴則轉屬陽明矣傷寒四五日身熱惡風頸項強此是太陽脇下滿此則少陽所獨手足溫而渴者前條之渴者屬陽明此因脇下滿則雖似陽明不作陽明治矣小柴胡湯主之傷寒陽脈瀼陰脈弦法當腹中急痛先與小建中湯不差者與小柴胡湯王之詳見桂枝類中傷寒中風有柴胡證但見一證便

傷寒五六日正當傳少陽之期中風往來寒熱太陽之寒熱寒時亦熱熱時亦寒胸脇苦滿胸脇為少陽之位默默不欲飲食木邪干土心煩喜嘔水氣上逆或胸中煩加不嘔或渴少陽火邪或腹中痛木剋土或脇下痞硬水氣或心下悸有痰小便不利或不渴有蓄身有微熱太陰或欬者肺有此湯主之少陽所現之證甚多柴胡湯所治之證亦不一加減法具載方末血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作有時默默不欲飲食或府相連其痛必下邪高痛下故使嘔也此條申明所以往來寒熱及不欬食下嘔之故皆因邪氣邪入臟府相牽所致則小柴胡湯主之服柴胡湯已渴者屬陽明也以法治之此必先見少陽之證故用柴胡湯服後而渴則轉屬陽明矣傷寒四五日身熱惡風頸項強此是太陽脇下滿此則少陽所獨手足溫而渴者前條之渴者屬陽明此因脇下滿則雖似陽明不作陽明治矣小柴胡湯主之傷寒陽脈瀼陰脈弦法當腹中急痛先與小建中湯不差者與小柴胡湯王之詳見桂枝類中傷寒中風有柴胡證但見一證便

是不必悉其少陽與太陽陽明三經之入凡柴胡湯病證而下之證若柴胡證不罷者復與柴胡湯此方本經之方

陽滿而嘔此少陽日嘔所發潮熱此證已而微利又見其證此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以丸藥

下之非其治也以瀉利之是不應復以潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外邪故仍以柴胡解外後以柴胡加芒硝主之

解在後如即過下傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便硬脈細者此為陽微結陽微結者不能隨經而散

外證無汗此為半在裏半在表也以上諸證有表有裏脈沈亦在裏也脈細者汗出為陽微以微假令純陰結不得復有

故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解得湯而不了了者其病可愈其通便之法即如芒硝及大柴胡等方是也

發潮熱大便澀小便自可胸脇滿而不去者小柴胡湯主之陽明潮熱乃瀉下之證因大便秘自可則裏證未

脇下硬滿少陽不大便下而嘔陽證舌上白胎者邪未結於陽明故舌白胎可與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣

因和身濈然汗出而解也此四句申明小柴胡之功效如此所以諸證得之皆愈也按少陽之外為太陽裏為陽明而少陽居其間故

也陽明中風脈弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛此少陽久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥

一身面目悉黃小便難此二證又有潮熱此耳前後腫刺之小差外不解病過十日脈續浮者與小柴胡湯陽浮

裏證邪仍欲外出脈但浮無餘證者與麻黃湯但浮無餘證則裏證全無必從浮解故用麻黃湯此二條明陽明中風若不尿勝氣絕腹滿

加臟者不治論中陽明云陽明病不能食攻其熱必噤所以然者胃中虛冷也虛冷一字尤明急欲飲也又云大吐下汗出

腹滿故本太陽病不解轉入少陽者此為傳經脇下硬滿乾嘔不能食往來寒熱以上皆少陽未吐下脈沈緊者吐

不治下不經誤治也少陽已漸入裏故不與小柴胡湯嘔而發熱者小柴胡湯主之但發熱而非往來寒熱則與太陽陽

浮而沈緊而弦之甚者亦少陽本十日以去脈浮細而嗜臥者外已解也設胸滿脅痛者與小柴胡湯脈但浮者與麻黃湯

後更發熱者小柴胡主之此復證也非勞復非女勞復乃正氣不充餘邪未盡留在半表半裏脈浮者以汗解之脈沉實者以

下解之復證之中更當考此二脈如果脈見浮象則邪留太陽當用桂枝湯以脈見沈實則裏未盡甚用下法但下不著方名者因并下之法不一醫者於麻黃桂枝皮承氣大柴胡等方對證之輕重擇而用之則無不中病矣 婦人中風七八

日續得寒熱發作有時此即下文所謂如瘧也 經水適斷者此為熱入血室其血必結血因熱結而成瘀矣 故使如瘧狀發作有時小柴

胡湯主之即以治瘧之法治之 又云婦人中風發熱惡寒經水適來彼云斷得之七八日熱除而脈遲身涼內伏 胸脅下滿

如結胸狀識語者此為熱入血室也血室為中焦榮氣之所聚肝臟血心主血榮血結滯則肝氣與心經之氣亦凝放脇滿而神昏識語 當刺期門隨其實而瀉之期門在乳下第二肋端去乳頭約四寸肝募也厥陰陰維之會刺入四分血結則為有形之證湯劑一時難效刺期門以瀉厥陰有餘之熱則尤親切而易散 又云婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則識語如見

鬼狀者此為熱入血室晝清而夜昏者血室屬陰病在陰經也 無犯胃氣及上二焦必自愈此為中焦榮氣之痰汗下二法皆非所宜小柴胡湯期門則其治也 按熱入血室之狀此二條為最詳婦人傷 此證最多前條證稍輕 後二條證尤重男子亦有之

大柴胡湯二小柴胡去人參甘草加枳實芍藥 大黃乃少陽陽明合治之力也 柴胡半斤 半夏 半斤 黃芩 三兩 芍藥 三兩 生薑 五兩 枳實 四個 大棗 十二個 右七味以水一升一斗二升煮取六升

再煎取三升溫服一升日三服 此方本有大黃二兩王叔和云若不加大黃恐不為大柴胡也

太陽病過經十餘日反二三下之一一誤後二三日柴胡證仍在者如寒熱嘔逆之類 先與小柴胡湯嘔不止心下急

微煩者猶有為未解也與大柴防湯下之則愈前雖已下非下法也 傷寒十餘日熱結在裏此大黃對證復往來寒熱此胡之與大柴胡湯 傷寒發熱汗出不解柴胡心中痞硬嘔吐而下痢者實中夏大黃 此湯主之 傷寒後經之後

柴胡加桂枝湯三此小柴胡與桂枝湯併為一方乃少陽太陽合病之力 柴胡四兩 黃芩 人參 桂枝 芍藥 生薑 各一兩 半夏 二合 甘草 一兩 大棗 六枚 右九味水七升煮取三升

去渣溫服一升

傷寒六七日發熱微惡寒支節疼煩以上太陽陽證 微嘔心下支結以上少陽證 外證未去者太陽陽證 柴胡桂枝湯主之 發汗

多亡陽譫語者此亡陽之輕者也 不可下 勿誤以為有燥屎 之譫語故以為戒與柴胡桂枝湯和其榮衛以通津液後自愈 桂枝湯和榮衛柴胡湯通津液深著二湯合用之功