

九、十卷

雲間李中梓士材父著

門人董爾正李方爨  
姪孫李廷芳衛伯父訂

大便不通

經曰北方黑色入通於腎開敷於二陰腎主五液津液盛則大便調若飢飽勞役損傷胃氣及過於辛熱厚味則而結者腎息燥急惡按內經之言則知大便秘結專責之少陰一經證狀雖殊總之津液枯乾一言以蔽之也分食辛以潤之是也

而言之則有胃實胃虛熱秘冷秘風秘氣秘之分胃實而秘者善飲食小便赤每仁丸胃虛而秘者不能飲食小便清利脾熱秘者面赤身熱六脈數夏腸胃脹悶時欲得冷或口舌生瘡四順丸涼飲潤腸丸冷秘者面白或黑六脈沉遲小便清白喜熱惡冷六脈數夏腸胃脹悶時欲得冷或口舌生瘡四順丸涼飲潤腸丸

風秘者風搏肺藏傳於大腸桂枝湯或活血潤腸丸桂枝湯更有老年津液乾枯婦人產後無血及發汗利小便病後血氣未復皆能秘結法當補香氣血使津液生則自通誤用硝黃利藥多致不救而巴豆牽牛其害更速湯加減子廣橘紅杏若病證雖屬陰寒而脈是微燥且溫煖藥中畧加苦寒以去熱躁躁止勿加如陰躁欲坐井中者兩尺按之必虛或沉細而遲但煎理中湯待極冷方服或服藥不應不敢用峻猛之藥者真薑煎導之用鹽五分分更煎中冷秘者醫生姜導之或於薑煎中有熱者猪胆汁導之久虛者如常飲食法煮猪血腸湯加酥食之血仍潤血脈仍潤臟此妙法也再見江湖方士輕用硝黃者十傷四五輕用巴豆者十傷七八不可不謹也結或變為

肺痿吐膿血或飲食不進而死

醫案

少室將恬養服五加皮酒遂患大便秘結四月以來腹中脹悶服大黃一錢通後復結余曰腎氣衰少津液不充誤行疎利是助其燥矣以六味丸煎成加入乳一鍾白蜜五錢二劑後即通十日而康復矣

文學顧以真素有風疾大便秘結經年不愈始來求治余曰此名風秘治風須治血乃大法也用十全大補湯加秦

大便不通

烏丸

芡麻仁杏仁防風煨皂角仁半月而效三月以後永不復患。以手書謝曰不有道丸僻處窮鄉日與庸人為伍一旦  
理就治神良作吟指款肺腑伏然反飲佳方如臭味之投百日以非來之疾同苦經年廉劑不膏反深沉瀾遠不違百  
病頓釋今幸生歸矣凡仰事俯育備非意外之虞則律非台翁之賜哉

麻仁丸 治腸胃熱燥大便秘結。厚朴去皮浸炒芍藥枳實炒各二錢 大黃一兩煨麻仁五兩研杏仁五兩半

右為末煉蜜和丸。桐子每服二十九丸。臨卧溫水下。枳實止。

大宣丸 治風氣結聚寔邪秘結。枳實炒各二錢 大黃一兩煨麻仁五兩研杏仁五兩半

右為末煉蜜和丸。桐子每服二十九丸。臨卧溫水下。枳實止。

厚樸湯 治胃虛秘結。厚朴薑汁浸炒透陳皮甘草各三兩白朮兩五半夏麩枳實炒各

為粗末每服五錢。水一鍾半薑三片。棗一枚煎至八分。食前大溫服。

四順清涼飲 治血燥內熱大便不通。水鍾半薄荷十葉煎至七分服

潤腸丸 治風結血秘。胃中伏火。羌活歸尾大黃五錢桃仁去皮麻仁各一

右為末。除麻仁桃仁另研如泥外。為細末。煉蜜丸。如桐子大。每服五十丸。溫送下。

木香檳榔丸 疎導二焦。快氣化痰。消食寬中。木香檳榔枳殼炒杏仁去皮青皮去各半夏麩皂

角酥又郁李仁各二。為末。別以皂角四兩用漿水一碗。搗揉慈膏。更入熟蜜少許。和丸。桐子大。每服五十丸。

食後善溫下。

大承氣湯 大黃芒硝厚朴去皮枳實各二。水二鍾。生薑三片。厚內硝煎服。

藿香止氣散 小續命湯 養止丹 八珍湯。俱見真

蘇子降氣湯 治氣滯妨悶痰盛便秘。蘇子炒半夏湯泡各一錢半前胡甘草厚朴姜汁

沉香水 水二鍾薑三片煎一鍾服。虛人加桂五分。黃耆一錢。

蘇子炒半夏湯泡各一錢半前胡甘草厚朴姜汁陳皮各一當歸五分

沉香水 水二鍾薑三片煎一鍾服。虛人加桂五分。黃耆一錢。



證若脾中有熱加味道遠散若脾肺氣虛補中益氣湯加益智若肝腎陰虛六味丸

至產後小便不禁其氣血虛不能制故也薛立齋云若因穩婆損胞者八珍湯兼進補脾飲若膀胱氣虛而小便頻數

當補脾肺若膀胱陰虛者須補肺腎

醫案

方伯張七澤夫人患飲食不進小便不禁余曰六脈沉遲水泉不藏是無火也投以八味丸料兼進六君子加益智

肉桂二劑減數劑而安

文學俞玄倩憂積經旬忽然小便不禁醫皆以固脬補腎之劑投之凡一月而轉甚余謂之曰六脈舉之則軟按之

則堅此腎肝之陰有伏熱也用牡丹皮白茯苓各二錢苦參八分甘草稍六分黃連一錢煎成調黃雞腸與服六劑

而安矣適有吳門醫者云既愈當大補之數日後仍復不禁再求治余曰肝家素有鬱熱得溫補而轉熾逆以龍

胆瀉肝湯加黃雞湯服之四劑即止更以四君子加黃連山枝一月而愈

家韭子丸 治遺溺夢遺白濁 家韭子炒六兩 鹿茸四兩 肉苁蓉酒浸去甲 牛膝酒浸 熟地黄 當歸各二兩

兔絲子酒浸各一兩 杜仲炒 石斛去 桂心 乾姜各一兩

右為末酒糊丸桐子大每服五十丸加至百丸空心食前鹽湯溫酒任下

固脬丸 兔絲子二兩 茴香一兩 附子泡去毒桑螵蛸各五錢 戎鹽二錢 五分

右為細末酒糊丸梧子大每服三十丸空心米飲送下 乾薑炮 附子炮去毒續斷 桂心 甘草炙各一兩 熟地黄 桑螵蛸炒

白茯苓散 白茯苓 龍骨 乾薑炮 附子炮去毒續斷 桂心 甘草炙各一兩 熟地黄 桑螵蛸炒

鹿茸散 治小便不禁陰痿脚弱 鹿茸二兩 去毛 韭子微 羊躑躅酒拌 附子炮 澤瀉 桂心各一兩

兔絲子散 治小便不禁或過多 兔絲子二兩 酒浸三日晒 牡蠣 附子炮去毒 五味子各一兩 雞胍去黃皮

內從容略二

牡蠣丸

牡蠣白者三斤入磁瓶鹽洗固清赤石脂內慢火炒令乾二味各研如粉

酒糊丸梧子大每服五十九丸空心鹽湯下

白微散

白微 白欬 白芍藥各等

為末每服二錢粥飲下

雞腸散

黃雞腸雄者四具切破黃連去積

肉從蓉酒洗切焙赤石脂研

白石脂另研

苦參各五兩

為末每服二錢食前酒下日夜一

大皂絲子丸

治腎虛小便不禁

皂絲子酒洗澤瀉

鹿茸去毛

石龍肉去粗皮

附子炮去皮

熟地黃

白茯苓去皮

牛膝酒浸

宿倍乾

續斷山茱萸核肉從蓉切焙

防風去粗皮

杜仲炒去粗皮

補骨脂酒炒

桑寄生酒炒

沉香

巴戟法酒香炒

五味子

桑螵蛸酒浸覆盆子去枝葉

右為末

酒煮麵糊丸如桐子大每服二十丸

空心溫酒或鹽湯任下

道遠散 治血虛小便不禁

白茯苓

白朮炒當歸身

白芍藥炒

柴胡各一錢

甘草五

水一鍾

煨薑

三片煎至六分服

補中益氣湯見類中風

八珍湯

六味丸俱見虛癆

補脾飲

治產時傷脾小便漏出

生黃絲絹剪一尺白牡丹根皮用白芍各一錢

右為末水一碗煮至絹爛如飴空心頓服服時不得作聲作聲即不效

桑螵蛸散

治陽氣虛弱小便不禁

桑螵蛸酒炒鹿茸酒炒黃耆各三兩

牡蠣煨

人參

赤石脂各二兩

為末每服二錢空心粥飲調服

遺精因夢而自遺者為精滑

經曰揀揚思慮者則傷神神傷則恐懼流淫而不下

傷而心怯也流淫謂流出淫精也思慮而兼之以揀揚則神不能收又曰恐懼而不解則傷精精傷則骨痠痿厥精神時自下而申言之也又曰五藏主藏精者也傷則失守

五藏



虛而神動非連志丸不可服十日而減半一月而全愈

武科張甯之曾醫妻強縱飲無度忽小便畢有白精數點自以為有餘之疾不且醫治經三月以來雖不小便時有

精中膏頭目眩暈醫者以固精澀脫之劑治瘳兩月果不見功迎余治之但見六脈滑大此因酒味濕熱下於精藏

遂以白朮茯苓橘紅甘草乾葛自寇加黃柏少許兩劑後即效不十日而康復如常

儒者錢用者色慾過度夢遺精滑先服清相火之劑繼服固澀之劑皆無效來求余余以玉華白丹濃煎人參湯送

二錢兩服後稍固兼進六味地黃丸加蓮藕艾實連志

達志丸 治心腎不足夢遺精滑 伏神祛皮白茯苓膜皮人參 龍齒各一連志祛皮姜石菖蒲各二

為末蜜丸桐子大辰砂為衣每服三十丸空心煎鹽湯下

靈砂丹 治上盛下虛痰涎壅盛最能鎮壓升降陰陽調和五臟補助元氣

水銀一斤硫黃四兩 二味用新銚內炒成砂子入水火鼎煨煉為末糯米糊丸如麻子大每服三丸空心東湯

米湯人參湯任下忌猪手四菜豆粉冷滑之物

扶神湯 治慾心太熾夢遺心悸

黃連 生地黃各八當歸酒洗甘草四分 水二鐘連子煎八錢食前服 人參 白茯苓各一

口七湯 治七情鬱結痰氣妨悶嘔吐惡心神情不快 水一鐘薑七片紅棗二枚煎八分服

手夏五錢按全錢二分紫蘇葉厚朴九分

青州白丸子 治風痰壅盛癱瘓嘔吐涎沫氣不舒暢悶悶不雷 半夏性七兩南星性二

川烏生半兩去皮臍 為末以生絹袋盛於井花水內揉出滓再研再蒸以盡為度置磁盆中日晒夜露至曉去舊水

別用井水攪又晒至來日早再換新水攪着五日夏三日秋七月冬十日去水晒乾以糯米粉煎粥清丸菜豆大

薑湯下二十九

妙香散 安心神閉精氣 龍骨各一益智仁 人參各一白茯苓祛連志去心伏神去皮木硃砂水飛

龍骨祛益智仁

人參各一白茯苓祛連志去心伏神去皮木硃砂水飛

道精

日一鳥



甘草錢各二 為末每服二錢空心溫酒調服

玉華白丹 清上竇下助養本元最治二便不固夢遺精滑等證 鍾乳粉煉成者

陽起石磁石中瓶令通紅取出酒 左顧牡蠣七錢洗用韭菜搗汁鹽

右四味各研之極細拌和作一處研一二日以糯米粉煮糊為丸如芡實大入地坑出火毒一宿每服一粒空心濃煎人參湯待冷送下不溼不燥可以久服大補真元最祛宿垢婦人無姙者當歸地黃浸酒送下凡服藥後以少少白粥壓之忌猪羊血菜豆粉

正元散 治下元虛臍腹脹痛泄利嘔吐陽虛自汗夢遺精滑手足厥冷一切虛寒 紅豆炒 乾姜炮 陳皮

去白各 茯苓皮去人參 白朮 甘草炙肉桂去粗川烏炮去皮附子炮去山藥薑汁川芎 烏藥 乾葛

各一錢 黃耆炙一兩 右為細末每服三錢水一盞薑三片棗二枚鹽少許煎七分食前溫服

鹿耳益精丸 治心腎虛冷漏精白濁 鹿耳去毛桑螵蛸瓦上肉苁蓉 巴戟法 兔絲子酒杜仲去皮姜

益智仁 禹餘糧醋炙川棟子祛殼當歸各三韭子微炒補骨脂炒赤石脂 山茱萸祛殼龍骨另研各滴乳香

半錢 為末酒煮糯米糊為丸桐子太每服七十丸食前白茯苓煎湯送下

山藥丸 治諸虛百損夢失精滑 赤石脂煨茯神去木山茱萸祛殼熟地黃酒巴戟去心牛膝酒浸

澤瀉各一杜仲祛殼姜 兔絲子酒山藥各三五味子肉茯苓各四右為末蜜丸桐子太每服三錢鹽湯送下

大皂絲子丸見小便 附子炮三川烏頭炮白龍骨補骨脂川棟子 舶土茴香各一兩

固陽丸 右為末酒糊丸桐子太每服五十丸空心酒下

補中益氣湯見虛癆蘇合香丸見真中風

秘真丸 固精安神 龍骨一兩訶子皮五砂仁五錢砂水一兩

右為末麵糊丸菜豆太每服三錢空心酒下

右為末麵糊丸菜豆太每服三錢空心酒下

右為末麵糊丸菜豆太每服三錢空心酒下

右為末麵糊丸菜豆太每服三錢空心酒下

右為末麵糊丸菜豆太每服三錢空心酒下

右為末麵糊丸菜豆太每服三錢空心酒下

金鎖玉關丸 治遺精白濁心虛不安 雞頭肉 蓮子 蓮鬚 藕節 白茯苓 白伏神 乾山藥

為末金櫻子煎膏為丸 梧子大每服三錢 米飲湯下

清心丸 治經絡熱鬱道心降

黃蘗皮一兩 生腦子一錢 同研勻蜜丸 梧子大每服十九 加至十五丸 濃煎麥門冬湯下

赤白濁

經曰思想無窮所願不得意淫於外入房太甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫此已見遺精條矣蓋復取者為濁病

也每見時醫治濁多以淋法治之五苓八正雜投不已而病反增劇不知經論只屬精病也 惡按經文及細致前哲諸論而知濁病即精病非溺病也故患濁者莖中如刀割火灼而溺自清惟其端時有穢物

如瘡之膿如目之眵淋漓不斷與便溺絕不相混大抵由精敗而腐者十之六七由溼熱流注與虛者十之二三其

有赤白之分者何也精者血之所化濁去太多精化不及赤未變白故成赤濁此虛之甚也所以少年天癸未至強

力行房所泄半精半血壯年施泄無度亦多精血雜出則知丹溪以赤屬血白屬氣者未盡然也又以赤為心虛有

熱由思慮而得白為腎虛有寒因嗜欲而得亦非確論總之心動於欲腎傷於色或強忍房事或多服淫方敗精流

溢乃為白濁虛滑者血不及變乃為赤濁揆寒則脈來沉遲無力小便清白並解分清飲八味丸 揆熱則口渴便赤

脈必滑數有力清心蓮子 有胃中溼痰流注蒼白二陳湯 有屬虛癆六味地黃丸 有因伏暑四苓散 加香

參石蓮有稠黏如膠溢痛異常乃精塞竅道香粉散 入味丸或金匱腎氣丸五味龍骨壯陽丸 有因伏暑四苓散 加香

清心飲清心蓮子 如上數端此其大畧若夫五臟之傷六淫之變難以枚舉臨症之頃慎之

脈候 脈大而濡按之無力或微細或沉緊而濡為虛尺脈虛浮急疾者皆難治遲者易治

醫案

歸德郡侯李易齋患白濁服藥數劑無功余診之兩尺大而濡是龍火虛炎精於竅道用牛膝茯苓黃蘗麥門

冬山藥連志細生甘草十劑而安

赤白濁

光祿卿吳伯玉閉精行房時有文字之勞患白濁甚中痛如刀割自服清火疎利之劑不效改服補腎之劑又不效  
商治于余余曰敗精久蓄已足為害况勞心之餘水火不交故難順用也用單解分清飲加茯神遠志肉桂黃連四  
劑即效兼服補中益氣六味地黃丸半月而安後因勞復發但服補中益氣即愈

清心蓮子飲 治心虛有熱小便赤濁

黃芩 麥門冬 地骨皮 車前子 甘草 錢五分 石蓮肉 白茯苓 黃耆 人參 各半 遠志 石菖蒲 各

錢 水二鍾煎一鍾空心溫服發熱加紫胡薄荷

單解分清飲 治真元不固赤白二濁

益智仁 川芎 石菖蒲 烏藥 各一 水一鍾入鹽一捻煎七分食前服 一方加茯

蒼白二陳湯 治濕痰下注為白濁 蒼朮 炒 白朮 炒 各一錢 半夏 二錢 茯苓 二錢 甘草 四

水二鍾薑三片煎一鍾服

四苓散 茯苓 猪苓 白朮 澤瀉 各半 為細末每服三錢空心長流水調服

玄菟丹 治三消渴利神藥 禁止遺濁

鹿茸 酒浸 鹿尾 酒浸 桑寄生 酒浸 沙苑 炒 肉蓯蓉 紫苑 蛇床子 酒浸 黃

鹿茸 鹿尾 桑寄生 沙苑 肉蓯蓉 紫苑 蛇床子 黃 桑寄生 陽起石 附子 炮

酒蒸 糊搜丸 如桐子大 每服五十丸 空心食前米飲下

六味地黃丸 八味地黃丸 補中益氣湯 見虛金匱腎氣丸 凡虛

內補鹿茸丸 補精益氣 善止白淫

鹿茸 鹿尾 桑寄生 沙苑 肉蓯蓉 紫苑 蛇床子 黃 桑寄生 陽起石 附子 炮

官桂 各等 為細末 蜜丸 桐子大 每服三十丸 食前溫 送下

香苓散 五苓散 與辰 山藥 炒 茯苓 炒 白朮 炒 澤瀉 炒 各一錢 黃耆 各一 人參 桔梗 去蘆 甘草 各

五分 辰砂 另研 麝香 另研 指苓 皮 白朮 炒 澤瀉 炒 各一錢 肉桂 二錢 右為末 每服二錢 天麥 二錢 去心煎湯 空心

調服日三服愈。

茯苓丸

治思慮太過。心腎虛傷。真陽不固。弱有餘瀝。小便白濁。夢寐頻泄。

兔絲子酒浸石蓮子去核白茯苓去皮

為細末。酒糊丸。如桐子。每服五十丸。空心鹽湯下。

加味清心散 治心中煩熱。赤濁肥膈。

白茯苓去皮石蓮肉各半益智仁 麥門冬法入參遠志法心石薑蒲 車前子 白朮炒 澤瀉 甘草

一錢 水二鍾。燈心二十莖。煎一鍾。食前服。有熱加薄荷少許。

瑞蓮丸

治思慮傷心。赤白二濁。白茯苓去皮石蓮肉法龍骨用天門冬麥門冬法柏子仁炒紫石英煨

研遠志甘草當歸酒浸酸棗仁炒龍齒各一乳香另研

右為細末。蜜丸。梧子大。每服七十丸。空心溫酒。或棗湯下。

遠志丸

治赤濁如神。遠志入油茯神法益智仁略二 為細末。酒煮麩糊丸。梧子大。每服五十丸。臨卧棗湯下。

鎖經丸 治赤白濁。 補骨脂炒 青鹽各四 白茯苓 五倍子略二

右為細末。酒煮糊為丸。如梧子大。每服三十丸。空心鹽湯下。

水陸二仙丹 治赤白濁。 金櫻子去子及毛熟地大熟成膏各等分

丸。食前溫酒下。一方用乳汁。

以前膏同酒糊為丸。梧子大。每服三十丸。食前溫酒下。

赤脚道人龍骨丸 治白濁。 龍骨 牡蠣各半 研為末。入鯽魚腹內。溼紙裹入火內。炮熟取出。去紙。將藥同

魚肉丸。如桐子大。每服三十丸。空心米飲下。鯽魚不拘大小。只以着盡上件藥為度。更加茯苓。遠志。各半兩。佳。

痰飲稠濁者為痰。清稀者為飲。

經曰。太陰在泉。濕淫所勝。民病飲積。又曰。歲土太過。雨濕流行。甚則飲發。又土鬱之。太陰之復。皆病飲發。愚按

痰之為病。十膏六七。而內經叙痰飲四條。皆因濕土為害。故先哲云。脾為生痰之源。又曰。治痰不理脾胃。非其治也。

痰飲

六鳥文堂

夫飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾，脾氣散精，上歸于肺，通調水道，下輸膀胱，水精四布，五經並行，何痰之有。惟脾土虛濕，清者難升，濁者難降，留中滯高，淤而成痰。故治痰先補脾，脾復健運之常，而痰自化矣。折而言之，痰有五飲，亦有五，而治法因之而變。在脾經者，名曰濕痰，脈緩而實，肢體沉重，嗜卧不收，腹脹食滯，其痰滑而易出。二陳湯白朮丸，祛痰者消暑丸，驚者妙應丸。在肺經者，名曰燥痰，氣痰脈溢而白，氣上喘促，洒淅寒熱，悲愁不樂，其痰澀而難出。肺飲，在肝經者，名曰風痰，脈弦而青，四肢滿悶，便溺秘澀，時有躁怒，其痰青而多泡。風九川羊丸，防在心經者，名曰熱痰，脈洪而赤，煩熱心痛，口乾唇燥，時多喜笑，其痰堅而成塊。小黃丸，在腎經者，名曰寒痰，脈沉而黑，小便急痛，足寒而逆，心多恐怖，其痰有黑點而多稀，胡桂丸，八味丸，其入素感今瘦，水走腸間，漉漉有聲，名曰痰飲，心下冷極，以溫藥和之。桂苓甘肅飲，後水流在脇下，咳吐引痛，名曰懸飲。主東湯，飲水流於四肢，當汗不汗，身體疼，右曰溢飲，飲清龍飲，逆倚息，短氣不得卧，其形如腫，名曰支飲。五苓散，暈暈之膈滿嘔吐，喘欬寒熱，腰背痛，目淚，出其人振振惡寒，身悶揚者，名曰伏飲。培求，更有一種，非痰非飲，時吐白沫，不甚稠粘，此脾虛不能約束津液，故涎沫自出，且用六君子湯，加益智仁以攝之，嗟乎五痰五飲，證各不同，治法向別，稍或不詳，妄投藥劑，非徒無益，而又言之，至如脾肺二家之痰，尤不可混，脾為溼土，喜溫燥而惡寒潤，故二朮星夏為要藥，肺為燥金，喜涼潤而惡溫燥，故二母二冬地黃桔梗為要藥，二者易治，鮮不危固，每見世俗，惡半夏之燥，喜貝母之潤，一見有痰，便以貝母投之，若是脾痰，則土氣益傷，飲食忽減矣，即使肺痰，毋過於涼潤，以傷中州，稍用脾藥，以生肺金，方為善治，故曰治痰不理脾胃，非其治也，信夫。

脈候 經曰：肝脈垂而散，色澤者，當病溢飲。偏弦為飲，浮而滑為飲，沉而滑者，懸飲。飲脈皆弦微沉滑。左右關脈實者，膈上有痰，可吐之。眼胞及眼下如烟煤者，痰也，痰得濡脈難愈。

醫案

刑部王政徐凌如，勞且怒後，神氣昏倦，汗出如浴，語言錯亂，危困之極，迎余療之，診其脈大而滑，且數，此氣虛有痰，也用補中益氣湯為料，併四貼為一劑，用參至一兩，加熟附子一錢，熟半夏三錢，四日而稍甦，更以六君子加姜汁一

鍾服數日。兼進八味丸。調理兩月而康。

郡侯王敬如患痰嗽。輒服清氣化痰丸。漸至氣促不能食。余曰。高年脾土不足。故有是證。若服前丸。則脾土益虛。矣。投以六君子湯。加煨姜三錢。益智一錢。五分。十劑而痰清。更以前方。煉蜜為丸。約服一斤。飲食乃進。

翰林方集虛勞而無度。醉而使內。汗出多痰。服寬膈化痰之藥。轉覺滯悶。診其脈沉而濡。兩尺尤甚。余謂其增楊玄。潤白痰得濡脈。一時難愈。况尺中濡甚。精傷之象也。在法不治。玄潤強之投劑。勉用補中益氣。加半夏茯苓兩劑。有小效。眾皆喜。余曰。清夢不減。脈法無根。死期近矣。果十餘日而歿。

文學朱子誠。道體如虫螫。口舌糜爛。朝起必見二鬼。執盤食以獻。向余慟曰。余年未三十。高堂有垂白之親。二鬼朝暮相侵。決無生理。尚邀如天之力。得以不死。即今日之秦越人矣。余診其寸脈。乍大乍小。意其為鬼祟。細察兩關。弦滑且大。遂斷定為痰飲之病。投濛痰丸三錢。雖微有所下。而痛患如舊。更以小胃丹一錢。與之。復下痰積及水十餘碗。遍體之痛減半。至明早。鬼亦不見矣。更以人參三錢。白朮二錢。煎湯服。小胃丹三錢。大瀉十餘行。約有二十碗。病若矣矣。乃以六君子為丸。服四劑而痊。

白朮丸 治濕痰咳嗽。南星 半夏 俱各一兩 白朮 一兩 五錢

右為細末。湯浸蒸餅為丸。梧子大。每服四錢。食後生薑湯下。

二陳湯 治脾胃不和一切痰證。半夏 湯洗七次 橘紅 各五錢 白茯苓 三兩 炙甘草 一兩 五錢

每服五錢。水二鍾。姜七片。烏梅一枚。煎八分。不拘時熱服。

六君子湯 人參 去蘆 白朮 土炒 茯苓 各一兩 半夏 橘紅 各一錢 炙甘草 五分

水二鍾。姜五片。煎至一鍾。溫服。

理中化痰丸 治虛寒嘔吐泄瀉飲食難化。人參 白朮 炒 茯苓 甘草 乾姜 半夏 等分為末。水丸。桐子大。每服三錢。白湯送下。

八味丸 補中益氣湯 痰飲

痰飲

導痰湯 治痰涎壅盛 痞塞不通

半夏湯洗七兩 南星炮去

枳實去心炒赤茯苓去皮橘紅各一甘草半

每服

四錢 水一鐘 姜十片 煎八分 食後服

保和丸 治食積酒積

山查肉 炮半夏

橘紅 神麴炒麥芽炒白茯苓略一連翹 萊菔子炒黃連各半

為末 清酒為丸 加白朮二兩 名大安丸

消暑丸 中暑為患 藥下即甦 一切暑藥 莫不及此 人所未知

半夏一斤 醋五甘草生用茯苓去皮各

右為末 姜汁煮糊丸 忌見生水 如桐子大 每服五十丸 熱湯送下 有痰生薑湯下 入夏後 不可缺此

妙應丸 一名粒 甘遂法紫大戟白芥子各等

為末 煮糊丸 如桐子大 晒乾臨臥淡薑湯下 七丸至十九丸 氣

竇痰狂 加丸數不妨 加硃砂二錢 全蝎三錢 治驚痰極效

利金湯 治氣壅之痰

桔梗炒貝母各三錢 陳皮去白茯苓各二錢 甘草五分 枳殼麴炒五分 水二鐘 姜五

片 煎一鐘 不拘時服

潤肺飲 新製

貝母糖炒天花粉各三錢 桔梗一錢 甘草五分 麥門冬去心橘紅去白茯苓各一錢 半知母酒炒生地

黃半錢

水二鐘 姜三片 煎七分 食後服

水煎金花丸

南星 半夏俱生用天麻五雄黃二錢 白麵三兩 為細末 滴水為丸 每服五十丸 至百丸 先煮漿水

令沸 下藥 煮至藥浮 為度 漉出 浸漿水 浸 另用生薑湯送下

防風丸 治一切風痰

硃砂半兩 研天麻酒浸甘草炙 防風 川芎各一

右為末 煉蜜丸 硃砂為衣 每服一丸 重一錢 荊芥湯化服

川芎丸 消風化痰 清上利膈 薄荷葉焙川芎各七桔梗十兩 甘草炙三細辛洗五 防風去苗二

為細末 煉蜜丸 每服一丸 重三分 食後臨臥 細茶嚼下

小黃丸 治熱痰咳嗽

南星湯洗半夏洗黃芩各一

為末 姜汁浸 蒸餅為丸 桐子大 每服七十丸 食後生薑湯下

天黃湯 天花粉附黃連耐竹葉湯為丸末且大母服三錢姜湯下

姜桂丸 治寒痰咳嗽

南星 洗 半夏 洗 官桂 各一兩

為末 蒸餅丸 梧子大 每服五十九丸 食後 生薑湯下

胡椒理中丸 治虛寒痰多食少

致冬花 批胡椒 甘草 炙 畢撥 良姜 細辛 法陳皮 白乾姜 各四兩

白末 兩

為末 蜜丸 梧子大 每服三十九丸 加至五十九丸 米飲下 日二服

桂苓末甘湯

茯苓 四錢 桂枝 白朮 各三錢 甘草 二錢

水二鍾 煎一鍾 溫服

十棗湯 見傷小胃丹

神芎導水丸 舟車神祐丸 大聖瀉川丸 腫脹 五苓散 見傷寒 青州白丸子 見遺精

大青龍湯 麻黃 六錢 桂枝 二錢 甘草 炙 二錢 杏仁 去皮 生薑 錢三 大棗 三枚 石膏 二錢

水三鍾 先煮麻黃減一鍾 去上沫 內諸藥 煮取一鍾 服

澤瀉湯 澤瀉 半兩 白朮 兩 水二鍾 煎一鍾 服

倍朮丸 治五飲

白朮 兩 桂心 乾姜 各一兩

為末 蜜丸 每服三十九丸 米飲下

滾痰丸 治一切痰百種怪證

大黃 蒸少 兩 礬石 各八錢 沉香 一兩 礬石 各五錢

為末 水丸 梧子大 白湯空心服三錢 此藥但取痰積

自腸次第而下 並不刮腸大瀉 為痰家聖藥

茯苓丸 治痰滿脇間 兩臂抽痛 如神

半夏 兩 茯苓 兩 枳殼 炒 五錢 朴硝 二錢 五分 以硝散在竹鹽中少時 咸

右為末 生薑汁煮麵糊為丸 桐子大 每服三十九丸 姜湯送下

清氣化痰丸 順氣消食化痰 半夏 南星 法皮 白礬 皂角 乾姜 各四兩

三碗 却入半夏南星浸兩日 再煮至半夏南星無白點 晒乾

蘿蔔子 炒 另青皮 穗紫葳子 炒 橘紅 山查 杏仁 炒 研 高根 神麩 炒 麥蘖 炒 香附 各二兩

右為末 蒸餅丸



桐子大每服七十丸食後茶湯下

詳而補曰有一人素厚味胸滿痰感內多積熱服  
之而愈彼見有秋傷於濕見於二篇一篇岐伯對曰五臟六腑皆令人  
效嗽曰嗽脾受濕有痰有聲無痰曰效修合德送脾胃虛者無不受言

黃帝問曰肺之令人效何也此言嗽而不言嗽者直文也如秋傷於濕見於二篇一篇岐伯對曰五臟六腑皆令人

效非獨肺也皮毛者肺之合也肺主皮毛肺為內應皮毛先受邪氣邪氣以從其合也其寒飲食入胃從肺脈上至

於肺則肺寒肺脈起于中焦下絡大腸上運循胃口上膈肺寒則外內合邪因而先之則為肺效外則皮毛受邪內則

故嗽所謂形寒效五臟各以其時受病非其時各傳以與之腎是也非其時而病者乃長夏脾秋肺冬人與天地相參

故五臟各以其時治時感於寒則受病微則為效甚則為泄為痛證也泄真證也寒在表則身痛寒在裏則腹痛惟

其內外合邪故乘秋則肺先受邪乘春則肝先受之乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬則腎先受之四藏

為病亦無內先受之者則肺效之狀效而喘息有音甚則唾血肺屬金所主惟音聲肺自病故喘息有音唾血者心

效之狀效則心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痹心脈起於中喉痹介介如有所梗妨礙之意肝效之狀效則兩

脇下痛甚則不可以轉轉則兩脇下滿肝脈布膈膈如椶櫚心脈起於中喉痹介介如有所梗妨礙之意肝效之狀效則兩

脇下痛甚則不可以轉轉則兩脇下滿肝脈布膈膈如椶櫚心脈起於中喉痹介介如有所梗妨礙之意肝效之狀效則兩

脇下痛甚則不可以轉轉則兩脇下滿肝脈布膈膈如椶櫚心脈起於中喉痹介介如有所梗妨礙之意肝效之狀效則兩

脇下痛甚則不可以轉轉則兩脇下滿肝脈布膈膈如椶櫚心脈起於中喉痹介介如有所梗妨礙之意肝效之狀效則兩

脇下痛甚則不可以轉轉則兩脇下滿肝脈布膈膈如椶櫚心脈起於中喉痹介介如有所梗妨礙之意肝效之狀效則兩

脇下痛甚則不可以轉轉則兩脇下滿肝脈布膈膈如椶櫚心脈起於中喉痹介介如有所梗妨礙之意肝效之狀效則兩

脇下痛甚則不可以轉轉則兩脇下滿肝脈布膈膈如椶櫚心脈起於中喉痹介介如有所梗妨礙之意肝效之狀效則兩

脇下痛甚則不可以轉轉則兩脇下滿肝脈布膈膈如椶櫚心脈起於中喉痹介介如有所梗妨礙之意肝效之狀效則兩

逆也此總結諸效之證也且諸效皆聚于胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣